FieldShift
SATELLITE DATA · FIELD DECISIOI

স্মার্ট ফসল আবর্তন ও সেচ পরামর্শ কার্ড

তারিখ: ১১ নভেম্বর, ২০২৬
কৌশল: ভারসাম্যপূর্ণ বহু-উদ্দেশ্যমূলক আবর্তন

জমির নাম:	জেলা / অঞ্চল:	জমির আয়তন:	প্রত্যাশিত মোট মুনাফা:
রহিম মিয়ার জমি	**চাঁপাইনবাবগঞ্জ (বরেন্দ্র)**	**৫.০ বিঘা (০.৬৭ হেক্টর)**	**১৭৫,১০০ টাকা**

প্রস্তাবিত ৬-মৌসুম ফসল আবর্তন ও সেচ পরিকল্পনা

১ম বছর রবি	১ম বছর খরিপ-১	১ম বছর খরিপ-২	২য় বছর রবি	২য় বছর খরিপ-১	২য় বছর খরিপ-২
সরিষা	**সয়াবিন**	**আমন ধান**	**ছোলা**	**তিল**	**আমন ধান**
০ মিমি	০ মিমি	০ মিমি	০ মিমি	০ মিমি	০ মিমি

মৌসুম	বাছাইকৃত ফসল	সেচ চাহিদা	সেচের পানি (লিটার)	বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা
১ম বছর রবি	**সরিষা**	০ মিমি	০ লিটার	🌿 কম পানি সহনশীল
১ম বছর খরিপ-১	**সয়াবিন**	০ মিমি	০ লিটার	🌿 কম পানি সহনশীল
১ম বছর খরিপ-২	**আমন ধান**	০ মিমি	০ লিটার	🌿 কম পানি সহনশীল
২য় বছর রবি	**ছোলা**	০ মিমি	০ লিটার	🫘 নাইট্রোজেন সংবন্ধন
২য় বছর খরিপ-১	**তিল**	০ মিমি	০ লিটার	🌿 কম পানি সহনশীল
২য় বছর খরিপ-২	**আমন ধান**	০ মিমি	০ লিটার	🌿 কম পানি সহনশীল

প্রধান ৩টি জলবায়ু ঝুঁকি ও মাঠের করণীয়

⚠ খরা ঝুঁকি — মাঝারি

করণীয়: 24 বছরের মধ্যে 8 বছর সংবেদনশীল পর্যায়ে ≥১৫ দিন শুকনো (বৃষ্টি <২ মিমি) · ≥৭ দিন শুকনো: 22 বছর

⚠ অতিবৃষ্টি ঝুঁকি — কম

করণীয়: জুলাই–সেপ্টেম্বরে বছরে গড়ে 1.6 দিন অতিবৃষ্টি (>৫০ মিমি)

⚠ তাপপ্রবাহ ঝুঁকি — উচ্চ

করণীয়: ফসল ফোটার মৌসুমে বছরে গড়ে 67.0 দিন তাপমাত্রা >৩৫°C

উপাত্ত সূত্র: NASA POWER · GPM IMERG · GRACE-FO · ISRIC SoilGrids · FAO-56 AWD Model