

Pregunta ⑧

II Parte

$$A = \{x / x \in \mathbb{N}, x \text{ primo}, x < 11\}$$

$$\Rightarrow A = \{2, 3, 5, 7\}$$

$$B = \{x / x \in \mathbb{N}, x = 2a + 1, a \in \mathbb{N}, 1 < a < 5\}$$

$$\Rightarrow a \text{ puede ser } 2, 3, 4$$

$$\therefore x(a) = 2a + 1$$

$$x(2) = 2 \cdot 2 + 1 = 5$$

$$x(3) = 2 \cdot 3 + 1 = 7$$

$$x(4) = 2 \cdot 4 + 1 = 9$$

$$B = \{5, 7, 9\}$$

$$D = \{2, 3, 4, 5\}$$

Universo:

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$\text{Resolver: } (A \oplus D)^c \setminus [(B \cup D) \cap A]$$

$$\Rightarrow A \oplus D = \{4, 7\}$$


$$\Rightarrow (A \oplus D)^c = \{1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10\}$$

$$\Rightarrow (B \cup D) = \{2, 3, 4, 5, 7, 9\}$$

$$\Rightarrow (B \cup D) \cap A = \{2, 3, 5, 7\}$$

Nombre: José Daniel Rodríguez Sánchez

Cédula: 1-1172-0707

Firma: 

Pregunta ⑧

II Parte

$$\begin{aligned} & (A \oplus D)^c \setminus [(B \cup D) \cap A] = \\ & = \{1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10\} \setminus \{2, 3, 5, 7\} \\ & = \{1, 6, 8, 9, 10\} \end{aligned}$$

Nombre: José Daniel Rodríguez Sánchez  
Cédula: 1-1172-0707

Firma: 