

PERROS

DESPARASITAR 2 0 3 VECES*

VACUNA SEXTUPLE Y RABIA

SEXTUPLE: PARVOVIRUS - MOQUILLO - ADENOVIRUS I Y II
PARAINFLUENZA - LEPTOSPIRA

GATOS

DESPARASITAR 2 0 3 VECES*

VACUNA TRIPLE FELINA Y RABIA

EN BASE AL CRITERIO VETERINARIO, LA CARGA AMBIENTAL Y EL RIESGO DE CONTAGIO





EDAD	DESPARASITACIÓN	VACUNA
15	X	
30	X	
45 (1 MES Y MEDIO)	X	QUINTUPLE
60 (2 MESES)	X	QUINTUPLE (REFUERZO)
81 (2 MESES Y 21 I	DÍAS) X	SEXTUPLE
102 (3 MESES Y 12	DÍAS) X	SEXTUPLE (REFUERZO)
123 (4 MESES Y 3 D	DÍAS)	RABIA

QUINTUPLE: PARVOVIRUS - MOQUILLO - ADENOVIRUS I Y II - PARAINFLUENZA SEXTUPLE: PARVOVIRUS - MOQUILLO - ADENOVIRUS I Y II - PARAINFLUENZA-LEPTOPIRA



Callejeritos



EDAD	DESPARASITACIÓN	VACUNA	
15	X		
35	X		
55	X		
60 (2 MESES)		TRIPLE FELINA*	
75	X		
81 (2 MESES Y 21	DÍAS)	TRIPLE FELINA	
95	X		
102 (3 MESES Y 2	l DÍAS)	REFUERZO TRIPLE FELINA	
115 (3 MESES Y 25	5 DÍAS) X	RABIA	
135	X		
*COMPLEJO RESPIRATORIO SUPERIOR FELINO, PANLEUCOPENIA.			

*COMPLEJO RESPIRATORIO SUPERIOR FELINO, PANLEUCOPENIA.

DESPARASITACIÓN: LUEGO DE LOS 4 MESES Y MEDIO, 3 O 4 DESPARASITACIONES ANUALES SEGÚN CARGA AMBIENTAL O EXPOSICIÓN A ZONAS DE RIESGO.

REVACUNACIONES ANUALES DE TRIPLE VIRICA Y RABIA.