

# Regla Trapezoidal

Martínez Navallez Daniel Isac

Octubre 2018

## 1 Introducción

En este artículo se verá la regla de cuadratura como un método para aproximar integrales definidas, por lo que es muy utilizado en análisis numérico.

El método del trapecioide tiene registro desde el año 50 a.C. en Babilonia como método para calcular la velocidad de Jupiter a lo largo de su eclíptica.

Por último se presentara un código en FORTRAN para el cálculo de la integral definida de cierta función utilizando el método del trapecioide.

## 2 Regla Trapezoidal

Utilizada para calcular integrales definidas:

$$\int_a^b f(x)dx$$

Con lo que se quiere calcular la región (área) que se encuentra debajo de una función indicada de la siguiente manera:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{\Delta x}{2}(f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + 2f(x_3) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + 2f(x_n))$$

donde:

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} \text{ y } x_i = a + i\Delta x$$

Para poder obtener una mejor aproximación a nuestra integral definida, es conveniente dividir el intervalo de integración de tal manera que se le aplique la regla del trapecio a cada subintervalo y sumar los resultados.




Figure 1: Figura 1

Tendremos que  $x_k$  pertenece al intervalo  $[a, b]$

dado que  $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{N-1} < x_N = b$  y  $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$

Entonces:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=1}^N \frac{f(x_{k-1}) + f(x_k)}{2} \Delta x_k$$

el método anterior se utiliza para los casos de rejilla no uniforme, en los casos de rejilla uniforme queda de la siguiente forma:

$$\Delta x_k = \Delta x = \frac{b-a}{N}$$

Para que la aproximación a la integral quede así:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &\approx \frac{\Delta x}{2} \sum_{k=1}^N (f(x_{k-1}) + f(x_k)) \\ &= \frac{\Delta x}{2} (f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + 2f(x_3) + \cdots + 2f(x_{N-1}) + 2f(x_N)) \\ &= \frac{\Delta x}{2} \left( f(x_0) + 2 \sum_{k=1}^{N-1} f(x_k) + f(x_N) \right) \end{aligned}$$

Para este caso se requiere un menor número de evaluaciones de la función a calcular.

### 3 Código en FORTRAN

```
PROGRAM TRAPEZOIDE

  IMPLICIT NONE
  REAL :: a,b

  PRINT*, "[a,b]"
  READ*,a,b

  call trapezoid_integration(a,b)

contains

  subroutine trapezoid_integration(a,b)
    IMPLICIT NONE
    REAL :: a,b
    REAL :: integral,u,h,error,integralo, T
    INTEGER :: i,n

    integral = 0.0
    n=10
    error=2.0
    integralo=0.0

    DO WHILE(error>1.0)

      DO i=0,n
        u = a + ((b-a)*float(i)/float(n))

        IF ((i.eq.0).or.(i.eq.n)) then
          integral = integral+integrand(u)
        ELSE
          integral = integral+(2.0*integrand(u))
        END IF
      END DO

      error=abs(integral-integralo)/integralo
```

```

        integralo=integral

        n=n*2
    END DO

    h=(b-a)/(n)

    T=integral*(h/2.0)

    PRINT*, "error=", error
    WRITE(*,*) "Integral=", T
end subroutine trapezoid_integration

function integrand(x) result (value)
    IMPLICIT NONE
    REAL :: x
    REAL :: value

    IF (x .lt. 0.00001) THEN
        x = 0.00001
    END IF

    value = (x**4)*EXP(X)/((EXP(X)-1.0)**2)
end function integrand

END PROGRAM TRAPEZOIDE

```

## 4 Conclusion

Se mostró uno método numérico para calcular la integral definida por medio de aproximaciones, muy útil al momento de aplicarla con funciones que no son integrables directamente; por supuesto que en el área de la programación resulta también de mucha utilidad ya que el cálculo requiere de muchas evaluaciones para que el resultado sea tan aproximado como se requiera y reduciendo el tiempo que se tarda en llegar a éste.

## References