


Tsunami



Shallow-water equation


$$\begin{aligned}\partial_t^2 P &= \nabla \cdot (v^2 \nabla P) \\ &= \partial_x v^2 \partial_x P + \partial_y v^2 \partial_y P + v^2 (\partial_x^2 P + \partial_y^2 P) && \text{[general form]} \\ &= v^2 (\partial_x^2 P + \partial_y^2 P) && \text{[homogeneous form]}\end{aligned}$$

$P = P(x, y, t)$: height of tsunami waves above sea level

$v = \sqrt{gH(x, y)}$: wave speed

gravity acceleration

ocean depth



Shallow-water equation


FD discretization

2nd order time & space schemes:

$$\begin{aligned}\partial_t^2 P_{i,j}^n &\approx \frac{P_{i,j}^{n+1} - 2P_{i,j}^n + P_{i,j}^{n-1}}{\Delta t^2} \\ \partial_x^2 P_{i,j}^n &\approx \frac{P_{i+1,j}^n - 2P_{i,j}^n + P_{i-1,j}^n}{\Delta x^2} \\ \partial_y^2 P_{i,j}^n &\approx \frac{P_{i,j+1}^n - 2P_{i,j}^n + P_{i,j-1}^n}{\Delta y^2}\end{aligned}$$

2nd order time & 4th order space schemes:

$$\begin{aligned}\partial_t^2 P_{i,j}^n &\approx \frac{P_{i,j}^{n+1} - 2P_{i,j}^n + P_{i,j}^{n-1}}{\Delta t^2} \\ \partial_x^2 P_{i,j}^n &\approx \frac{-\frac{1}{12}P_{i+2,j}^n + \frac{4}{3}P_{i+1,j}^n - \frac{5}{2}P_{i,j}^n + \frac{4}{3}P_{i-1,j}^n - \frac{1}{12}P_{i-2,j}^n}{\Delta x^2} \\ \partial_y^2 P_{i,j}^n &\approx \frac{-\frac{1}{12}P_{i,j+2}^n + \frac{4}{3}P_{i,j+1}^n - \frac{5}{2}P_{i,j}^n + \frac{4}{3}P_{i,j-1}^n - \frac{1}{12}P_{i,j-2}^n}{\Delta y^2}\end{aligned}$$



Shallow-water equation

FD discretization

4th order space scheme:

$$P_{i+1} = P_i + \Delta x P'_i + \frac{1}{2}(\Delta x)^2 P''_i + \frac{1}{6}(\Delta x)^3 P'''_i + \frac{1}{24}(\Delta x)^4 P''''_i + \frac{1}{120}(\Delta x)^5 P'''''_i + O[(\Delta x)^6]$$


$$P_{i-1} = P_i - \Delta x P'_i + \frac{1}{2}(\Delta x)^2 P''_i - \frac{1}{6}(\Delta x)^3 P'''_i + \frac{1}{24}(\Delta x)^4 P''''_i - \frac{1}{120}(\Delta x)^5 P'''''_i + O[(\Delta x)^6]$$

$$P_{i+2} = P_i + 2\Delta x P'_i + \frac{1}{2}(2\Delta x)^2 P''_i + \frac{1}{6}(2\Delta x)^3 P'''_i + \frac{1}{24}(2\Delta x)^4 P''''_i + \frac{1}{120}(2\Delta x)^5 P'''''_i + O[(\Delta x)^6]$$

$$P_{i-2} = P_i - 2\Delta x P'_i + \frac{1}{2}(2\Delta x)^2 P''_i - \frac{1}{6}(2\Delta x)^3 P'''_i + \frac{1}{24}(2\Delta x)^4 P''''_i - \frac{1}{120}(2\Delta x)^5 P'''''_i + O[(\Delta x)^6]$$

$$\rightarrow 16(P_{i+1} + P_{i-1}) - (P_{i+2} + P_{i-2}) = 30P_i + (16 - 1 * 4)(\Delta x)^2 P''_i + O[(\Delta x)^6]$$

$$\rightarrow P''_i = \frac{-P_{i+2} + 16P_{i+1} - 30P_i + 16P_{i-1} - P_{i-2}}{12(\Delta x)^2} + O[(\Delta x)^4]$$




Tsunami




Countries most affected

Model setup:
2004 Mw 9.2 Sumatra earthquake

Below seafloor earthquake
(30 km beneath sea level)
⇒ Strong vertical displacement
⇒ Tsunami



Tsunami




Source: point source,
distributed on 9 points of the grid


Dirichlet boundary conditions:

$$P(x,y) = 0$$

seafloor: $H(x,y)$
(bathy.out)



Tsunami



FD discretization

$$P_{i,j}^n \equiv P(x = i \times \Delta x, y = j \times \Delta y, t = n \times dt)$$

Consider

$$\Delta x = \Delta y = 10$$


$$dt = 10$$

$$nx = 1000 \text{ km}$$


$$ny = 800 \text{ km}$$

$$nt = 3000$$

$$v_{max} = 0.2956 \text{ km/s}$$




Tsunami



Solver: C-code class_tsunami.c

Input file: bathy.out => $H(x,y)$

Output file: slices.out => $P(x,y,t)$
every 100 time steps



Tsunami

