COVID-19 MÉXICO Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Domingo 15 noviembre, 2020







Avance de estrategia

Noviembre, 2020

	dom	Iun	mar	mie	jue	vie	sab		dom	Iun	mar	mie	jue	vie	s
marzo	1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	
	8	9	10	11	12	13	14	0	5	6	7	8	9	10	
	15	16	17	18	19	20	21	julio	12	13	14	15	16	17	1
	22	23	24	25	26	27	28		19	20	21	22	23	24	
	29	30	31	1	2	3	4		26	27	28	29	30	31	
	dom	Iun	mar	mie	jue	vie	sab		dom	Iun	mar	mie	jue	vie	Si
abril	29	30	31	1	2	3	4		26						
	5	6	7	8	9	10	11	2	2	3	4	5	6	7	-
	12	13	14	15	16	17	18	OSI	9	10	11	12	13	14	1
	19	20	21	22	23	24	25	agosto	16	17	18	19	20	21	2
	26	27	28	29	30	1	2	10	23	24	25	26	27	28	2
0									30	31					
	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab				_				
	26	27	28	29	30	1	2	4	dom	Iun	mar	mie	jue	vie	s
	3	4	5	6	7	8	9	or e	30		1	2	3	4	
ě	10	n	12	13	14	15	16	본	6	7	8	9	10	11	1
mayo	17	18	19	20	21	22	23	<u>•</u>	13	14	15	16	17	18	1
	24	25	26	27	28	29	30	septiembre	20	21	22	23	24	25	2
	31	1	2	3	4	5	6	Se	27	28	29	30			
	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab		dom	lun	mar	mie	jue	vie	s
junio		1	2	3	4	5	6	d)	-1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	10	11	12	13	20	8	9	10	11	12	13	1
	14	15	16	17	18	19	20	octubre	15	16	17	18	19	20	:
			23	24	25	26	27	ರ	22	23	24	25	26	27	- 2
-	21	22	23	2.4											

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	7	2	3	4	5

Fase 3

169 Nueva Normalidad 256
Conferencias vespertinas







COVID-19 México



15 noviembre, 2020

Semáforo de riesgo epidémico











Componente técnico


Información diaria

FASE 3 Domingo 15 de noviembre, 2020



COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos





COVID-19 México: casos incidentes estimados y personas recuperadas por semana






15 noviembre, 2020

1,166,165 Casos estimados

47,099 (4%) Casos activos estimados

750,190


Personas recuperadas




Semana epidemiológica

COVID-19 México: defunciones confirmadas y sospechosas por semana epidemiológica de ocurrencia









Semana epidemiológica de defunción

Defunciones confirmadas

10,685

Defunciones sospechosas sin muestra

Defunciones sospechosas con posibilidad de resultado


4,322

Defunciones sospechosas sin posibilidad de resultado

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general








COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador







Componente temático

Día mundial sin alcohol

FASE 3 Domingo 15 de noviembre, 2020



El alcohol es un factor de desigualdad



15 noviembre, 2020

- Los daños a la salud provocados por el alcohol son mayores en las familias más pobres.
- El alcohol es responsable del 7.2% de todas las muertes prematuras.
- De las muertes atribuibles al alcohol:
 - 29% lesiones.
 - 21% enfermedades del sistema digestivo.
 - 19% enfermedades cardiovasculares.
 - 12.9% enfermedades infecciosas.
 - 12.6% cáncer.

El consumo de alcohol es un **obstáculo** para alcanzar los **Objetivos de Desarrollo Sostenible**



Agenda 5 x 5



15 noviembre, 2020

El alcohol se encuentra dentro de los cinco principales **factores de riesgo**, que concentran más del 50% de la carga de enfermedad mundial.





15 noviembre, 2020

Alcohol y COVID-19 en América Latina

- Posible disminución de la ingesta de alcohol en jóvenes durante la pandemia.
- El confinamiento, la crisis económica, la pérdida de vidas parece afectar más a personas en edad productiva.

Nivel estrés, el consumo de alcohol y el malestar emocional quizás ya representaban un problema.

Los episodios de consumo excesivo de alcohol se incrementaron en los hombres entre los 30 y 40 años de edad durante el confinamiento.*







15 noviembre, 2020

Identificar señales que pudieran sugerir problemas de consumo nocivo de alcohol, como:

- Consumir cantidades mayores de alcohol a las acostumbradas.
- Consumir en horarios distintos a los usuales.
- Beber a escondidas o "en secreto".
- Cambios marcados de humor.
- Aumento de la irritabilidad.
- Falta de cuidado personal.







- Durante los primeros meses de la epidemia en México se encontró* que:
 - 12% de la población aumentó su consumo de alcohol,
 - 39% disminuyó y,
 - 48% informó sin cambios en su consumo.
- Aumento en la frecuencia de la ingesta diaria de alcohol durante el confinamiento, particularmente entre mujeres.**
- En la CDMX aumento del 35.8% del consumo de alcohol durante la pandemia.***



Alcohol y COVID-19 en México



- Durante la Jornada Nacional de Sana
 Distancia, 21 estados aprobaron "leyes secas" totales o parciales:
 - 4 entidades, todo el estado.
 - o 17 entidades solo a nivel municipal.
- Durante el mes de mayo se redujo hasta en 40% los ingresos hospitalarios atribuibles al consumo de alcohol.*
- Incremento de los casos de envenenamiento accidental por consumo de alcohol adulterado.*



Retos para el control de las bebidas alcohólicasen México post COVID

SALUD SECRETARIA DE SALUD

- Homologación del marco jurídico nacional:
 - 1. Punto de corte para alcoholimetría.
 - Estandarización en horarios y sitios de venta autorizados.
 - 3. Estandarización para requisitos de las licencias para la venta de bebidas alcohólicas (incluir internet).
 - 4. Advertencias gráficas en el etiquetado de las bebidas con contenido de alcohol.
 - 5. Restringir la publicidad.
- Modernización de impuestos que pagan las bebidas alcohólicas.



Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones



Día Nacional Contra el Uso Nocivo de Alcohol -Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-19



15 noviembre, 2020



La prevención y control del consumo de tabaco y alcohol son elementos fundamentales en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México


44,612 hogares en todo del país

Consumo de alcohol en adolescentes en México 2018-2019




15 noviembre, 2020

Consumo Actual



- Población → **10 y 19** años
- Prevalencia global de consumo anual → 38%
- Razón de Consumo Hombre:Mujer →
 0.74

Consumo Excesivo




Consumo Excesivo de Alcohol → **Número de copaspor cada ocasión**

Consumo de alcohol en adultos en México 2018-2019




15 noviembre, 2020



- Prevalencia de consumo anual en hombres → **94.3**%
- Prevalencia de consumo anual en mujeres → 93.7%
- Razón de Consumo Hombre:Mujer → 1





Consumo Excesivo de Alcohol → Número de copas por cada ocasión

Prevalencia de depresión en adolescentes en México 2018-2019








- El 11% de los adolescentes presentan sintomatología depresiva
- Mayor en los adolescentes de 15 a 19 años (13%)
- El 4% de los adolescentes cuenta con diagnóstico de depresión
- El 46% de los adolescentes con diagnóstico médico ha recibido algún tratamiento

Prevalencia de depresión en adultos en México 2018-2019









Modelo mexicano de prevención



15 noviembre, 2020

OFERTA

SSPC, SEDENA y SEMAR, con el apoyo territorial de la Guardia Nacional, **trabajan para reducir la oferta** de sustancias psicoactivas.

DEMANDA

La presente estrategia
propone mitigar el impacto
de los determinantes
biopsicosociales para
reducir la demanda de
sustancias psicoactivas

Determinantes Biopsicosociales de la Demanda



15 noviembre, 2020

Socioeconómicos

Pedagógicos

Vida Saludable

Narrativa

PROGRAMAS →
trabajar en los
DETERMINANTES
BIOPSICOSOCIALES
del consumo de
sustancias


PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE FACTORES DE RIESGO

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

Coordinación intersectorial



15 noviembre, 2020



ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES