

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Martes 1º diciembre, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia

noviembre, 2020

Fase 3

185
Nueva
Normalidad

272
Conferencias
vespertinas

marzo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

abril

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

mayo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

junio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

julio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

agosto

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

septiembre

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3

octubre

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

noviembre

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
29	30	 Todos sin violencia	 2	 3	 4	 5
 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12
 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19
 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26
 27	 28	 29	 30	 31	1	2

16 **DÍAS DE ACTIVISMO**
CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES

**La violencia sexual es un
factor de riesgo para la
transmisión del VIH.***

* ONUSIDA, "Unidos contra la violencia y el VIH", marzo de 2014.

Día 7/16



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

1 diciembre, 2020



1 de diciembre

Día de la Persona Química



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

1º diciembre, 2020



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Componente técnico

Información diaria

FASE 3 Martes 1º diciembre, 2020


SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos

Escenario nacional



Fase 3

1º diciembre, 2020

2,892,449

Personas notificadas

45%

Positividad SE 47

1,369,285

Negativos

200,618

Sosp. sin muestra

52,347

Sosp. con posibilidad de resultado

1,122,362

Confirmados

147,837


Sosp. sin posibilidad de resultado

106,765

Defunciones confirmadas

COVID-19 México: casos incidentes estimados y personas recuperadas por semana

Escenario nacional



Fase 3

1º diciembre, 2020

1,300,128

Casos estimados

63,927 (5%)


Casos activos
estimados

829,817

Personas recuperadas

COVID-19 México: defunciones confirmadas y sospechosas por semana epidemiológica de ocurrencia

Escenario nacional



Fase 3

1º diciembre, 2020

5,377

SE 28: Máximo de defunciones

3,045

Defunciones ocurridas en SE 47

-43% ↓

106,765

Defunciones confirmadas

10,794

Defunciones sospechosas sin muestra

590

Defunciones sospechosas con posibilidad de resultado


4,542

Defunciones sospechosas sin posibilidad de resultado

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

Fase 3

1º diciembre, 2020




FUENTE: RED IRAG, acumulado del 30 de noviembre, 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

Fase 3

1º diciembre, 2020



Política Nacional de Vacunación COVID

- Grupo asesor de vacunas
- Principios rectores
 - Promoción del bienestar humano, respeto igualitario, equidad global, equidad nacional, reciprocidad y legitimidad
- Esquema de priorización
- Estrategia de distribución y aplicación
- Farmacovigilancia y efectividad
- Estrategia de comunicación




GOBIERNO DE
MÉXICO

POLÍTICA NACIONAL DE
VACUNACIÓN CONTRA EL
VIRUS SARS-CoV-2, PARA LA
PREVENCIÓN DE LA COVID-19
EN MÉXICO

Versión 2.0

17 de noviembre de 2020



Componente técnico adicional

Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

FASE 3 Martes 1º diciembre, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 Temático: Día mundial del sida




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Seguimiento de las metas mundiales, México

Fase 3

1º diciembre, 2020

Una vez que las personas viviendo con VIH inician tratamiento antirretroviral, se tiene un alto porcentaje de éxito en el control de la infección



COVID-19 Temático: Día Mundial del sida



CONASIDA
CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN
Y EL CONTROL DEL SIDA




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Incidencia de VIH en México

Fase 3

1º diciembre, 2020

Estimación de nuevas infecciones
de VIH por grupos de edad: 2019



Se estiman:

- **12 mil nuevas infecciones** por VIH en el último año.
- **Diariamente, 33 personas** adquieren VIH.
- Reducción de 14%, en el número de nuevas infecciones de 2010 a 2019.

**42% de las nuevas
infecciones se presentan
en personas entre los 15 y
los 29 años.**

COVID-19 Temático: Día Mundial del sida



CONASIDA
CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN
Y EL CONTROL DEL SIDA




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Existen municipios en nuestro país con una mayor frecuencia de casos nuevos

Fase 3

1º diciembre, 2020



72% de los municipios con mayor número de nuevos casos se encuentran en la región del sureste del país.

COVID-19 Temático: Día Mundial del sida



CONASIDA
CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN
Y EL CONTROL DEL SIDA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Atención integral

Prevención

Condomes y lubricantes

Profilaxis pre y posexposición

Vacunas: hepatitis B

Reducción de daños

Detección

Consejería

Pruebas rápidas

Diagnóstico de otras ITS

Acciones focalizadas a poblaciones clave

Vinculación/ Atención

Referencia a instituciones

Optimización de tratamiento antirretroviral

Atención de comorbilidades

Vacunas

Retención

Consejería para la adherencia

Salud mental

Prevención de comorbilidades

Eliminación de la co-infección VIH-hepatitis C

Tomar en cuenta el curso de vida, identidad sexo-genérica, región de residencia, libres de estigma y discriminación

Fase 3

1º diciembre, 2020



Optimización de tratamiento

Fase 3

1º diciembre, 2020

ESQUEMAS ANTERIORES



DISMINUYE LA CARGA VIRAL



VARIAS TOMAS



POSIBLES MOLESTIAS



MAYOR POSIBILIDAD DE QUE
EL VIRUS GENERE RESISTENCIA
AL MEDICAMENTO

NUEVOS ESQUEMAS



DISMINUYE LA CARGA VIRAL



MENOS TOMAS



ES MENOS PROBABLE QUE SE
GENEREN MOLESTIAS



ES MENOS PROBABLE
QUE EL VIRUS GENERE RESISTENCIA
AL MEDICAMENTO



COVID-19 Temático: Día Mundial del sida

Discriminación a personas con VIH

Fase 3

1º diciembre, 2020

- ✓ En México, **3 de cada 10 personas** que viven con VIH se han abstenido de usar servicios de salud durante la pandemia de la COVID-19 por **temor a sufrir discriminación**.
- ✓ La **discriminación es una barrera** para tratamiento de VIH y pone en riesgo de complicaciones por la COVID-19.

Las personas que viven con **VIH** deben acceder de manera oportuna a su tratamiento, para evitar complicaciones graves, incluso la muerte, en caso de contagio por la **COVID-19**



Tres de cada diez personas con VIH dejaron de usar servicios de salud por temor a sufrir discriminación

Prevenir el estigma y la discriminación es responsabilidad de todas y todos

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

gob.mx/censida

COVID-19 Temático: Día Mundial del sida



CONASIDA
CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN
Y EL CONTROL DEL SIDA




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Acciones realizadas para la protección de personas con VIH ante la COVID-19

Fase 3

1º diciembre, 2020





Difusión de información para personas con VIH frente a la pandemia del COVID-19

Fase 3

1º diciembre, 2020

Información para personas con VIH frente a la pandemia del COVID-19

¿Sexo en tiempos de COVID-19?

¿Qué hacer para cuidar mi salud mental?

¿Si estoy embarazada y vivo con VIH tengo más riesgos por el COVID-19?

Derechos humanos en tiempos de COVID-19



COVID-19 Temático: Día Mundial del sida



CONASIDA
CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN
Y EL CONTROL DEL SIDA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Mujeres viviendo con VIH

- A nivel mundial, las mujeres y las niñas representaron **48%** del total de nuevas infecciones por VIH.
- **1 de cada 5** personas viviendo con VIH en México son mujeres.
- **8 de cada 10** mujeres viviendo con VIH la adquieren a través de una **pareja estable**.



Fase 3

1º diciembre, 2020

Prevención de la transmisión vertical

Fase 3

1º diciembre, 2020

El tratamiento reduce en 95% el riesgo de transmisión de VIH en el embarazo.

Durante la pandemia por la COVID-19 ha disminuido el número de mujeres que acuden a control de embarazo y se aplican pruebas.



Las pruebas de VIH y sífilis debe aplicarse en **TODAS** las mujeres embarazadas.

El diagnóstico y el tratamiento protegen la salud de tú bebé y la tuya.

COVID-19 Temático: Día Mundial del sida



CONASIDA
CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN
Y EL CONTROL DEL SIDA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

¿Quiénes deben hacerse la prueba de VIH?

Fase 3

1º diciembre, 2020

El diagnóstico temprano y el inicio oportuno de tratamiento garantiza la calidad de vida.



TODAS las personas que tengan vida sexual activa al menos una vez al año.



Mujeres embarazadas en el primer y tercer trimestre del embarazo.



Personas con más de una pareja sexual y usuarias de drogas inyectables cada 6 meses.



COVID-19 Temático: Día Mundial del sida

La respuesta contra el VIH es responsabilidad compartida:

Fase 3

1º diciembre, 2020



- Combatamos la discriminación hacia las personas que viven con VIH.
- Hagámonos la prueba para proteger mi salud y la de las otras personas.
- Si vives con VIH ¡no abandones tu tratamiento!
- Recuerda aplicarte la vacuna contra influenza.

Si tienes dudas o problemas con tu tratamiento, escríbenos a:

vih_covid-19@salud.gob.mx