Facteurs associés aux troubles psychiatriques du post-partum chez les accouchées, Clinique Universitaire de Gynécologie-Obstétrique, Cotonou, 2025

Mongbo Virginie[1], Ezin N. B. Vénérose[1], Codjo-Seignon Karine[2], Sopoh Ghislain[2], Ouendo Edgard-Marius[1]

1 : Institut Régional de Santé Publique de Ouidah, Département "Politiques et Systèmes de Santé "

2 : Institut Régional de Santé Publique de Ouidah, Département " Santé et Environnement"

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthodes
- Résultats
- Conclusion

Introduction

Troubles psychiatriques du post-partum (TPPP) : atteintes mentales liées à la période allant de l'accouchement au retour de couches

- Dépression post-partum (DPP) : 1,9 - 82,1% vs 5,2 - 74% (Norhayati *et al*., 2015)
- Anxiété post-partum : 15% (Dennis et *al*., 2017)

Introduction

- Conséquences : altération du lien mère-enfant, retard de développement de l'enfant, suicide maternel, infanticide

Plan d'action OMS santé mentale : soins postnatals intégrant aspects physique et mental

- CUGO: prise en charge pluridisciplinaire des cas avec la CUSM
- Absence de suivi systématique
- TPPP peu investigués au Bénin

Objectifs

1. Estimer la prévalence des troubles psychiatriques du post-partum chez les accouchées de la Clinique Universitaire de Gynécologie-Obstétrique (CUGO) en 2025

2. Identifier les facteurs associés aux troubles psychiatriques du post-partum chez les accouchées de la Clinique Universitaire de Gynécologie-Obstétrique (CUGO) en 2025

Matériel et méthodes

- **Cadre d'étude :** CUGO/CNHU-HKM, hôpital de première référence du Bénin
- **Type d'étude :** Etude transversale, analytique
- **Période d'étude** : mars - avril 2025
- **Population cible :** Accouchées de la CUGO
  - Avoir accouché dans les six dernières semaines avant la collecte
  - Donner son consentement libre et éclairé

Matériel et méthodes

- **Taille d'échantillon:** formule de Schwartz : 250
- **Méthode et technique :** Commodité

- **Variables d'étude**
  - ***Variable dépendante*** : TPPP, définis par *l'échelle de dépression post-natale de Edimbourg* (10 questions; 0 – 30 points)
  - ***Variables indépendantes*** : facteurs liés à la femme, l'accouchement, au nouveau-né, l'environnement familial et au système de santé

Matériel et méthodes

- **Technique et outil de collecte :** Enquête par questionnaire
- **Analyse des données**
  - Logiciel Stata 14
  - Descriptive
  - Analytique : seuil, 5%

    Bivariée

    Multivariée : Régression logistique multiple, pas à pas descendante

Résultats

- Echantillon : 264 accouchées
- Caractéristiques
  - Age : 33 ± 6,23 ans
  - Niveau d'instruction : non scolarisée → 37,12%
  - Religion : Chrétienne → 79,17%
  - Nombre de CPN : ≤ 4 visites → 84,95%
  - Antécédents de troubles psychiatriques : 4,92%

Résultats: TPPP : 20,7%



Figure 1 : Troubles psychiatriques du post-partum chez les accouchées du CNHU, Cotonou, 2025 (n = 53)

Résultats

Tableau I: Facteurs associés aux troubles psychiatriques du post-partum chez les accouchées du CNHU, Cotonou, 2025 (n = 264)

	TPPP n(%)	OR	IC 95%	p-value
Situation matrimoniale				
En couple	36 (15,45)	1	--	--
Célibataire /Séparée	17 (50,00)	3,74	[1,44-9,68]	0,006
Revenu mensuel moyen (F CFA)				
< 52000	18 (24,00)	2,71	[1,18-6,23]	0,018
52000-65500	19 (30,65)	2,74	[1,13-6,63]	0,025
> 65500	16 (12,60)	1	--	--

Résultats

Tableau I: Facteurs associés aux troubles psychiatriques du post-partum chez les accouchées du CNHU, Cotonou, 2025 (n = 264) (suite et fin)

	TPPP n (%)	OR	IC 95%	p-value
Nombre de CPN				
≥ 4	33 (15,07)	1	--	--
< 4	20 (44,44)	3,01	[1,38-6,59]	0,006
Antécédents de troubles psychiatriques				
Non	45 (17,93)	1	--	--
Oui	8 (61,54)	4,18	[1,01-17,25]	0,047

Conclusion

Troubles psychiatriques du post-partum

- Réalité sous estimée, ignorée
- Menace silencieuse pour les familles
- Nécessité de stratégies de prévention
  - Primordiale : lutte contre inégalités sociales
  - Primaire : CPN-R, communication
  - Secondaire : dépistage et prise en charge
  - Tertiaire : suivi, réinsertion sociale

Merci pour votre attention