La prophylaxie anti-palustre et l'anémie au cours de la grossesse chez femmes enceintes atteintes de troubles hypertensifs . Etude hospitalière transversale à Kaya et à Dori

Franck Garanet

Franck GARANET[1*] , Diane BAMOGO[2] , Jérome Winbetouréfâ SOME[1], Adama OUATTARA[3], Augustin Nawidimbasba ZEBA[1]

[1]Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST)/ Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS)/Département Biomédical et Santé Publique, Ouagadougou, Burkina Faso.

[2]Institut Africain de Santé (IASP),Ouagadougou, Burkina Faso.

[3]Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ)/Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS), Ouagadougou, Burkina Faso

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Les troubles hypertensifs de la grossesse, l'anémie et le paludisme restent un véritable problème de santé publique dans les pays à ressources faibles et intermédiaire
- Co-morbidité **augmente** la mortalité maternelle et infantile
- Prophylaxie anti-Palustre (SP) +++, réduire le paludisme chez les femmes enceintes.

Objectif

- Examiner l'association entre
  - ✓ la prophylaxie antianémique et
  - ✓ l'anémie

chez les femmes atteintes de troubles hypertensifs de la grossesse

Matériel et méthode(s) (1/2)

- Une étude transversale chez des femmes enceintes diagnostiquées avec des troubles hypertensifs au cours du troisième trimestre
- Dans 02 Centres Hospitaliers Régionaux (Dori et Kaya), dans un contexte de crise sécuritaire 2019 à 2022

Matériel et méthode(s) (2/2)

- L'anémie : taux d'hémoglobine inférieur à 7 g/dl
- Les troubles hypertensifs = l'hypertension chronique ou préexistante, l'hypertension gestationnelle et la prééclampsie/éclampsie
- Une analyse de régression logistique multivariée ajusté a été effectuée pour examiner la relation entre la **prophylaxie antipalustre (SP)** et **l'anémie**
- Variables d'ajustement (âge, type THG, Hyperglycemie, **Prophylaxie anti anémique**)

Résultats (1/2)

- Au total, 986 femmes ont participé à l'étude
- La prévalence de l'anémie chez les femmes atteintes de troubles hypertensifs de la grossesse était de 6,19 %

- La proportion des femmes n'ayant pas reçu la prophylaxie anti palustre au cours de la grossesse était de **19,78%**

- Dans l'analyse multivariée ajusté sur l'âge, le type de troubles hypertensifs, la **prise de prophylaxie antianémique** l'hyperglycémie

Résultats (2/2)

- les femmes qui ont reçu la prophylaxie anti palustre étaient:

63% moins susceptible d'avoir une anémie sévère au cours de la grossesse au dernier trimestre

(**ORa=0,37** , **$IC_{95\%}$[0 ,20-0,69**], p-value=0,002)

Conclusion

- La prophylaxie anti palustre au cours de la grossesse pourrait être un facteur clé de la lutte contre l'anémie chez les femmes enceintes avec des troubles hypertensifs de la grossesse

- Le nombre de femmes enceintes sans prophylaxie anti palustre reste élevé

- Il faut **améliorer la couverture de la prophylaxie anti-palustre** chez les femmes enceintes

Merci pour votre attention