Connaissances des Sages-Femmes et Maïeuticiens (SF/M) sur les Hémorragies du Post-Partum Immédiat (HPPI):cas de la maternité du Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) de Dafra au Burkina Faso

Nom du présentateur :OUEDRAOGO NOUHOUM

Auteurs et coauteurs OUEDRAOGO NOUHOUM 1,2,3. YAMEOGO ISSOUF1,2;SANOU SONIA 1,2;ILY IRENEE 1,2.NEBIE ISSA 1;SOMA HONORINE 2,3 MEDA ZIEMLE CLEMENT 2:

Affiliations
1-DISTRICT SANITAIRE DAFRA
2-REMEHBS
3-ABSF/M:

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- **Décès maternels**
  - Problème de santé publique
  - OMS : des 585 000 femmes qui meurent chaque année de complications de grossesses et de l'accouchement, un quart succombe par hémorragie du post partum (HPP)

Introduction

- **Hémorragie du Postpartum (HPP)**
  - Première cause de décès maternels dans le monde
  - Pays à faibles ou moyens revenus : 99% de ces décès
  - Décès et morbidités maternels

    Conséquences d'un retard au diagnostic dû à l'insuffisance du plateau technique

Objectif

Evaluer les connaissances des principaux acteurs de la prise en charge de l'HPP Immédiat (HPPI) à la maternité CMA de Dafra, dans la Région du Guiriko, au Burkina Faso

Matériel et méthode(s)

- **Cadre d'étude :** maternité du CMA du district sanitaire de Dafra, Burkina Faso

- **Type d'étude :** étude transversale à collecte prospective

- **Population d'étude, échantillon et échantillonnage :Recensement** exhaustif des 39 de sages-femmes et maïeuticiens

Matériel et méthode(s)

- **Méthode d' étude :** enquête
- **Outils** : questionnaire semi-structuré et auto administré
- **Période de collecte des données :** 20 au 27 Octobre 2023
- **Analyse descriptive relative à l'HPPI** : définitions, étiologies, gestion active de la troisième période de l'accouchement (GATPA), signes cliniques, prise en charge, suivi, formation et supervision

Résultats

- **Effectif**
  - Attendu : 39 sages-femmes et maïeuticiens
  - Inclus : 24, soit un taux de participation de 62%
- **Sages femmes** : 79%
- **Ancienneté professionnelle (années)**
  - Moins de 2 ans : 14%
  - Entre 2 – 5 ans : 36%
  - Au moins 5 ans : 50%

Résultats

- **Ancienneté dans le service (années)**
  - Moins de 2 ans : 43%
  - Entre 2 – 5 ans : 36%
  - Au moins 5 ans : 21%

Résultats

▪Connaissances relatives à l'HPPI : Définitions

- ❑ Définition de HPPI connue : 29% :
- ❑ Définition de l'hémorragie de la délivrance connue : 8%
- ❑ Définition de l'hémorragie de la période de délivrance connue : 7%
- ❑ Définition de l'hémorragie du postpartum:21%

Résultats

❑Connaissances relatives à l'HPPI : étiologies

- **Etiologies de HPPI connues : 57%**
- **Causes de l'hémorragie de la délivrance connues : 21%**

Résultats

❑Connaissances relatives à l'HPPI : GATPA

- **Définition de la GATPA :** veut dire *« gestion active de la troisième phase de l'accouchement (GATPA »* **: 100% de réponse « Oui »**
- **Etapes de la GATPA connues : 29%**

Résultats

❑Connaissances relatives à l'HPPI : signes cliniques

- **Signes cliniques connus : 29%**
- **Différents facteurs favorisants l'HPPI connus : 50%**

❑ Connaissances relatives à l'HPPI : suivi

Rythme de surveillance connu : 21%

Résultats

❑Connaissances relatives à l'HPPI : prise en charge

- Moyens médicamenteux connus : 36%
- moyens physiques utilisés connus : 14%
- moyens manuels utilisés connus : 57%

Résultats

❑Activités d'appui : formation y compris supervision

- Pas de formation SONU depuis la sortie de l'école de base : 71%
- Pas de supervision : 79%

Résultats

LECONS APPRISES/COMMENTAIRES

- **Réticence à l'autocritique (auto-évaluation) expliquant le faible taux de participation**
  - Peur d'être évalué
  - Excuses par la charge de travail
- **Au regard des résultats**
  - Absence de remise à niveau avec installation du personnel dans la routine
  - Insuffisance dans l'autoformation

Résultats

LECONS APPRISES/COMMENTAIRES

- Absence de restitution des formations
- Absence de systèmes d'exposés lors des staffs et dans le service
- Insuffisance d'implication des responsables dans la formation continue des prestataires
- Faible implication des agents du CMA dans les formations
- Faible motivation pour la lecture
- Peu de sessions de supervision (de qualité)

Résultats

PERSPECTIVES

- Restituer les résultats de l'étude
- Amener à plus d'implication des responsables de la maternité et du district dans la formation continue
- Conduire des sessions de supervision et de qualité
- Encourager l'autoformation et l'amour de la lecture

Résultats

PERSPECTIVES

- Instaurer des exposés et des restitutions de formation dans le service
- Associer les agents du CMA aux différentes formations du district
- Encourager les actions des partenaires comme MSF dans la formation continue

Conclusion

- **HPPI** : cause première de décès maternels

- Constat d'un faible niveau de connaissances sur la gestion de l'HPPI pouvant augmenter la morbidité et la mortalité maternelles dans le service

- Appel à plus d'engagement du personnel, plus d'implication des responsables et nécessité de formation continue de qualité

- Appel d'autres études: CAP sur les HPPI, investiguer le niveau dans d'autres domaines

Merci pour votre attention