RECOURS A LA CONTRACEPTION D'URGENCE HORMONALE DANS LES OFFICINES PHARMACEUTIQUES DE LA VILLE DE BOBO-DIOULASSO, BURKINA FASO, 2025

Nom de la présentatrice : KONATE Rabiatou

Auteurs et coauteurs : KONATE Rabiatou, MEDA Zièmlé Clément, GUIRO Issouf, ROUAMBA Nazaire, SOME Der Adophe

Affiliations :
1. Institut supérieur des sciences de la santé, Université Nazi Boni, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
2. Centre Hospitalier universitaire Sourô Sanou, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Santé sexuelle et reproductive : pilier fondamental en santé publique, surtout pour les pays en développement
- Officines pharmaceutiques (OP)
  - Rôle central, dispensation des méthodes contraceptives (MC), contraception d'urgence hormonale (CUH)
  - CUH ou pilule contraceptive d'urgence (PCU), alternative précieuse, prévention des grossesses non désirées
- Usage réel de la PCU: peu documenté au Burkina Faso

Objectifs

Objectif général

Etudier le recours à la contraception d'urgence hormonale dans les OP de la ville de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, 2025.

Objectifs spécifiques

1. Déterminer les caractéristiques socio-démographiques des clients acheteurs de PCU en OP à Bobo-Dioulasso
2. Décrire les connaissances relatives à la PCU en OP de la ville
3. Déterminer les pratiques des clients acheteurs de PCU
4. La satisfaction des clients en rapport avec l'utilisation de la PCU

Matériel et méthode(s)

- **Cadre et champ d'étude**

  - Cadre d'étude : ville de Bobo-Dioulasso
  - Champ d'étude : officines pharmaceutiques (OP)

- **Type et période d'étude**

  - Etude transversale à collecte prospective
  - Période : 31 mai 2024 au 30 juin 2025

Matériel et méthode(s)

- **Population d'étude et critères d'inclusions**
  - Clients acheteurs de PCU dans les OP objet de l'étude
  - Ayant acheté une PCU durant la période de collecte
  - Ayant donné son consentement pour participer à l'étude
- **Echantillon et échantillonnage**
  - Calcul de la taille des OP : Raosoft en ligne (31 OP)
  - Choix des 31 OP : tirage aléatoire, simple, sans remise
  - Choix des clients : choix raisonné de 10 clients par OP
  - Variables : sociodémographique, connaissances, pratiques, satisfaction

Matériel et méthode(s)

Saisie et analyse

- **Outil de collecte** : questionnaire semi-structuré
- **Saisie** : plateforme Kobotoolbox
- **Analyse** : logiciel R version 4.4.1
- **Variables quantitatives** : moyenne ±écart type, tranches, médiane, minimum, maximum,
- **Variables qualitatives** : effectifs (n) et pourcentages (%)

Résultats

- **Taux de participation** : 83,5%
- **Données sociodémographiques**
  - **Age**
    - Moyen : 27,2± 7,2 ans
    - Tranche la plus représentative : [24-28[(29,3%)
  - **Femmes** : 67,2% pour sex-ration de 2,1
  - **Célibataires** : 71,2%
  - **Occupation** : élèves/étudiants (49,1%)

Résultats

Connaissances sur la PCU

- **Connaissances des méthodes contraceptives (MC):** Minimum une MC (99,2%)
- **MC déjà utilisées** : préservatif (88,4%)
- **Exigence du préservatif lors des rapports sexuels**



Figure 1. Répartition des clients acheteurs de pilule contraceptive d'urgence selon l'exigence du préservatif lors des rapports sexuels

Résultats

Connaissances sur la PCU

- **Connaissances des MC d'urgence** : 95,8% pilule de lendemain
- **Source d'information** : tiers/entourage (74,5%)
- **Délai de prise** : jusqu'à 72H après les rapports sexuels à risque (58,3%)
- **Spécialité connue** : Norlevo® (81,1%)
- **Décideurs de recours à la PCU** : les deux partenaires sexuels (39,8%)

Résultats

Pratiques sur la PCU

- **Sorties de PCU** : week-ends (56,4%), Demande (91,5%)
- **Motifs de recours** : rapports sexuels (RS) non protégés (79,5%)
- **Fréquence de recours** : après chaque rapport sexuel (19,7%)
- **Moment d'achat** : avant RS (4,2%)
- **Nombre de partenaire sexuel** : plus de deux partenaires sexuels (23,2%)
- **Nombre de prise de PCU par cycle menstruel** : plus de deux (25,9%)

Résultats

Pratique sur la PCU

Usage d'autre méthode pour éviter une grossesse

- N = 41 (15,9%) de la population d'étude
- Dont Nescafé + Boisson coca cola : 27*100 / 41 = 65,9%

Satisfaction

- **Recours futur à la PCU**
  - Toujours au besoin (62,9%)
  - Jamais (3,1%)
- **Préférence de la PCU aux autres MC** : 81,3%
- **Echec vécu/ entendu** : 8,5%/29,7%

Conclusion

- Connaissance de la pilule du lendemain = 95,8%
- Informations reçues de tiers
- Mésusage fréquent de la PCU, nécessité de communication
- Etude mettant en lumière, nécessité d'approfondir la sensibilisation sur la contraception et en particulier, celle d'urgence
- Néanmoins son utilisation isolée posant le problème de la propagation des IST

Merci pour votre attention