

МОД-КП Лабораторная работа 3:

Тема 4. : Нестационарное уравнение теплопроводности

1 Явная схема для уравнения теплопроводности

В данной лабораторной работе, необходимо решить смешанную краевую задачу для нестационарного уравнения теплопроводности с помощью явной схемы. Теоретический материал см. в файле `kp-w07.pdf` (Неделя 7). Детали реализации явной схемы см. файле `kp-w07prakt.pdf` (Неделя 7).

Необходимо выполнить следующие шаги:

1. Модифицируйте функцию `he_step()`, которая реализует один шаг по явной схеме для внутренних и граничных точек по x .
2. Модифицируйте (если нужно) основной скрипт, который использует функцию `he_step()`.
3. Решите уравнение из своего варианта, и постройте численные и теоретические зависимости (на одном графике) $u(x, 0)$ и $u(x, t_{end})$ (получится 4 кривых на одном графике). Проанализируйте точность численного решения в зависимости от величины шага h по x .
4. Сделайте выводы из полученных результатов.

Что включить в отчет: 1) Номер варианта, 2) Уравнение теплопроводности, 3) График зависимостей $u(x, 0)$ и $u(x, t_{end})$, полученные численным моделированием и из теоретической формулы. 4) Использованная величина шага по x . 5) В конце отчета по данному заданию приведите свои выводы: Как влияет величина шага по x на точность вычислений? Как при этом меняется время вычислений? Какую порядок аппроксимации использовался для граничных условий? Какие эффекты, тенденции наблюдаются в численном счете? Общие выводы: Как можно изменить / упростить / улучшить данное задание? и т.п.

Отчет в Степике пишите полностью, но кратко. Можно также написать отчет в Ворде, или другом редакторе. В этом случае необходимо doc- или pdf-файл разместить в облачном хранилище (YandexDisk, Mail.ru, GoogleDrive и т.д.), а в Степике указать соответствующую ссылку.

Варианты задач те же, что и на в Лаб. работе 2 (Неделя 6), а именно:

Варианты задач:

$$1. u_t = u_{xx} + \left(2 - \frac{8x^2}{3}\right) e^{t-x^2},$$

$$u(0, t) - u_x(0, t) = 2e^t/3, \quad u(1, t) + u_x(1, t) = -2e^{t-1}/3, \\ u(x, 0) = 2e^{-x^2}/3, \quad u_{th}(x, t) = 2e^{t-x^2}/3.$$

$$2. u_t = u_{xx} - \frac{2}{\operatorname{ch}(x, t)} (x \operatorname{th}(xt) + t^2(2 \operatorname{th}^2(xt) - 1)),$$

$$u(0, t) = 2 - e^{t-1}/4, \quad u(1, t) - 2u_x(1, t) = e^{t-1}/4 + \frac{2(1 + 2t \operatorname{th} t)}{\operatorname{ch} t},$$

$$u(x, 0) = 2 - e^{x-1}/4, \quad u_{th}(x, t) = \frac{2}{\operatorname{ch}(xt)} - e^{x+t-1}/4.$$

$$3. u_t = u_{xx} + \frac{x + 2t^2 \operatorname{th}(xt)}{\operatorname{ch}^2(xt)},$$

$$u(0, t) + u_x(0, t) = 1 + t, \quad u_x(1, t) = 1 + \frac{t}{\operatorname{ch}^2 t},$$

$$u(x, 0) = x, \quad u_{th}(x, t) = x + \operatorname{th}(xt).$$

$$4. u_t = u_{xx} + x - t^2 \operatorname{ch}(xt) + x \operatorname{sh}(xt),$$

$$u_x(0, t) = t - 1, \quad u(1, t) - 3u_x(1, t) = 2(1 - t) + \operatorname{ch} t - 3t \operatorname{sh} t,$$

$$u(x, 0) = 1 - x, \quad u_{th}(x, t) = x(t - 1) + \operatorname{ch}(xt).$$

$$5. u_t = u_{xx} + 2xt + \frac{1 + \operatorname{th}(x - t) - 2 \operatorname{th}^2(x - t)}{\operatorname{ch}(x - t)},$$

$$u(0, t) + u_x(0, t) = t^2 + \frac{1 + \operatorname{th} t}{\operatorname{ch} t}, \quad u(1, t) = t^2 + \frac{1}{\operatorname{ch}(1 - t)},$$

$$u(x, 0) = \frac{1}{\operatorname{ch} x}, \quad u_{th}(x, t) = \frac{1}{\operatorname{ch}(x - t)} + xt^2.$$

$$6. u_t = u_{xx} - \operatorname{sh}(x - t) - \operatorname{ch}(x - t),$$

$$u(0, t) - u_x(0, t) = e^t, \quad u(1, t) + u_x(1, t) = e^{1-t},$$

$$u(x, 0) = \operatorname{ch} x, \quad u_{th}(x, t) = \operatorname{ch}(x - t).$$

$$7. u_t = u_{xx} - \frac{3(1 + \operatorname{ch}^2(1 - x - t) + \operatorname{sh}(2 - 2x - 2t))}{8(\operatorname{ch}(1 - x - t))^{3/2}},$$

$$u(0, t) = \frac{3}{2}\sqrt{\operatorname{ch}(1 - t)}, \quad u(1, t) - 2u_x(1, t) = \frac{3(\operatorname{ch} t - \operatorname{sh} t)}{2\sqrt{\operatorname{ch} t}},$$

$$u(x, 0) = \frac{3}{2}\sqrt{\operatorname{ch}(1 - x)}, \quad u_{th}(x, t) = \frac{3}{2}\sqrt{\operatorname{ch}(1 - x - t)}.$$

$$\begin{aligned}
8. \quad u_t &= u_{xx} + \frac{5(2\operatorname{th}^2(x-t) - 1)}{2\operatorname{ch}^2(x-t)}, \\
u(0, t) - u_x(0, t) &= -\frac{5}{2} \left(\operatorname{th} t + \frac{1}{\operatorname{ch}^2 t} \right), \quad u_x(1, t) = \frac{5}{2\operatorname{ch}^2(t-1)}, \\
u(x, 0) &= \frac{5}{2} \operatorname{th} x, \quad u_{th}(x, t) = \frac{5}{2} \operatorname{th}(x-t).
\end{aligned}$$