



## Cálculo 1

### Concentração de medicamento no sangue

Suponha que a concentração de medicamento no sangue de um paciente seja dada pela função


$$C(t) = \frac{3t}{2t^2 + 8}, \quad t \geq 0,$$

após  $t \geq 0$  horas de aplicação da medicação. Estamos interessados em saber o que acontece com esta concentração para valores grandes de  $t$ . Como não estamos supondo que ocorre nova aplicação, é natural imaginar que, com o passar do tempo, a concentração deve diminuir, se aproximando cada vez mais de zero. Isto pode ser melhor compreendido a partir da igualdade abaixo

$$C(t) = \frac{3t}{2t^2 + 8} = \frac{t^2 \cdot \frac{3}{t}}{t^2 \left(2 + \frac{8}{t^2}\right)} = \frac{\frac{3}{t}}{2 + \frac{8}{t^2}}.$$

Note que, quando  $t$  vai ficando muito grande, o termo  $3/t$  vai se aproximando de zero, o mesmo ocorrendo com  $8/t^2$ . Deste modo, a fração se aproxima de  $0/(2 + 0) = 0$ . Escrevemos então

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = 0.$$



De uma maneira geral, suponha que uma função  $f$  está definida em um intervalo do tipo  $(b, +\infty)$  e considere  $L \in \mathbb{R}$ . Escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L,$$

para representar o fato de que, à medida que  $x$  se torna arbitrariamente grande, os valores  $f(x)$  tornam-se cada vez mais próximos de  $L$ . A expressão acima deve ser lida da seguinte maneira: *o limite de  $f(x)$ , quando  $x$  tende para infinito, é igual a  $L$* . De maneira análoga, podemos definir

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L.$$


Quando ocorre qualquer uma das situações acima dizemos que a reta  $y = L$  é uma **assíntota horizontal** da função  $f$ .

**Exemplo 1.** Para a função

$$V(p) = \begin{cases} 200/p, & \text{se } 0 < p \leq 100, \\ -0,01p + 2, & \text{se } 100 < p \leq 150, \\ 1/2, & \text{se } 150 < p, \end{cases}$$

temos que

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} V(p) = \lim_{p \rightarrow +\infty} (1/2) = 1/2.$$



Logo, a reta  $y = 1/2$  é uma assíntota horizontal de  $V$ . Isto significa que o gráfico de  $V$  se aproxima desta reta quando  $p$  cresce. Neste caso, de fato, a assíntota se confunde com o gráfico para  $p > 150$ .

Observe que, no cálculo do limite, usamos somente a expressão de  $V(p)$  que vale para  $p > 150$ . Isto porque estamos interessados em saber o que ocorre com  $V(p)$  quando  $p$  é grande. Note ainda que, para esta função, não faz sentido tentar calcular  $\lim_{p \rightarrow -\infty} V(p)$ , pois o domínio da função é  $(0, +\infty)$ .  $\square$

**Exemplo 2.** Sejam  $f$  e  $g$  as funções cujos gráficos estão indicados pelas Figuras 1 e 2 abaixo, respectivamente.




Figura 1




Figura 2

Observe que  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$  e  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ , de modo que as retas  $y = -1$  e  $y = 0$  são assíntotas horizontais da função  $f$ . Para a função  $g$ , temos as assíntotas horizontais  $y = -1$  e  $y = 1$ , conforme pode-se notar pelo gráfico. Novamente, perceba que o gráfico se aproxima de suas assíntotas.  $\square$

Vale a pena olhar para os gráficos acima e identificar também as assíntotas verticais das funções  $f$  e  $g$ . Para a primeira, temos  $x = 0$ , que é exatamente o eixo  $\mathcal{O}y$ , enquanto que a segunda possui duas assíntotas verticais  $x = -\pi/2$  e  $x = \pi/2$ .

Evidentemente, uma função pode ter no máximo duas assíntotas horizontais, ao passo que pode ter muitas assíntotas verticais. Por exemplo, a função  $\tan(x)$  possui assíntotas verticais em qualquer reta do tipo  $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ , com  $k \in \mathbb{Z}$ , mas não possui nenhuma assíntota horizontal, por ser periódica e não constante.

O exemplo abaixo nos permite calcular uma classe bem variada de limites no infinito.

**Exemplo 3.** Vamos verificar que, se  $n \in \mathbb{N}$ , então

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0.$$

De fato, a expressão acima nos diz que, quando  $x > 0$  cresce muito, o número  $x^{-n}$  fica próximo de zero. Para verificar isso, suponha que queiramos que  $|x^{-n}| < 10^{-5}$ . Considerando  $x > 0$ , uma conta simples mostra que

$$|x^{-n}| = \frac{1}{x^n} < 10^{-5} \quad \Longleftrightarrow \quad x^n > 10^5 \quad \Longleftrightarrow \quad x > \sqrt[n]{10^5}.$$

Não existe nada de especial no número  $10^{-5}$ . Na verdade, dado qualquer  $\varepsilon > 0$ , temos que  $|x^{-n}| < \varepsilon$ , desde que  $|x| > \sqrt[n]{1/\varepsilon}$ . Assim, podemos facilmente concluir que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a}{x^n} = 0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a}{x^n},$$

para todo  $a \in \mathbb{R}$ . O mesmo vale, quando  $x \rightarrow +\infty$ , se substituirmos  $n$  por um número racional  $r > 0$ .  $\square$

**Exemplo 4.** Temos que

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4x^3 - 3x + 1}{2x^3 + x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3(4 - \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^3})}{x^3(2 + \frac{1}{x})} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{(4 - \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^3})}{(2 + \frac{1}{x})} = \frac{4 - 0 + 0}{2 + 0} = 2.$$

O que ocorre neste exemplo é que, quando  $|x|$  é grande, o termo  $4x^3$  do numerador fica muito maior (em módulo), do que os outros termos. Da mesma forma, no denominador, o termo dominante é  $2x^3$ . Logo, quando  $|x|$  cresce, a fração se comporta como  $\frac{4x^3}{2x^3} = 2$ .  $\square$

**Exemplo 5.** Temos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{x}}{x^2 - 9} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^{3/2}})}{x^2(1 - \frac{9}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^{3/2}})}{(1 - \frac{9}{x^2})} = \frac{0 + 0}{1 - 0} = 0.$$

Como no exemplo anterior, podemos identificar aqui o termo dominante do numerador e denominador. Quando  $x$  é grande, a fração se comporta como  $\frac{x}{x^2} = \frac{1}{x} \rightarrow 0$ , quando  $x \rightarrow +\infty$ . Por isso o limite é igual a zero.  $\square$

A estratégia de observar o termo dominante nos permite calcular muitos limites no infinito. Contudo, é preciso ter o cuidado de verificar se a intuição está mesmo correta. O exemplo a seguir ilustra bem o que queremos dizer.

**Exemplo 6.** Vamos calcular o limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x).$$

Veja que o termo que envolve o radical fica muito grande, o mesmo ocorrendo com o termo  $x$  que está sendo subtraído. Dizemos então que temos uma indeterminação do tipo  $\infty - \infty$ .

Poderíamos pensar que, quando  $x$  é grande, o termo  $\sqrt{x^2 + x}$  se comporta como  $\sqrt{x^2} = x$ , de modo que o limite deve ser igual a zero. Porém, observe que

$$(\sqrt{x^2 + x} - x) = (\sqrt{x^2 + x} - x) \frac{(\sqrt{x^2 + x} + x)}{(\sqrt{x^2 + x} + x)} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x}.$$

Como  $x \rightarrow \infty$ , podemos supor que  $x > 0$ , de modo que  $\sqrt{x^2} = |x| = x$ . Assim,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} = \frac{1}{2}.$$

Outros tipos de indeterminações podem aparecer, não só no cálculo de limites no infinito, mas também de limites em um ponto. Esteja atento!  $\square$

Em algumas situações, teremos de considerar limites infinitos no infinito. Como a exposição teórica é longa e não apresenta dificuldades extras, achamos que o exemplo abaixo ilustra bem o que isso significa.

**Exemplo 7.** Temos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x - 2}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(x - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2})}{x(1 + \frac{1}{x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}} = +\infty,$$

pois o numerador fica grande (e positivo) e o denominador se aproxima de 1. De maneira análoga, temos que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - x - 2}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}} = -\infty.$$

Note que aqui, como  $x$  fica negativo, a fração também fica negativa (e grande em módulo). Por isso o limite é  $-\infty$ . Vale lembrar que, nos dois casos acima, o limite não existe.  $\square$

## Tarefa

Determine as assíntotas horizontais e verticais da função

$$f(x) = \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{2x - 4}.$$

Em seguida, use essas informações para fazer um esboço do gráfico da função.