

Exercícios de Geometria Riemanniana

Índice

1 Exercícios do do Carmo	2
1.1 Capítulo 0	2
1.2 Capítulo 1	3
1.3 Capítulo III	6
1.3.1 maximum principle!	6
2 Exercícios de aulas .pdf	9
2.1 Pullback da torsão (e da curvatura)	9
3 Dudas	12
3.1 Minimizante \implies geodésica	15
3.2 First variation formula explained	15
3.3 Duas geodésicas	16
3.4 minimal submanifolds	18
3.5 distance and second variation	18
3.6 weinstein theorem	19
3.7 lema do índice	19
4 Monitorias	19
4.1 Abril 25	19
4.2 21 maio	20
5 Exercícios das listas (não entregue)	21
5.1 Lista 3	21
5.1.1 Complemento	21
5.2 Lista 4	22
5.2.1 Mean curvature	23
6 Lista 1	24
6.1 Revisão	24
6.2 Métricas Riemannianas	25
7 Lista 2	27
Lista 3	28
Lista 4	37
Campos de Killing	42

1 Exercícios do do Carmo

1.1 Capítulo 0

Exercise 2 Prove que o fibrado tangente de uma variedade diferenciável M é orientável (mesmo que M não seja).

Solution. Es porque la diferencial de los cambios de coordenadas está dada por la identidad y una matriz lineal. Sí, porque por definición las trivializaciones locales de TM preservan la primera coordenada y son isomorfismos lineales en la parte del espacio vectorial. Entonces queda que

$$d(\varphi_U \circ \varphi_V^{-1}) = \left(\begin{array}{c|c} \text{Id} & 0 \\ \hline 0 & \xi \in \text{GL}(n) \end{array} \right)$$

pero no estoy seguro de por qué ξ preservaría orientación, i.e. que tenga determinante positivo... a menos de que... \square

Exercise 5 (Mergulho de $P^2(\mathbb{R})$ em \mathbb{R}^4) Seja $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por

$$F(x, y, z) = (x^2 - y^2, xy, xz, yz), \quad (x, y, z) = p \in \mathbb{R}^3.$$

Seja $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ a esfera unitária com centro na origem $0 \in \mathbb{R}^3$. Observe que a restrição $\varphi := F|_{S^2}$ é tal que $\varphi(p) = \varphi(-p)$, e considere a aplicação $\tilde{\varphi} : \mathbb{R}P^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por

$$\tilde{\varphi}([p]) = \varphi(p), \quad [p] = \text{clase de equivalência de } p = \{p, -p\}$$

Prove que

- (a) $\tilde{\varphi}$ é uma imersão.
- (b) $\tilde{\varphi}$ é biunívoca; junto com (a) e a compacidade de $\mathbb{R}P^2$, isto implica que $\tilde{\varphi}$ é um mergulho.

Solution.

- (a) Considere a carta $\{z = 1\}$. A representação coordenada de $\tilde{\varphi}$ vira

$$(x, y) \mapsto (x^2 - y^2, xy, x, y)$$

cuja derivada como mapa $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ é

$$\begin{pmatrix} 2x & -2y \\ y & x \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

que é injetiva. Agora pegue a carta $\{x = 1\}$. Então a representação coordenada de $\tilde{\varphi}$ vira

$$(y, z) \mapsto (1 - y^2, y, z, yz)$$

e tem derivada

$$\begin{pmatrix} -2y & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ z & y \end{pmatrix}$$

que também é injetiva. Seguramente algo análogo acontece na carta $\{y = 1\}$.

- (b) $\tilde{\varphi}$ é injetiva. Pegue dois pontos $p_1 := [x_1 : y_1 : z_1]$ e $p_2 := [x_2 : y_2 : z_2]$ e suponha que $\tilde{\varphi}(p_1) = \tilde{\varphi}(p_2)$. I.e.,

$$x_1^2 - y_1^2 = x_2^2 - y_2^2, \quad x_1 y_1 = x_2 y_2, \quad x_1 z_1 = x_2 z_2, \quad y_1 z_1 = y_2 z_2$$

Suponha primeiro que $z_1 \neq 0$. Segue que

$$x_1 = \frac{z_2}{z_1} x_2, \quad y_1 = \frac{z_2}{z_1} y_2$$

logo

$$x_2^2 - y_2^2 = x_1^2 - y_1^2 = \left(\frac{z_2}{z_1}\right)^2 (x_2^2 - y_2^2) \implies z_2 = z_1 \implies x_1 = x_2, \quad y_1 = y_2$$

Em fim, uma imersão injetiva com domínio compacto é um mergulho porque é fechada: pegue um fechado no domínio, vira compacto, imagem é compacta, que é fechado. Pronto. .

□

Exercício 8 $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ difeo local. Se M_2 é orientável, então M_1 é orientável.

Solução. Defina: uma base $\beta \subset T_p M$ é orientada se $\varphi_* \beta$ é orientada em $T_{\varphi(p)} M$. Tá bem definida porque φ é um difeomorfismo em p , i.e. φ_* é isomorfismo. Para mostrar que é contínua à la Lee, qualquer vizinhança de um ponto $p \in M_1$, a correspondente carta coordenada em $\varphi(p)$, um marco coordenado nela e puxe (pushforward baix φ^{-1}) de volta para U . Difeomorfismo e muito bom: o pushforward the campos vetoriais está bem definido. E por construção está orientado. □

1.2 Capítulo 1

Exercise 1 Prove que a aplicação antípoda $A : S^n \rightarrow S^n$ dada por $A(p) = -p$ é uma isometria de S^n . Use este fato para introduzir uma métrica Riemanniana no espaço projetivo real $\mathbb{R}P^n$ tal que a projeção natural $\pi : S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$ seja uma isometria local.

Solution. Lembre que a métrica de S^n é a induzida pela métrica euclidiana, onde pensamos que $T_p S^n \hookrightarrow T_p \mathbb{R}^{n+1}$. É claro que A é uma isometria de \mathbb{R}^n , pois ela é a sua derivada (pois ela é linear), de forma que $\langle v, w \rangle_p = \langle -v, -w \rangle_{A(p)} = \langle v, w \rangle_{-p}$.

É um fato geral que se as transformações de coberta preservam a métrica, obtemos uma métrica no quociente de maneira natural, i.e. para dois vetores $v, w \in T_p \mathbb{R}P^n$ definimos $\langle v, w \rangle_p^{\mathbb{R}P^n} := \langle \tilde{v}, \tilde{w} \rangle_{\tilde{p} \in \pi^{-1}(p)}$.

Para ver que a projeção natural é uma isometria local basta ver que a diferencial de A é um isomorfismo em cada ponto. Mas como ela é $-A$, isso é claro. \square

Exercício 7 Seja G um grupo de Lie compacto e conexo ($\dim(G) = n$). O objetivo do exercício é provar que G possui uma métrica bi-invariante. Para isto, prove as seguintes etapas:

- (a) Seja ω uma n -forma diferencial em G invariante à esquerda, isto é, $L_x^* \omega = \omega$, para todo $x \in G$. Prove que ω é invariante à direita.

Sugestão: Para cada $a \in G$, $R_a^* \omega$ é invariante à esquerda. Decorre daí que $R_a^* \omega = f(a)\omega$. Verifique que $f(ab) = f(a)f(b)$, isto é, $f : G \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$ é um homomorfismo (contínuo) de G no grupo multiplicativo dos números reais. Como $f(G)$ é um subgrupo compacto e conexo, conclui-se que $f(G) = 1$. Logo $R_a^* \omega = \omega$.

- (b) Mostre que existe uma n -forma diferencial invariante à esquerda ω em G .
- (c) Seja $\langle \cdot, \cdot \rangle$ uma métrica invariante à esquerda em G . Seja ω uma n -forma diferencial positiva invariante à esquerda em G , é defina uma nova métrica Riemanniana $\langle\langle \cdot, \cdot \rangle\rangle$ em G por

$$\langle\langle u, v \rangle\rangle_p = \int_G \langle (dR_x)_y u, (dR_x)_y v \rangle_{y_x} \omega, \\ x, y \in G, \quad u, v \in T_y G$$

Prove que $\langle\langle \cdot, \cdot \rangle\rangle$ é bi-invariante.

Solução.

- (a)
- (b)
- (c) Vou usar outra notação. Suponha que g é uma métrica invariante à esquerda em G . Definimos

$$\tilde{g} := \int_{x \in G} (R_x^* g) \omega$$

como operador $\mathfrak{X}(G) \times \mathfrak{X}(G) \longrightarrow \mathcal{F}(G)$.

Lance final Essa definição tá errada! Para que $R_x^* g$ seja uma função que acompanhe ω em cada ponto, **também temos que puxar ω** . Ou seja, a definição correta é:

$$\tilde{g} := \int_{x \in G} R_x^* (g \omega)$$

E ai entra que tem que considerar $R_x^* \omega$, que por definição é invariante à esquerda, mas tu já provou que também é invariante à direita então beleza: $R_x^* \omega = \omega$.

A partir daqui contas confusamente mexidas entre a primeira vez que escrevi e depois... mas a definição acima deve ser suficiente para provar em um par de linhas...

Agora vamos ver que \tilde{g} é invariante à esquerda, i.e. queremos ver que para todo $a \in G$,

$$\tilde{g} \stackrel{\text{quero}}{=} L_a^* \tilde{g} \stackrel{\text{def}}{=} L_a^* \int_G (R_x^* g) \omega.$$

Vamos ver que o pullback L_a^* pode “entrar na integral” e trocar de lugar com R_x^* , daí o resultado segue porque g é L_a -invariante. As contas acabam sendo que

$$\begin{aligned} L_a^* \int_G (R_x^* g) \omega &= \int_G L_a^* R_x^* g \omega = \int_G (L_a \circ R_x)^* g \omega = \int_G (R_x \circ L_a)^* g \omega \\ &= \int_G R_x^* L_a^* g \omega = \int_G R_x^* g \omega = \tilde{g} \end{aligned}$$

Para ver que \tilde{g} também é invariante à direita fazemos:

$$\tilde{g} \stackrel{\text{quero}}{=} R_a^* \tilde{g} \stackrel{\text{def}}{=} R_a^* \int_G (R_x^* g) \omega = \int_G R_a^* R_x^* g \omega = \int_G R_{ax}^* g \omega = \int_G R_x^* g \omega = \tilde{g}$$

porque estamos integrando em todo G e $G \curvearrowright G$ transitivamente. **Catch!** Como é o pullback? $F^*(f\omega) = F^*f \wedge F^*\omega$ então temos

$$R_a^*(R_x^* g \omega) = R_a^*(R_x^* g) R^* \omega$$

Então beleza só que: para que essa forma ai seja invariante à direita, não é suficiente que $R_a^*(R_x^* g)$ seja invariante à direita: também o pullback de ω ! É ai que entra o inciso (a): você provou que ω invariante à esquerda é invariante à direita, i.e. $R^* \omega = \omega$.

Para todo aquele que tem dúvida, aqui estão as contas da invarianza à esquerda super explicitas:

Fixe $y \in G$ e $u, v \in T_y G$. Temos que

$$\begin{aligned}
(L_a^* \tilde{g})(u, v) &= L_a^* \left(\int_G (R_x^* g) \omega \right) (u, v) \\
&= \left(\int_G (R_x^* g) \omega \right) \left((L_a)_* a^{-1} u, (L_a)_* a^{-1} v \right) \\
&= \int_G (R_x^* g) \left((L_a)_* a^{-1} u, (L_a)_* a^{-1} v \right) \omega \\
&= \int_G g \left((R_x)_* a^{-1} y x^{-1} (L_a)_* a^{-1} u, (R_x)_* a^{-1} y x^{-1} (L_a)_* a^{-1} v \right) \omega \\
&= \int_G g \left((R_x \circ L_a)_* a^{-1} y x^{-1} u, (R_x \circ L_a)_* a^{-1} y x^{-1} v \right) \omega \\
\text{associatividade em } G &= \int_G g \left((L_a \circ R_x)_* a^{-1} y x^{-1} u, (L_a \circ R_x)_* a^{-1} y x^{-1} v \right) \omega \\
&= \int_G g \left((L_a)_* a^{-1} y x^{-1} (R_x)_* y x^{-1} u, (L_a)_* a^{-1} y x^{-1} (R_x)_* y x^{-1} v \right) \omega \\
&= \int_G \left((L_a)^* g \right) \left((R_x)_* y x^{-1} u, (R_x)_* y x^{-1} v \right) \omega \\
g \text{ invariante à esquerda} &= \int_G g \left((R_x)_* y x^{-1} u, (R_x)_* y x^{-1} v \right) \omega \\
&\stackrel{\text{def}}{=} \tilde{g}(u, v).
\end{aligned}$$

onde $R_x \circ L_a = L_a \circ R_x$ por associatividade de produto no grupo.

□

1.3 Capítulo III

1.3.1 maximum principle!

Maximum principle (E. Hopf) (Minimal surface course statement.) For any (M, g) , harmonic functions satisfy *maximum principle*: any harmonic function $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ for U connected and open, if $\exists p \in U$ that is a local maximum or local minimum, then f is constant on U .

We shall show Do Carmo's version that f *subharmonic*, i.e. $\Delta f \geq 0$, on M compact connected $\implies f$ constant. (This is Exercise 12, Chapter III.)

Demonstração.

Step 1 (Exercise 7, Chapter III of [dC79].) Make sure you can pick a *referencial geodésico* about every point of M . This is an orthonormal frame $\{E_i\} \subset \mathfrak{X}(U)$, where $p \in U$ such that $\left(\nabla_{E_i} E_j \right)_p = 0$. This frame can be obtained by taking geodesic coordinates at the point, an orthonormal base $\{e_i\}$ of $T_p M$, and taking parallel transport of the vectors e_i along radial geodesics emanating from p . This immediately ensures that E_i is orthonormal since parallel transport preserves angles.

To check that Christoffel symbols vanish at p we do as follows. (This is actually a basic fact about geodesic coordinates, see [Lee19] Prop. 5.24.) Take a random vector $v \in T_p M$ and its geodesic $\gamma_v(t) = \exp_p(tv)$. I drop the subindex v for the next computations for the next computations. Then (this is Florit way of using covariant derivative along a curve; it's the *pullback* or *induced connection* ∇^γ):

$$0 = \nabla_{\frac{d}{dt}}^\gamma \gamma' = \nabla_{\frac{d}{dt}}^\gamma v^i (E_i \circ \gamma)$$

where the $v = (v^1, \dots, v^n)$. Indeed: this is very silly but, since the coordinate chart of geodesic coordinates is \exp_p^{-1} , the coordinate representation of γ in this chart is as simple as

$$\hat{\gamma}(t) = (\underbrace{\varphi}_{\text{chart}} \circ \gamma)(t) = \exp_p^{-1} \exp_p(tv) = tv.$$

And the composition $E_i \circ \gamma$ just means that we take our local frame *along* γ . Continue:

$$\begin{aligned} &= v^i \nabla_{\frac{d}{dt}}^\gamma E_i \circ \gamma = v^i \nabla_{\gamma_v, * \frac{d}{dt}} E_i \\ &= v^i \nabla_{v^j E_j} E_i = v^i v^j \nabla_{E_j} E_i \\ &= v^i v^j \Gamma_{ji}^k E_k \end{aligned}$$

along γ . Now choose $v = e_1$. You get $\Gamma_{11}^k = 0$ for all k along γ_{e_1} . Now choose $v = e_2$, then $\Gamma_{22}^k = 0$ along γ_{e_2} , so at least at p they both vanish. And now choose $v = e_1 + e_2$. You get

$$0 = (v^1)^2 \cancel{\Gamma_{11}^k}^0 + v^1 v^2 \Gamma_{12}^k + v^2 v^1 \Gamma_{21}^k + (v^2)^2 \cancel{\Gamma_{22}^k}^0$$

So $\Gamma_{12}^k = 0$ since Levi-Civita is torsion-free, i.e. symmetric. And so on. So the all Christoffel symbols vanish at the same time at p .

Step 2 (Exercise 11, Chapter III of [dC79].) Prove that

$$\text{div}_X \text{Vol} = \text{div } X \text{Vol}$$

To do this first recall that *divergence* and *trace* are

$$\text{div } X := \text{tr}(v \mapsto \nabla_v X)$$

$$\text{tr}(T) := \sum_i \langle T E_i, E_i \rangle, \quad T \in \text{End}(V), E_i \text{ orthonormal frame}$$

Now pick a Geodesic frame E_i and its dual coframe ε^i , i.e. satisfying $\varepsilon^i(E_j) = \delta_{ij}$. Then $\text{Vol} = \varepsilon^1 \wedge \dots \wedge \varepsilon^n$. Then for any $X = X^i E_i \in \mathfrak{X}(U)$,

$$i_X \text{Vol} = \varepsilon^1 \wedge \dots \wedge \varepsilon^n (X^i E_i, \cdot, \dots, \cdot) = X^i \varepsilon^1 \wedge \dots \wedge \varepsilon^n (E_i, \cdot, \dots, \cdot)$$

How to compute that? Recall that for top-forms we have

$$\varepsilon^1 \wedge \dots \wedge \varepsilon^n (Z_1, \dots, Z_n) = \det(\varepsilon^i(Z_j))$$

so for example if $n = 3$

$$\begin{aligned}\varepsilon^1 \wedge \varepsilon^2 \wedge \varepsilon^3(E_1, Z_2, Z_3) &= \begin{vmatrix} \varepsilon^1(E_1) & \varepsilon^1(Z_2) & \varepsilon^1(Z_3) \\ \varepsilon^2(E_1) & \varepsilon^2(Z_2) & \varepsilon^2(Z_3) \\ \varepsilon^3(E_1) & \varepsilon^3(Z_2) & \varepsilon^3(Z_3) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & \varepsilon^1(Z_2) & \varepsilon^1(Z_3) \\ 0 & \varepsilon^2(Z_2) & \varepsilon^2(Z_3) \\ 0 & \varepsilon^3(Z_2) & \varepsilon^3(Z_3) \end{vmatrix} \\ &= \varepsilon^2(Z_2)\varepsilon^3(Z_3) - \varepsilon^2(Z_3)\varepsilon^3(Z_2) = \varepsilon^2 \wedge \varepsilon^3(Z_2, Z_3), \\ \varepsilon^1 \wedge \varepsilon^2 \wedge \varepsilon^3(E_2, Z_2, Z_3) &= \begin{vmatrix} 0 & \varepsilon^1(Z_2) & \varepsilon^1(Z_3) \\ 1 & \varepsilon^2(Z_2) & \varepsilon^2(Z_3) \\ 0 & \varepsilon^3(Z_2) & \varepsilon^3(Z_3) \end{vmatrix} = -\varepsilon^1 \wedge \varepsilon^3(Z_2, Z_3)\end{aligned}$$

and so on. When we sum over all i , we get

$$X^i \varepsilon^1 \wedge \dots \wedge \varepsilon^n(E_i, \cdot, \dots, \cdot) = \sum_i (-1)^{i+1} X^i \varepsilon^1 \wedge \dots \wedge \hat{\varepsilon}^i \wedge \dots \wedge \varepsilon^n.$$

Now take exterior derivative of that, we get

$$\begin{aligned}d_X \text{Vol} &= \sum_i (-1)^{i+1} (dX^i) \wedge \varepsilon^1 \wedge \dots \wedge \hat{\varepsilon}^i \wedge \dots \wedge \varepsilon^n \\ &\quad + \sum_i (-1)^{i+1} X^i \wedge d(\varepsilon^1 \wedge \dots \wedge \hat{\varepsilon}^i \wedge \dots \wedge \varepsilon^n)\end{aligned}$$

And then the first term actually is

$$\sum_i (-1)^{i+1} E_j X^i \varepsilon^j \wedge \varepsilon^1 \wedge \dots \wedge \hat{\varepsilon}^i \wedge \dots \wedge \varepsilon^n = E_i X^i \text{Vol}$$

while the second term vanishes because look,

$$\begin{aligned}d\varepsilon^i(E_j, E_k) &= E_j \varepsilon^i(E_k) - E_k \varepsilon^i(E_j) - \varepsilon^i([E_j, E_k]) \\ &= -\varepsilon^i(\nabla_{E_j} E_k - \nabla_{E_k} E_j) \quad \text{torsion!}\end{aligned}$$

which vanishes at p because we said that this geodesic frame would have vanishing Christoffel symbols at p . So we conclude:

$$d_X \text{Vol} = E_i X^i \text{Vol}$$

Now you just have to think what is divergence:

$$\begin{aligned}\text{div } X &= \sum_i \langle \nabla_{E_i} X^j E_j, E_i \rangle = \sum_i \langle E_i X^j E_j, E_i \rangle + X^j \langle \nabla_{E_i} E_j, E_i \rangle \\ &= \sum_i \langle E_i X^j E_j, E_i \rangle = \sum_i E_i X^j \langle E_j, E_i \rangle = E_i X^i\end{aligned}$$

again using that we are a geodesic frame with vanishing covariant derivative at p .

Step 3 (Exercise 9(b), Chapter III of [dC79].) You realise that

$$\Delta(fg) = f\Delta g + g\Delta f + 2 \langle \nabla f, \nabla g \rangle.$$

Recall that *Laplacian* is

$$\Delta f := \operatorname{div} \nabla f$$

This is just a computation no problem, I'll say how it starts. For any $X \in \mathfrak{X}(M)$,

$$\langle \nabla(fg), X \rangle = X(fg) = fXg + gXf = f \langle \nabla g, X \rangle + g \langle \nabla f, X \rangle.$$

which says that

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$$

So, for an orthonormal frame E_i

$$\Delta(fg) = \operatorname{div} \nabla(fg) = \sum_i \langle \nabla_{E_i} (f\nabla g + g\nabla f), E_i \rangle$$

Then use Leibniz rule and definition of gradient, you get there.

Step 4 (Exercise 12, Chapter III of [dC79].) To prove the theorem for subharmonic functions first we show that in fact they are harmonic via step 2 on $X := \nabla f$ and Stokes:

$$\int_M \Delta f \operatorname{Vol} = \int_M \operatorname{div} X \operatorname{Vol} = \int_M d(i_X \operatorname{Vol}) = \int_{\partial M} i_X \operatorname{Vol} = 0$$

meaning that the non-negative function Δf is in fact 0, i.e. f is harmonic. Now we do it again for $X := \nabla(f^2/2)$:

$$\int_M \Delta(f^2/2) \operatorname{Vol} = \int_M d(i_X \operatorname{Vol}) = \int_{\partial M} i_X \operatorname{Vol} = 0$$

And then apply step 3:

$$0 = \int_M \Delta(f^2/2) \operatorname{Vol} = \int_M f \Delta f \operatorname{Vol} + \int_M \langle \nabla f, \nabla f \rangle \operatorname{Vol}$$

First one vanishes because f is harmonic, so second one is zero which says f is constant!

□

2 Exercícios de aulas .pdf

2.1 Pullback da torsão (e da curvatura)

Exercício Mostre que $T_{\nabla f} = f^*T$.

Explanation of the notation

Let $f : M \rightarrow \tilde{M}$ be a map of manifolds and $p \in \tilde{M}$. Recall that the differential of f at p is a map

$$\begin{aligned} f_{*,p} : T_p M &\longrightarrow T_p M \\ X(p) &\longmapsto f_{*,p} X_p \end{aligned}$$

defined by

$$(f_{*,p}X_p)g := X_p(g \circ f)$$

for all $g \in \mathcal{F}(\tilde{M})$.

Then we have a tensor

$$f_* : \mathfrak{X}(M) \longrightarrow \mathfrak{X}_f$$

that maps a vector field of M to a section of the pullback bundle $f^*T\tilde{M}$ that at every point of M gives you the vector of \tilde{M} just defined as $f_{*,p}X_p$.

There is an exercise that says that the vector fields ∂_i defined as doing $\partial_i x^j = \delta_i^j$ are a local basis of sections of $T\tilde{M}$, so you can write

$$f_*X = X^i(\partial_i \circ f).$$

The question arises:

who is X^i ?

The answer reads: on one hand,

$$(f_*X)_{f(p)}(x^j) = (X^i \partial_i)_{f(p)}(x^j) = X^i(f(p))(\partial_i)_{f(p)}x^j = X^i(f(p))$$

and on the other hand, by definition of differential

$$(f_*X)_{f(p)}(x^j) = X_p(x^j \circ f) = X_p(f^j)$$

where we denote $f^j = x^j \circ f$ the coordinate functions of f . So we conclude, for once and for all, that

$$X_{f(p)}(f^j) = X^j(f(p))$$

So we can write

$$f_*X = X(f^i)\partial_i.$$

Solução

Exercício Mostre que $T_{\nabla f} = f^*T$.

Solution.

$$\begin{aligned}
T_{\nabla f}(X, Y) &= \nabla_X f_* Y - \nabla_Y f_* X - f_*[X, Y] \\
&= \nabla_X Y(f^i) \partial_i \circ f - \nabla_Y X(f^j) \partial_j \circ f - f_*[X, Y] \\
&= X(Yf^i) \partial_i \circ f + Y(f^i) \nabla_X \partial_i \circ f - Y(Xf^j) \partial_j - Xf^j \nabla_Y \partial_j - f_*(XY - YX) \\
&= \left(X(Yf^i) - Y(Xf^i) \right) \partial_i + Yf^i \nabla_X \partial_i - Xf^j \nabla_Y \partial_j - (XY - YX)(f^i) \partial_i \\
&= Yf^i \nabla_{f_* X} \partial_i - Xf^j \nabla_{f_* Y} \partial_j \\
&= Yf^i Xf^k \nabla_{\partial_k} \partial_i - Xf^j Yf^\ell \nabla_{\partial_\ell} \partial_j \\
&= Yf^i Xf^k \nabla_{\partial_k} \partial_i - Xf^k Yf^i \nabla_{\partial_i} \partial_k \\
&= Yf^i Xf^k (\nabla_{\partial_k} \partial_i - \nabla_{\partial_i} \partial_k) \\
&= Yf^i Xf^k (\nabla_{\partial_k} \partial_i - \nabla_{\partial_i} \partial_k - [\partial_k, \partial_i]) \\
&= Yf^i Xf^k T(\partial_k, \partial_i) \\
&= T(f_* X, f_* Y)
\end{aligned}$$

□

3 Dudas

Exercício (Para revisión, creo que está bien) Sea \mathbb{V} un espacio vectorial. Suponga que $R, R' : \mathbb{V}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ son dos tensores tipo curvatura. Si $K = K' \implies R = R'$. **Sugerencia:** polarizar.

Solution. Polarizamos así:

$$4R(X, Y, Z, W) = R(X + Z, Y + W, X + Z, Y + W) - R(X - Z, Y - W, X - Z, Y - W) \quad (1)$$

donde el truco es simplemente que $\mathbb{V}^4 \cong \mathbb{V}^2 \times \mathbb{V}^2$. Entonces la polarización usual para formas bilineales simétricas arbitrarias $T : \mathbb{W} \times \mathbb{W} \rightarrow \mathbb{R}$, que nos dice que

$$4T(X, Y) = T(X + Y, X + Y) - T(X - Y, X - Y),$$

aplica para R con $\mathbb{W} = \mathbb{V}^2$. Para llegar de eq. (1) a la curvatura escalar simplemente aplicamos la antisimetría en las primeras dos o las últimas dos entradas. De ahí podremos sustituir K por K' y recuperar R' . \square

Exercício Si la curvatura seccional de (M, g) es idénticamente cero, la exponencial $\exp_p : B_\epsilon(0) \rightarrow B_\epsilon(p)$ es una isometría.

Ideas

- **(Idea 1.)** Considerar dos vectores tangentes $u, v \in T_p M$ a algún punto de M , y la superficie Σ generada por ellos mediante la exponencial. Es decir, definimos $V := \text{span}\{u, v\}$ y $\Sigma := \exp_p(V \cap B_\epsilon(0))$ donde $B_\epsilon(0)$ es el dominio de definición de la exponencial en p . Trabajar en una superficie nos permite usar el lema de simetría para curvatura, i.e. que

$$\nabla_{\partial_s} \nabla_{\partial_t} X - \nabla_{\partial_t} \nabla_{\partial_s} X = R(\partial_s, \partial_t)X,$$

donde se trata de la conexión inducida por la exponencial y el tensor de curvatura inducido por la exponencial; s y t son los parámetros de la exponencial restringida a $V \cap B_\epsilon(0)$ y X es un campo a lo largo de \exp_p .

Por el ejercicio anterior sabemos el tensor de curvatura R de M es idénticamente cero. (Porque también la curvatura seccional del tensor $R' := 0$ es cero.) Como $R_{\nabla^{\exp}} = \exp_p^* R = 0$, tenemos que

$$\nabla_{\partial_s} \nabla_{\partial_t} X = \nabla_{\partial_t} \nabla_{\partial_s} X$$

¿Esta idea tiene futuro?

- **(Idea 2.)** Sabemos que el pullback de la curvatura de M coincide con la curvatura de $T_p M$, que también es cero por ser un espacio euclidiano. Es decir: tenemos dos variedades con el mismo tensor de curvatura, ¿podemos concluir desde aquí que sus métricas también coinciden? (Cf. pregunta de Arthur: curvaturas iguales \implies métricas iguales?).

- **(Idea 3.)** Consultando notas de monitoria, la idea correcta es demostrar que

$$|d_v \exp_p(w)| = |w|, \quad v \in T_p M, \quad w \in T_v(T_p M)$$

Para eso consideramos la variación por geodésicas

$$f(s, t) := \exp_p(t(v + sw))$$

cuyo campo variacional J es de Jacobi. Como $R \equiv 0$, $J'' = 0$. De acuerdo a mis notas: esto significa que

“coordenada a coordenada tenemos líneas.”

Pero no entiendo esto qué quiere decir. El siguiente paso es aplicar el lema de Gauss.

Exercício Provar que são equivalentes:

- (a) M é localmente isométrica a \mathbb{R}^n .
- (b) A traslação ao longo de curvas é localmente independente das curvas.
- (c) $K = 0$.

Solução. (c) \implies (a) Ejercicio anterior.

(a) \implies (b) **(Para revisión.)** Considere un vector $X(p) \in T_p M$ y su traslación paralela $X(q)$ a lo largo de la curva γ . Análogamente sea $\tilde{X}(q)$ la traslación paralela de $X(p)$ a lo largo de σ . Considere una isometría local $\varphi : U \subset M \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$.

Considere el transporte paralelo de $\varphi_* X(p)$ a lo largo de $\varphi \circ \gamma$, y compare con $\varphi_* X(q)$. Afirmo que el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{array}{ccc} T_p M & \xrightarrow{p} & T_q M \\ \varphi_* \downarrow & & \downarrow \varphi_* \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{p} & \mathbb{R}^n \end{array}$$

porque:

- El transporte paralelo de $X(p)$ a lo largo de γ es el único campo $X \in \mathfrak{X}_\gamma$ satisfaciendo que $X(0) = X(p)$ y $\nabla_{\frac{d}{dt}}^\gamma X(t) = 0$.
- El transporte paralelo de $\varphi_* X(p)$ a lo largo de $\varphi \circ \gamma$ es el único campo $\tilde{X} \in \mathfrak{X}_{\varphi \circ \gamma}$ satisfaciendo que $\tilde{X}(0) = \varphi_* X(p)$ y $\nabla_{\frac{d}{dt}}^{\varphi \circ \gamma} \tilde{X}(t) = 0$.
- Entonces $\tilde{X}(t) = \varphi_* X(t)$ porque $\varphi_* X(t)$ también es un campo paralelo a lo largo de $\varphi \circ \gamma$:

$$0 = \varphi_* \left(\nabla_{\frac{d}{dt}}^\gamma X(t) \right) = \nabla_{\frac{d}{dt}}^{\varphi \circ \gamma} \varphi_* X(t)$$

En particular $\varphi_*X(q)$ es el transporte paralelo de $\varphi_*X(p)$ a lo largo de $\varphi \circ \gamma$.

Para concluir note que el transporte paralelo de \mathbb{R}^n no depende de la curva. De hecho, el transporte paralelo de cualquier vector en \mathbb{R}^n es el campo constante. Esto es porque la derivada covariante a lo largo de cualquier curva consiste en derivar el campo entrada a entrada. Que esa derivada se anule significa que las coordenadas del campo deben ser constantes.

Para confirmar que de hecho esa es la derivada covariante en \mathbb{R}^n , recuerde que la derivada covariante de campos vectoriales en \mathbb{R}^n definida como

$$D_{V_p} W = V_p W^i \partial_i$$

es métrica y simétrica (lo comprobé).

(b) \implies (c) (Tengo duda.) Éste es el ejercicio 4 del capítulo IV del libro de Manfredo. La sugerencia Manfredo es parecida a la idea de construir una superficie Σ como en la Idea 1 del ejercicio anterior. De acuerdo a la notación de la Idea 1, sabemos que

$$\nabla_{\partial_s} \nabla_{\partial_t} X - \nabla_{\partial_t} \nabla_{\partial_s} X = R(\partial_s, \partial_t)X.$$

Queremos demostrar que el lado izquierdo de la ecuación anterior es cero.

La sugerencia de Manfredo es definir un campo X como la traslación paralela de un vector cualquiera $v \in T_p M$, a lo largo de curvas verticales $t \mapsto (s, t)$; bajo la suposición de que la superficie Σ está parametrizada de tal forma que la recta $(s, 0)$ va a dar a un sólo punto de Σ . Me parece que para argumentar que $\nabla_{\partial_t} X = 0$ usa el lema 4.1 sobre cómo las geodésicas tangentes a las esferas geodésicas permanecen fuera de las respectivas bolas geodésicas.

No consigo ver exactamente cómo se usa este lema, y me pregunto si hay otra forma más simple de resolver esta pregunta.

□

Exercício Suponha que M tem curvatura seccional não-positiva, $K \leq 0$. Mostre que M é uma variedade sem pontos conjugados, isto é, para todo $p \in M$, o conjunto dos pontos conjugados a p é vazio.

Solução. Suponga que existen dos puntos conjugados p y q . Es decir, existe una geodésica $\gamma : (a, b) \rightarrow M$ uniendo p y q , y un campo de Jacobi $J \in \mathcal{X}_\gamma^J$ tal que $J(a) = 0$, $J(b) = 0$. De acuerdo a las cuentas hechas en aula, sabemos que

$$\|J(t)\|^2 = \|w\|^2 t^2 - \frac{1}{3} K(w, v) t^4 + O(t^4)$$

donde $v = \gamma'(0)$ y $w = J'(0)$. Evaluando en b y pasando la curvatura seccional (que es negativa) del lado izquierdo, obtenemos que $\|w\|^2 b^2 + O(b^4)$ es un número negativo.

Pregunta: puedo tener problemas con los términos $O(b^4)$? La sugerencia de Manfredo (ex. 5 cap. V) es diferente (también logré seguirla). □

3.1 Minimizante \implies geodésica

Exercício 8 (Curvas minimizantes)

- (a) Seja γ uma curva suave por partes parametrizada por comprimento de arco (this is important, velocity is 1) conectando p a q . Mostre que se $d(p, q) = \ell(\gamma)$ então γ é uma geodésica.

Solution. Imagino que podemos só usar a primeira fórmula da variação:

$$S'(0) = - \int_a^b \langle V, \gamma'' \rangle dt.$$

(na página que segue anexo uma prova dela, mas isso é extra.)

É claro que se γ é minimizante, estamos num ponto crítico do funcional de distância S , é se cumpre a primeira fórmula da variação.

Pergunta Para mim parece que daí segue que $\gamma'' = 0$, porque a métrica é não degenerada. Porém, [Lee19], thm. 6.4 afirma que devemos usar $V = \gamma''$ para concluir esse exercício. Isso não entendo por que.

□

3.2 First variation formula explained

Explanation of first variation formula. Não precisa ler :)

Consider a *variation* of γ , which is like a homotopy:

$$\begin{aligned} \Gamma : (a, b) \times (-\varepsilon, \varepsilon) &\longrightarrow M \\ \Gamma(t, s) &= \gamma(t) + sV(\gamma(t)) \end{aligned}$$

where $V \in \mathfrak{X}_\gamma$ is a vector field along γ called the *variation field*, and it has to vanish on the endpoints. Then there's the *length functional*

$$S(s) := \ell(\Gamma(t, s)) = \int_a^b \left| \nabla_{\frac{d}{dt}} \Gamma(t, s) \right| dt.$$

Because $\gamma = \Gamma(t, 0)$ is minimizing, we know that $S'(0) = 0$. Then we compute that and

hope that it will say $\gamma'' = 0$.

$$\begin{aligned}
S'(0) &= \int_a^b \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \langle \nabla_t \Gamma(t, s), \nabla_t \Gamma(t, s) \rangle^{1/2} dt \\
&= \int_a^b \frac{2}{2|\dot{\Gamma}(t, 0)|} \langle \nabla_s \nabla_t \Gamma(t, s), \nabla_t \Gamma(t, s) \rangle dt \\
&\stackrel{\text{symmetry lemma}}{=} \int_a^b \left\langle \nabla_t \underbrace{\nabla_s \Gamma(t, s)}_{=V}, \nabla_t \Gamma(t, s) \right\rangle dt \\
&= \int_a^b \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \langle V, \nabla_t \Gamma(t, s) \rangle - \int_a^b \left\langle V, \underbrace{\nabla_t \nabla_t \Gamma(t, s)}_{\gamma''} \right\rangle dt
\end{aligned}$$

and the first one vanished out fundamental theorem of calculus and the fact that V is zero on the endpoints.

So we get that if γ minimizes distance, this integral is zero for any variation of γ .

Remarks

- Symmetry lemma basically follows from commutativity of partial derivatives in \mathbb{R}^n . Florit used pullback connection (as in the previous exercise!) and [Lee19] used Christoffel symbols.
- The true version of the variation formula admits that Γ is only piecewise smooth. The formula becomes less nice and the proof a little more involved, I won't do it, but something nice comes out of that: the fact that you realise that geodesics can't have corners because:




Fig. 6.5: Rounding the corner

so it would be nice to understand that precisely but OK.


3.3 Duas geodésicas

Mais um:

Exercício 8 (Curvas minimizantes)

- (b) Suponha que $\gamma, \sigma : [0, 2] \rightarrow M$ são geodésicas distintas e satisfazem: $\gamma(0) = \sigma(0) := p$, $\gamma(1) = \sigma(1) := q$, γ e σ realizam a distância entre p e q . Mostre que γ não realiza a distância entre p e $\gamma(1 + s)$ para nenhum $s > 0$.

Demonstração. Argumentamos na monitoria que teríamos um problema de diferenciabilidade. Pela explicação dada em [Lee19] sobre a suavização de quinas, sabemos que as geodésicas devem ser suaves. Porém, que não poderia acontecer algo assim?




□

Exercício Show that for a bi-invariant metric on a Lie Group, it holds that $\exp_e = \exp^G$.

Solution. After delving into the abyss of definitions, I think it boils down to showing that $\nabla_{X_v} X_v = 0$, where $v \in \mathfrak{g}$. So we have to use that the metric is bi-invariant. But it's not necessarily Levi-Civita connection... □

Exercício Seja M completa, $S \subset M$ compacta, $L \subset M$ completa. Mostre que existe uma geodésica minimizante unindo S e L (isso é fácil), e que toda geodésica minimizante unindo S e L intersecta S e L perpendicularmente.

Sugestão



3.4 minimal submanifolds

There was some confusion about how to define a variation for a given submanifold. It's clear that we must use the exponential map:

$$\begin{aligned} f : (-\varepsilon, \varepsilon) \times M &\longrightarrow \tilde{M} \\ f(s, x) &= \exp_p(sN) \end{aligned}$$

where N is a normal (unit) vector at $p \in M \subset \tilde{M}$.

Let $M \subset (\tilde{M}, g)$ be a submanifold. Define a variation $f : (-\varepsilon, \varepsilon) \times M \rightarrow \tilde{M}$. Then for every $s \in (-\varepsilon, \varepsilon)$, f_s is an immersion (embedding?) and we can pull back the metric of \tilde{M} to M_s , i.e. f_s^*g . We have the volume functional

$$S(s) := \int_{M_s} \text{Vol}_{f_s^*g}.$$

How to express volume in any coordinate system?

$$\sqrt{\det(f_s^*g)_{ij}} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$$

And then you just differentiate this with respect to s . You realise that you have to differentiate the square root of a determinant, which is a trace. Then you get to a mean curvature vector, which is also a trace. And that's the exercise. But you have to do it.

3.5 distance and second variation

Exercício Show that $d(\gamma_v(t), \gamma_w(t)) = \|v - w\|t + O(t^2)$. Suggestion: consider the variation given by minimizing geodesics joining $\gamma_v(t)$ and $\gamma_w(t)$ for each small t , differentiate.

3.6 weinstein theorem

autoexercício Escreva a prova do teorema de Weinstein para entende la.

3.7 lema do índice

Exercício reescreva a prova do lema do índice usando o tensor \bar{J} instead of J .

4 Monitorias

4.1 Abril 25

Kobayashi theorem (Also [Pet16] prop. 5.6.5) $\sigma : M \rightarrow M$ isometria. Prove que cada componente conexa do conjunto dos pontos fixos de σ é uma subvariedade totalmente geodésica.

Solução. Primeiro mostramos que os pontos fixos de σ , M^σ tem estrutura de subvariedade. Pegue uma bola geodésica $B_\varepsilon(p)$ e um ponto $q \in B_\varepsilon(p)$. Existe um vetor $v \in B_\varepsilon(0) \subset T_p M$ tal que $\exp_p(v) = q$. Então q tem coordenadas v porque

$$\underbrace{\exp_p^{-1}}_{\text{carta}}(\underbrace{\exp_p(v)}_q) = v$$

Agora aplique $d_p \sigma$. Aqui usamos o diagrama de naturalidade da exponencial:

$$\begin{array}{ccc} B_\varepsilon(0) \subset T_p M & \xrightarrow{d_p \sigma} & B_\varepsilon(0) \subset T_p M \\ \exp_p \downarrow & & \downarrow \exp_p \\ B_\varepsilon(p) \subset M & \xrightarrow{\sigma} & B_\varepsilon(p) \subset M \end{array}$$

esse diagrama comuta se σ é uma isometria.

Lembre por que esse diagrama comuta: por um lado, como σ é isometria, $(\sigma \circ \exp_p)(tv)$ é uma geodésica. Por outro lado, por definição da exponencial, $(\exp_p \circ d_p \sigma)(tv)$ também é uma geodésica. Então basta ver que essas duas geodésicas são a solução da mesma EDO (a condição inicial é a mesma: que as curvas começam em p , claro, pois p é ponto fixo). Então derive cada uma delas em $t = 0$:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (\sigma \circ \exp_p)(tv) &= d_{\exp_p(0)} \sigma \cdot d_0 \exp_p(v) = d_p \sigma \text{Id}(v) \\ &= \text{Id } d_p \sigma(v) = d_0 \exp_p d_p \sigma(v) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (\exp_p \circ d_p \sigma)(tv) \end{aligned}$$

O fato do diagrama comutar significa que

$$\exp_p(d_p \sigma(v)) = \sigma(\exp_p(v)) = \sigma(q)$$

Note que se $d_p \sigma$ fixa v , automaticamente σ fixa q . Mas ainda, se q é um ponto fixo de σ , aplicando \exp_p^{-1} obtemos que

$$d_p \sigma(v) = \exp_p^{-1}(\sigma(q)) = \exp_p^{-1}(q) = v$$

ou seja, $d_p \sigma$ fixa v . Isso significa que o conjunto de pontos fixos está em bijeção com os vetores que $d_p \sigma$ fixa. Em particular o conjunto de pontos fixos de σ está localmente parametrizado como o subespaço vetorial de $T_p M$ dos pontos fixos de $d_p \sigma$, ou seja, tem cartas de subvariedade.

Mas ainda, considerando a geodésica $\gamma(t) = \exp_p(tv)$, como

$$d_p \sigma(tv) = td_p \sigma(v) = tv$$

o mesmo argumento mostra que $\sigma(\gamma(t)) = \gamma(t)$. Ou seja, σ fixa toda a geodésica que liga p e q desde que fixe qualquer ponto nela. Isso conclui a prova: se $M^\sigma \cap B_\varepsilon(p) = \{p\}$, pronto! $\{p\}$ já é uma subvariedade totalmente geodésica. \square

Exercício 2 ([Pet16]) $F : (M, g) \rightarrow (M, g)$ conexa, F isometria, $p \in M$. Prove que

$$DF_p = -\text{Id}|_{T_p M} \iff \begin{cases} F^2 = \text{Id}_M \\ p \text{ é ponto fixo isolado} \end{cases}$$

Exercício 3 (Petersen) $N_1, N_2 \subset M$ totalmente geodésicas. Prove que cada componente conexa de $N_1 \cap N_2$ é uma subvariedade totalmente geodésica.

Exercício 4 Que se tem uma superfície (dimensão 2 só!) com um plano de simetria no sentido de que pode reflexar nela, então a curva que essa reflexão fixa é geodésica. Ou seja: se tem uma isometria que não é a identidade

Exercício 0 Curvatura negativa implica que...?

4.2 21 maio

Exercício -1 Para (M, g_M) e (N, g_N) e $f : M \rightarrow \mathbb{R}_+$, definimos o *warped product* como sendo o produto cartesiano $M \times N$ com a métrica $g_M + f^2 g_N$.

Se os fatores são completos o warped product é completo.

Exercício 0 M completa, $K \subset M$ compacto, $\text{Ric} \geq \varepsilon > 0$ em $M \setminus K$, então M completa. Estime o diâmetro de M .

Exercício 1 Troque scal por K_M no statement de teo. Hadamard. Prove que não da. (Também não da trocando por Ric , isso é mais difícil de ver.)

Exercício 2 (M^n, g) completa, $\text{Ric}_M > 0$. A, B hipersuperfícies mínimas completas (i.e. traço da segunda forma é zero). Então $A \cap B \neq \emptyset$.

5 Exercícios das listas (não entregue)

5.1 Lista 3

5.1.1 Complemento

Exercício 21 (Geodésicas e conexões afins)

- (a) Seja $\gamma : I \rightarrow M$ uma curva regular definida sobre um intervalo aberto $I \subset \mathbb{R}$. Prove que γ é uma reparametrização de uma geodésica se e somente se existe $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ suave tal que

$$\nabla_{\frac{d}{dt}}^\gamma \gamma' = f(t)\gamma'$$

para todo $t \in I$.

- (b) Seja ∇ uma conexão afim em M . Prove que existe uma conexão $\bar{\nabla}$ em M que é livre de torção e admite as mesmas geodésicas que ∇ . Há unicidade?
- (c) Sejam ∇ e $\bar{\nabla}$ conexões afins em M , livres de torção. Mostre que ∇ e $\bar{\nabla}$ possuem as mesmas geodésicas (a menos de reparametrizações) se e somente se existe uma 1-forma ω tal que

$$\nabla_X Y - \bar{\nabla}_X Y = \omega(X)Y + \omega(Y)X$$

para todo $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$.

Solução.

- (a) (\implies) Suponha que $\gamma = \tilde{\gamma} \circ u$ para alguma geodésica $\tilde{\gamma}$ e $u : J \rightarrow I$ onde J é outro intervalo aberto.

$$\begin{aligned} \nabla_{\frac{d}{dt}}^\gamma \gamma' &= \nabla_{\frac{d}{dt}}^\gamma (\tilde{\gamma} \circ u)' = \nabla_{\frac{d}{dt}}^\gamma (\tilde{\gamma}' \circ u)u' \\ &= \frac{d}{dt} u' \tilde{\gamma}' \circ u + u' \nabla_{\frac{d}{dt}}^\gamma \tilde{\gamma}' \circ u \end{aligned}$$

Para aplicar tudo que você sabe de conexões respire fundo e escreva:

$$\begin{aligned} \nabla_{\frac{d}{dt}}^\gamma \tilde{\gamma} \circ u &= \nabla_{\frac{d}{dt}}^{\tilde{\gamma} \circ u} \tilde{\gamma} \circ u && \text{porque } \gamma = \tilde{\gamma} \circ u \\ &= (\nabla^{\tilde{\gamma}})_{\frac{d}{dt}}^u \tilde{\gamma} \circ u && \text{exercício \#475} \\ &= \nabla_{u_* \frac{d}{dt}}^{\tilde{\gamma}} \tilde{\gamma} && \text{tudo que eu sei} \\ &= \nabla_{u' \frac{d}{dt} \circ u}^{\tilde{\gamma}} \tilde{\gamma} && \text{posso explicar} \\ &= u' \nabla_{\frac{d}{dt} \circ u}^{\tilde{\gamma}} \tilde{\gamma} \end{aligned}$$

Ah, é porque para qualquer função $g \in \mathcal{F}(M)$,

$$\left(u_* \frac{d}{dt}\right)_t g = \frac{d}{dt} \Big|_t (g \circ u) = g'(u(t))u'(t) = u'(t) \frac{d}{dt} \Big|_{u(t)} g$$

So you may want to always remember that

$$\nabla_{\frac{d}{dt}}^{\tilde{\gamma} \circ u} (\tilde{\gamma} \circ u)' = u'' \tilde{\gamma}' \circ u + (u')^2 \nabla_{\frac{d}{dt} \circ u}^{\tilde{\gamma}} \tilde{\gamma}'$$

Clearly if $\tilde{\gamma}$ is a geodesic we get the desired result.

- (b) For the converse we do this: suppose there is a function $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ such that $\nabla_{\frac{d}{dt}}^{\gamma} \gamma' = f(t) \gamma'$. I want to prove γ is of the form $\gamma = \tilde{\gamma} \circ u$ for some $\tilde{\gamma}$ and function u . But hey, if they existed (who could tell?) they would satisfy the equation in that box over there.

□

5.2 Lista 4

5.2.1 Mean curvature

Exercício 8 Seja (M, g) uma variedade Riemanniana. Suponha que existe $f \in C^\infty(M)$ tal que $0 \in \mathbb{R}$ é um valor regular e seja $\Sigma := f^{-1}(0)$.

(a) Seja $N = \frac{\nabla f}{|\nabla f|} \in \mathfrak{X}^\perp(\Sigma)$. Mostre que

$$\langle \alpha_\Sigma(X, Y), N \rangle = -\frac{\text{Hess}(f)(X, Y)}{|\nabla f|}$$

para todos $X, Y \in \mathfrak{X}(\Sigma)$. (Aqui α é a segunda forma fundamental de Σ .)

(b) Mostre que a curvatura média de Σ (definida como o traço do operador de forma A) é dada por

$$H_\Sigma = -\frac{1}{n} \text{div} \left(\frac{\nabla f}{|\nabla f|} \right)$$

Solução.

(a) On one hand,

$$\langle \alpha(X, Y), \nabla f \rangle = -\langle Y, A_{\nabla f} X \rangle$$

and on the other,

$$\text{Hess}(f)(X, Y) = \langle \tilde{\nabla}_X \nabla f, Y \rangle = \langle -A_{\nabla f} X + \nabla_X^\perp \nabla f, Y \rangle$$

then multiply by $\frac{1}{|\nabla f|}$. ($\tilde{\nabla}$ é a conexão LC da variedade ambiente.)

(b) Para calcular a divergência como o traço do gradiente precisamos de uma base ortonormal de M . Pegue uma base ortonormal E_i de Σ e agregue $\frac{\nabla f}{|\nabla f|}$. Então temos:

$$\begin{aligned} \text{div} \left(\frac{\nabla f}{|\nabla f|} \right) &= \sum \left\langle \tilde{\nabla}_{E_i} \frac{\nabla f}{|\nabla f|}, E_i \right\rangle + \underbrace{\left\langle \tilde{\nabla}_{\frac{\nabla f}{|\nabla f|}} \frac{\nabla f}{|\nabla f|}, \frac{\nabla f}{|\nabla f|} \right\rangle}_{=\frac{1}{2} \frac{d}{dt} |\nabla f|^2 = 0} \\ &= \sum \left\langle -A_{\frac{\nabla f}{|\nabla f|}} E_i, E_i \right\rangle \\ &= -\text{tr}(X \mapsto A_{\frac{\nabla f}{|\nabla f|}} X) = -nH_\Sigma(p) \end{aligned}$$

□

6 Lista 1

6.1 Revisão

Exercício 1 Dada uma subvariedade $M \subseteq \tilde{M}$ uma subvariedade mergulhada e $X \in \mathfrak{X}(M)$. Mostre que existe um aberto $U \subset \tilde{M}$ contendo M e um campo $\tilde{X} \in \mathfrak{X}(U)$ tal que $\tilde{X}|_M = X$. Caso M seja subconjunto fechado de \tilde{M} , prove que U pode ser tomado igual a \tilde{M} . Se M não é subconjunto fechado de \tilde{M} , pode não existir extensão de X definida em todo \tilde{M} .

Solução. Acho que a prova canônica é tomar coordenadas de subvariedade de $M \subset \tilde{M}$, i.e. onde M está dada localmente como o lugar onde se anulam as últimas $n - m$ funções coordenadas.

Pegamos uma vizinhança rectificante U de X em $p \in M$, i.e. $X = \partial_1$ em U . Daí pega para cada vetor normal a exponencial, que percorre pela geodésica um pouquinho. Isso dá uma vizinhança em \tilde{M} ... \square

Exercício 2 Seja $f : M^n \rightarrow N^m$ um mapa suave. Os campos $X \in \mathfrak{X}(M)$ e $\tilde{X} \in \mathfrak{X}(N)$ são ditos f -relacionados se $df_p X_p = \tilde{X}_{f(p)}$, $\forall p \in M$. Mostre que se os campos $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ são, respetivamente, f -relacionados com $\tilde{X}, \tilde{Y} \in \mathfrak{X}(N)$ então $[X, Y]$ é f -relacionado com $[\tilde{X}, \tilde{Y}]$.

Solução. Intento 2. $s_1 \in \Gamma(\tau_N)$ está f -relacionado com $s \in \Gamma(\tau_M)$ se $s = s_1 \oplus s^\perp$ para algum $s^\perp \in \nu$. Queremos ver que se $s \stackrel{f}{\sim} s_1$ e $t \stackrel{f}{\sim} t_1$, $[s, t] \stackrel{f}{\sim} [s_1, t_1]$, ou seja $[s, t] = [s_1, t_1] \oplus [s, t]^\perp$ onde $[s, t]^\perp$ é um vetor em ν cuja cara não é muito importante.

$$[s, t] = [s_1 \oplus s^\perp, t_1 \oplus t^\perp] = [s_1, t_1] + \underbrace{[s_1, t^\perp]}_{=0} + \underbrace{[s^\perp, t_1]}_{=0} + \underbrace{[s^\perp, t^\perp]}_{\in \nu}$$

Falta un argumentín para ver que esos colchetes se anulan...

Intento 1 (incompleto). Pegue $p \in M$. Queremos ver que

$$(f_*[X, Y])_p \stackrel{\text{quero}}{=} [\tilde{X}, \tilde{Y}]_{f(p)}.$$

Pegue $g \in \mathcal{F}(N)$.

$$\begin{aligned} [\tilde{X}, \tilde{Y}]_{f(p)} &\stackrel{\text{def}}{=} \tilde{X}_{f(p)}(\tilde{Y}g) - \tilde{Y}_{f(p)}(\tilde{X}g) \\ &\stackrel{\text{hip}}{=} f_{*,p}(X_p)(\tilde{Y}g) - f_{*,p}(Y_p)(\tilde{X}g) \\ &= X_p((\tilde{Y}g) \circ f) - Y_p((\tilde{X}g) \circ f) \\ &\stackrel{\text{hip}}{=} X_p((f_{*,p}(Y))g \circ f) - Y_p((f_{*,p}(X_p))g \circ f) \end{aligned}$$

\square

Exercício 3 Seja $\pi : M \rightarrow N$ uma submersão sobrejetiva. Dado $Y \in \mathfrak{X}(N)$, mostre que existe $X \in \mathfrak{X}(M)$ tal que X é π -relacionado com Y .

Solução. O resultado segue de que $\tau_M \cong \pi^* \tau_N \oplus \nu$, tomando $X := Y \oplus 0$. □

Exercício 4 (Fibrado pullback) Suponha que M^n, N^m são variedades suaves, $\pi : E \rightarrow M$ é um fibrado vetorial suave de posto k e $f : N \rightarrow M$ é um mapa suave. Considere o espaço

$$f^*E = \{(p, e) \in N \times E : f(p) = \pi(e)\},$$

e $\tilde{\pi} : E \rightarrow N$ a projeção na primeira coordenada. Mostre que f^*E tem uma estrutura de variedade suave de forma que a tripla $\tilde{\pi} : f^*E \rightarrow N$ é um fibrado vetorial suave de posto k .

Solução. Para mostrar que $\tilde{\pi}$ é um fibrado vetorial devemos dar trivializações locais. Pegue um ponto $p \in M$ e uma vizinhança trivializante de E perto de $f(p)$, i.e. um aberto $U \ni f(p)$ e um difeomorfismo $h : \pi^{-1}(U) \xrightarrow{\cong} U \times \mathbb{R}^k$. Pegue também um aberto $V \ni p$ tal que $f(V) \subset U$. Defina

$$\begin{aligned} h_1 : \tilde{\pi}^{-1}(V) &\longrightarrow V \times \mathbb{R}^k \\ (q, v) &\longmapsto (q, \pi_2 \circ h(f(q), v)) \end{aligned}$$

Como estamos usando a estrutura de fibrado vetorial de E , segue imediatamente a coleção de funções desse tipo formam um atlas trivializante de f^*E . □

6.2 Métricas Riemannianas

Exercício 6 Seja (N^n, g) uma variedade Riemanniana e $M^m \subset N$ uma subvariedade mergulhada. Mostre que para todo $p \in M$ existe uma vizinhança aberta $U \subset N$ de p e campos vetoriais E_1, \dots, E_n em U tal que $E_1(q), \dots, E_n(q)$ é uma base ortonormal de $T_q N$ para todo $q \in U$ e $E_1(r), \dots, E_m(r)$ são tangentes a M para todo $r \in U \cap M$.

Solução. (Intento 1.) Pegue $p \in M$ e uma vizinhança aberta de $U \subset N$ de p tal que $U \cap M$ é suficientemente pequeno como para ter um marco ortonormal $\{E_i\}_{i=1}^n$. Considere esses campos como campos tangentes a N . Usando o exercício 1 podemos estender esses campos a uma vizinhança de $U \subset N$. Aplicando Gram-Schmidt obtemos um marco ortonormal de $\mathfrak{X}(U)$.

(Intento 2, [MS74] thm. 3.3, p. 36.) Take orthonormal frames $\{E_i\}_{i=1}^m \subset \mathfrak{X}(U \cap M)$ and $\{E'_i\}_{i=1}^n \subset \mathfrak{X}(U)$. Notice that the matrix $(E_i \cdot E'_j)$ has rank m at p . (I think that two orthonormal frames are related up to an orthogonal matrix.) Suppose that the first m columns are linearly independent at p . Then there is an open neighbourhood V of p where the first m columns of this matrix are linearly independent. Then a slightly confusing part arguing that $E_1, \dots, E_m, E'_{m+1}, \dots, E'_n$ are linearly independent in V . Then apply Gram-Schmidt. And that's it.

Then Milnor shows that this is a vector bundle called the *orthogonal bundle*. The lance is that the orthonormal frame we have found gives the local trivialization. For a subbundle

$\xi \subset \eta$ define the fiber of the orthogonal complement of ξ by $F_b(\xi^\perp) := F_b(\xi)^\perp$ with respect to the metric of η . Define local trivializations by

$$\begin{aligned} \bar{h} : \pi^{-1}(U) &\longrightarrow U \times \mathbb{R}^{n-m} \\ \left(q, \sum x_i E_i\right) &\longmapsto (q, x_{m+1}, \dots, x_n) \end{aligned}$$

□

Definição 1 Sejam (M^m, g_M) e (N^n, g_N) variedades Riemannianas. Seja $F : M \rightarrow N$ uma submersão. Dizemos que F é uma **submersão Riemanniana** quando para todo $p \in M$, $DF : \ker(DF)^\perp \rightarrow T_{F(p)}N$ é uma isometria linear. Em outras palavras, sempre que $v, w \in T_p M$ são perpendiculares ao núcleo de DF , vale

$$g_M(v, w) = g_N(DF(v), DF(w)).$$

Exercício 7 Seja (M^n, g) uma variedade Riemanniana. Suponha que existe um grupo de Lie G agindo por isometrias em (M, g) de tal forma que M/G admite uma estrutura de variedade suave, onde a projeção $\pi : M \rightarrow M/G$ é uma submersão. Mostre que existe uma métrica Riemanniana \bar{g} em M/G tal que $\pi : (M, g) \rightarrow (M/G, \bar{g})$ é uma submersão Riemanniana.

Solução. (Seguindo notação e ideias de [MS74].) Fazemos assim para definir a métrica em G/M . Primeiro lembre que $\tau_{G/M} \cong \pi^* \tau_{M/G}$. Considere o fibrado ν normal a $\pi^* \tau_{M/G}$, que é um fibrado sobre M satisfazendo $\pi^* \tau_{G/M} \oplus \nu \cong \tau_M$. Então qualquer vetor tangente a M/G pode ser pensado como um vetor tangente a M se anulamos a parte normal dele, mostrando que podemos usar a mesma métrica em M para introduzir uma métrica em G/M .

Para resolver o exercício devemos analisar como age π_* em τ_M quando este es visto como soma direita $\pi^* \oplus \nu$: $\pi_*(v_1 \oplus v^\perp) = v_1$. Daí segue trivialmente que $\ker \pi := \kappa \subset \nu$. Conversamente se $v_1 \oplus v^\perp \in \kappa$, fazemos para $w \in \pi^*$

$$(v_1 \oplus v^\perp) \cdot w = v_1 \cdot w + \cancel{v^\perp \cdot w}^0 = \pi_* v_1 \cdot \pi_* w = 0.$$

Então $\kappa = \nu$, então $\kappa^\perp \cong \pi^* \cong \tau_{M/G}$ isometricamente.

Intento 1 (errado). Defina a seguinte métrica em M/G :

$$g_{M/G} := g_M|_{\pi^* \tau_{M/G}}$$

i.e. a restrição da métrica em M ao fibrado pullback de $\tau_{M/G} := T(G/M)$, que sabemos que é isomorfo (como fibrado) a $\tau_{M/G}$.

Para ver que $\pi : M \rightarrow M/G$ é uma submersão Riemanniana devemos mostrar que o complemento ortogonal de $\kappa_\pi := \ker(\pi)$ é isomorfo (como fibrado Riemanniano, i.e. isométrico como fibrado) a $\tau_{M/G}$.

Como M é Riemanniana, o fibrado pullback tem um complemento ortogonal $(\pi^* \tau_{M/G})^\perp := \nu$. Basta mostrar que $\nu \cong \kappa$ isometricamente.

□

7 Lista 2

Exercício 1 Mostre que todo fibrado vetorial admite uma conexão.

Exercício 3 Exercício 2 do Capítulo 2 do livro do professor Manfredo:

Sejam X e Y campos de vetores numa variedade Riemanniana M . Sejam $p \in M$ e $\gamma : I \rightarrow M$ uma curva integral de X por p , i.e. $\gamma(t_0) = p$ e $\frac{d\gamma}{dt} = X(\gamma(t))$. Prove que a conexão Riemanniana de M é

$$(\nabla_X Y)(p) = \frac{d}{dt} \left(P_{\gamma, t_0, t}^{-1} (Y(\gamma(t))) \right) \Big|_{t=t_0} \quad (2)$$

onde $P_{\gamma, t_0, t} : T_{\gamma(t_0)} M \rightarrow T_{\gamma(t)} M$ é o transporte paralelo ao longo de γ de t_0 a t .

Solução. Primeiro devemos escrever o lado direito da eq. (2) em termos do fibrado pull-back ao longo de γ :

$$\frac{d}{dt} \left(P_{\gamma, t_0, t}^{-1} (Y(\gamma(t))) \right) \Big|_{t=t_0} \longleftrightarrow \nabla_{\frac{d}{dt}}^\gamma$$

□

Lista 3

Exercício 4 Exemplo: esfera.

- (a) Determine as geodésicas da esfera \mathbb{S}^n com sua métrica canônica.
- (b) Determine o grupo de isometrias da esfera \mathbb{S}^n com sua métrica canônica.

Solution.

- (a) **Ideia essencial.** Suponha que $\gamma : I \rightarrow \mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ é uma geodésica. Podemos pensar que $\gamma' : I \rightarrow T\mathbb{S}^n \subset T\mathbb{R}^{n+1} = \mathbb{R}^{n+1}$ e analogamente $\gamma'' : I \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$. Espaço tangente à esfera é perpendicular ao vetor posição, i.e. $\gamma \perp \gamma'$. Também $\gamma'' \perp \gamma'$; isso é porque $\gamma'' = (\gamma'')^\top + (\gamma'')^\perp$, e como γ é geodésica sabemos que $(\gamma'')^\top = 0$. Por fim, $\gamma'' = \lambda\gamma$, então concluímos que γ está dada por senos e cosenos.

Para escrever isso formalmente precisamos de uma expressão experta para γ . Em [Lee19] Prop. 5.27 achamos inspiração: damos a volta ao problema e começamos propondo uma curva que vai acabar sendo geodésica. Pegue um ponto $p \in \mathbb{S}^n$ e um vetor unitário $v \in T_p\mathbb{S}^n$. Considere

$$\gamma(t) = \cos tp + \sin tv$$

Derivando como uma simples curva em \mathbb{R}^{n+1} , vemos que $\gamma'' = -\gamma$, o que significa que $(\gamma'')^\top = 0$, i.e. γ é uma geodésica de \mathbb{S}^n . Mais precisamente,

$$\gamma''(t) = \left(\nabla_{\frac{d}{dt}}^{i \circ \gamma} \gamma' \right)_t \in (i \circ \gamma)^* T\mathbb{R}^{n+1} \cong \gamma^*(T\mathbb{S}^n \oplus N)$$

não tem componente tangente, e portanto

$$0 = \nabla_{\frac{d}{dt}}^\gamma \gamma' \in \gamma^* T\mathbb{S}^n.$$

Sendo essa uma geodésica partindo de um ponto arbitrário numa direção arbitrária, concluímos por unicidade das geodésicas e *rescaling lemma* que todas as geodésicas de \mathbb{S}^n são como γ .

Note que a geodésica γ é uma parametrização do círculo unitário no plano gerado pelos vetores p e v , i.e. um círculo máximo. Em conclusão, as geodésicas são os círculos máximos de \mathbb{S}^n .

- (b) Afirimo que $\text{Isom } \mathbb{S}^n = \text{O}(n+1) \stackrel{\text{def}}{=} \{A \in \text{GL}(n+1) : AA^\top = \text{Id}\}$. É claro que $\text{O}(n+1) \subset \text{Isom } \mathbb{S}^n$, pois as transformações $A \in \text{O}(n+1)$ preservam o produto interno euclidiano:

$$\begin{aligned} AA^\top = \text{Id} &\iff \sum_k A_{ik} A_{jk} = \delta_{ij} \iff A e_i \cdot A e_j = \delta_{ij} \\ &\iff A v \cdot A w = A(v^i e_i) \cdot A(w^j e_j) = v^i w^j e_i \cdot e_j = v \cdot w. \end{aligned}$$

Para ver que $\text{Isom } \mathbb{S}^n \subset O(n+1)$ suponha que $A : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ é uma isometria. Vamos mostrar que A é a restrição de uma função $\tilde{A} \in O(n+1)$. Defina

$$\begin{aligned}\tilde{A} : \mathbb{R}^{n+1} &\longrightarrow \mathbb{R}^{n+1} \\ (r, \theta) &\longmapsto rA(1, \theta) \\ 0 &\longmapsto 0\end{aligned}$$

Se mostramos que \tilde{A} é uma isometria linear, é claro que ela é um elemento de $O(n+1)$ pela conta anterior. De fato, basta mostrar que \tilde{A} é uma isometria, pois toda isometria de espaços de Banach que fixa a origem é linear ([?] Teo. 7.11).

Para ver que \tilde{A} é uma isometria de \mathbb{R}^{n+1} , **afirmo** que a distância de p a q está totalmente determinada pelas normas $\|p\|$ e $\|q\|$, e pela distância esférica entre $\frac{p}{\|p\|}$ e $\frac{q}{\|q\|}$. Note que essa afirmação é na verdade um problema de geometria plana, pois todas essas quantidades podem ser descritas dentro do único plano que contém 0 , p e q .




Figure 1: Intento de prova

Acabou que essa afirmação é simplesmente a lei dos cosenos, já que a distância esférica entre $\frac{p}{\|p\|}$ e $\frac{q}{\|q\|}$ é exatamente o ângulo entre p e q (poque essa distância é um segmento de círculo máximo!):

$$\text{lei dos cosenos: } d(p, q)^2 = \|p\|^2 + \|q\|^2 - 2\|p\|\|q\| \cos \angle(p, q)$$

Em fim, \tilde{A} é uma isometria porque $d_{\mathbb{R}^{n+1}}(p, q) = d_{\mathbb{R}^{n+1}}(\tilde{A}p, \tilde{A}q)$ pelo argumento anterior.

□

Exercício 12 Seja (G, g) um grupo de Lie munido de uma métrica bi-invariante e ∇ sua conexão de Levi-Civita.

(a) Mostre que

$$\nabla_u v = \frac{1}{2}[u, v],$$

para cada $u, v \in \mathfrak{g} \subset \mathfrak{X}(G)$.

(b) Seja $\bar{\nabla}$ uma conexão agim simétrica em G . Mostre que $\bar{\nabla} = \nabla$ se e somente se $\bar{\nabla}_u u = 0$ para todo $u \in \mathfrak{g}$.

Solution.

(a) Como ∇ é Levi-Civita, temos Koszul, i.e. $\forall u, v, w \in \mathfrak{g}$,

$$\begin{aligned} 2 \langle \nabla_u v, w \rangle &= u \langle v, w \rangle + v \langle u, w \rangle - w \langle u, v \rangle \\ &\quad - \langle u, [v, w] \rangle + \langle v, [w, u] \rangle + \langle w, [u, v] \rangle \end{aligned}$$

Como $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é invariante à esquerda, é constante quando avaliamos em elementos de \mathfrak{g} , e portanto os primeiros três termos se anulam. Então o exercício acaba quando mostramos que

$$\langle v, [w, u] \rangle = \langle u, [v, w] \rangle = - \langle u, [w, v] \rangle.$$

Seguindo [dC79], p. 45., a ideia é usar o fluxo $\varphi : \mathbb{R} \times G \rightarrow G$ de w para expressar o colchete de Lie. Primeiro precisamos de

Afirmção O fluxo φ de um campo invariante à esquerda w comuta com a traslação à esquerda, i.e.,

$$\varphi_t(e) \circ L_h = L_h \circ \varphi_t(e) \quad \forall t \in \mathbb{R} \forall h \in G.$$

Prova da afirmação. Derivamos de ambos lados. Por um lado,

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \varphi_t(e) \circ L_h = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \varphi_t(h) = v_h$$

Por outro lado,

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} L_h \circ \varphi_t(e) = (L_h)_{*, \varphi_t(e)} \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \varphi_t(e) = (L_h)_{*, e} v_e = v_h.$$

Por unicidade das soluções de EDOs, acabou. \square

Então repare:

$$\varphi_t(h) = (\varphi_t \circ L_h)(e) = (L_h \circ \varphi_t)(e) = h \varphi_t(e) = R_{\varphi_t(e)} h,$$

ou seja, qualquer curva integral de w é simplesmente a curva integral que passa por e trasladada.

Agora lembre que o colchete de Lie pode ser expressado como

$$[w, v]_e = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \left(\varphi_{-t} \right)_{*, \varphi_t(e)} v_{\varphi_t(e)}.$$

(Onde fixamos o parâmetro $-t$ e deixamos livre o outro para ver φ_{-t} como um difeomorfismo de G .)

Juntando com a discussão anterior obtemos

$$[w, v]_e = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \left(R_{\varphi_{-t}(e)} \right)_{*, \varphi_t(e)} v_{\varphi_t(e)}.$$

Agora repare: como a métrica é bi-invariante,

$$\begin{aligned} \langle u, v \rangle &= \left\langle \left(R_{\varphi_{-t}(e)} \right)_{*, \varphi_t(e)} \left(L_{\varphi_t(e)} \right)_{*, e} u_e, \left(R_{\varphi_{-t}(e)} \right)_{*, \varphi_t(e)} \left(L_{\varphi_t(e)} \right)_{*, e} v_e \right\rangle \\ &= \left\langle \left(R_{\varphi_{-t}(e)} \right)_{*, \varphi_t(e)} u_{\varphi_t(e)}, \left(R_{\varphi_{-t}(e)} \right)_{*, \varphi_t(e)} v_{\varphi_t(e)} \right\rangle \end{aligned}$$

Agora derivemos como funções de t (dentro de $T_e G$, i.e. não precisamos derivada covariante), e avaliemos em $t = 0$. (Note que quando avaliamos em $t = 0$ o factor que não derivamos não muda—estamos trasladando à direita e à esquerda por $\varphi_0(e)$!) Obtemos:

$$\begin{aligned} 0 &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \left\langle \left(R_{\varphi_{-t}(e)} \right)_{*, \varphi_t(e)} u_{\varphi_t(e)}, \left(R_{\varphi_{-t}(e)} \right)_{*, \varphi_t(e)} v_{\varphi_t(e)} \right\rangle \\ &= \left\langle \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \left(R_{\varphi_{-t}(e)} \right)_{*, \varphi_t(e)} u_{\varphi_t(e)}, \left[\left(R_{\varphi_{-t}(e)} \right)_{*, \varphi_t(e)} v_{\varphi_t(e)} \right]_{t=0} \right\rangle \\ &\quad + \left\langle \left[\left(R_{\varphi_{-t}(e)} \right)_{*, \varphi_t(e)} u_{\varphi_t(e)} \right]_{t=0}, \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \left(R_{\varphi_{-t}(e)} \right)_{*, \varphi_t(e)} v_{\varphi_t(e)} \right\rangle \\ &= \langle [w, u]_e, v_e \rangle + \langle u_e, [w, v]_e \rangle. \end{aligned}$$

Pelo inciso (a), é claro que se $\bar{\nabla} = \nabla$, $\bar{\nabla}_u u = 0$. Para a implicação contrária, vejamos que

$$\bar{\nabla}_u v = \frac{1}{2} [u, v], \quad u, v \in \mathfrak{g}$$

que é conveniente porque sabemos que isso é igual a $\nabla_u v$ pelo inciso (a). É só fazer:

$$0 = \bar{\nabla}_{u+v} u + v = \overrightarrow{\bar{\nabla}_u u}^0 + \bar{\nabla}_u v + \bar{\nabla}_v u + \overrightarrow{\bar{\nabla}_v v}^0$$

Lembre que $\bar{\nabla}$ é simétrica, i.e. $\bar{\nabla}_u v - \bar{\nabla}_v u = [u, v]$. Somando com a equação anterior:

$$\bar{\nabla}_u v - \bar{\nabla}_v u + \bar{\nabla}_u v + \bar{\nabla}_v u = [u, v]$$

como queríamos. Para concluir é só ver que ∇ e $\bar{\nabla}$ também coincidem em campos vectoriais que não são invariantes à esquerda. Então pegue uma base $\{u_i\} \subset \mathfrak{g}$ e dois campos $X = X^i u_i, Y = Y^j u_j$ quaisquer. Então:

$$\bar{\nabla}_X Y = \bar{\nabla}_{X^i u_i} Y^j u_j = X^i u_i Y^j u_j + Y^j \bar{\nabla}_{u_i} u_j = X^i u_i Y^j u_j + Y^j \nabla_{u_i} u_j = \nabla_X Y.$$

Pergunta Tem algum argumento super simples para argumentar essa última parte sem pegar uma base de \mathfrak{g} ?

□

Exercício 13 (Exercício 3, Cap. III, [dC79]) Sejam G um grupo de Lie, \mathfrak{g} sua álgebra de Lie, e $X \in \mathfrak{g}$. As trajetórias de X determinam uma aplicação $\varphi : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow G$ com $\varphi(0) = e$, $\varphi'(t) = X(\varphi(t))$.

- (a) Prove que $\varphi(t)$ está definida para todo $t \in \mathbb{R}$ e que $\varphi(t+s) = \varphi(t) \cdot \varphi(s)$, ($\varphi : \mathbb{R} \rightarrow G$ é então chamado um *subgrupo a 1-parâmetro* de G).
- (b) Prove que se G tem uma métrica bi-invariante $\langle \cdot, \cdot \rangle$ então as geodésicas de G que partem de e são os subgrupos a 1-parâmetro de G .

Solution.

- (a) Lembre que no exercício anterior mostramos que

$$\varphi_t(h) = R_{\varphi_t(e)}(h) = h \cdot \varphi_t(e), \quad \forall t \in (-\varepsilon, \varepsilon), \forall h \in G.$$

Fixe um $t_0 \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ e pegue $h = \varphi_{t_0}(e)^{-1}$. Obtemos que

$$\varphi_t(\varphi_{t_0}(e)^{-1}) = \varphi_{t_0}(e)^{-1} \varphi_t(e).$$

Ou seja, $\varphi_{t_0}(e)^{-1} \varphi_t(e)$ é uma curva integral de X que passa por e no tempo $t = t_0$. Como também $\varphi_{t-t_0}(e)$ é uma curva integral de X que passa por e no tempo $t = t_0$, por unicidade de EDOs obtemos

$$\varphi_{t_0}(e)^{-1} \varphi_t(e) = \varphi_{t-t_0}(e) \quad (3)$$

Avaliando o lado esquerdo em $t' = t - t_0$, do lado direito chegamos até $\varphi_{t-2t_0}(e)$. Repetindo esse processo cobrimos todo \mathbb{R} .

Para confirmar a segunda propriedade avaliamos eq. (3) em $t = 0$ para obter $\varphi_{t_0}(e)^{-1} = \varphi_{-t_0}(e)$. Para concluir pegue $t, s \in \mathbb{R}$ quaisquer e escreva:

$$\varphi_{t+s}(e) = \varphi_{t-(-s)}(e) = \varphi_{-s}^{-1} \varphi_t(e) = \varphi_s(e) \varphi_t(e).$$

- (b) Pegue $X \in \mathfrak{g}$ e considere a curva integral que passa por e , φ . Pelo exercício anterior,

$$0 = \nabla_X X = \nabla_{\varphi_* \frac{d}{dt}} X = \nabla_{\frac{d}{dt}}^{\varphi} X \circ \varphi = \nabla_{\varphi'} \varphi'$$

Então as curvas integrais de X que passam por e são geodésicas. Como isso é para qualquer vetor em \mathfrak{g} , por unicidade das soluções a EDOs, acabou.

□

Exercício 14 Dada uma variedade Riemanniana (M^n, g) denotamos por d_g a distância induzida por g .

- (a) Sejam g, h duas métricas Riemannianas em M^n . Mostre que se $d_g = d_h$ então $g = h$.
- (b) Seja (M, g) uma variedade Riemanniana e $F : M \rightarrow M$ um difeomorfismo. Mostre que F é uma isometria se e somente se $d_g(F(\cdot), F(\cdot)) = d_g(\cdot, \cdot)$.

Demonstração.

- (a) Prova por contrapositiva.

Afirmção Se $g \neq h$, existem um aberto $U \subset M$ e um marco $\{E_i\} \subset \mathfrak{X}(U)$ tais que

$$g(E_{i_0}, E_{i_0}) \neq h(E_{i_0}, E_{i_0}) \quad \text{para algum } i_0 \in \{1, \dots, n\}.$$

Prova da afirmação. Se $g(E_i, E_i) = h(E_i, E_i)$ para todo marco em todo aberto de M , é claro que

$$g(X, Y) = g(X^i E_i, Y^j E_j) = X^i Y^j g(E_i, E_j) = h(X, Y)$$

para quaisquer $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$. □

Então pegue um marco $\{E_i\} \in \mathfrak{X}(U)$ tal que $g(E_{i_0}, E_{i_0}) \neq h(E_{i_0}, E_{i_0})$ em U . Sendo a diferença dessas quantidades uma função distinta da constante zero, podemos supô-la estritamente positiva dentro de U . Pegue $p \in U$ e uma vizinhança geodésica contendo p , que renomeamos U por simplicidade. Dentro de uma vizinhança geodésica, a distância de p aos outros pontos dentro de U está realizada por geodésicas, então podemos pegar $q \in U$ e γ geodésica ligando p e q .

Considere uma extensão de $\gamma' \in \mathfrak{X}_\gamma$ dentro de U , digamos $G = G^i E_i$. Então:

$$\begin{aligned} d_g(p, q) &= \int_a^b g(G^i E_i, G^i E_i) \circ \gamma dt = \int_a^b (G^i \circ \gamma)^2 g(E_i, E_i) \circ \gamma dt \\ &\neq \int_a^b (G^i \circ \gamma)^2 h(E_i, E_i) \circ \gamma dt = d_h(p, q). \end{aligned}$$

- (b) Primeiro suponha que $F^* d_g = d_g$. Para mostrar que F é uma isometria usamos o inciso anterior: consideramos as métricas g e $F^* g$ em M . Basta mostrar que $d_g = d_{F^* g}$. Por um tempo pensei que era para usar um câmbio de variáveis, mas acabei pensando assim: Pegue uma curva γ ligando p e q . Note que

$$\underbrace{\int_a^b F^* g(\gamma'(t), \gamma'(t)) dt}_{\ell(\text{curva de } p \text{ a } q)} = \underbrace{\int_a^b g(F_{*, \gamma(t)} \gamma'(t), F_{*, \gamma(t)} \gamma'(t)) dt}_{\ell(\text{curva de } F(p) \text{ a } F(q))}$$

Ou seja, do lado esquerdo estamos medindo o comprimento (respeito à métrica $F^* g$) de uma curva ligando p a q , enquanto que do lado direito estamos medindo o comprimento (respeito à métrica g) da curva $F \circ \gamma$, que liga $F(p)$ a $F(q)$.

Pegando o ínfimo de ambas quantidades, concluímos que a distância d_{F^*g} coincide com a distância F^*d_g , que por hipótese é igual a d_g . A implicação contrária também fica clara: supondo que $F^*g = g$, levando em conta a igualdade das integrais acima e pegando o ínfimo, concluímos que $F^*d_g = d_g$.

□

Exercício 15 Suponha que (M^n, g) é uma variedade Riemanniana conexa.

- (a) (M, g) simétrica $\implies (M, g)$ homogênea.
- (b) (M, g) 2-homogênea $\implies (M, g)$ isotrópica.

Solution.

- (a) **Ideia.** Pegamos dois pontos $q, q' \in M$. Para usar que M é simétrica buscamos o “ponto meio”. Esse deve ser $p \in M$ que esteja no meio do caminho de uma curva minimizante γ ligando q e q' . Daí, pegamos $F \in \text{Iso}_p := \{ \text{isometrias de } M \text{ que fixam } p \}$ com a propriedade de que $d_p F = -\text{Id}$. Daí devemos provar que F preserva γ e não fixa q . Daí, só existem dois pontos em γ que guardam a mesma distância com p : q e q' . Como $F(q) \neq q$ também guarda essa distância, concluímos que $F(q) = q'$.

Infelizmente fui incapaz de levar minha ideia até uma prova sem ajuda externa. Primeiramente me pareceu improvável a possibilidade de construir a geodésica minimizante (pode não existir para variedades não completas; mostrar que a propriedade de simetria implica a existência de curvas minimizantes parecia muito forte).

Conjectura Para quaisquer $q, q' \in M$ existe uma curva minimizante γ ligando q e q' .

Supondo que existe γ , podemos pegar $F \in \text{Iso}_p$ tal que $d_p F = -\text{Id}$ onde p é ponto meio sobre γ respeito q e q' .

Tentei mostrar que F preserva γ perto de p usando um marco geodésico, onde a geodésicas são curvas integrais de linhas, mas depois descobri que minha prova estava errada (pois dF só age como $-\text{Id}$ em p):

Afirmção Perto de p , $F(\gamma(t)) \in \text{img } \gamma$.

Prova da afirmação. Pegue coordenadas geodésicas centradas em p , de modo que as curvas minimizantes como γ são imagens de retas em $T_p M$ baixo a exponencial. Agora derivamos: $F \circ \gamma$:

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_t F \circ \gamma = F_{*, \gamma(t)} \gamma'(t) = -\gamma'(t).$$

Portanto, a derivada da curva $F \circ \gamma$ coincide com a derivada de γ . Por unicidade de soluções de EDOs, concluímos que $F \circ \gamma(t) \in \text{img } \gamma$ dentro desta bola geodésica. □

Depois desse ponto comecei a buscar ajuda em livros, internet e ChatGPT. Rapidamente reparei que minhas ideias eram boas, e consegui:

Prova da afirmação reforçada. Pegue coordenadas geodésicas centradas em p , de modo que as curvas minimizantes como γ são imagens de retas em $T_p M$ baixo a exponencial. Agora derivamos: $F \circ \gamma$ em $t = 0$ (supondo que $\gamma(0) = p$):

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} F \circ \gamma = F_{*,p} \gamma'(0) = -\gamma'(0).$$

Portanto, a derivada da curva $(F \circ \gamma)(t)$ coincide com a derivada de $\gamma(-t)$. Por unicidade de soluções de EDOs, concluímos que $F \circ \gamma(t) \in \text{img } \gamma$ dentro desta bola geodésica. \square

Seguindo com esse raciocínio, $F \circ \gamma$ é uma curva definida em todo o domínio de γ , e portanto deve coincidir com $\gamma(-t)$ ao longo desse domínio. Ou seja, $F \circ \gamma$ é γ percorrida em sentido oposto. Isso significa, por definição de p como ponto meio, e desde que supomos que $\gamma(0) = p$, que, se $\gamma(t_0) = q$, necessariamente $q' = \gamma(-t_0) = (F \circ \gamma)(t_0) = F(q)$, como queríamos. (Note que meu desejo inicial de mostrar que $F(q) \neq q'$ não foi necessário.)

Então tudo fica resolvido se mostramos a conjectura. O motivo inicial para conjecturar isso foi notar que $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, onde os pontos antípodas (entre outros) não podem ser ligados por curvas minimizantes, parece perder a propriedade de ser um espaço simétrico (que \mathbb{R}^2 tem). Com efeito, a intuição mostra que $\text{Iso}(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) = O(2)$, de modo que o grupo de isotropia Iso_p é trivial para todo ponto.

A inspiração final chega de [MathOverflow](#): parece que, com efeito, toda variedade simétrica é completa:

“Consider a local geodesic and use the symmetry to flip it, effectively doubling the length of the geodesic, ad infinitum”

A ideia nos lembra do exercício que fizemos com grupos de Lie. Pegamos uma geodésica definida perto de p . Pegamos $q \neq p$ dentro da bola geodésica centrada em p . Agora considere $F \in \text{Iso}_q$ tal que $F_q = \text{Id}$. Sabemos que γ está definida entre p e q , e, pela afirmação mostrada acima, compondo com F obtemos γ reparametrizada em sentido oposto. Isso permite chegar a um ponto sobre a curva original que fica à mesma distância de q que p , só que no sentido oposto. Repetindo esse processo, vemos que a geodésica pode ser estendida infinitamente.

De fato, isso parece mostrar a conjectura via teorema de Hopf-Rinow, por exemplo em [\[Lee19\]](#), Lemma 6.18 e Coro. 6.20. Tem uma prova sem usar esse teorema?

- (b) Queremos ver que $\forall p \in M$ e $\forall v, w \in T_p^1 M$ existe $F \in \text{Iso}_p(M)$ tal que $F_{*,p} v = w$. Para usar a propriedade de ser 2-homogênea, defina $p_1 := q_1 := p$, e $p_2 := \exp_p(v)$, $q_2 := \exp_p(w)$. (Isto é, supondo por enquanto que \exp_p está definida em vetores de norma 1.) Então existe $F \in \text{Iso}(M)$ tal que $F(p_1) = F(q_1)$, i.e. $F \in \text{Iso}_p(M)$, e tal que $F(p_2) = F(q_2)$.

Para ver que $F_{*,p} v = w$, note que $(F \circ \gamma_v)(1) = F(\gamma_v(1)) = F(p_2) = q_2$. Então $F \circ \gamma_v$ é uma curva ligando p e q . Pelo exercício 14(b) dessa lista, como F é uma isometria, sabemos que preserva a distância, de modo a $F \circ \gamma_v$ é minimizante e portanto uma geodésica. Daí $F \circ \gamma_v$ é uma reparametrização de γ_w ; mas como F é isometria,

preserva a norma dos vetores velocidade e portanto as curvas coincidem. Isso significa que $w = \gamma'_w(0) = (F \circ \gamma_v)'(0) = F_{*,p} \gamma'_v(0) = F_{*,p} v$.

Por último só note que se \exp_p não está definida em vetores de norma 1, podemos fazer a mesma construção em vetores que estejam dentro do domínio dela, obtendo uma função cuja diferencial envia um múltiplo pequeno de v em um múltiplo de igual proporção respeito a w . A diferencial dessa função também envia v em w , pois é uma isometria linear.

□

Lista 4

Exercício 1 (Cap. IV Exer. 1, [dC79]) Seja G um grupo de Lie com uma métrica $\langle \cdot, \cdot \rangle$ bi-invariante. Seja $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(G)$ campos unitários e invariantes à esquerda em G .

- (a) Mostre que $\nabla_X Y = \frac{1}{2}[X, Y]$. (Feito na lista 3.)
- (b) Conclua de (a) que $R(X, Y)Z = \frac{1}{4}[[X, Y], Z]$.
- (c) Prove que, se X e Y são ortonormais, a curvatura seccional $K(\sigma)$ de G segundo o plano σ gerado por X e Y é dada por

$$K(\sigma) = \frac{1}{4}\| [X, Y] \|^2.$$

Portanto, a curvatura seccional $K(\sigma)$ de um grupo de Lie com métrica bi-invariante é não negativa e é zero se e só se σ é gerado por vetores X, Y tais que $[X, Y] = 0$.

Solution.

(b)

$$\begin{aligned} R(X, Y)Z &= \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z \\ &= \frac{1}{2} \nabla_X [Y, Z] - \frac{1}{2} \nabla_Y [X, Z] - \frac{1}{2} [[X, Y], Z] \\ &= \frac{1}{4} [X, [Y, Z]] - \frac{1}{4} [Y, [X, Z]] - \frac{1}{2} [[X, Y], Z] \\ &= \frac{1}{4} ([X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]]) + \frac{1}{4} [Z, [X, Y]] \\ \text{identidade de Jacobi} \quad &= \frac{1}{4} [Z, [X, Y]] \end{aligned}$$

que é exatamente o que queríamos a menos de um signo que muda com a convenção de [dC79] para R .

(c)

$$\begin{aligned} K(X, Y) &= \frac{R(X, Y, Y, X)}{\langle X, X \rangle \langle Y, Y \rangle - \langle X, Y \rangle^2} \\ &= R(X, Y, Y, X) = \langle R(X, Y)Y, X \rangle \quad X, Y \text{ ortonormais} \\ &= \frac{1}{4} \langle [[X, Y], Y], X \rangle \quad \text{inciso (b) (convenção [dC79])} \end{aligned}$$

Agora lembre que na lista 3 provei que

$$\langle [w, u], v \rangle = -\langle u, [w, v] \rangle \quad \forall u, v, w \in \mathfrak{g}$$

Pegue $u = [X, Y]$, $v = X$ e $w = Y$ para obter

$$\langle [Y, [X, Y]], X \rangle = -\langle [X, Y], [Y, X] \rangle = \langle [X, Y], [X, Y] \rangle$$

a por outra parte

$$\langle [Y, [X, Y]], X \rangle = -\langle [[X, Y], Y], X \rangle$$

Então parece de novo que tá errado por um signo mas resulta que a definição de K também é outra em [dC79], então por antisimetria de R nas últimas duas entradas o signo vira e tudo tá certo.

□

Exercício 2 Seja (M, g) uma variedade Riemanniana.

- (a) Se (M, g) é homogênea, então M possui curvatura escalar constante.
- (b) Se (M, g) é 2-homogênea, então M é Einstein.
- (c) Se (M, g) é 3-homogênea, então M possui curvatura seccional constante.

Solução.

- (a) (Começarei com o inciso (b), pois foi o que consegui fazer melhor.)
- (b) **(Intento sem ajuda externa. Com pouco de pena mas da para mostrar, pode poular.)** Queremos ver que existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $\lambda \text{Ric} = g$. Como tanto Ric quanto g são tensores, basta mostrar o resultado numa base do espaço tangente a qualquer ponto. Usamos o exercício 15(b) da lista 3 para obter que M é isotrópica, i.e. $\forall u, v \in T_p^1 M$ existe $f \in \text{Iso}(M)$ tal que $f_{*,p} u = v$.

Para uma base ortonormal E_i de $T_p M$ temos que

$$\begin{aligned} \text{Ric}(E_i, E_j) &= \sum_k \langle R(E_k, E_i)E_j, E_k \rangle \\ &= \sum_k \langle R(E_i, E_k)E_k, E_j \rangle \\ &= \sum_k \langle R(E_i, E_k)E_k, f_* E_i \rangle \end{aligned}$$

onde existe $f \in \text{Iso}$ tal que $f_* E_i = E_j$ porque M é isotrópica. Daí (aqui começo a ter dúvida) usamos que $f^* R = R$, ou seja

$$R(f_* E_i, f_* E_k) f_* E_k = R(E_i, E_k) E_k$$

isso é porque f é uma isometria e R depende da métrica e suas derivadas. Então a

equação acima vira

$$\begin{aligned}\text{Ric}(E_i, E_j) &= \sum_k \langle R(f_* E_i, f_* E_k) f_* E_k, f_* E_i \rangle \\ &= \sum_k \langle R(E_i, E_k) E_k, E_i \rangle \\ &= \sum_k K(E_i, E_k)\end{aligned}$$

que não faz sentido.

(Solução depois de consultar o professor + ChatGPT.) A observação central feita pelo professor é considerar o endomorfismo associado a Ric , que definimos como $\widehat{\text{Ric}}$ satisfazendo

$$\langle \widehat{\text{Ric}}(v), w \rangle = \text{Ric}(v, w)$$

A observação central feita pelo ChatGPT é que para uma isometria f temos que

$$f^* \text{Ric} = \text{Ric} \implies f_* \circ \widehat{\text{Ric}} = \widehat{\text{Ric}} \circ f_*$$

De fato, para $v, w \in T_p M$,

$$\begin{aligned}\langle \widehat{\text{Ric}}(f_* v), w \rangle &= \text{Ric}(f_* v, w) = f^* \text{Ric}(v, f_*^{-1} w) = \text{Ric}(v, f_*^{-1} w) \\ &= \langle \widehat{\text{Ric}} v, f_*^{-1} w \rangle = \langle f_* \widehat{\text{Ric}} v, w \rangle\end{aligned}$$

Agora mostramos que $\widehat{\text{Ric}} = \lambda \text{Id}$. Então como Ric é simétrico, $\widehat{\text{Ric}}$ é diagonalizável e dá para calcular o seus eigenvalores. Vamos ver todos eles coincidem. Pegue v, w eigenvetores de norma 1. Como M é 2-homogênea, sabemos que é isotrópica e existe f isometria tal que $f_* w = v$.

$$\lambda_v v = \widehat{\text{Ric}} v = \widehat{\text{Ric}}(f_* w) = f_* \widehat{\text{Ric}}(w) = f_* \lambda_w w = \lambda_w f_* w = \lambda_w v$$

então $\lambda_v = \lambda_w$ como queríamos. E isso mostra que em cada ponto,

$$\text{Ric}(v, w) = \langle \widehat{\text{Ric}} v, w \rangle = \langle \lambda v, w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle$$

ou seja, λ é na verdade uma função em M . Para ver que ela é constante, note que a condição de 2-homogeneidade implica homogeneidade, então Iso age transitivamente em M . Ou seja para $p \neq q$ pontos em M existe f isometria tal que $f(p) = q$. Como essa isometria preserva tanto o tensor de Ricci quanto a métrica, obtemos que

$$\begin{aligned}\lambda(q) g_q &= \text{Ric}_q = \text{Ric}_{f(p)} = (f^* \text{Ric})_p = \text{Ric}_p \\ &= \lambda(p) g_p = \lambda(p) (f^* g)_p = \lambda(p) g_{f(p)} = \lambda(p) g_q.\end{aligned}$$

- (c) **(Sem ajuda externa nem muito tempo para aprofundar!)** Minha ideia é assim: para controlar a curvatura seccional a partir da 3-homogeneidade realizamos dois vetores arbitrários $v, w \in T_p M$ como sendo as derivadas de duas curvas: uma ligando p a q , e outra ligando p a q' . Agora nos perguntamos como é a curvatura em outro ponto \hat{p} . Transportamos a terna (p, q, q') com uma isometria a alguma terna $(\hat{p}, \hat{q}, \hat{q}')$. Essa segunda terna pode ser escolhida de maneira que as correspondentes derivadas sejam quaisquer outros vetores \hat{v} e \hat{w} tangentes a \hat{p} . As curvaturas seccionais coincidem porque f é uma isometria.
- (a) **(Sem ajuda externa nem muito tempo para aprofundar!)** Uma isometria preserva a curvatura escalar. Como para todo $p \neq q$ em M existe isometria f tal que $f(p) = q$, obtemos que

$$\text{Scal}(q) = \text{Scal}(f(p)) = (f^* \text{Scal})(p) = \text{Scal}(p).$$

□

Exercício 5 (Exer. 4, Cap IV, [dC79]) Seja M uma variedade Riemanniana com a seguinte propriedade: dados dois pontos quaisquer $p, q \in M$, o transporte paralelo de p a q não depende da curva que liga p a q . Prove que a curvatura de M é identicamente nula, isto é, para todo $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$, $R(X, Y)Z = 0$.

Demonstração. Parece que a sugestão é a prova quase por completo. Começarei explicando os pontos que achei que era necessário destrinchar para chegar a uma prova formal, e depois escrevo o argumento completo (que é basicamente uma cópia da sugestão).

Concluir o exercício só depende de duas coisas:

1. **(Mostrar que f sempre existe.)** A prova formalmente começa pegando três vetores $X(p), Y(p), Z(p)$ no espaço tangente a um ponto arbitrário $p \in M$. Primeiro devemos mostrar que existe $f : U \rightarrow M$ tal que $\partial_s|_{(0,1)} = X(p)$, $\partial_t|_{(0,1)} = Y(p)$, e que $f(s, 0) = f(0, 0)$.

Primeiro usamos a exponencial \exp_p de M para definir a superfície como a imagem do subespaço vetorial gerado por $X(p)$ e $Y(p)$. A exponencial fica determinada numa bola aberta $B_\epsilon(0) \subset T_p M$. Note $X(p)$ e $Y(p)$ podem não estar contidos em $B_\epsilon(0)$, mas podemos consertar isso redefinindo a exponencial avaliando as geodésicas em valores menores do que 1. Agora compomos com uma função suave $g : U \rightarrow B_\epsilon(0)$ tal que

- $g(0, 1) = (0, 0)$, de modo que $p = (\widetilde{\exp}_p^{-1} \circ g)(0, 1)$.
- $g(s, 0) = g(0, 0)$.
- $g_{*,(0,1)} e_1 = X(p)$.
- $g_{*,(0,1)} e_2 = Y(p)$.

Então $f = \widetilde{\exp}_p^{-1} \circ g$. **(Faltou: por que sempre existe g ?)**

2. **(Mostrar que $Z(p)$ pode ser atingido como o transporte paralelo de $V(0,0)$.)** Isso é simples: definimos $V(0,0)$ como o transporte paralelo de $Z(p)$ a $f(0,0)$. Por unicidade do transporte paralelo, acabou.

Agora escrevo a prova completa. Como R é um tensor, basta mostrar o resultado num ponto só. R depende de três vetores.

Para escolher os primeiros dois consideramos a superfície dada como a imagem do mapa $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow M$ construído acima, cujo domínio U é um quadrado aberto contendo o quadrado unitário:


$$U := \{(s, t) \in \mathbb{R}^2; -\varepsilon < t < 1 + \varepsilon, -\varepsilon < s < 1 + \varepsilon, \varepsilon > 0\}$$

Definimos um campo vetorial pegando um vetor arbitrário $V_0 \in T_{f(0,0)}M$ e transportamos paralelamente ao longo das curvas verticais $t \mapsto (s, t)$. Isso significa que $\nabla_{\partial_t} V = 0$, e concluímos que

$$\nabla_{\partial_s} \nabla_{\partial_t} V = 0 = \nabla_{\partial_t} \nabla_{\partial_s} V + R(\partial_t, \partial_s)V$$

onde todos os campos são seções ao longo de f e R realmente é $R_{\nabla f} = f^*R$.

Agora notamos que $V(1,0)$ deve ser, além do transporte paralelo de $V(0,0)$ ao longo de $t \mapsto (0, t)$, o transporte paralelo de $V(0,0)$ ao longo de $t \mapsto (s, t)$ seguido de $s \mapsto (s, 1)$ para qualquer s . Concluímos que $\nabla_{\partial_s} V(s, 1) = 0$. Isso significa que $R_{f(0,1)} = 0$.



□

Campos de Killing

Exercício 11 (Exer. 5, Cap. III, [dC79]) Sejam M uma variedade Riemanniana e $X \in \mathfrak{X}(M)$. Seja $p \in M$ e sejam $U \subset M$ uma vizinhança de p , e $\varphi : (-\varepsilon, \varepsilon) \times U \rightarrow M$ uma aplicação diferenciável tais que para todo $q \in U$ a curva $t \mapsto \varphi(t, q)$ é a trajetória de X passando por q em $t = 0$. X é chamado um **campo de Killing** (ou uma **isometria infinitesimal**) se, para todo $t_0 \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ a aplicação $\varphi(t_0) : U \subset M \rightarrow M$ é uma isometria. Prove que

- (a) Um campo linear em \mathbb{R}^n , definido por uma matriz A é um campo de Killing se e só se A é anti-simétrica.
- (b) Seja X um campo de Killing em M , $p \in M$ e U uma vizinhança normal de p em M . Admita que p é o único ponto de U que satisfaz $X(p) = 0$. Então, em U , X é tangente às esferas geodésicas centradas em p .
- (c) Sejam X um campo diferenciável de vetores em M e $f : M \rightarrow N$ uma isometria. Seja Y o campo de vetores em N definido por $Y(f(p)) = df_p(X(p))$, $p \in M$. Então Y é um campo de Killing se e somente se X também o for.
- (d) X é de Killing $\iff \langle \nabla_Y X, Z \rangle + \langle \nabla_Z X, Y \rangle = 0$ para todo $Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$ (a equação acima é chamada **equação de Killing**).
- (e) Seja X um campo de Killing em M com $X(q) \neq 0$, $q \in M$. Então existe um sistema de coordenadas (x_1, \dots, x_n) em uma vizinhança de q , de modo que os coeficientes g_{ij} da métrica neste sistema de coordenadas não dependem de x_n .

Solução.

- (d) Seguimos a sugestão usando [Lee12].

Observação Note que X é de Killing $\iff \mathcal{L}_X g = 0$. A ideia para escrever com a definição de derivada de Lie de campos tensoriais covariantes:

$$(\mathcal{L}_X g)_p(Y, Z) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} g_{\varphi_t(p)}(\varphi_{*,p}^t Y_p, \varphi_{*,p}^t Z_p) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} g_p(Y_p, Z_p) = 0$$

onde escrevo o fluxo como φ_t ou φ^t a vontade para facilitar notação. A volta também é simples usando Thm 12.37 [Lee12]: $(\varphi_t^* g)_p = g_p \iff \mathcal{L}_X g = 0$.

Usando essa observação o inciso (d) pode ser resolvido assim: X killing $\iff \mathcal{L}_X g = 0$. Desenrolamos essa definição usando Prop. 12.32(d) [Lee12]:

$$\begin{aligned} 0 &= (\mathcal{L}_X g)(Y, Z) = L_X(g(Y, Z)) - g(L_X Y, Z) - g(Y, L_X Z) \\ &= X \langle Y, Z \rangle - \langle [X, Y], Z \rangle - \langle Y, [X, Z] \rangle \end{aligned}$$

Como $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é simétrica,

$$\begin{aligned} X \langle Y, Z \rangle &= \langle \nabla_X Y, Z \rangle + \langle Y, \nabla_X Z \rangle \\ &= \langle \nabla_X Y, Z \rangle - \langle \nabla_Y X, Z \rangle \\ &\quad + \langle \nabla_X Z, Y \rangle - \langle \nabla_Z X, Y \rangle \end{aligned}$$

Como $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é métrica, acabou.

(a) Noto que para todo $p = (p^1, \dots, p^n) \in \mathbb{R}^n$,

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \varphi(t, p) = X_p = A(p).$$

Consegui escrever

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \varphi(t, p)^i = a_{ij} p^j$$

pensando nas funções coordenadas de $\varphi(t, p)$. Porém, não vi que isso é um sistema de equações diferenciais! Divaguei um tempo sem chegar a nada. Consultando ChatGPT, da para escrever

$$\begin{cases} \dot{\varphi}(t, p) = A\varphi(t, p) \\ \varphi(0, p) = p \end{cases}$$

que tem solução

$$\varphi(t, p) = e^{tA} \varphi(0, p).$$

Isso faz sentido pelas propriedades da exponencial de matrizes, em particular o fato que que

$$\frac{d}{dt} e^{tA} = A e^{tA} \quad [\text{Hal15}], \text{ Prop. 2.4}$$

que implica que efetivamente a função $e^{tA} \varphi(0, t)$ é solução do sistema dado acima. (Explorei outras formas de resolver o sistema, mas achei essa explicação mais familiar.)

Então concluímos que o fluxo é um mapa linear (a exponencial de matrizes é uma matriz). Como além disso é uma isometria, segue que é um elemento de $O(n)$. Agora lembre que a exponencial de grupos de Lie, que coincide com a exponencial de matrizes nesse caso, é um mapa da álgebra de Lie ao grupo. Como $\exp(tA) \in O(n)$, concluímos que $A \in \mathfrak{o}(n)$. Para concluir só devemos confirmar que $\mathfrak{o}(n)$ consta das matrizes antisimétricas. Note que

$$0 = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \langle \exp(tA)x, \exp(tA)y \rangle = \langle Ax, y \rangle + \langle x, Ay \rangle$$

onde $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é o produto ponto euclidiano. De fato, podemos reescrever as parcelas como

$$\langle Ax, y \rangle = (Ax)^T y = x^T A^T y, \quad \langle x, Ay \rangle = x^T (Ay)$$

obtendo que

$$0 = x^T (A^T + A) y$$

ou seja, $A^T + A = 0$. (Argumento do Misha; também era natural pegar uma curva em $O(n)$ e derivar.)

(b) Note que φ_t é uma isometria de $B_\varepsilon(p)$. Isso segue de que $\varphi_t(p) = p$ para todo t . Isso segue de que a curva constante p satisfaz a equação do fluxo $0 = X_p = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \varphi_t(p)$ e a mesma condição inicial. Daí segue que, como φ preserva a métrica

riemanniana e portanto a distância riemanniana, ele manda esferas geodésicas em esferas geodésicas. Segue que as derivadas do fluxo, i.e. vetores de X são tangentes às esferas geodésicas.

- (c) Parece que segue da “Propriedade de naturalidade dos fluxos”, uma proposição em [Lee12]. Vejamos se posso escrever o essencial: basta mostrar que o fluxo de $\tilde{X} := f_*X$ é dado por $f \circ \varphi$ onde φ é o fluxo de X . Basta diferenciar $f \circ \varphi$ e comprovar que sua derivada coincide com \tilde{X} em cada ponto. Por unicidade de EDOs, acabou. E sim: $(f \circ \varphi_p)'(0)$ é, por definição de vetores como velocidades de curvas, $f_*(\varphi_p'(0)) = f_*X$.

Seja $\tilde{\varphi}$ o fluxo de \tilde{X} . Para ver que $\tilde{\varphi}_t$ é uma isometria para todo t , note que para todo $\tilde{p} = f(p) \in \tilde{M}$ temos que

$$\tilde{\varphi}_t(\tilde{p}) = \tilde{\varphi}_{\tilde{p}}(t) = (f \circ \varphi_p)(t) = f(\varphi_t(p))$$

é isometria porque f e φ_t são isometrias. (A troca do subíndice no fluxo me serve para pensar o fluxo como curva ou como isometria.)

- (e) Queremos mostrar que $\frac{\partial}{\partial x^n} g_{ij} = 0$ para todo i, j naquele sistema coordenado. A escolha natural é o sistema coordenado onde $X = \partial_n$. Como X é Killing vemos que:

$$0 = L_{\partial_n}(g_{ij} dx^i dx^j) = (\partial_n g_{ij}) dx^i dx^j + g_{ij} L_{\partial_n} dx^i dx^j$$

de novo pelas propriedades da derivada de Lie para campos tensoriais em [Lee12]. Lembre que $dx^i dx^j$ denota a simetrização de $dx^i \otimes dx^j \in \Gamma(T^*M \otimes T^*M)$, que é igual a $\frac{1}{2}(dx^i \otimes dx^j + dx^j \otimes dx^i)$ (quase) por definição—é uma conta pequena com a definição de simetrização de tensores. Basta argumentar que a segunda parcela da equação anterior se anula. Então temos que

$$\begin{aligned} 2L_{\partial_n}(dx^i dx^j) &= (L_{\partial_n} dx^i) \otimes dx^j + dx^i \otimes (L_{\partial_n} dx^j) \\ &\quad + (L_{\partial_n} dx^j) \otimes dx^i + dx^j \otimes (L_X dx^i) \end{aligned}$$

Lembremos a definição da derivada de Lie de campos tensoriais:

$$L_{\partial_n} dx^i := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \varphi_t^* dx^i$$

onde para $V \in \mathfrak{X}(M)$ o pullback de campos tensoriais é definido por

$$(\varphi_t^* dx_i)_p := (dx^i)_{\varphi(t,p)}(\varphi_{*,p}^t V_p)$$

Minha intuição é que o fluxo de ∂_n não modifica as coordenadas de V distintas de V^n , mas talvez essa última sim. No caminho para comprovar isso descobri que de fato o pushforward é a identidade. Vamos calcular o fluxo de $X = \partial_n$ (aqui usei ChatGPT):

$$x \circ \varphi_p(t) = \left((x^1 \circ \varphi_p)(t), \dots, (x^n \circ \varphi_p)(t) \right) := (\varphi^1(t), \dots, \varphi^n(t))$$

obtemos o sistema

$$\dot{\varphi}^i(t) \begin{cases} 0 & i \neq n \\ 1 & i = n \end{cases}$$

que implica que

$$\varphi^i(t) = \begin{cases} x(p) & i \neq n \\ x(p) + t & i = n \end{cases}$$

dada a condição inicial $x \circ \varphi(0) = x(p)$. Então aqui, para minha surpresa, acaba que, dado t fixo, a derivada do fluxo φ_t é a identidade. E sim, porque como difeomorfismo de M vemos em coordenadas que trata-se do mapa

$$(x^1(p), \dots, x^n(p)) \mapsto (x^1(p), \dots, x^n(p) + t),$$

e quando derivamos, como t é fixo, obtemos a matrix identidade. Concluimos que φ_t^*V é constante respeito a t , de modo que a derivada de Lie é zero. Note que o fato de que a derivada do fluxo é a identidade não significa que $L_{\partial_n}\omega = 0$ para outros campos tensoriais, pois embora o pushforward dos campos vetoriais não é modificado por φ , outros campos tensoriais podem variar de ponto a ponto, de modo que o pullback não é constante.

□

Exercício 14 (Exer. 12, Cap. VI, [dC79], Singularidades de um campo de Killing) Seja X um campo de Killing em uma variedade Riemanniana M . Seja $N = \{p \in M; X(p) = 0\}$. Prove que

- (a) Se $p \in N$, $V \subset M$ é uma vizinhança normal de p , e $q \in N \cap V$, então o segmento de geodésica radial γ ligando p a q está contido em N . Conclua que $\gamma \cap V \subset N$.
- (b) Se $p \in N$, existe uma vizinhança $V \subset M$ de p tal que $V \cap N$ é uma subvariedade de M (Isto implica que toda componente conexa de N é uma subvariedade de M).
- (c) A codimensão, como subvariedade de M , de uma componente conexa N_k de N é par. Admita o seguinte fato: se uma esfera possui um campo diferenciável não nulo então sua dimensão é ímpar.

Solução.

- (a) Suponha que existe um ponto $\gamma(t_0)$ sobre γ onde X não é nulo. Como X é de Killing, o fluxo preserva a distância, i.e. sabemos que para qualquer s ,

$$\varepsilon_1 := d(\gamma(t_0), p) = d(\varphi_s(\gamma(t_0)), \varphi_s(p)) = d(\varphi_s(\gamma(t_0)), p)$$

de modo que $\varphi_s(\gamma(t_0))$ está na esfera de raio ε_1 centrada em p . Porém, o mesmo acontece com q , i.e. $\varphi_s(\gamma(t_0))$ está na esfera de raio $\varepsilon_2 := d(\gamma(t_0), q)$ centrada em q . Essas duas esferas se intersectam tangencialmente em $\gamma(t_0)$ pelo lema de Gauss, e portanto o ponto de interseção é único numa vizinhança dele. Isso significa que o fluxo é constante em $\gamma(t_0)$ e portanto $X(\gamma(t_0)) = 0$.

- (b) **(Solução seguindo a sugestão.)** Devemos mostrar que para todo $t \in \mathbb{R}$, a restrição da diferencial do fluxo φ_t^* a $Q := \text{span}(\exp_p^{-1}(q_1), \exp_p^{-1}(q_2))$ é a identidade. Isso resulta claro pelo exercício 3 da lista 3: como φ^t é uma isometria,

$$\varphi^t \circ \exp_p = \varphi_t^* \circ \exp_p$$

Defina $v_1 = \exp_p^{-1}(q_1)$. Como q_1 é um ponto fixo de φ_t ,

$$\varphi^t(\exp_p(v_1)) = \exp_p(v_1)$$

Pela observação da lista 3, esse ponto também é

$$\exp_p(\varphi_t^*(v_1)) = \exp_p(v_1)$$

Então, como \exp_p é bijetiva,

$$\varphi_t^*(v_1) = v_1$$

Agora defina $v_2 = \exp_p^{-1}(q_2)$; o mesmo argumento funciona. E mesmo para qualquer $v := av_1 + bv_2 \in \text{span}(v_1, v_2)$. Segue que em qualquer ponto de $N_2 := \exp(\text{span}(v_1, v_2))$ o fluxo tem derivada zero e portanto X se anula. O procedimento funciona igual em dimensões maiores.

- (c) **(Seguindo a sugestão.)** A ideia é construir um campo vetorial diferenciável não nulo em alguma esfera contida no espaço N^\perp . Isso significa que a dimensão da esfera é ímpar, e portanto a dimensão de N^\perp deve ser par.

A prova acaba sendo bem parecida ao argumento que eu dei para o inciso (a), onde mostrei que os vetores não nulos de um campo de Killing num ponto q perto de $p \in N$ devem ser tangentes a alguma esfera centrada em p . Além disso, o campo X não pode se anular em pontos dessa esfera (**por que?** :). Portanto, a restrição de X a essa esfera é um campo que não se anula.

Além disso, como φ^t é uma isometria, notamos que preserva o espaço normal $E_p := (T_p N)^\perp$. Isso implica (**por que?**) que todo vetor de um campo de Killing que não seja zero deve ser tangente a N^\perp .

□

Exercício 15 (Fórmula de Bochner para campos de Killing) Seja (M, g) uma variedade Riemanniana, $X \in \text{Kil}(M, g)$ e $f := \frac{1}{2}|X|^2 \in C^\infty(M)$. Mostre que

$$\Delta f = |\nabla X|^2 - \text{Ric}(X, X)$$

onde $|\nabla X|(p)$ denota a norma do operador $T_p M \ni v \mapsto \nabla_v X \in T_p M$.

Ideias. Certamente não consegui resolver esse exercício. Aqui vão algumas ideias e perguntas:

0. A “norma do operador $T_p M \ni v \mapsto \nabla_v X \in T_p M$ ” é

$$|X| := \sup_{|v|=1} \nabla_v X \quad ?$$

1. Tentei fazer algumas contas:

$$\Delta f = \Delta \left(\frac{1}{2} |X|^2 \right) = \frac{1}{2} \nabla \langle X, X \rangle$$

Onde, para $Y \in \mathfrak{X}(M)$, sabemos que

$$\langle \nabla \langle X, X \rangle, Y \rangle = Y \langle X, X \rangle = 2 \langle \nabla_Y X, X \rangle.$$

Agora pegue um marco ortonormal E_i , de modo que

$$\Delta f = \sum_i \langle \nabla_{E_i} \nabla f, E_i \rangle$$

Agora tendo em mente a conta anterior, estou motivado a calcular

$$E_i \langle \nabla f, E_i \rangle = \langle \nabla_{E_i} \nabla f, E_i \rangle + \langle \nabla f, \nabla_{E_i} E_i \rangle$$

Ou seja, podemos expressar o Laplaciano de f como

$$\Delta f = \sum_i \left(E_i \langle \nabla f, E_i \rangle - \langle \nabla f, \nabla_{E_i} E_i \rangle \right).$$

Em que momento aparece uma segunda derivada do tipo $\nabla \nabla$ i.e. ∇^2 ?

2. Outra ideia foi usar a notação de índices para os tensores em coordenadas. Consultando [Lee19],

$$\nabla f = g^{ij} E_i f E_j \quad \text{(quase consegui escrever sem consultar o livro)}$$

$$\operatorname{div} X = \frac{1}{\sqrt{\det g}} \partial_i (X^i \sqrt{\det g})$$

$$\Delta f = \frac{1}{\sqrt{\det g}} \partial_i \left(g^{ij} \sqrt{\det g} \partial_j f \right)$$

De modo que estou interessado em calcular as derivadas parciais de f :

$$\begin{aligned} \partial_i f &= \partial_i \left(\frac{1}{2} g(X, X) \right) \\ &= \frac{1}{2} \partial_i (g_{jk} X^j X^k) \\ &= \frac{1}{2} (X^j X^k \partial_i g_{jk} + g_{jk} \partial_i X^j X^k) \\ &= \frac{1}{2} (X^i X^k \partial_i g_{jk} + g_{jk} (X^i \partial_i X^k + X^k \partial_i X_j)) \end{aligned}$$

Depois teria que calcular as derivadas disso multiplicado com $g^{ij} \sqrt{\det g}$. A dificuldade maior seria identificar onde aparecem os coeficientes do tensor de Ricci.

3. Finalmente consultei [dC79] e [Lee19] em busca de alguma ajuda. Em [dC79] não encontrei nada, quanto em [Lee19] aparece uma fórmula extremamente parecida na questão 7-7: para $u \in C^\infty(M)$,

$$\Delta \left(\frac{1}{2} |\nabla u|^2 \right) = |\nabla^2 u|^2 + \langle \nabla \Delta u, \Delta u \rangle + \text{Ric}(\nabla u, \nabla u).$$

que a principio não tem a ver com campos de Killing. Então uma expectativa óbvia é que no caso de ∇u ser um campo de Killing,

$$\langle \nabla \Delta u, \nabla u \rangle = 0$$

mas não é claro o que Δu nesse caso. Consultando os resultados indicados para resolver o problema em [Lee19], reparei nas fórmulas que parecem generalizar o resultado de que

$$\nabla_{\partial_t} \nabla_{\partial_s} V - \nabla_{\partial_s} \nabla_{\partial_t} V = R(f_* \partial_t, f_* \partial_s) V$$

para tensores em geral: são as *Ricci identities*, Thm. 7.14. Em particular, a fórmula para 1-formas é a sugestão para provar a fórmula de Bochner.

References

- [dC79] M.P. do Carmo. *Geometria Riemanniana*. Escola de geometria diferencial. Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 1979.
- [Hal15] Brian Hall. *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*. Springer International Publishing, Cham, 2015.
- [Lee12] John M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*. Springer New York, New York, NY, second edition edition, 2012.
- [Lee19] John M. Lee. *Introduction to Riemannian Manifolds*. Graduate Texts in Mathematics. Springer International Publishing, 2019.
- [MS74] John W. Milnor and James D. Stasheff. *Characteristic Classes. (AM-76)*. Princeton University Press, 1974.
- [Pet16] P. Petersen. *Riemannian Geometry*. Graduate Texts in Mathematics. Springer International Publishing, 3 edition, 2016.

Lista 6

Exercício 1 (Curvatura do espaço projetivo complexo, [dC79] VIII.12) Defina uma métrica Riemanniana em $\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}$ do seguinte modo. Se $Z \in \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}$ e $V, W \in T_Z(\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\})$,

$$\langle V, W \rangle_Z = \frac{\operatorname{Re}(V, W)}{(Z, Z)}$$

onde

$$(Z, W) = z_0 \bar{w}_0 + \dots + z_n \bar{w}_n$$

é o produto hermitiano em \mathbb{C}^{n+1} . Observe que a métrica $\langle \cdot, \cdot \rangle$ restrita a $S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}$ coincide com a métrica induzida por \mathbb{R}^{2n+2} .

- (a) Mostre que, para todo $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $e^{i\theta} : S^{2n+1} \rightarrow S^{2n+1}$ é uma isometria, e que, portanto, é possível definir uma métrica Riemanniana em $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ de modo que a submersão f seja Riemanniana.
- (b) Mostre que, nesta métrica, a curvatura seccional de $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ é dada por

$$K(\sigma) = 1 + 3 \cos^2 \varphi,$$

onde σ é gerado pelo par ortonormal X, Y , $\cos \varphi = \langle \bar{X}, i\bar{Y} \rangle$, e \bar{X}, \bar{Y} são os levantamentos horizontais de X e Y , respectivamente. Em particular, $1 \leq K(\sigma) \leq 4$.

Solução. Começo notando que a métrica $\langle \cdot, \cdot \rangle$ restrita a S^{2n+1} coincide com a métrica induzida por \mathbb{R}^{2n+2} : pegue $Z \in S^{2n+1}$ e $V, W \in T_Z(\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\})$. Então

$$\begin{aligned} \langle V, W \rangle_Z &= \operatorname{Re}(V, W) \\ &= \operatorname{Re} \sum v^i \bar{w}^i \\ &= \operatorname{Re} \sum \left(\operatorname{Re} v^i + \sqrt{-1} \operatorname{Im} v^i \right) \left(\operatorname{Re} w^i - \sqrt{-1} \operatorname{Im} w^i \right) \\ &= \operatorname{Re} \sum \left(\operatorname{Re} v^i \operatorname{Re} w^i + \sqrt{-1} (\operatorname{Im} v^i \operatorname{Re} w^i - \operatorname{Re} v^i \operatorname{Im} w^i) + \operatorname{Im} v^i \operatorname{Im} w^i \right) \\ &= \operatorname{Re} \sum \left(\operatorname{Re} v^i \operatorname{Re} w^i + \operatorname{Im} v^i \operatorname{Im} w^i \right) + \operatorname{Re} \left(\sqrt{-1} (\dots) \right) \\ &= \sum \operatorname{Re} v^i \operatorname{Re} w^i + \operatorname{Im} v^i \operatorname{Im} w^i \\ &= \langle V, W \rangle_{\mathbb{R}^{2n+2}} \end{aligned}$$

- (a) Pela observação anterior, basta mostrar que $e^{i\theta}$ é uma isometria de S^{2n+1} com a métrica esférica usual. Sabemos que o grupo de isometrias dessa esfera é $O(2n+2)$.

De fato, o mapa $e^{i\theta} \in O(n+1, \mathbb{C}) \subset O(2n+2)$ onde o primeiro grupo são as isometrias da forma Hermitiana. Para ver por que, defina h como a forma hermitiana canônica de \mathbb{C}^{n+1} . Das contas feitas acima fica claro que podemos escrever

$h = g + \sqrt{-1}\omega$, onde g é a métrica Riemanniana (produto ponto) canônica de \mathbb{R}^{2n+2} e ω é uma outra forma bilinear.

Primeiro note que $e^{i\theta}$ é uma isometria de h . Para todo $z \in \mathbb{C}^{n+1}$,

$$h(e^{i\theta}z, e^{i\theta}z) = e^{i\theta} \overline{e^{i\theta}} h(z, z) = |e^{i\theta}|^2 h(z, z) = h(z, z)$$

separando em parte real e imaginária, segue que $g(e^{i\theta}z, e^{i\theta}z) = g(z, z)$. Como $e^{i\theta}$ é linear, concluímos que é uma isometria de g .

- (b) Seguindo a sugestão, defina N como o vetor de posição de S^{2n+1} . Pensando $\theta \mapsto e^{i\theta}N$ como uma curva usual em \mathbb{C}^{2n+1} , sabemos pelas propriedades da exponencial complexa, i.e. derivando entrada a entrada, que $(\frac{d}{d\theta} e^{i\theta}N)_{\theta=0} = iN$.

Note que esse vetor é vertical, i.e. está no kernel da projeção π . Isso está quase feito: como iN é a derivada de uma curva, basta compor essa curva com π e derivar em $\theta = 0$. A derivada é zero porque no quociente essa curva é constante.

Daí simplesmente escrevemos a fórmula do Manfredo para uma curva $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S^{2n+1}$ realizando o levantamento \bar{X} de $X \in \mathcal{X}(\mathbb{CP}^n)$ em N , i.e. com $\alpha(0) = N$ e $\alpha'(0) = \bar{X}$:

$$\begin{aligned} (\bar{\nabla}_{\bar{X}} iN)_N &= \left. \frac{d}{dt} iN \circ \alpha(t) \right|_{t=0} \\ &= \left. \frac{d}{dt} i\alpha(t) \right|_{t=0} \quad \text{já que } N \text{ é o vetor posição} \\ &= i\alpha'(0) = i\bar{X}, \quad \text{derivada complexa usual} \end{aligned}$$

Agora note que

$$\bar{X} \langle \bar{Y}, iN \rangle = \langle \bar{\nabla}_{\bar{X}} \bar{Y}, iN \rangle + \langle \bar{Y}, \bar{\nabla}_{\bar{X}} iN \rangle$$

de modo que

$$\begin{aligned} \langle [\bar{X}, \bar{Y}], iN \rangle &= \langle \bar{\nabla}_{\bar{X}} \bar{Y} - \bar{\nabla}_{\bar{Y}} \bar{X}, iN \rangle \\ &= -\langle i\bar{X}, \bar{Y} \rangle + \langle i\bar{Y}, \bar{X} \rangle \\ &= 2 \cos \varphi \end{aligned} \tag{4}$$

por definição de φ como satisfazendo $\cos \varphi = \langle \bar{X}, i\bar{Y} \rangle$, e porque

$$\langle i\bar{X}, \bar{Y} \rangle = \operatorname{Re} h(i\bar{X}, \bar{Y}) = \operatorname{Re} h(\bar{X}, i\bar{Y}) = \operatorname{Re} h(\bar{X}, -i\bar{Y}) = -\langle \bar{X}, i\bar{Y} \rangle$$

Finalmente, o **exercício 10(b)** diz que para $\sigma = \operatorname{span}\{X, Y\}$ e $\bar{\sigma} = \operatorname{span}\{\bar{X}, \bar{Y}\}$,

$$\boxed{K(\sigma) = \bar{K}(\bar{\sigma}) + \frac{3}{4} \left| [\bar{X}, \bar{Y}]^\vee \right|^2}$$

onde \bar{K} é a curvatura de $S^{2n+1} \setminus \{0\}$, que é constante 1. Portanto, o desafio final acaba sendo mostrar que

$$3 \cos^2 \varphi = \frac{3}{4} \left| [\bar{X}, \bar{Y}]^\vee \right|^2$$

Mas já tá quase: elevando eq. (4) ao quadrado,

$$4 \cos^2 \varphi = \langle [\bar{X}, \bar{Y}], iN \rangle^2$$

Ou seja, basta mostrar que

$$|[\bar{X}, \bar{Y}]^v|^2 \stackrel{?}{=} \langle [\bar{X}, \bar{Y}], iN \rangle^2$$

Como iN é vertical, o lado direito é igual a $\langle [\bar{X}, \bar{Y}]^v, iN \rangle^2$.

Como N é um vetor unitário, podemos expressar

$$[\bar{X}, \bar{Y}]^v = |[\bar{X}, \bar{Y}]^v| iN$$

Então acaba que

$$\langle [\bar{X}, \bar{Y}]^v, iN \rangle^2 = \langle |[\bar{X}, \bar{Y}]^v| iN, iN \rangle^2 = |[\bar{X}, \bar{Y}]^v|^2 \langle iN, iN \rangle = |[\bar{X}, \bar{Y}]^v|^2$$

□

Exercício 2 (Espaços lenticulares)

- (a) Definição e geodésicas (exer 4. cap. VIII [dC79]). Identifique \mathbb{R}^4 com \mathbb{C}^2 fazendo corresponder (x_1, x_2, x_3, x_4) a $(x_1 + ix_2, x_3 + ix_4)$. Seja

$$S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2; |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}$$

e seja $h : S^3 \rightarrow S^3$ dada por

$$h(z_1, z_2) = \left(e^{\frac{2\pi i}{q}} z_1, e^{\frac{2\pi i}{r}} z_2 \right), \quad (z_1, z_2) \in S^3$$

onde q e r são primos entre si, $q > 2$.

- (i) Mostre que $G = \{\text{id}, h, \dots, h^{q-1}\}$ é um grupo de isometrias da esfera S^3 , com a métrica usual, que opera de modo totalmente descontínuo. A variedade S^3/G é chamada um *espaço lenticular*.
 - (ii) Considere S^3/G com a métrica induzida pela projeção $p : S^3 \rightarrow S^3/G$. Mostre que todas as geodésicas de S^3/G são fechadas mas podem ter comprimentos diferentes.
- (b) Calcule o volume de um espaço lenticular.
- (c) Exiba uma sequência de variedades Riemannianas completas com curvatura seccional constante igual a 1 de modo que a sequência dos volumes seja uma sequência que converge a zero.

Demonstração.

- (a) (i) Para ver que G age por isometrias usamos o mesmo argumento que no exercício anterior: denote agora por $\eta = g + i\omega$ a forma hermitiana canônica de \mathbb{C}^2 . Basta mostrar que $h : S^3 \rightarrow S^3$ preserva η . Nesse caso fica mais fácil usar a definição de η como somando as entradas dos vetores (conjugando as entradas do segundo vetor):

$$\begin{aligned}
 \eta(h(z_1, z_2), h(w_1, w_2)) &= \eta\left(\left(e^{\frac{2\pi i}{q}} z_1, e^{\frac{2\pi i r}{q}} z_2\right), \left(e^{\frac{2\pi i}{q}} w_1, e^{\frac{2\pi i r}{q}} w_2\right)\right) \\
 &= e^{\frac{2\pi i}{q}} z_1 \overline{e^{\frac{2\pi i}{q}} w_1} + e^{\frac{2\pi i r}{q}} z_2 \overline{e^{\frac{2\pi i r}{q}} w_2} \\
 &= e^{\frac{2\pi i}{q}} e^{\frac{2\pi i}{q}} z_1 \overline{w_1} + e^{\frac{2\pi i r}{q}} e^{\frac{2\pi i r}{q}} z_2 \overline{w_2} \\
 &= \left|e^{\frac{2\pi i}{q}}\right|^2 z_1 \overline{w_1} + \left|e^{\frac{2\pi i r}{q}}\right|^2 z_2 \overline{w_2} \\
 &= z_1 \overline{w_1} + z_2 \overline{w_2} \\
 &= \eta((z_1, z_2), (w_1, w_2))
 \end{aligned}$$

É claro que $h^q = \text{id}$. Também é simples conferir que a ação é discreta: como a órbita é finita, defina d como sendo a mínima distância entre os elementos da órbita de qualquer ponto. As bolas de raio $d/2$ são disjuntas baixo a ação de G .

Para conferir que a ação é própria de acordo à definição dada em aula devemos ver que dadas duas órbitas, existe uma vizinhança de qualquer uma delas que não intersecta a outra. Novamente como a ação é finita podemos tomar a mínima distância entre todos os pontos das duas órbitas para produzir um raio tão pequeno que as bolas com esse raio são a vizinhança desejada.

- (ii) Para mostrar que todas as geodésicas de S^3/G são fechadas usamos as geodésicas de S^3 , que são círculos máximos. Como a projeção quociente é uma isometria local, sabemos que toda geodésica de S^3/G corresponde com um círculo máximo. É claro que esses círculos são curvas fechadas em S^3 , ou seja, conjuntos compactos. Como a projeção é contínua, a imagem de cada uma deve ser compacta, ou seja, uma curva fechada.

Para achar duas geodésicas em S^3/G com comprimentos diferentes, buscamos uma curva que “feche antes do que outra”. Note que a relação de equivalência no quociente é

$$(z_1, z_2) \sim (z'_1, z'_2) \iff \exists n \text{ tal que } h^n(z_1, z_2) = (z'_1, z'_2)$$

ou seja se

$$\left(e^{\frac{n2\pi i}{q}} z_1, e^{\frac{n2\pi i r}{q}} z_2\right) = (z'_1, z'_2) \quad (5)$$

Lembre que as geodésicas da esfera são da forma $\gamma(t) = P \cos t + Q \sin t$ para

$P, Q \in S^3$. Isso significa que

$$\begin{aligned}\gamma_{z_1, z_2}(t) &:= e^{it}(z_1, z_2) = (\cos t + i \sin t)(z_1, z_2) \\ &= \cos t(z_1, z_2) + \sin t(iz_1, iz_2)\end{aligned}$$

é uma geodésica. É claro que essa geodésica fecha em $t = 2\pi$, mas no quociente pode fechar antes. Nosso objetivo é achar um t tal que

$$\gamma(t) = h^n(z_1, z_2), \quad \text{para alguma } n \leq q-1.$$

A dificuldade aqui é que h modifica as duas entradas de formas diferentes, então a solução natural é considerar as geodésicas associadas a $(z_1, 0)$ e $(0, z_2)$.

No primeiro caso fica que

$$\gamma_{z_1, 0}\left(\frac{2i\pi}{q}\right) = \left(e^{\frac{2i\pi}{q}} z_1, 0\right) = h(z_1, 0) = (z_1, 0) = \gamma_{z_1, 0}(0)$$

ou seja, $\gamma_{z_1, 0}$ fecha em $t = \frac{2i\pi}{q}$.

Agora pegue $(0, z_2)$. A situação agora é que, para $1 \leq n \leq q-1$,

$$h^n(0, z_2) = \left(0, e^{rn\frac{2i\pi}{q}} z_2\right), \quad \text{quanto que} \quad \gamma\left(n\frac{2i\pi}{q}\right) = \left(0, e^{n\frac{2i\pi}{q}} z_2\right).$$

Então queremos que esses dois pontos sejam o mesmo, ou seja, que

$$\begin{aligned}e^{rn\frac{2i\pi}{q}} &= e^{n\frac{2i\pi}{q}} \implies e^{2i\pi\frac{r-1}{q}} = 1 \\ &\implies \frac{n(r-1)}{q} \in \mathbb{Z} \\ &\implies n(r-1) \equiv 0 \pmod{q}\end{aligned}$$

Afirmção Existem escolhas de q e r tais que $n(r-1) \equiv 0 \pmod{q} \implies n > 1$.


Infelizmente isso não é verdadeiro em geral. Porém, suspeito que não para todas as escolhas de q e r o resultado vai ser certo. Para outras, como por exemplo $q = 7$ e $r = 5$, a afirmação é válida: $n > 1$ já que $r-1 = 4$ não divide a 7. Nesses casos, concluímos que essa curva não pode fechar no mesmo que tempo que a primeira curva exibida, e portanto tem comprimento maior.

- (b) Intuitivamente, o volume de um quociente discreto é o volume do domínio fundamental, que é a região $D \subset M$ mais pequena tal que $G \cdot D = M$. Se conseguimos definir formalmente D , concluímos dizendo que como π é um quociente riemanniano, $\text{Vol } D = \text{Vol } S^3/G$ e portanto

$$\text{Vol}(S^3/G)|G| = \text{Vol}(S^3) \implies \text{Vol } S^3/G = \frac{1}{q} \text{Vol } S^3$$

Uma construção formal do domínio D pode ser feita a traves da “Voronoi cell” (cf. Complex manifolds in dimension 1, lecture 14): para qualquer espaço métrico M e subconjunto discreto $\{p_i\} \subset M$, a *Voronoi cell* associada a p_i é

$$D_i := \{z \in M : d(z, p_i) \leq d(z, p_j) \forall j \neq i\}$$



Para finalizar o argumento pegue D como a Voronoi cell da órbita de qualquer ponto $p \in M$. Note que pode sim ter dois elementos na mesma classe de equivalência dentro de D . Porém, nesse caso eles devem ficar na fronteira ∂D já que G age por isometrias. Para concluir note que $\pi|_{\text{Int } D}$ é uma isometria, e portanto $\text{Vol } D = \text{Vol } S^3/G$ como queríamos.

- (c) Lembre a pergunta: *exibir uma sequência de variedades Riemannianas completas com curvatura constante igual a 1 de modo que a sequência dos volumes seja uma sequência que converge a zero*. A resposta natural é S^3/G_q onde G_q é o grupo que determina o espaço lenticular, podendo mudar o valor de r livremente desde que para cada q fique r primo relativo com q .

Então só falta mostrar que a curvatura seccional de S^3/G é constante igual a 1, e que é completa. O último é imediato porque S^3 é completa. Para ver o primeiro usamos de novo o exercício 10(b) que diz que para $X, Y \in \mathfrak{X}(S^3/G)$, $\sigma = \text{span}\{X, Y\}$ e $\bar{\sigma} = \text{span}\{\bar{X}, \bar{Y}\}$,

$$K(\sigma) = \bar{K}(\bar{\sigma}) + \frac{3}{4} \left| [\bar{X}, \bar{Y}]^v \right|^2$$

onde \bar{K} é a curvatura de S^3 , que 1. Ou seja, queremos ver que

$$[\bar{X}, \bar{Y}]^v = 0.$$

Mas isso segue de que a ação é discreta! Temos uma decomposição $TS^3 \cong \kappa \oplus \pi^*T(S^3/G)$, onde κ é o kernel de π_* . Como a dimensão do grupo é zero, a dimensão do espaço lenticular é 3, e o kernel dever ter dimensão zero. Então não tem componentes verticais em geral. (Então aprendi que a curvatura seccional é preservada em quocientes sob ações discretas.)

□

Exercício 3 Encontre um exemplo de variedade suave que admite uma métrica Riemanniana com curvatura escalar positiva, mas não admite uma métrica Riemanniana com Ricci positivo.

Solução. É parecida à solução de “Hadamard não vale para curvatura escalar” que o Rafael diu na monitoria: pegue \mathbb{H}_{100}^2 , i.e. espaço de curvatura seccional constante negativa e pequeníssima, e faça produto com uma esfera. Então a curvatura escalar é positiva porque é a soma dos pullbacks das curvaturas escalares, que coincidem com as curvaturas seccionais. Porém, a curvatura de Ricci, que também é a soma dos pullbacks das curvaturas de Ricci, não pode ser positiva porque em qualquer ponto podemos pegar um vetor cuja componente em S^2 é zero, e a componente hiperbólica vai dar um número negativo. Para confirmar isso último lembre a definição de Ric negativo ou positivo: é a definição para uma forma bilinear, que está dada como o signo da forma avaliada no mesmo vetor nas duas entradas. Então só note que $\text{Ric}(X, X) = \sum K(E_i, X) < 0$.

□

Exercício 4 Encontre um exemplo de variedade suave que admite uma métrica Riemanniana com Ricci positivo, mas não admite uma métrica Riemanniana com curvatura seccional positiva.

Solução. $S^2 \times S^1$, porque pelo teorema de Synge, se $S^2 \times S^1$ admitisse uma métrica com $K > 0$, teria que ter $\pi_1(S^2 \times S^1) = \mathbb{Z}_2$ porque tem dimensão ímpar e é orientável. A métrica produto tem Ricci positivo já que $\text{Ric } S^2 > 0$, e, como no exercício anterior, sabemos que Ricci de um produto é a soma dos pullbacks das Ricci’s em cada componente.

□

8 Variações de Energia

Exercício 5 Sejam (M^n, g) completa, conexa e com curvatura positiva e A, B subvariedades totalmente geodésicas e compactas tais que $\dim A + \dim B \geq n$. Mostre que $A \cap B \neq \emptyset$.

Solução. Suponha que a interseção não é vazia. Então existe uma geodésica minimizante não trivial que minimiza a distância entre A e B . Sabemos que essa geodésica intersecta tanto A quanto B ortogonalmente. Queremos ver que $E''(0) < 0$, ou seja que γ não pode ser minimizante, uma contradição.

Suponha que conseguimos construir uma variação de γ tal que todos os pontos iniciais $f(s, 0)$ estão em A , e o mesmo acontece com os pontos finais, i.e. $f(s, \ell) \in B$. Então as derivadas das curvas $f(s, 0)$ e $f(s, \ell)$ em $s = 0$ são perpendiculares a $\gamma'(0)$ e $\gamma'(\ell)$. Ou seja, temos que $\langle \gamma'(0), \nabla_{\partial_s} V \rangle|_0^\ell = 0$.

Suponha ainda que essa variação tem campo variacional paralelo. Então acabou porque a segunda fórmula da variação diz que

$$E''(0) = - \int_0^\ell \langle R_{\gamma'} V, V \rangle < 0$$

Vamos construir essa variação. O passo inicial é fácil: pegamos qualquer vetor $v \in T_a A$ e transportamos paralelamente ao longo de γ para obter o campo paralelo $V \in \mathfrak{X}_\gamma$. Como A é totalmente geodésica, a variação $f(s, t) := \exp_{\gamma(0)}(sV(0))$ fica dentro de A .

Para concluir basta ver que $V(\ell) \in T_b B$, já que B também é totalmente geodésica. Isso segue da última hipótese. Podemos realizar esse processo para cada vetor básico de $T_a A$, obtendo $\dim A$ vetores linearmente independentes em $T_b B$ (já que o transporte paralelo é uma isometria). Se nenhum deles ficasse em $T_b B$, poderíamos construir um espaço de dimensão $\dim A$ estritamente contido em $T_b M \setminus T_b B$, absurdo pois isso implicaria que $\dim A < \text{codim } B$, porém, $\dim A + \dim B \geq n$.

Edit. Depois de reler a prova do exercício seguinte, parece que não era necessário usar que γ intersecta ortogonalmente A e B , pois a variação que usei foi por geodésicas, então $\nabla_{\partial_s} V = 0$. Então fiquei com a dúvida de que parece que não usei compacidade de A e B . \square

Exercício 6 Seja M^{2n} uma variedade Riemanniana de dimensão par, completa, orientável e com curvatura seccional $K > 0$. Seja γ uma geodésica fechada em M de comprimento $\ell(\gamma)$. Mostre que existem curvas livremente homotópicas a γ em M , arbitrariamente próximas de γ , que possuem comprimento menor que $\ell(\gamma)$.

Sugestão. Estude variações de γ com campo variacional paralelo ao longo de γ .

Solução. Considere qualquer vector unitário ortogonal a $\dot{\gamma}$, defina $V \in \mathfrak{X}_\gamma$ como sendo o transporte paralelo de v ao longo de γ . Note que $\dot{V} = 0$. Defina a variação $f(s, t) = \exp_{\gamma(t)} sV(t)$. Note que $\nabla_{\partial_s} f_s = 0$.


A segunda fórmula da variação nos diz que

$$E''(0) = - \int_0^a \langle R_{\dot{\gamma}} V, V \rangle = - \int_0^a K < 0$$

já que $K > 0$. Como γ é uma geodésica, temos que para s pequeno

$$\frac{1}{a} \ell^2(c^s) \leq E(s) < E(0) = \frac{1}{a} \ell^2(\gamma)$$

Note que essa variação pode não preservar o fechamento das curvas. Para resolver isso olhemos ao seguinte desenho:



Fica claro que se $V(0) = V(a)$ as curvas c^s são fechadas para toda s . Então a condição que precisamos é que

$$P_{0,a}^\gamma V(0) = V(a)$$

onde P é o transporte paralelo. Dito de outra forma, basta ver que P tem um ponto fixo—além de $\gamma'(0) = \gamma'(a)$, que já é um ponto fixo. Esse argumento é uma imitação da prova do teorema de Weinstein: como P preserva orientação, o determinante dele deve ser positivo, ou seja, o produto dos seus autovalores deve ser positivo. Restringindo-nos ao subespaço $\gamma'(0)^\perp$, que tem dimensão ímpar, concluímos que para que o produto dos autovalores de P seja positivo, deve ter pelo menos um que seja 1. \square

References

- [dC79] M.P. do Carmo. *Geometria Riemanniana*. Escola de geometria diferencial. Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 1979.
- [Hal15] Brian Hall. *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*. Springer International Publishing, Cham, 2015.
- [Lee12] John M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*. Springer New York, New York, NY, second edition edition, 2012.
- [Lee19] John M. Lee. *Introduction to Riemannian Manifolds*. Graduate Texts in Mathematics. Springer International Publishing, 2019.
- [MS74] John W. Milnor and James D. Stasheff. *Characteristic Classes. (AM-76)*. Princeton University Press, 1974.
- [Pet16] P. Petersen. *Riemannian Geometry*. Graduate Texts in Mathematics. Springer International Publishing, 3 edition, 2016.