

Densidad de *Lobatus galeatus* en Punta Mala, Puntarenas

Ecología de Poblaciones

true

12 de junio, 2019

Índice general

1	Resumen	7
2	Introducción	9
2.1	Ecosistemas Rocosos	9
2.2	Biología de <i>Lobatus galeatus</i>	9
2.3	Dinámica de poblaciones de <i>Lobatus galeatus</i>	10
2.4	Objetivo	11
3	Metodología	13
3.1	Estimación de abundancia y Análisis de Viabilidad de Población	13
3.2	Estimación de abundancia	13
3.3	Elaboración del sistema de gestión de datos.	13
3.4	Área de estudio	14
3.5	Área de estudio	14
3.6	Muestreo de <i>Lobatus galeatus</i>	14
4	Resultados	17
	Bibliografía	21

Índice de cuadros

Capítulo 1

Resumen

- **Integrantes:** Ericka Arley Venegas, Jeannina Barrientos Ching, Jorge D. Carballo Morales, José López Rodríguez, Daniela Madrigal Tejada, Daniela Marín Ramírez, Joselyn Miranda González, Sofía Pastor Parajeles, Katherine Porras Brenes, Daniel Rodríguez García, Francisco Vargas, Carlos Andrés Venegas Elizondo.

Capítulo 2

Introducción

2.1 Ecosistemas Rocosos

Las áreas protegidas son sitios importantes para la conservación y protección de ambientes naturales y especies que habitan en ella. El Refugio de Vida Silvestre Punta Mala, es un sitio donde protege playas, zonas de bosque y áreas geológicas importantes. Como lo son los ecosistemas rocosos que poseen características biológicas, ecológicas y paisajísticas importantes (Salas, Ross & Arias, 2012). Son áreas que se encuentran en constante exposición al sol y emersión del mar, según las mareas que presente. Además son sitios con una variación de parámetros como la acción de las olas, dinámica de sedimentos, temperatura, salinidad, etc. (Paniagua, 2015). Los ecosistemas rocosos intermareales son sitios que contienen comunidades con altos niveles de diversidad y dinámica que han sido estudiados a lo largo del tiempo. Al ser especies accesibles son utilizados como modelos ecológicos para observar y estudiar patrones y procesos a diferentes escalas (Peña, 2011).

2.2 Biología de *Lobatus galeatus*

El cambute *Lobatus galeatus* es una especie que pertenece a la familia Stromboidea, del orden Sorbeoconcha, y la clase de los Gastropodos (Castro-Mondragón, *et al*, 2016). En la costa del Pacífico americano, los caracoles del género *Lobatus*, mejor conocidos como cambute, se distribuyen desde el Golfo de México hasta las islas Galápagos. En Costa Rica es posible hallar estos caracoles a lo largo de toda la costa, principalmente en zonas rocosas y poco profundas. En el sector San Miguel del Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabo Blanco, se estimó la población de *Lobatus galeatus* en 627 individuos, donde el adulto con mayor peso alcanzó 2800 g y el juvenil más pequeño pesó 50 g. A nivel etario es posible separar los individuos de cambute en tres clases de edades (adultos, subadultos y juveniles), de acuerdo con la biometría de su concha (largo, ancho y grosor del labio). Por ejemplo, se estima que el largo medio de la concha de los adultos es de (183.2 ± 9.5) mm, mientras que el ancho medio de la concha es de (146.5 ± 11.1) mm (Mora, D. A, 1998).

En general, la ecología de la especie presenta las siguientes características. El principal recur-

so alimenticio de *Lobatus galeatus* proviene de las macroalgas que crecen sobre la superficie rocosa. Presentan poca actividad, pero ante una amenaza, atacan con el opérculo y hacen movimientos con el pie. Con lo que respecta al comportamiento reproductivo, estos se reúnen en pequeños grupos donde solo hay una hembra, se reproducen durante todo el año, pero existe una tendencia marcada hacia finales de año y meses con temperaturas elevadas. Las hembras desovan un filamento que contienen los huevos, posteriormente lo tapan con arena y pequeñas conchas. Por otro lado, los estadíos juveniles son más propensos a permanecer en profundidades bajas y a medida que el caracol crece, algunas algas, esponjas y otros moluscos se adhieren a la concha, dándoles al mismo un camuflaje particular (Mora, D. A, 1998).

Con respecto al ciclo de vida de la especie, según (Vega & Pérez, 2003) el cambute alcanza 100 mm de longitud durante el primer año, posterior al asentamiento larvario. Después los individuos invierten aproximadamente un año para llegar hasta los 180 mm, talla con la que son capaces de reproducirse, con una tasa de crecimiento mayor en las tallas menores. En palabras sencillas, los individuos pueden alcanzar la edad reproductiva a los dos años.

Una sola hembra puede ovopositar entre 190 000 y 460 000 huevos en cada desove. Esta variación en la cantidad de huevos puestos por cada hembra, se debe al efecto que ciertas condiciones ambientales generan sobre ellas, como por ejemplo: la temperatura y la disponibilidad de alimento. Cada hembra puede poner entre 8 y 9 masas de huevos en cada temporada reproductiva (Robertson, 1959).

Los individuos han sido extraídos por las personas que habitan cerca de las costas, ya sea manualmente o por buceo a pulmón, con el fin de consumirlo. La especie se ha visto afectada por un incremento en la demanda local y turística, tornando su uso a un nivel comercial. Debido a esto y al largo tiempo para alcanzar la edad reproductiva, la densidad de la población ha decrecido e incluso ha desaparecido de algunas zonas específicas. Como consecuencia, actualmente existe una prohibición de captura y comercialización de esta especie dentro de Costa Rica (Arroyo-Mora, 2008).

Las poblaciones de *Lobatus galeatus* en lugares como: Panamá, México, Ecuador y otros lugares del Pacífico muestran una baja tasa de crecimiento en los últimos años. Esta situación se relaciona con la explotación masiva sin regulaciones provocada por el ser humano para el consumo de este molusco (Castellanos-Galindo, *et al*, 2011). Los modelos de crecimiento en esta especie son utilizados en muchos para establecer políticas que regulen la extracción y comercialización. Por ejemplo, en Panamá han detectado que cinco años después de haber prohibido la extracción de cambute, la población aun no muestra una tendencia al aumento, a pesar de encontrar principalmente individuos adultos (Cipriani, Guzman, Vega, & Lopez, 2008).

2.3 Dinámica de poblaciones de *Lobatus galeatus*

Los modelos de crecimiento en esta especie son utilizados en muchos estudios con el fin de determinar si la población se encuentra en declive o en aumento, después de que se prohíbe o se permite la extracción comercial de este caracol. Tal es el caso de una investigación realizada en Panamá donde detectan que cinco años después de haber prohibido la pesca de cambute, la población de estos en Las Perlas y Coiba Archipelagos no se encuentra en aumento, encontrando

principalmente individuos adultos (Cipriani, Guzman, Vega, & Lopez, 2008).

Otro estudio adapta un modelo de crecimiento de Von Bertalanffy a datos de juveniles, utilizando los siguientes parámetros: $L_{\infty} = 320$ mm , $K = 0.029$ /mo , y $t_0 = 0.50$ mo. En el mismo se llegó a observar que la apariencia de un labio delgado es considerado un criterio pobre para la madurez sexual y entre mayor sea este, es recomendado para lograr la protección de las poblaciones bajo una fuerte presión de pesca, permitiendo que las poblaciones de *L. galeatus* puedan restablecerse con éxito (Cipriani, Guzman, Vega, & Lopez, 2008).

2.4 Objetivo

El objetivo de este trabajo es estimar densidad poblacional de *Lobatus galeatus* en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Punta Mala, Costa Rica.

Capítulo 3

Metodología

3.1 Estimación de abundancia y Análisis de Viabilidad de Población

3.2 Estimación de abundancia

3.3 Elaboración del sistema de gestión de datos.

Con miras a realizar un proceso de monitoreo de las poblaciones de *Strombus galeatus* se desarrolló un sistema de gestión de datos que permita realizar una mejor administración de los datos colectados en campo, su resguardo y su posterior procesamiento. El monitoreo de esta especie permitirá a los administradores del RNVS Playa Hermosa-Punta Mala conocer en qué medida está contribuyendo el área silvestre protegida a la conservación y protección del cambe del pacífico.

Para el almacenamiento de los datos se creó una base datos relacional mediante la utilización del programa LibreOffice Base (versión 5.2.7.2). En su construcción, se elaboraron tres tablas de datos. La primera que contiene datos sobre la fecha en la que se desarrolló la gira; la segunda, conserva información sobre los cuadrantes muestreados así como su fecha y hora de muestreo, y por último, la tercera posee información sobre las remociones realizadas y las tallas de los individuos colectados.

Los datos se ingresaron mediante un formulario desarrollado para tal efecto, donde la integración entre las tablas estaba dada entre la identificación de la tabla principal, en la primera tabla, y la identificación del cuadrante en la segunda tabla; la siguiente relación estaba dada entre la casilla del cuadrante, de la segunda tabla, y la casilla de la longitud total de la tercer tabla.

Se realizaron tres consultas, una con los valores de longitud para los juveniles, sub adultos y adultos, el resultado de estas consultas se adecuó a para los requerimientos del paquete estadístico mediante una tabla dinámica el LibreOffice Calc, los datos fueron agrupados de tal manera que se pudiese obtener una matriz de números naturales con los datos de las columnas hicieran

referencia a las remociones y los datos de las filas a las unidades de muestreo.

3.4 Área de estudio

Se visitó el sitio de muestreo del cambute, los días del 15 al 17 de marzo de 2019; el área de estudio se encuentra en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa – Punta Mala, este refugio nacional de vida silvestre pertenece al Área de Conservación Pacífico Central, se encuentra ubicado específicamente en el cantón de Garabito en la provincia de Puntarenas, coordenadas geográficas: 9°31'04"N y 84°32'25"W, además cuenta con una precipitación de 3 780 mm al año y una temperatura máxima de 31°C y una mínima de 23°C (ALVARADO QUESADA, 2007); (Vargas-Fonseca, 2014).

3.5 Área de estudio

El Refugio Nacional de Vida Silvestre se crea mediante el Decreto Ejecutivo N° 27210, del 16 de abril de 1998, y por medio del decreto N° 33044, del 03 de mayo del 2002 se amplía el área del refugio. Además, cuenta con diversidad de ecosistemas, cómo lo son: desembocadura de río, manglares, esteros, estuarios entre muchos otros (Herrera Domínguez, 2010).

El estudio se realizó en una de las plataformas rocosa que se encuentra dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre, estas plataformas se extiende en dirección al océano, formando un área de aproximadamente 4 km de largo, esta zona rocosa alberga diferentes formas de vida como lo son los moluscos (Azofeifa-Solano, Salas-Moya, Cubero-Campos, & Sibaja-Cordero, 2018).

3.6 Muestreo de *Lobatus galeatus*

Se realizaron tres parcelas sistemáticamente de 10 x 10 metros, en la zona intermareal durante la marea baja, específicamente en aquellos sitios donde se formaban pozas. Cada cuadrante fue georreferenciado por medio de GPS.

En cada parcela se hizo una búsqueda intensiva de *L. galeatus* mediante el método de barrido, este consistió en hacer tres remociones en la parcela, con una duración de 20 min cada una. Solo los individuos vivos fueron recolectados, con el fin de medir el largo total de la concha, esta medida se obtuvo con un calibrador, ± 0.0050 mm, una vez medidos se depositaron a una distancia no menor de diez metros de la parcela medida.

Para caracterizar a cada individuo se utilizó las medidas descritas por Arroyo-Mora (1998), donde se asigna una clase según la edad, para los juveniles corresponde a una longitud inferior a 150 mm, subadultos entre 150 mm a 170 mm y adultos superior a los 170 mm. Se clasificó cada organismo recolectado y a partir de los datos obtenidos se construyó una tabla de vida.

3.6.1 Análisis de datos

Para el análisis de los datos recolectados, se utilizó el paquete de R, denominado “unmarked”, es un modelo que se utiliza para animales no marcados y de abundancia. Así mismo, se utilizó la función “gmultmix generalized multinomial N-mixture model”, basándose en la opción de remoción (Removal) y variando la función de acuerdo a los datos que se obtuvieron. Además esta función, toma en cuenta las características de abundancia, disponibilidad y probabilidad de detección, es decir para obtener la probabilidad de existencia en los sitios de muestreo de las clases obtenidas.

Capítulo 4

Resultados


En los 9 cuadrantes muestreados, se encontraron 42 individuos de la especie *Lobatus galeatus* en la zona rocosa intermareal muestreada, en cuadro de los cuadrantes se encontró por lo menos 1 cambute, siendo el máximo registro en el cuadrante 8 con 10 individuos. Todos fueron categorizados como juveniles (< 15 cm (Figura 4.0.1). Solamente dos de los individuos tuvieron longitudes de la concha mayores de 6 cm, la mayoría fueron menor a 3 cm de largo.

En cada cuadrante, se encontraron menos individuos en la remoción 3 comparada con la remoción 1 (Figura 4.0.2).

El análisis de remoción mostró que Para la zona intermareal de la playa Punta Mala, se estiman 5.72 (S.E= 1.186) individuos por cuadrante, con una probabilidad de detección de 43 % (S.E= 0.116).

```
## Backtransformed linear combination(s) of Abundance estimate(s)
##
## Estimate    SE LinComb (Intercept)
##      5.72 1.19      1.74              1
##
## Transformation: exp

## Backtransformed linear combination(s) of Detection estimate(s)
##
## Estimate    SE LinComb (Intercept)
##      0.431 0.116  -0.278              1
##
## Transformation: logistic
```






Figura 4.0.2: presencia de individuos juveniles de *L. galeatus* por remoción

Bibliografía

- Arroyo-Mora, D. (2008). Características poblacionales del cambute, *Strombus galeatus* (Gastropoda: Strombidae) en el Parque Marino Ballena, Pacífico, Costa Rica (1999-2003). *Revista de Biología Tropical*, 56(4), 113-124.
- Castellanos-Galindo, G. A., Cantera, J. R., Espinosa, S., & Mejía-Ladino, L. M. (2011). Use of local ecological knowledge, scientist's observations and grey literature to assess marine species at risk in a tropical eastern Pacific estuary. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 21(1), 37–48. <https://doi.org/10.1002/aqc.1163>
- Castro-Mondragón, H., Flores-Garza, R., Valdez-González, A., Flores-Rodríguez, P., García-Ibáñez, S., & Rosas-Acevedo, J. L. (2016). Diversidad, especies de mayor importancia y composición de tallas de los moluscos en la pesca ribereña en Acapulco, Guerrero, México. *Acta universitaria*, 26(6), 24-34
- Cipriani, R., Guzman, H. M., Vega, A. J., & Lopez, M. (2008). Population Assessment of the Conch *Strombus galeatus* (Gastropoda, Strombidae) in Pacific Panama. *Journal of Shellfish Research*, 27(4), 889–896. [https://doi.org/10.2983/07308000\(2008\)27%5B889:PAOTCS%5D2.0.CO;2](https://doi.org/10.2983/07308000(2008)27%5B889:PAOTCS%5D2.0.CO;2)
- Mora, D. A. (1998). Crecimiento y reproducción de *Strombus galeatus* (Gastropoda: Strombidae) en el Pacífico de Costa Rica. *Revista de biología tropical*, 27-36. .
- Paniagua, G. (2015). Dinamica costera y ecología de comunidades macrobentónicas intermareales de Pehuen CO, provincia de Buenos Aires. Tesina de licenciatura. Universidad Nacional del Sur. Argentina.
- Peña, C. (2011). Estructura de las comunidad desde el intermareal rocoso asociadas al mejillón *Mytilus californianus* en la costa oeste de Baja California. Tesis para Maestría. Universidad Autónoma de Baja California. México.
- Salas, E.; E. Ross Salazar & A. Arias (Eds.). 2012. Diagnóstico de áreas marinas protegidas y áreas marinas para la pesca responsable en el Pacífico costarricense. Fundación MarViva. San José, Costa Rica. 174 pp.
- Robertson, R. (1959). Observations on the spawn and veligers of conchs (*strombus*) in the bahamas. *Journal of Molluscan Studies*, 33(4), 164–171.
- Vega, A. J., & Pérez, F. (2003). Crecimiento del Cambute, *Strombus galeatus* (Gastropoda:

Strombidae) en el Parque Nacional Coiba, Pacífico Panameno. *Tecnociencias*, 5, 77-89

ALVARADO QUESADA, G. M. (2007). Migración de la gaviota *Larus pipixcan* (Aves: Laridae) sobre el Refugio de Vida Silvestre Punta Mala, Costa Rica. *Brenesia.*, (67), 75-76.

Azofeifa-Solano, J. C., Salas-Moya, C., Cubero-Campos, Y., & Sibaja-Cordero, J. A. (2018). Influencia de la vigilancia en una zona rocosa dentro de un área marina protegida, Pacífico Central de Costa Rica. *Revista de Biología Tropical*, 66(3), 984-995.

Herrera Domínguez, C. P. (2010). Propuesta de Diseño de una Torre de Avistamientos de Aves y Desoves de Cocodrilos especializada en Turismo Científico en el Refugio Nacional Vida Silvestre Playa Hermosa—Punta Mala, Costa Rica.

Vargas-Fonseca, E. M. (2014). RELACIÓN ENTRE LA DIVERSIDAD DE AVES ACUÁTICAS Y LA VARIACIÓN TEMPORAL DE LAS DIMENSIONES DE UN HUMEDAL PALUSTRINO EN PUNTARENAS, COSTA RICA. *Ornitología Neotropical.*, 25(3), 333-343.