
Facultad de Ciencias · Grado en Física

Ecuaciones Diferenciales

Tema 4

EDO lineales de orden superior

Parte I · Estructura de las soluciones, coeficientes constantes y funciones de Green



$$\mathcal{L}_x\, G(x,\tilde{x}) = \delta(x-\tilde{x}), \qquad y_p(x) = \int G(x,\tilde{x})\, b(\tilde{x})\, \mathrm{d}\tilde{x}$$

Autor
Daniel Martín Guerrero

Profesorado
Pilar García Estévez
José Beltrán Jiménez
María Pérez Garrote

Apuntes formalizados
Salamanca, curso 2026/2027

Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior y funciones de Green

Daniel Martín Guerrero

Grado en Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca

Resumen. Estudiamos la ecuación lineal de orden n $\mathcal{L}[y] = a_n(x)\,y^{(n)} + \cdots + a_0(x)\,y = b(x)$. Toda la teoría descansa en la linealidad de $\mathcal{L}$: de ella se siguen que las soluciones de la homogénea forman un espacio vectorial de dimensión n —lo que demostramos identificándolo con el espacio de datos iniciales— y que la solución general es la suma de la homogénea y una particular. Para coeficientes constantes construimos una base del núcleo factorizando $\mathcal{L}$ como polinomio en $D = \mathrm{d}/\mathrm{d}x$, incluido el caso de raíces múltiples, que resolvemos con un lema de conjugación por la exponencial. Para la particular deducimos la fórmula matricial de variación de las constantes y mostramos que coincide con el método de la función de Green, la respuesta del sistema a un impulso unitario, que permite escribir la solución como superposición de respuestas a fuentes puntuales.

Palabras clave. operador lineal, sistema fundamental, wronskiano, polinomio característico, raíces múltiples, variación de las constantes, función de Green, delta de Dirac, causalidad.

MSC 2020. 34A30, 34A05, 34B27.

Índice

1 Planteamiento y estructura de la solución . . . **3**
- 1.1 El operador lineal de orden n . . . 3
- 1.2 El espacio de soluciones tiene dimensión n . . . 4
- 1.3 Independencia lineal y wronskiano . . . 5
- 1.4 Estructura de la solución general . . . 6

2 Homogénea con coeficientes constantes . . . **6**
- 2.1 El ansatz exponencial . . . 6
- 2.2 Factorización del operador . . . 7
- 2.3 Soluciones reales . . . 9
- 2.4 El oscilador amortiguado . . . 10

3 Raíces múltiples . . . **11**
- 3.1 Conjugación por la exponencial . . . 11
- 3.2 Solución general . . . 12

4 Variación de las constantes . . . **13**
- 4.1 Ansatz y condiciones impuestas . . . 13
- 4.2 Forma matricial: el wronskiano . . . 14
- 4.3 El caso $n = 2$ . . . 14

5 Funciones de Green . . . **15**
- 5.1 Idea: descomponer la fuente . . . 15
- 5.2 Definición y fórmula de la solución . . . 16
- 5.3 No unicidad, causalidad y condiciones de salto . . . 17
- 5.4 Conexión con la variación de las constantes . . . 17
- 5.5 Puente con el Electromagnetismo . . . 18

6 Resumen operativo . . . **19**

7 Referencias . . . **20**

1 Planteamiento y estructura de la solución

Todo el tema descansa sobre una sola propiedad: el operador diferencial es *lineal*. De ella se siguen tres hechos: que la solución general es «homogénea más particular», que las soluciones de la homogénea forman un espacio vectorial de dimensión n, y que una fuente complicada puede descomponerse en impulsos elementales cuyas respuestas se suman (sección 5).

1.1 El operador lineal de orden n

Definición 1.1 (EDO lineal de orden n)

Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto y $a_0, \dots, a_n, b \in \mathcal{C}(I)$ con $a_n(x) \neq 0$ para todo $x \in I$. Con $D \stackrel{\text{def}}{=} \mathrm{d}/\mathrm{d}x$, el *operador diferencial lineal de orden n*

$$\mathcal{L} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{j=0}^{n} a_j(x)\, D^j : \ \mathcal{C}^n(I) \longrightarrow \mathcal{C}(I) \tag{1.1}$$

define la *ecuación diferencial lineal de orden n*

$$\mathcal{L}[y] \equiv a_n(x)\, y^{(n)} + a_{n-1}(x)\, y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)\, y' + a_0(x)\, y = b(x). \tag{1.2}$$

Se llama *homogénea* si $b \equiv 0$ y *completa* en caso contrario; b es la *fuente* o término inhomogéneo.

Proposición 1.2 (Linealidad y superposición)

Para cualesquiera $y_1, y_2 \in \mathcal{C}^n(I)$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$,

$$\mathcal{L}[\alpha y_1 + \beta y_2] = \alpha\, \mathcal{L}[y_1] + \beta\, \mathcal{L}[y_2].$$

En consecuencia: (i) *el conjunto de soluciones de la homogénea es el núcleo $\ker \mathcal{L}$, un subespacio vectorial;* (ii) *si $\mathcal{L}[y_k] = b_k$ para $k = 1, \dots, m$, entonces $\mathcal{L}\big[\sum_k y_k\big] = \sum_k b_k$ (principio de superposición).*

Demostración. La derivación es lineal y $a_j(x)$ multiplica punto a punto; (i) y (ii) son consecuencias inmediatas. ∎

1.2 El espacio de soluciones tiene dimensión n

Teorema 1.3 (Existencia y unicidad; recordatorio)

Para cada $x_0 \in I$ y cada $(\eta_0, \dots, \eta_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$ existe una única $y \in \mathcal{C}^n(I)$ solución de (1.2) con $y^{(j)}(x_0) = \eta_j$, $j = 0, \dots, n-1$ [1, cap. 3], [2, cap. IV].

Teorema 1.4 (Dimensión del núcleo)

$\dim \ker \mathcal{L} = n$. *Más precisamente, para cada $x_0 \in I$ la aplicación «datos iniciales»*

$$\Phi_{x_0} \colon \ker \mathcal{L} \longrightarrow \mathbb{R}^n, \qquad \Phi_{x_0}(y) = \big(y(x_0),\, y'(x_0),\, \dots,\, y^{(n-1)}(x_0)\big), \tag{1.3}$$

es un isomorfismo de espacios vectoriales.

Demostración. Φ_{x_0} es lineal porque la derivación y la evaluación lo son. Aplicando el teorema 1.3 con $b \equiv 0$: la *existencia* dice que todo vector de datos es imagen de alguna solución, luego Φ_{x_0} es sobreyectiva; la *unicidad* dice que esa solución es única, luego Φ_{x_0} es inyectiva. Así $\ker \mathcal{L} \cong \mathbb{R}^n$. ∎

Observación 1.5 *(¿n soluciones o n constantes?).* Ambas afirmaciones expresan lo mismo. Conviene distinguir tres objetos: el conjunto de soluciones $\ker \mathcal{L}$, que es infinito; una *base* $\{\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n\}$ o *sistema fundamental*, las piezas fijas; y las n constantes $c_1, \dots, c_n$, que son las coordenadas de una solución concreta en esa base, $y = c_1\hat{y}_1 + \cdots + c_n\hat{y}_n$. Es la misma situación que en $\mathbb{R}^3$: infinitos vectores, tres vectores de la base y tres coordenadas para cada uno. Fijar una solución equivale a dar n números, sean los datos iniciales o las constantes c_i (figura 1.1).

Ejemplo 1.6. Para $y'' + y = 0$ ($n = 2$), $\{\cos x, \operatorname{sen} x\}$ es una base y la solución general $y = c_1 \cos x + c_2 \operatorname{sen} x$ tiene dos constantes. En $x_0 = 0$, $y(0) = c_1$ e $y'(0) = c_2$: aquí las constantes son directamente los datos iniciales, porque $\Phi_0(\cos) = (1, 0)$ y $\Phi_0(\operatorname{sen}) = (0, 1)$ son la base canónica de $\mathbb{R}^2$.




FIGURA 1.1. (a) La aplicación Φ_{x_0} asigna a cada solución de la homogénea sus n datos iniciales en x_0; el teorema de existencia y unicidad la convierte en un isomorfismo, de modo que $\dim \ker \mathcal{L} = n$. (b) Soluciones de $y'' + y = 0$ con datos $(y(0), y'(0)) = (1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$ y $(-\frac{1}{2}, \frac{4}{5})$: cada par de datos determina una única curva.

1.3 Independencia lineal y wronskiano

No basta con tener n soluciones: deben ser independientes. Por ejemplo, $\{\cos x,\, 2\cos x\}$ sólo genera una recta de $\ker \mathcal{L}$.

Definición 1.7 (Matriz wronskiana)

Dadas $\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n \in \mathcal{C}^{n-1}(I)$, su *matriz wronskiana* y su *wronskiano* son

$$W(x) \overset{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} \hat{y}_1 & \cdots & \hat{y}_n \\ \hat{y}_1' & \cdots & \hat{y}_n' \\ \vdots & & \vdots \\ \hat{y}_1^{(n-1)} & \cdots & \hat{y}_n^{(n-1)} \end{pmatrix}(x), \qquad w(x) \overset{\text{def}}{=} \det W(x). \tag{1.4}$$

Proposición 1.8 (Criterio del wronskiano)

Sean $\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n \in \ker \mathcal{L}$. *Son equivalentes:*

(a) $\{\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n\}$ *es una base de* $\ker \mathcal{L}$;

(b) $w(x_0) \neq 0$ *para* algún $x_0 \in I$;

(c) $w(x) \neq 0$ *para* todo $x \in I$.

Demostración. La columna i de $W(x_0)$ es precisamente $\Phi_{x_0}(\hat{y}_i)$. Como Φ_{x_0} es un isomorfismo (teorema 1.4) para *cada* $x_0 \in I$,

$$\{\hat{y}_i\} \text{ base de } \ker \mathcal{L} \iff \{\Phi_{x_0}(\hat{y}_i)\} \text{ base de } \mathbb{R}^n \iff w(x_0) \neq 0, \tag{1.5}$$

y la primera condición no depende de x_0. ∎

Observación 1.9. Para funciones *arbitrarias*, $w \not\equiv 0$ implica independencia lineal, pero no al revés: x^2 y $x|x|$ son independientes en $\mathbb{R}$ y su wronskiano es idénticamente nulo. La equivalencia de la proposición 1.8 usa que las $\hat{y}_i$ resuelven la misma ecuación lineal con $a_n \neq 0$.

Ejemplo 1.10 (Dos wronskianos [2]).

(i) $x^3y''' - 3x^2y'' + 6x\,y' - 6y = 0$ en $I = (0, \infty)$ admite las soluciones x, x^2, x^3, y

$$w(x) = \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix} = 2x^3 \neq 0,$$

luego la solución general es $y = k_1x + k_2x^2 + k_3x^3$.

(ii) Para $y'' + y = 0$, las soluciones $\cos x$, $\operatorname{sen} x$, $\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}$ son dependientes, $\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} - \cos x - \mathrm{i}\operatorname{sen} x = 0$ (como debe ser: tres vectores en un espacio de dimensión 2), y en efecto su wronskiano 3×3 es nulo.

1.4 Estructura de la solución general

Teorema 1.11 (Homogénea más particular)

Sean $\{\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n\}$ un sistema fundamental e y_p una solución cualquiera de (1.2). Entonces toda solución de (1.2) es de la forma

$$y(x) = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} c_i\, \hat{y}_i(x)}_{y_h \in \ker \mathcal{L}} + y_p(x), \qquad c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}. \tag{1.6}$$

Demostración. Por linealidad, $\mathcal{L}[y - y_p] = b - b = 0$, luego $y - y_p \in \ker \mathcal{L}$, que es el espacio generado por las $\hat{y}_i$. ∎

El trabajo se reparte así en dos problemas (figura 1.2): hallar y_h, lo que haremos para coeficientes constantes en las secciones 2 y 3, y hallar y_p, lo que haremos en general en las secciones 4 y 5.




FIGURA 1.2. Estructura del tema: por la linealidad, el problema se separa en hallar el núcleo de $\mathcal{L}$ y una solución particular.

2 Homogénea con coeficientes constantes

Supongamos que $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ son constantes, con $a_n \neq 0$. Entonces $\mathcal{L}$ es un *polinomio en el operador* D:

$$\mathcal{L} = p(D), \qquad p(\lambda) \overset{\text{def}}{=} a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0, \tag{2.1}$$

donde p es el *polinomio característico*. Trabajamos con funciones de valores complejos y extraemos al final las soluciones reales [2, cap. IV], [3], [4, cap. 4].

2.1 El ansatz exponencial

Proposición 2.1 (La exponencial es autofunción de D)

Para todo $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$\mathcal{L}\left[\mathrm{e}^{\lambda x}\right] = p(\lambda)\, \mathrm{e}^{\lambda x}. \tag{2.2}$$

En consecuencia, $\mathrm{e}^{\lambda x} \in \ker \mathcal{L}$ si y sólo si λ es raíz de la ecuación característica $p(\lambda) = 0$.

Demostración. $D^j e^{\lambda x} = \lambda^j e^{\lambda x}$, luego $\mathcal{L}[e^{\lambda x}] = \sum_j a_j \lambda^j e^{\lambda x} = p(\lambda) e^{\lambda x}$, y $e^{\lambda x} \neq 0$. ∎

2.2 Factorización del operador

Por el teorema fundamental del álgebra,

$$p(\lambda) = a_n \prod_{k=1}^{r} (\lambda - \lambda_k)^{m_k}, \qquad \lambda_k \in \mathbb{C} \text{ distintas}, \qquad \sum_{k=1}^{r} m_k = n. \tag{2.3}$$

Cálculo simbólico con D. Para trasladar (2.3) al operador hay que poder operar con polinomios en D exactamente igual que con polinomios en λ. Los operadores se suman y se multiplican según

$$(A + B)\, y \overset{\text{def}}{=} Ay + By, \qquad (AB)\, y \overset{\text{def}}{=} A(By), \tag{2.4}$$

es decir, el producto es la composición: primero actúa B y luego A (así, $D^2 y = D(Dy) = y''$). Con coeficientes constantes bastan dos reglas:

$$D^i D^j = D^{i+j}, \qquad D(c\, y) = c\, Dy \quad (c \text{ constante}). \tag{2.5}$$

Ejemplo 2.2 (Dos factores). Para $a, b \in \mathbb{C}$,

$$(D - a)(D - b)\, y = (D - a)(y' - by) = y'' - by' - ay' + ab\, y = \big(D^2 - (a + b)D + ab\big)\, y,$$

que es $(\lambda - a)(\lambda - b) = \lambda^2 - (a + b)\lambda + ab$ con λ sustituida por D. Como el resultado es simétrico en a y b, $(D - a)(D - b) = (D - b)(D - a)$.

Lema 2.3 (Polinomios en D)

Para $q_1(\lambda) = \sum_i a_i \lambda^i$ y $q_2(\lambda) = \sum_j b_j \lambda^j$ con coeficientes constantes, la sustitución $q(\lambda) \mapsto q(D)$ cumple

$$(q_1 + q_2)(D) = q_1(D) + q_2(D), \qquad (q_1 q_2)(D) = q_1(D)\, q_2(D). \tag{2.6}$$

Es decir, da igual multiplicar los polinomios y sustituir que sustituir y multiplicar los operadores.

Demostración. La suma sólo usa (2.4): $(q_1 + q_2)(D)\, y = \sum_k (a_k + b_k) D^k y = \sum_k a_k D^k y + \sum_k b_k D^k y$. Para el producto, como polinomios $q_1 q_2(\lambda) = \sum_{i,j} a_i b_j \lambda^{i+j}$, y aplicando $q_1(D) q_2(D)$ a y,

$$q_1(D)\big(q_2(D)\, y\big) = \sum_i a_i\, D^i \Big(\sum_j b_j\, D^j y \Big) = \sum_{i,j} a_i b_j\, D^i \big(D^j y\big) = \sum_{i,j} a_i b_j\, D^{i+j} y = (q_1 q_2)(D)\, y,$$

donde la segunda igualdad usa la linealidad de D^i y que los b_j son constantes, y la tercera, $D^i D^j = D^{i+j}$. Es el mismo cálculo que desarrollar el producto de dos polinomios término a término. ∎

Proposición 2.4 (Factorización de $\mathcal{L}$)

Los operadores $D-\lambda_k$ conmutan entre sí y

$$\mathcal{L} = a_n\,(D-\lambda_1)^{m_1}(D-\lambda_2)^{m_2}\cdots(D-\lambda_r)^{m_r}, \tag{2.7}$$

con los factores en cualquier orden.

Demostración. Aplicando el lema 2.3 a la identidad polinómica (2.3) se obtiene (2.7). Y como los polinomios conmutan, $q_1(D)\,q_2(D) = (q_1q_2)(D) = (q_2q_1)(D) = q_2(D)\,q_1(D)$. ∎

Observación 2.5 *(Por qué hacen falta coeficientes constantes).* Si un coeficiente depende de x, la segunda regla de (2.5) falla: $D(x\,y) = y + x\,y' \neq x\,Dy$, de modo que $D\circ x \neq x\circ D$. Por ejemplo,

$$(D-x)\,D\,y = y'' - x\,y', \qquad D\,(D-x)\,y = y'' - x\,y' - y,$$

y el orden de los factores importa. La factorización (2.7) sólo vale con coeficientes constantes.

Corolario 2.6 (Raíces simples)

Si todas las raíces son simples ($r=n$, $m_k=1$), las exponenciales $\mathrm{e}^{\lambda_1 x},\dots,\mathrm{e}^{\lambda_n x}$ forman una base de $\ker\mathcal{L}$, y

$$y_h(x) = c_1\mathrm{e}^{\lambda_1 x} + c_2\mathrm{e}^{\lambda_2 x} + \cdots + c_n\mathrm{e}^{\lambda_n x}. \tag{2.8}$$

Demostración. Son soluciones por la proposición 2.1; falta ver que son independientes y, por la proposición 1.8, basta comprobar que $w(x_0)\neq 0$ en un punto. Tomamos $x_0=0$. Para $y_k = \mathrm{e}^{\lambda_k x}$ se tiene $y_k^{(j)}(x) = \lambda_k^j \mathrm{e}^{\lambda_k x}$, luego $y_k^{(j)}(0) = \lambda_k^j$, y la matriz wronskiana en 0, cuya columna k es $\Phi_0(y_k)$, es la *matriz de Vandermonde*

$$W(0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix}, \qquad \det W(0) = \prod_{1\le i<k\le n} (\lambda_k - \lambda_i). \tag{2.9}$$

Como las raíces son distintas, ningún factor se anula y $w(0)\neq 0$. Por ejemplo, para $n=2$, $\det\left(\begin{smallmatrix}1 & 1\\ \lambda_1 & \lambda_2\end{smallmatrix}\right) = \lambda_2 - \lambda_1 \neq 0$. ∎

Observación 2.7 *(El determinante de Vandermonde).* Visto como polinomio en $\lambda_1,\dots,\lambda_n$, $\det W(0)$ se anula si $\lambda_i=\lambda_k$ (dos columnas iguales), luego es divisible por cada $\lambda_k-\lambda_i$. Ambos miembros de (2.9) tienen grado total $0+1+\cdots+(n-1) = \binom{n}{2}$, el número de pares $i<k$, de modo que coinciden salvo una constante, que vale 1 comparando el término diagonal $\lambda_2\lambda_3^2\cdots\lambda_n^{n-1}$. Es aquí donde se usa que las raíces sean distintas: con raíces repetidas hay menos de n exponenciales y faltan soluciones, las de la forma $x^j\mathrm{e}^{\lambda x}$ (sección 3).

2.3 Soluciones reales

Proposición 2.8 (Raíces complejas conjugadas)

Si los a_j son reales y $\lambda = \alpha + \mathrm{i}\beta$, $\beta \neq 0$, es raíz de p, también lo es $\bar\lambda$, con la misma multiplicidad, y el par $\{\mathrm{e}^{\lambda x}, \mathrm{e}^{\bar\lambda x}\}$ puede sustituirse por el par real

$$\operatorname{Re} \mathrm{e}^{\lambda x} = \mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x, \qquad \operatorname{Im} \mathrm{e}^{\lambda x} = \mathrm{e}^{\alpha x}\operatorname{sen}\beta x, \tag{2.10}$$

que genera el mismo subespacio.

Demostración. Como p tiene coeficientes reales, $p(\bar\lambda) = \overline{p(\lambda)} = 0$. Al ser $\mathcal{L}$ real, $\mathcal{L}[\operatorname{Re} y] = \operatorname{Re}\mathcal{L}[y]$ e igual con la parte imaginaria, luego (2.10) son soluciones. Por último, $\mathrm{e}^{\lambda x} = \mathrm{e}^{\alpha x}(\cos\beta x + \mathrm{i}\operatorname{sen}\beta x)$ y $\mathrm{e}^{\bar\lambda x} = \mathrm{e}^{\alpha x}(\cos\beta x - \mathrm{i}\operatorname{sen}\beta x)$, de modo que ambos pares generan el mismo plano. ∎

Ejemplo 2.9 ($2y'' - y' - y = 0$). $p(\lambda) = 2\lambda^2 - \lambda - 1 = (2\lambda+1)(\lambda-1)$, de raíces $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = -\tfrac{1}{2}$. Por el corolario 2.6,

$$y(x) = c_1\,\mathrm{e}^{x} + c_2\,\mathrm{e}^{-x/2}. \tag{2.11}$$

Ejemplo 2.10 ($y'' + 2y' + 2y = 0$ [2]).

1. *Polinomio característico.* Sustituyendo $y^{(k)} \mapsto \lambda^k$, es decir, $\mathcal{L} = p(D) = D^2 + 2D + 2$:
$$p(\lambda) = \lambda^2 + 2\lambda + 2.$$
2. *Raíces.* El discriminante es negativo:
$$\lambda = \frac{-2 \pm \sqrt{4-8}}{2} = \frac{-2 \pm 2\mathrm{i}}{2} = -1 \pm \mathrm{i}, \qquad \alpha = -1, \quad \beta = 1,$$
un par conjugado, como garantiza la proposición 2.8 por ser reales los coeficientes.
3. *Sistema fundamental complejo.* Al ser las raíces distintas (corolario 2.6), $\{\mathrm{e}^{(-1+\mathrm{i})x},\ \mathrm{e}^{(-1-\mathrm{i})x}\}$.
4. *Paso a soluciones reales.* Por la fórmula de Euler,
$$\mathrm{e}^{(-1+\mathrm{i})x} = \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} = \mathrm{e}^{-x}(\cos x + \mathrm{i}\operatorname{sen} x), \qquad \operatorname{Re}\mathrm{e}^{\lambda x} = \mathrm{e}^{-x}\cos x, \quad \operatorname{Im}\mathrm{e}^{\lambda x} = \mathrm{e}^{-x}\operatorname{sen} x,$$
que, por la proposición 2.8, son soluciones y generan el mismo plano que el par complejo.
5. *Solución general.*
$$y(x) = \mathrm{e}^{-x}\big(k_1\cos x + k_2\operatorname{sen} x\big), \qquad k_1, k_2 \in \mathbb{R}. \tag{2.12}$$
6. *Comprobación.* Para $y_1 = \mathrm{e}^{-x}\cos x$: $y_1' = -\mathrm{e}^{-x}(\cos x + \operatorname{sen} x)$ e $y_1'' = 2\mathrm{e}^{-x}\operatorname{sen} x$, luego
$$y_1'' + 2y_1' + 2y_1 = \mathrm{e}^{-x}\big[2\operatorname{sen} x - 2\cos x - 2\operatorname{sen} x + 2\cos x\big] = 0,$$
y del mismo modo con $y_2 = \mathrm{e}^{-x}\operatorname{sen} x$. Son independientes: en $x_0 = 0$, $(y_1, y_1') = (1, -1)$ e $(y_2, y_2') = (0, 1)$, y $w(0) = \det\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right) = 1 \neq 0$.

Interpretación: $\alpha = -1$ aporta el factor e^{-x}, que amortigua la amplitud, y $\beta = 1$ la oscilación $\cos x$, $\operatorname{sen} x$: es una oscilación amortiguada, el caso subamortiguado del ejemplo 2.11 con $\gamma = 1$ y $\Omega = 1$.

2.4 El oscilador amortiguado

Ejemplo 2.11 ($y'' + \nu\omega\, y' + \omega^2 y = 0$, con $\nu \geq 0$, $\omega > 0$). La ecuación característica $\lambda^2 + \nu\omega\lambda + \omega^2 = 0$ da

$$\lambda_\pm = \frac{-\nu\omega \pm \sqrt{\nu^2\omega^2 - 4\omega^2}}{2} = \frac{\omega}{2}\Big(-\nu \pm \sqrt{\nu^2 - 4}\Big). \tag{2.13}$$

El signo del discriminante $\nu^2 - 4$ decide el comportamiento (figura 2.1):

- $\nu > 2$ (*sobreamortiguado*): dos raíces reales negativas y $y = c_1 \mathrm{e}^{\lambda_+ x} + c_2 \mathrm{e}^{\lambda_- x}$; decae exponencialmente sin oscilar.
- $\nu < 2$ (*subamortiguado*): raíces complejas conjugadas $\lambda_\pm = -\gamma \pm \mathrm{i}\Omega$ y oscilaciones amortiguadas (2.14); se desarrolla más abajo.
- $\nu = 2$ (*crítico*): raíz doble $\lambda = -\omega$. Sólo se obtiene una exponencial, $\mathrm{e}^{-\omega x}$, y falta una segunda solución. Este caso frontera motiva la sección 3.

Desarrollo del caso subamortiguado.

1. *Raíz de un número negativo.* Si $\nu < 2$, entonces $\nu^2 - 4 < 0$ y

   $$\sqrt{\nu^2 - 4} = \sqrt{-(4 - \nu^2)} = \mathrm{i}\sqrt{4 - \nu^2},$$

   donde ahora $4 - \nu^2 > 0$ y la raíz de la derecha es un real positivo.

2. *Sustitución en* (2.13).

   $$\lambda_\pm = \frac{\omega}{2}\Big(-\nu \pm \mathrm{i}\sqrt{4 - \nu^2}\Big) = \underbrace{-\frac{\nu\omega}{2}}_{\text{parte real}} \pm \mathrm{i}\ \underbrace{\frac{\omega}{2}\sqrt{4 - \nu^2}}_{\text{parte imaginaria}}.$$

3. *Notación.* Se definen

   $$\gamma \overset{\text{def}}{=} \frac{\nu\omega}{2}, \qquad \Omega \overset{\text{def}}{=} \frac{\omega}{2}\sqrt{4 - \nu^2} = \omega\sqrt{\frac{4 - \nu^2}{4}} = \omega\sqrt{1 - \frac{\nu^2}{4}},$$

   de modo que $\lambda_\pm = -\gamma \pm \mathrm{i}\Omega$.

4. *Soluciones reales.* Por la proposición 2.8 con $\alpha = -\gamma$ y $\beta = \Omega$, el par real es $\mathrm{e}^{-\gamma x}\cos\Omega x$, $\mathrm{e}^{-\gamma x}\operatorname{sen}\Omega x$, y

   $$y = \mathrm{e}^{-\gamma x}\big(A\cos\Omega x + B\operatorname{sen}\Omega x\big) \qquad \text{(oscilaciones amortiguadas)}. \tag{2.14}$$

   El ejemplo 2.10 es el caso $\omega = \sqrt{2}$, $\nu = \sqrt{2}$, que da $\gamma = 1$ y $\Omega = 1$.

Interpretación. γ es la *tasa de decaimiento* y crece con el rozamiento ν. Ω es la *frecuencia de oscilación*: sin rozamiento ($\nu = 0$) vale $\Omega = \omega$, la frecuencia natural, y $\gamma = 0$, con lo que se recupera la oscilación libre $A\cos\omega x + B\operatorname{sen}\omega x$. Al aumentar ν, $\Omega < \omega$: el rozamiento hace oscilar más despacio, y cuando $\nu \to 2$, $\Omega \to 0$ y las oscilaciones desaparecen, que es el paso al caso crítico.

Como $\lambda_+\lambda_- = \omega^2$, para $\nu < 2$ las raíces recorren la circunferencia $|\lambda| = \omega$; en $\nu = 2$ chocan en $-\omega$ y para $\nu > 2$ se separan sobre el eje real.




Figura 2.1. Oscilador amortiguado con $\omega = 1$. (a) Al crecer ν desde 0, las raíces $\lambda_\pm = -\gamma \pm i\Omega$ recorren la circunferencia $|\lambda| = \omega$ (violeta) hasta chocar en $\lambda = -\omega$ para $\nu = 2$; después se separan sobre el eje real (naranja). Los puntos marcan los tres casos de (b). (b) El régimen crítico, $y = (1 + x)\,e^{-x}$, es el regreso al equilibrio más rápido sin oscilar.

3 Raíces múltiples

Si λ_k tiene multiplicidad $m_k > 1$, la exponencial $e^{\lambda_k x}$ está en $\ker(D - \lambda_k)^{m_k}$, pero veremos que ese núcleo tiene dimensión m_k: faltan $m_k - 1$ soluciones.

3.1 Conjugación por la exponencial

Lema 3.1 («Derivada covariante»)

Para todo $\lambda \in \mathbb{C}$, todo $m \in \mathbb{N}$ y toda $g \in \mathcal{C}^m(I)$,

$$(D - \lambda)\big(e^{\lambda x} g\big) = e^{\lambda x} g', \qquad (D - \lambda)^m \big(e^{\lambda x} g\big) = e^{\lambda x} g^{(m)}. \tag{3.1}$$

Es decir, $e^{-\lambda x}(D - \lambda)\,e^{\lambda x} = D$: conjugado por la exponencial, $D - \lambda$ actúa como la derivada ordinaria.

Demostración. $(D - \lambda)(e^{\lambda x} g) = \lambda e^{\lambda x} g + e^{\lambda x} g' - \lambda e^{\lambda x} g = e^{\lambda x} g'$. La segunda igualdad se obtiene aplicando la primera m veces (inducción sobre m). ∎

Observación 3.2 *(Lectura como igualdad de operadores).* $e^{-\lambda x}(D - \lambda)\,e^{\lambda x}$ es la composición de tres operadores, que actúan de derecha a izquierda: multiplicar por $e^{\lambda x}$, aplicar $D - \lambda$ y multiplicar por $e^{-\lambda x}$. Sobre una función g,

$$g \xrightarrow{\cdot\, e^{\lambda x}} e^{\lambda x} g \xrightarrow{D - \lambda} e^{\lambda x} g' \xrightarrow{\cdot\, e^{-\lambda x}} g' = Dg, \tag{3.2}$$

donde el paso central es la primera igualdad de (3.1). Como el resultado coincide con Dg para toda g, ambos operadores son iguales. Se habla de *conjugación* por analogía con las matrices: si P es invertible, $P^{-1}AP$ es la misma aplicación lineal A vista en otras coordenadas. Aquí P es «multiplicar por $e^{\lambda x}$» y P^{-1}, «multiplicar por $e^{-\lambda x}$»: en esas coordenadas, $D - \lambda$ es simplemente D. En la práctica, al escribir $y = e^{\lambda x} g$, aplicar $D - \lambda$ a y equivale a derivar g y volver a multiplicar por la exponencial: el factor $e^{\lambda x}$ «absorbe» el $-\lambda$. Esto es lo que permite resolver $(D - \lambda)^m y = 0$ en la proposición 3.3.

Proposición 3.3 (Núcleo de $(D-\lambda)^m$)

Para todo $\lambda \in \mathbb{C}$ y todo $m \geq 1$,

$$\ker(D-\lambda)^m = \operatorname{span}\{e^{\lambda x},\, x\,e^{\lambda x},\, \dots,\, x^{m-1}e^{\lambda x}\}, \qquad \dim\ker(D-\lambda)^m = m. \tag{3.3}$$

Demostración. Toda función se escribe como $y = e^{\lambda x}g$ con $g = e^{-\lambda x}y$. Por el lema 3.1,

$$(D-\lambda)^m y = 0 \iff g^{(m)} = 0 \iff g(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_{m-1}x^{m-1}.$$

Las m funciones $x^j e^{\lambda x}$ son independientes porque $e^{\lambda x} \neq 0$ y los monomios lo son. ∎

3.2 Solución general

Lema 3.4 (Independencia)

Si $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{C}$ son distintas y $P_1, \dots, P_r$ son polinomios con $\sum_k P_k(x)\,e^{\lambda_k x} \equiv 0$ en I, entonces $P_1 = \cdots = P_r = 0$.

Demostración. Por inducción sobre r; el caso $r = 1$ es inmediato. Multiplicando por $e^{-\lambda_r x}$ y derivando $\deg P_r + 1$ veces se elimina el último término. Como $D\big(Pe^{\mu x}\big) = (P' + \mu P)\,e^{\mu x}$ y $\mu = \lambda_k - \lambda_r \neq 0$ para $k < r$, cada derivación transforma $P_k e^{(\lambda_k-\lambda_r)x}$ en $Q_k e^{(\lambda_k-\lambda_r)x}$ con $\deg Q_k = \deg P_k$. La hipótesis de inducción da $Q_k = 0$, luego $P_k = 0$ para $k < r$, y entonces $P_r e^{\lambda_r x} \equiv 0$ obliga a $P_r = 0$. ∎

Teorema 3.5 (Base de $\ker \mathcal{L}$ con coeficientes constantes)

Con la factorización (2.7), las n funciones $x^j e^{\lambda_k x}$, $0 \leq j < m_k$, $1 \leq k \leq r$, forman una base de $\ker \mathcal{L}$, y

$$y_h(x) = \sum_{k=1}^{r} \big(c_{k,0} + c_{k,1}\,x + \cdots + c_{k,m_k-1}\,x^{m_k-1}\big)\,e^{\lambda_k x}. \tag{3.4}$$

Demostración. Por la conmutatividad (proposición 2.4) podemos escribir el factor $(D-\lambda_k)^{m_k}$ en último lugar, de modo que actúe primero: $\ker(D-\lambda_k)^{m_k} \subseteq \ker \mathcal{L}$. Por la proposición 3.3 esto aporta m_k soluciones, $\sum_k m_k = n$ en total, independientes por el lema 3.4. Como $\dim\ker \mathcal{L} = n$ (teorema 1.4), forman una base. ∎

Observación 3.6 *(Raíces próximas [2]).* El factor x aparece de forma natural como límite. Si $\lambda_1 \neq \lambda_2$ son raíces, el cociente $\big(e^{\lambda_2 x} - e^{\lambda_1 x}\big)/(\lambda_2 - \lambda_1)$ es solución; cuando $\lambda_2 \to \lambda_1$ tiende a $\partial_\lambda e^{\lambda x}\big|_{\lambda_1} = x\,e^{\lambda_1 x}$, que es la segunda solución asociada a la raíz doble.

Ejemplo 3.7 ($y''' - 4y'' + 5y' - 2y = 0$ [2]). $p(\lambda) = \lambda^3 - 4\lambda^2 + 5\lambda - 2 = (\lambda-1)^2(\lambda-2)$: raíz 1 doble y raíz 2 simple. Por el teorema 3.5, $y = (k_1 + k_2 x)\,e^x + k_3\,e^{2x}$.

Ejemplo 3.8 (Vuelta al caso crítico). Para $\nu = 2$ en el ejemplo 2.11, $p(\lambda) = (\lambda+\omega)^2$ y

$$y = (c_0 + c_1 x)\,\mathrm{e}^{-\omega x}, \tag{3.5}$$

que es el regreso al equilibrio más rápido sin oscilar (figura 2.1 (b)).

Observación 3.9 *(Raíces complejas múltiples).* Combinando el teorema 3.5 con la proposición 2.8: un par $\alpha \pm \mathrm{i}\beta$ de multiplicidad m aporta las $2m$ soluciones reales $x^j \mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x$ y $x^j \mathrm{e}^{\alpha x}\operatorname{sen}\beta x$, $0 \le j < m$.

4 Variación de las constantes

Este método no exige coeficientes constantes: sólo necesita un sistema fundamental $\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n$ de la homogénea, con $y_h = \sum_i k_i \hat{y}_i$ [5, cap. 15], [2, cap. IV].

Observación 4.1 *(Nota histórica).* La idea de «promover las constantes a funciones» aparece en Euler, en sus estudios de perturbaciones planetarias (hacia 1748–1753), y Johann Bernoulli ya la usaba para la ecuación lineal de primer orden. Lagrange la sistematizó para ecuaciones lineales de orden n en la década de 1770, con las condiciones (4.2); por eso el método se atribuye a Euler o a Lagrange según el texto [6].

4.1 Ansatz y condiciones impuestas

Buscamos una solución particular de la forma

$$y_p(x) = \sum_{i=1}^{n} k_i(x)\,\hat{y}_i(x). \tag{4.1}$$

Al derivar aparecen términos con k_i'. Tenemos n funciones incógnita y una sola ecuación, de modo que podemos imponer $n-1$ condiciones. Las elegimos para que las derivadas de y_p se comporten como si las k_i fueran constantes:

$$\sum_{i=1}^{n} k_i'\,\hat{y}_i^{(j)} = 0, \qquad j = 0, 1, \dots, n-2. \tag{4.2}$$

Lema 4.2

Bajo (4.2), $y_p^{(j)} = \sum_i k_i\,\hat{y}_i^{(j)}$ para $j \le n-1$, y sólo la última derivada arrastra un término nuevo:

$$y_p^{(n)} = \sum_i k_i\,\hat{y}_i^{(n)} + \sum_i k_i'\,\hat{y}_i^{(n-1)}. \tag{4.3}$$

Demostración. Por inducción: si $y_p^{(j)} = \sum_i k_i \hat{y}_i^{(j)}$ con $j \le n-1$, derivando, $y_p^{(j+1)} = \sum_i k_i \hat{y}_i^{(j+1)} + \sum_i k_i' \hat{y}_i^{(j)}$, y el último sumatorio es nulo por (4.2) mientras $j \le n-2$. ∎

Sustituyendo en $\mathcal{L}$ y usando $\mathcal{L}[\hat{y}_i] = 0$,

$$\mathcal{L}[y_p] = \sum_i k_i \underbrace{\mathcal{L}[\hat{y}_i]}_{0} + a_n \sum_i k_i'\,\hat{y}_i^{(n-1)} = b \quad\Longrightarrow\quad \sum_i k_i'\,\hat{y}_i^{(n-1)} = \frac{b}{a_n}. \tag{4.4}$$

4.2 Forma matricial: el wronskiano

Las n ecuaciones (4.2) y (4.4) forman un sistema lineal para $\boldsymbol{k}' = (k_1', \dots, k_n')^{\mathsf{T}}$ cuya matriz es la wronskiana (1.4):

$$W(x)\,\boldsymbol{k}'(x) = \boldsymbol{b}(x), \qquad \boldsymbol{b}(x) \overset{\text{def}}{=} \frac{b(x)}{a_n(x)}\,\boldsymbol{e}_n = \Big(0, \dots, 0, \frac{b(x)}{a_n(x)}\Big)^{\mathsf{T}}. \tag{4.5}$$

Teorema 4.3 (Fórmula de variación de las constantes)

Sean $\hat{\boldsymbol{y}} = (\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n)^{\mathsf{T}}$ un sistema fundamental y $x_0 \in I$. Entonces

$$\boxed{y_p(x) = \hat{\boldsymbol{y}}^{\mathsf{T}}(x) \int_{x_0}^{x} W^{-1}(s)\,\boldsymbol{e}_n\,\frac{b(s)}{a_n(s)}\,\mathrm{d}s} \tag{4.6}$$

es solución de $\mathcal{L}[y] = b$ con $y_p^{(j)}(x_0) = 0$, $j = 0, \dots, n-1$, y la solución general es $y = y_h + y_p$.

Demostración. Por la proposición 1.8, $W(x)$ es invertible para todo $x \in I$, y W^{-1} es continua. Así $\boldsymbol{k}(x) = \int_{x_0}^{x} W^{-1}(s)\,\boldsymbol{b}(s)\,\mathrm{d}s$ es de clase $\mathcal{C}^1$ y cumple (4.5), es decir, (4.2) y (4.4); por el lema 4.2, $\mathcal{L}[y_p] = b$. Como $\boldsymbol{k}(x_0) = \boldsymbol{0}$, se tiene $y_p^{(j)}(x_0) = \sum_i k_i(x_0)\hat{y}_i^{(j)}(x_0) = 0$ para $j \le n-1$. La última afirmación es el teorema 1.11. ∎

Observación 4.4.

(i) Basta la *última columna* de W^{-1}, porque $\boldsymbol{b}$ sólo tiene no nula la última componente.

(ii) Como y_p arranca «en reposo» en x_0, los datos iniciales de $y = y_h + y_p$ los fija únicamente y_h: $y^{(j)}(x_0) = y_h^{(j)}(x_0)$.

(iii) Cambiar el límite inferior x_0 añade a $\boldsymbol{k}$ un vector constante, es decir, una solución homogénea: no altera la solución general.

4.3 El caso $n = 2$

Con $w = \hat{y}_1\hat{y}_2' - \hat{y}_2\hat{y}_1'$,

$$W^{-1} = \frac{1}{w}\begin{pmatrix} \hat{y}_2' & -\hat{y}_2 \\ -\hat{y}_1' & \hat{y}_1 \end{pmatrix}, \qquad \hat{\boldsymbol{y}}^{\mathsf{T}}(x)\,W^{-1}(s)\,\boldsymbol{e}_2 = \frac{\hat{y}_1(s)\,\hat{y}_2(x) - \hat{y}_1(x)\,\hat{y}_2(s)}{w(s)},$$

y (4.6) se reduce a

$$y_p(x) = \int_{x_0}^{x} \frac{\hat{y}_1(s)\,\hat{y}_2(x) - \hat{y}_1(x)\,\hat{y}_2(s)}{w(s)}\,\frac{b(s)}{a_2(s)}\,\mathrm{d}s. \tag{4.7}$$

Ejemplo 4.5 (Oscilador forzado, $y'' + \omega^2 y = b(x)$). Con $\hat{y}_1 = \cos\omega x$ y $\hat{y}_2 = \operatorname{sen}\omega x$ se obtiene $w = \omega$, y el numerador de (4.7) es $\operatorname{sen}\omega x\cos\omega s - \cos\omega x\operatorname{sen}\omega s = \operatorname{sen}\omega(x-s)$:

$$y_p(x) = \frac{1}{\omega}\int_{x_0}^{x} \operatorname{sen}\omega(x-s)\;b(s)\,\mathrm{d}s. \tag{4.8}$$

Para $b \equiv 1$ y $x_0 = 0$: $y_p = (1 - \cos\omega x)/\omega^2$. En efecto, $y_p'' + \omega^2 y_p = \cos\omega x + 1 - \cos\omega x = 1$.

La forma de (4.8) es reveladora: la solución es una integral de la fuente $b(s)$ ponderada por un *núcleo* $\frac{1}{\omega}\operatorname{sen}\omega(x-s)$ que no depende de b. Ese núcleo es una *función de Green*.

5 Funciones de Green


5.1 Idea: descomponer la fuente

Por el principio de superposición (proposición 1.2), si $b=\sum_k b_k$ y $\mathcal{L}[y_{p,k}]=b_k$, entonces $y_p=\sum_k y_{p,k}$: el efecto de una combinación lineal de fuentes es la superposición del efecto de cada una. ¿Cuál es la forma más elemental de trocear una fuente? La respuesta son las *fuentes puntuales*. Por la propiedad de filtrado de la delta de Dirac,

$$b(x)=\int b(\tilde{x})\,\delta(x-\tilde{x})\,\mathrm{d}\tilde{x}. \tag{5.1}$$

La fuente se ve así como una fila de picos infinitamente estrechos: en cada punto $\tilde{x}$ hay una fuente puntual $\delta(x-\tilde{x})$ de intensidad $b(\tilde{x})\,\mathrm{d}\tilde{x}$, y la integral es la versión continua de la suma $\sum_k b_k$ (el índice discreto k pasa a ser la variable continua $\tilde{x}$). Basta, pues, resolver el problema para un impulso unitario (figura 5.1).

(a) Fuente $b(\tilde{x})$ troceada en $K=8$ impulsos de anchura $\Delta\tilde{x}=0{,}7$



(b) Respuestas $b(\tilde{x}_k)\,G(x,\tilde{x}_k)\,\Delta\tilde{x}$ y su suma




Figura 5.1. La función de Green como respuesta a impulsos, para $y''+2\gamma y'+y=b$ con $\gamma=0{,}16$. (a) La fuente $b(\tilde{x})=\operatorname{sen}^2(\pi\tilde{x}/5{,}6)$ se aproxima por 8 impulsos (flechas). (b) Cada impulso produce una respuesta proporcional a $G(x,\tilde{x}_k)$ (5.11), nula antes de $\tilde{x}_k$ (causalidad); su suma (trazo discontinuo) aproxima la solución $y_p=\int G\,b\,\mathrm{d}\tilde{x}$ (trazo continuo), a la que tiende cuando $\Delta\tilde{x}\to 0$.

5.2 Definición y fórmula de la solución

Definición 5.1 (Función de Green)

Una *función de Green* del operador $\mathcal{L}$ es una función $G(x,\tilde{x})$, $x,\tilde{x}\in I$, que cumple

$$\mathcal{L}_x\, G(x,\tilde{x}) = \delta(x-\tilde{x}), \tag{5.2}$$

donde el subíndice indica que $\mathcal{L}$ deriva respecto de x (el punto donde se *observa* el efecto) y $\tilde{x}$ (el punto donde está la *fuente*) actúa como un parámetro. La igualdad se entiende en sentido distribucional: $\mathcal{L}_x G = 0$ para $x\neq\tilde{x}$, con las condiciones de salto en $x=\tilde{x}$ de la proposición 5.4 [7], [8, cap. 10].

Teorema 5.2 (Solución como superposición de impulsos)

Si G es una función de Green de $\mathcal{L}$, entonces

$$\boxed{y_p(x) = \int G(x,\tilde{x})\, b(\tilde{x})\,\mathrm{d}\tilde{x}} \tag{5.3}$$

es una solución particular de $\mathcal{L}[y]=b$.

Demostración. A la fuente $b(\tilde{x})\,\delta(x-\tilde{x})$ le corresponde la respuesta $b(\tilde{x})\,G(x,\tilde{x})$; sumando sobre $\tilde{x}$ y como $\mathcal{L}_x$ sólo actúa sobre x, entra en la integral y sólo afecta a G:

$$\mathcal{L}_x\, y_p(x) = \int \underbrace{\mathcal{L}_x G(x,\tilde{x})}_{\delta(x-\tilde{x})}\, b(\tilde{x})\,\mathrm{d}\tilde{x} = b(x). \tag{5.4}$$

Para la función de Green causal, el teorema 5.5 reduce este cálculo formal al teorema 4.3, ya demostrado. ∎

Observación 5.3 *(G depende del operador, no de la fuente).* G está asociada a $\mathcal{L}$ (y a las condiciones de contorno o iniciales que se impongan), no a b: se calcula una sola vez y sirve para cualquier fuente. Físicamente, $G(x,\tilde{x})$ es la *respuesta en x a un impulso unitario en $\tilde{x}$*, y la solución es la suma ponderada de todas esas respuestas.

5.3 No unicidad, causalidad y condiciones de salto

G no es única: si $h(x;\tilde{x})$ cumple $\mathcal{L}_x h = 0$, también $G + h$ satisface (5.2). Se fija imponiendo condiciones de contorno o iniciales. Una elección habitual es la *causal* o *retardada*:

$$G(x,\tilde{x}) = 0 \qquad \text{para } x < \tilde{x} \tag{5.5}$$

(no hay respuesta antes del impulso).

Proposición 5.4 (Condiciones de salto)

Sea G de clase C^n en $x \neq \tilde{x}$ y solución de (5.2). Entonces $G, \partial_x G, \dots, \partial_x^{n-2} G$ son continuas en $x = \tilde{x}$ y

$$\partial_x^{n-1} G \Big|_{x=\tilde{x}^-}^{x=\tilde{x}^+} = \frac{1}{a_n(\tilde{x})}. \tag{5.6}$$

Justificación. La delta sólo puede equilibrarse con la derivada de mayor orden: si $\partial_x^{n-1} G$ salta en c, entonces $\partial_x^n G$ contiene $c\,\delta(x-\tilde{x})$, y $a_n \partial_x^n G$ aporta $a_n(\tilde{x})\, c\, \delta$. Si alguna derivada de orden $j \leq n-2$ saltara, $\partial_x^n G$ contendría $\delta^{(n-1-j)}$, que nada en $\mathcal{L}_x G$ podría compensar. Integrando (5.2) en $(\tilde{x}-\varepsilon, \tilde{x}+\varepsilon)$ y haciendo $\varepsilon \to 0$, sólo sobrevive $a_n(\tilde{x})\, c = 1$. ∎




Figura 5.2. Función de Green causal de $y'' + 2\gamma y' + y = \delta(x-\tilde{x})$ con $\tilde{x} = 2$, sin amortiguamiento (5.10) y con él (5.11). G es nula antes del impulso (zona sombreada) y continua en $x = \tilde{x}$, pero su derivada salta de 0 a $1 = 1/a_2$, como exige la proposición 5.4: el impulso comunica «velocidad» instantáneamente, no «posición».

5.4 Conexión con la variación de las constantes

Teorema 5.5 (Función de Green causal)

La función de Green causal de $\mathcal{L}$ es

$$\boxed{G(x,\tilde{x}) = \Theta(x-\tilde{x})\; \hat{\boldsymbol{y}}^{\mathsf{T}}(x)\, W^{-1}(\tilde{x})\, \boldsymbol{e}_n\, \frac{1}{a_n(\tilde{x})}} \tag{5.7}$$

Es decir: para $x > \tilde{x}$, $G(\cdot,\tilde{x})$ es la solución de la homogénea con datos $(0,\dots,0,1/a_n(\tilde{x}))$ en $\tilde{x}$. Además, (5.3) con G causal y fuente en $[x_0,\infty)$ coincide con (4.6).

Demostración. Para $x > \tilde{x}$, (5.7) es combinación lineal de las $\hat{y}_i$, luego $\mathcal{L}_x G = 0$; para $x < \tilde{x}$ es nula. En $x = \tilde{x}^+$,

$$\partial_x^j G\big|_{x=\tilde{x}^+} = \big(\hat{\boldsymbol{y}}^{(j)}(\tilde{x})\big)^{\mathsf{T}} W^{-1}(\tilde{x})\, \boldsymbol{e}_n \frac{1}{a_n(\tilde{x})} = \frac{\delta_{j,n-1}}{a_n(\tilde{x})}, \qquad j = 0, \dots, n-1,$$

porque $\big(\hat{\boldsymbol{y}}^{(j)}\big)^{\mathsf{T}}$ es la fila j de W y $WW^{-1} = \mathbb{1}$. Así se cumplen las condiciones de la proposición 5.4. Finalmente, introduciendo $\hat{\boldsymbol{y}}^{\mathsf{T}}(x)$, que no depende de s, dentro de la integral de (4.6),

$$y_p(x) = \int_{x_0}^{x} \underbrace{\hat{\boldsymbol{y}}^{\mathsf{T}}(x)\, W^{-1}(s)\, \boldsymbol{e}_n \frac{1}{a_n(s)}}_{G(x,s)}\, b(s)\, \mathrm{d}s, \tag{5.8}$$

y el límite superior x expresa la causalidad: sólo contribuyen las fuentes con $s < x$. ∎

La variación de las constantes *es* el método de Green: son el mismo cálculo visto desde dos lados.

Corolario 5.6 (Orden 2)

Para $n = 2$,

$$G(x, \tilde{x}) = \Theta(x - \tilde{x})\, \frac{\hat{y}_1(\tilde{x})\, \hat{y}_2(x) - \hat{y}_1(x)\, \hat{y}_2(\tilde{x})}{a_2(\tilde{x})\, w(\tilde{x})}. \tag{5.9}$$

Ejemplo 5.7 (Oscilador). Para $y'' + \omega^2 y = \delta(x - \tilde{x})$, con $\hat{y}_1 = \cos \omega x$, $\hat{y}_2 = \operatorname{sen} \omega x$, $w = \omega$ y $a_2 = 1$,

$$G(x, \tilde{x}) = \Theta(x - \tilde{x})\, \frac{\operatorname{sen} \omega(x - \tilde{x})}{\omega}, \tag{5.10}$$

que sustituida en (5.3) da exactamente (4.8). G es la respuesta de un oscilador en reposo a un golpe unitario en el instante $\tilde{x}$: a partir de ahí oscila como $\operatorname{sen} \omega(x - \tilde{x})$.

Ejemplo 5.8 (Oscilador amortiguado). Para $y'' + 2\gamma y' + \omega^2 y = \delta(x - \tilde{x})$ con $0 < \gamma < \omega$ ($\gamma = \nu\omega/2$ en la notación del ejemplo 2.11), la base $\hat{y}_{1,2} = \mathrm{e}^{-\gamma x}\{\cos \Omega x, \operatorname{sen} \Omega x\}$, $\Omega = \sqrt{\omega^2 - \gamma^2}$, tiene $w = \Omega\, \mathrm{e}^{-2\gamma x}$, y (5.9) da

$$G(x, \tilde{x}) = \Theta(x - \tilde{x})\, \mathrm{e}^{-\gamma(x - \tilde{x})}\, \frac{\operatorname{sen} \Omega(x - \tilde{x})}{\Omega}. \tag{5.11}$$

Observación 5.9 *(Invariancia por traslación).* Con coeficientes constantes, G depende sólo de $x - \tilde{x}$: $G(x, \tilde{x}) = g(x - \tilde{x})$. Entonces (5.3) es una *convolución*, $y_p = g * b$.

5.5 Puente con el Electromagnetismo

El mismo esquema funciona en tres dimensiones. En electrostática el operador es el laplaciano y la fuente, la densidad de carga: la ecuación de Poisson es $\nabla^2 \phi = -\rho/\varepsilon_0$. La función de Green del laplaciano en todo el espacio, con $G \to 0$ en el infinito, es

$$\nabla_{\boldsymbol{r}}^2\, G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') = -\delta^3(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'), \qquad G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') = \frac{1}{4\pi |\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}, \tag{5.12}$$

y (5.3), en tres dimensiones, da

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{\varepsilon_0}\int G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\,\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r'. \tag{5.13}$$

Físicamente, G es el potencial de una carga puntual unidad en $\boldsymbol{r}'$, y (5.13) es la ley de Coulomb: el potencial de una distribución es la superposición de los potenciales de las cargas puntuales $\mathrm{d}q = \rho\,\mathrm{d}^3r'$ [9, §2.3]. (El signo de (5.12) es una convención habitual en electrostática.)

6 Resumen operativo

Resolución de $\mathcal{L}[y] = b$ con coeficientes constantes

1. Escribir la ecuación característica $p(\lambda) = 0$ y hallar sus raíces con su multiplicidad.
2. Cada raíz λ_k de multiplicidad m_k aporta $\mathrm{e}^{\lambda_k x}, x\mathrm{e}^{\lambda_k x}, \ldots, x^{m_k-1}\mathrm{e}^{\lambda_k x}$; los pares complejos se sustituyen por sus versiones reales (tabla 6.1).
3. Para la particular: variación de las constantes (resolver $W\boldsymbol{k}' = \boldsymbol{b}$) o función de Green (resolver $\mathcal{L}_x G = \delta$ con las condiciones adecuadas e integrar contra b); ambas son la misma fórmula (5.8).
4. Solución general $y = y_h + y_p$; ajustar las n constantes con los datos.

Tabla 6.1. Contribución de cada raíz del polinomio característico a la base real de $\ker\mathcal{L}$.

Raíz	Soluciones	Número
$\lambda \in \mathbb{R}$ simple	$\mathrm{e}^{\lambda x}$	1
$\lambda \in \mathbb{R}$ de multiplicidad m	$x^j\mathrm{e}^{\lambda x},\ 0 \le j < m$	m
$\alpha \pm \mathrm{i}\beta$ simples	$\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x,\ \mathrm{e}^{\alpha x}\operatorname{sen}\beta x$	2
$\alpha \pm \mathrm{i}\beta$ de multiplicidad m	$x^j\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x,\ x^j\mathrm{e}^{\alpha x}\operatorname{sen}\beta x,\ 0 \le j < m$	$2m$

Observación 6.1 *(Errores típicos).*

(i) Olvidar el factor x^j en las raíces múltiples, lo que deja menos de n soluciones.

(ii) No dividir por a_n en la última componente de $\boldsymbol{b}$.

(iii) Dar $\mathrm{e}^{(\alpha\pm\mathrm{i}\beta)x}$ como solución final cuando se pide una solución real.

(iv) Pensar que la variación de las constantes sólo vale con coeficientes constantes: vale siempre que se conozca un sistema fundamental de la homogénea.

7 Referencias

[1] E. A. Coddington. *An Introduction to Ordinary Differential Equations*. New York: Dover, 1989.

[2] Área de Física Teórica. *Ecuaciones diferenciales. 2.º curso del Grado en Física. Teoría y ejercicios resueltos*. Curso 2022-23. Profesorado: P. García Estévez, J. Beltrán Jiménez y M. Pérez Garrote. Cap. IV: «Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden superior», pp. 133–162. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2023.

[3] L. Elsgoltz. *Ecuaciones diferenciales y cálculo variacional*. 4.ª ed. Madrid: Rubiños-1860.

[4] W. E. Boyce, R. C. DiPrima y D. B. Meade. *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*. 11.ª ed. Wiley, 2017.

[5] K. F. Riley, M. P. Hobson y S. J. Bence. *Mathematical Methods for Physics and Engineering*. 3.ª ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

[6] M. Kline. *Mathematical Thought from Ancient to Modern Times*. New York: Oxford University Press, 1972.

[7] I. Stakgold y M. Holst. *Green's Functions and Boundary Value Problems*. 3.ª ed. Hoboken: Wiley, 2011.

[8] G. B. Arfken, H. J. Weber y F. E. Harris. *Mathematical Methods for Physicists*. 7.ª ed. Academic Press, 2013.

[9] D. J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. 4.ª ed. Cambridge University Press, 2017.