



בּוֹנוֹס 2

איך להעלות פריטין ועדיין לאכול מתוק

הקשר בין סוכר לספיגת ברזל,
7 מתוקים לכל יום
ו-2 כללים חשובים.

בּוֹנוֹס למדריך
המלא לפריטין

דנית בן סימון

בת 42, נושקת ל-30

הקשר בין סוכר לספיגת ברזל

תפריט שדורש לאכול בריא כל הזמן לא מחזיק. לכן כדאי שיהיה מתוק בכל יום, ורק לדעת איזה מתוק ומתי.

מה סוכר עושה לברזל

הרבה סוכר מוסף בבת אחת, על קיבה ריקה, מעלה מהר את הסוכר בדם. הגוף מגיב באינסולין, ואחריו מגיעה דלקת קצרה.

הדלקת מעלה את הפסידין. זה הורמון שהכבד מייצר, והוא מונע מהברזל לעבור מהמעי אל הדם.

מה שקובע הוא הקצב. אותה כמות סוכר, עם סיבים, חלבון או שומן, נכנסת לדם לאט, והגוף כמעט לא מגיב בדלקת. מזה יוצאים 2 כללים.

כלל 1. מתוק אחרי הארוחה

חתיכת שוקולד אחרי צהריים מלאים נכנסת לדם לאט יותר מאותה חתיכה ב-4 אחר הצהריים על בטן ריקה, כי האוכל בקיבה מאט את הסוכר. אם בא לך מתוק, אכלי אותו בסוף ארוחה.

כלל 2. מתוק עם עוד משהו

תמר לבד מעלה את הסוכר מהר, ותמר עם טחינה כמעט לא. פרי עם אגוזים עולה לאט יותר מפרי לבד. השומן והחלבון מאטים את הסוכר.

7 מתוקים לכל יום

מה זה ארוחת הברזל

הארוחה הכי עשירה בברזל ביום, למשל עדשים, בשר, סרדינים או טחינה עם לימון. חלק מהמאכלים מפריעים לספיגה רק כשהם באותה ארוחה איתה.

1 תמרים עם טחינה

2 עד 3 תמרים עם כף טחינה גולמית. התמר נותן ברזל וסיבים, והטחינה מוסיפה ברזל ושומן שמאט את הסוכר. זה המתוק היחיד כאן שמוסיף ברזל למאגר.

2 שוקולד מריר 70% ומעלה

2 ריבועים. יש בו ברזל, ויש בו גם חומרים שנקשרים לברזל, כמו בתה ובקפה. אוכלים אותו שעתיים אחרי ארוחת הברזל.

3 גלידת פירות ביתית

אוכמניות או מנגו קפואים עם יוגורט או לבן בבלנדר. בלי סוכר מוסף, עם חלבון וסיבים. בגלל היוגורט, אוכלים אותה שעתיים לפני או אחרי ארוחת הברזל.

4 חלבה

25 עד 30 גרם. יש בה טחינה, שמביאה ברזל ושומן. קונים חלבה שיש בה טחינה, סוכר וסבונריה, בלי שמן דקלים וצבעי מאכל.

ועוד 3

5 עוגיית שיבולת שועל ביתית

שיבולת שועל, בננה מעוכה, טחינה או חמאת אגוזים, וקצת סילאן. הסיבים והשומן מאטים את הסוכר, והיא נשמרת 3 ימים בקופסה. טובה לרגע שבו בא משהו אפוי.

6 פרי שלם עם חופן אגוזים

תפוח עם 5 אגוזי מלך, ענבים עם שקדים, אגס עם פיסטוקים. אגוזי המלך מוסיפים אומגה 3 שעוזרת להוריד דלקת.

7 יוגורט עם סילאן וקינמון

כף סילאן ביוגורט וקינמון מעל. החלבון ביוגורט מאט את הסוכר, והסילאן מוסיף מעט ברזל. גם הוא מוצר חלב, אז שעתיים מארוחת הברזל.

ומה עם עוגה, גלידה מהקיוסק ובורקס?

הם נשארים בחיים שלך. מה שחשוב הוא כמה פעמים ובאיזה רגע.

קינוח אחד לא הורס שבוע. מה שמזיק הוא הרגל של סוכר על קיבה ריקה, כמה פעמים ביום, כל יום. פעם או פעמיים בשבוע, אחרי ארוחה מלאה, הגוף מתמודד עם זה בקלות.

עוגה ביתית ומאפה תעשייתי

מאפים תעשייתיים ארוזים ומשקאות ממותקים כדאי להוריד. עוגה שנאפתה בבית או נקנתה במאפייה, אחרי ארוחה, שונה מבורקס קפוא ב-10 בבוקר על בטן ריקה. ההבדל הוא בשמנים, בתוספים ובשעה.

קפה עם משהו מתוק

הקפה חוסם ספיגת ברזל, והמתוק מוסיף דלקת. אם בא לך קפה ומשהו מתוק, קבעי אותם לפחות שעתיים אחרי ארוחת הברזל, ואז שניהם בסדר.

2 כללים חשובים

- המתוק מגיע אחרי ארוחה. ולא במקומה.
- המתוק רחוק מארוחת הברזל. לפחות שעתיים.

ועוד טיפ קטן: שמים את המתוק על צלחת, ולא אוכלים מהשקית.

מה מעלה את הפריטין

3 חודשים עם מתוק כל יום, בזמן הנכון, יעלו לך את הפריטין. שבועיים בלי מתוק בכלל ואחריהם שבוע של השלמה לא יעלו אותו.