



מתנה ממני

# המדריך לתזונה אנטי-דלקתית

מה זה דלקת, מה להוריד מהצלחת,  
ואיך מותסס אחד ביום  
עוזר לגוף לספוג ברזל.

חלק מהמדריך  
המלא לפריטין

דנית בן סימון

בת 42, נושקת ל-30



## 3 הסרטונים שלי על כרוב כבוש

הסדרה "חידקים טובים, בטן רגועה". לחצי על סרטון כדי לצפות.



### פרק 3

איך מכינים כרוב בלי  
עובש



### פרק 2

הלוואי שהייתי יודעת את  
זה לפני האנטיביוטיקה



### פרק 1

הדבר היחיד שעזר לבטן  
שלי אחרי ההליקובקטר

[לצנצנת ולקורס בהנחה ←](#)

## מה זה דלקת

דלקת היא התגובה של הגוף כשמשוהו פוגע בו. כשאת נחתכת או חולה, מערכת החיסון שולחת תאים לאזור, והוא מאדים, מתנפח וכואב. זו דלקת רגילה, והיא עוברת כשהגוף מחלים.

## דלקת כרונית שקטה

יש גם דלקת שלא עוברת. היא לא כואבת ולא רואים אותה, אבל הגוף נשאר בכוננות לאורך חודשים ושנים. מה שמחזיק אותה הוא הרבה סוכר ומזון מעובד, מעי לא מאוזן, מעט שינה ולחץ שלא נגמר.

## למה זה קשור לפריטין

כשיש דלקת בגוף, הכבד מייצר הורמון בשם הפסידין. ההורמון הזה מונע מהברזל לעבור מהמעי אל הדם. לכן אפשר לאכול נכון, לקחת תוסף, והבדיקות נשארות זהות.

## סימנים שכדאי לשים לב אליהם

- עייפות שלא עוברת גם אחרי לילה של שינה
- נפיחות בבטן אחרי ארוחות
- עור שמגיב, עם אדמומיות או פצעונים
- CRP גבוה בבדיקת הדם

### המדריך המלא לפריטין ←

שם תמצאי מה לבקש בבדיקה הבאה, ולאיזה מספר לכוון לפי ההנחיות החדשות מספטמבר 2026.

# מה כדאי להוריד מהצלחת

לחם, אורז, תפוחי אדמה, פסטה ועוגה של שבת נשארים. הרשימה של מה שכדאי להוריד קצרה יותר ממה שנדמה.

## אנטי־דלקתי ו"בריא" הם 2 דברים שונים

יוגורט דיאט עם ממתיקים וחטיף חלבון עם 15 רכיבים נחשבים בריאים, והם מעלים דלקת. טחינה ושמן זית שמנים ועשירים בקלוריות, והם לא מעלים דלקת. מה שקובע הוא סוג המזון, יותר מהכמות.

## להוריד

- **משקאות ממותקים ומיצי פירות.** הסוכר נכנס לדם הכי מהר, בלי סיבים שמאטים אותו ובלי שובע. את אלה כדאי להוריד לגמרי.
- **מאפים תעשייתיים ארוזים.** בורקס קפוא, עוגיות מהסופר וחטיפים, בגלל השמנים והתוספים שבהם. עוגה שאפית בבית או קנית במאפייה היא דבר אחר.
- **בשר מעובד.** נקניק, נקניקיות, סלמי ובשר מעושן. נתח בשר טרי בסדר.
- **שמנים מזוקקים.** סויה, תירס, חמניות ומרגרינה. הם מעלים את היחס בין אומגה 6 לאומגה 3, וזה מעלה דלקת. במקומם שמן זית וטחינה.
- **מזון אולטרה־מעובד.** רשימת רכיבים ארוכה עם שמות שאת לא מכירה.
- **אלכוהול.** מגרה את מערכת העיכול ומעמיס על הכבד, והכבד מנהל את הברזל בגוף.
- **ממתיקים מלאכותיים.** חלקם משנים את החיידקים במעי. עדיף פחות מתוק, עם סוכר אמיתי.

## מה נשאר, בשעה אחרת

### מה זה ארוחת הברזל

הארוחה הכי עשירה בברזל ביום, למשל עדשים, בשר, סרדינים או טחינה עם לימון. חלק מהמאכלים מפריעים לספיגה רק כשהם באותה ארוחה איתה.

- **קפה ותה.** שעה לפני ארוחת הברזל או שעתיים אחריה.
- **חלב, גבינות ויוגורט.** שעתיים לפני או אחרי ארוחת הברזל. בגבינה צהובה קשה יש בערך 700 מ"ג סידן ל-100 גרם, ובקוטג' בערך 80, אז קוטג' ויוגורט מפריעים הרבה פחות. מעט חלב בקפה לא משנה. כוס חלב או 50 גרם גבינה צהובה כבר משנים.
- **ביצים.** בארוחה נפרדת מהטחינה והעדשים. ביצים וחלב יחד באותה ארוחה בסדר גמור.
- **שוקולד מריר, יין אדום, תה ורימונים.** יש בהם את החומרים שנותנים לתה ולקפה טעם מר, והם נקשרים לברזל. אוכלים ושותים אותם בין הארוחות.
- **קטניות ודגנים.** נשירים. משרים, מנביטים או מתסיסים אותם.

### ולחם? ופחמימות?

נשירים, ובכמות אמיתית. מחמצת, פיתה, אורז, תפוחי אדמה, פסטה וקוסקוס נותנים לך כוח לעבור את היום. נשים שמורידות פחמימות מוותרות בדרך כלל אחרי שבועיים. אם את אוהבת לחם, אכלי לחם.

תזונה אנטי־דלקתית

## ומה עם...

### גלידת פירות ביתית?

אוכמניות קפואות עם יוגורט בבלנדר זה מצוין. מה שכדאי להוריד הוא סוכר מוסף, ופרי שלם נשאר, כי יש בו סיבים. בגלל היוגורט, אוכלים אותה שעתיים לפני או אחרי ארוחת הברזל. אם קונים מוכנה, בודקים שאין בה סירופ גלוקוז.

### תמרים?

נשאים. תמר הוא פרי שלם עם סיבים, ויש בו גם קצת ברזל. הסוכר בו מרוכז, אז 2 עד 3 ביום ולא חופן. הכי טוב עם טחינה, כי היא מוסיפה ברזל, והשומן והחלבון שבה מאטים את כניסת הסוכר לדם. בסילאן הסוכר מרוכז יותר, אז כף אחת ביום מספיקה.

### אגוזי מלך?

מצוינים, בעיקר בגלל אומגה 3 שמורידה דלקת. חופן ביום, רצוי כארוחת ביניים ולא בארוחת הברזל, כי יש בהם חומצה פיטית שקושרת ברזל. השריה בלילה מורידה אותה.

# מאכלים בריאים שכדאי לתזמן

רוב המאכלים כאן מצוינים. בזמן שאת מעלה פריטין, כדאי לדעת מתי לאכול אותם, ועל מה לוותר ל-3 חודשים.

## חוסמים ברזל

- **תה ירוק, מאצ'ה ותה שחור.** מהחוסמים הכי חזקים. תה ירוק בארוחה יכול לבטל חלק גדול מהברזל שבצלחת. שותים אותו בין הארוחות.
- **תרד ומנגולד.** הברזל בהם קשור לאוקסלטים, והגוף כמעט לא סופג אותו. אוכלים אותם בשביל הפולאט.
- **סובין, שיבולת שועל וקטניות לא מושרים.** החומצה הפיטית בהם קושרת ברזל. השריה בלילה, הנבטה ותסיסה מורידות אותה.
- **חלב שקדים או סויה מועשרים בסידן.** הסידן שהוסיפו מתחרה בברזל. קונים גרסה לא מועשרת.

## מגרים קיבה רגישה

אם יש לך צרבות, כאבי בטן, נפיחות או הליקובקטר, קיבה מגורה סופגת פחות ומייצרת פחות חומצה. הגוף צריך את החומצה הזו כדי לפרק את הברזל מהאוכל.

- **חומץ תפוחים על בטן ריקה.** בקיבה רגישה הוא בעיקר מגרה. לימון בתוך הארוחה עוזר לספיגה בלי לצרוב.
- **קפה על בטן ריקה.** חוסם ברזל ומגרה את הקיבה. עדיף אחרי אוכל.
- **קומבוצ'ה.** חומצית ויש בה סוכר. כרוב כבוש וקפיר עדיפים.

## נחשבים בריאים ומעלים דלקת

- **גרנולה וחטיפי אנרגיה.** יש בהם כמעט אותו סוכר כמו בעוגייה.
- **יוגורט דיאט וקינוחי לייט.** הממתקים המלאכותיים משנים את החיידקים במעי אצל חלק מהאנשים. יוגורט רגיל עם פרי עדיף.
- **מיצים סחוטים ושייקים ירוקים.** הסחיטה מוציאה את הסיבים, ונשאר סוכר מהיר. אוכלים פרי שלם.
- **שמני קנולה, סויה וחמניות.** משווקים כבריאים, ומעלים את היחס בין אומגה 6 לאומגה 3. במקומם שמן זית וטחינה.
- **חטיפי חלבון עם 15 רכיבים.** החלבון בסדר. שאר הרכיבים פחות.
- **הדרים ועגבניות בכמות גדולה על קיבה ריקה.** בתוך ארוחה הם עוזרים לספיגה. לבד בבוקר, על בטן רגישה, פחות.

## הברזל נספג במעיים

הברזל נספג בחלק העליון של המעי הדק. חומצת הקיבה מפרקת אותו מהאוכל. כשיש מעט חומצה, או כשרירית המעי פגועה, הברזל עובר בלי להיספג.

### מה פוגע בספיגה

- **הליקובקטר פילורי.** חיידק קיבה נפוץ שמוריד את החומצה ופוגע ישירות בספיגת הברזל. בודקים אותו בבדיקת נשיפה או בבדיקת אנטיגן בצואה. בדיקת דם רגילה לא מספיקה.
- **תרופות להורדת חומצה.** אומפרזול ודומיו מורידים את ספיגת הברזל, בעיקר בשימוש ממושך.
- **אנטיביוטיקה.** מחסלת גם את החיידקים הטובים. שיקום החיידקים במעי חשוב לספיגה.

### מה עוזר

- **מותססים חיים.** כרוב כבוש לא מפוסטר, קימצ'י, קפיר, מיסו וטמפה. מתחילים מכף ביום ומעלים לאט.
- **הרבה סוגי סיבים.** חיידקים שונים ניזונים ממזונות שונים, אז מגוון חשוב יותר מכמות.
- **לשתות בין הארוחות.** שתייה ליד האוכל מדללת את חומצת הקיבה בדיוק כשהיא הכי נחוצה.

### גם תוסף ברזל יכול להפריע

תוסף ברזל מעלה לכ-24 שעות את ההורמון שמונע ספיגה. במחקרים, תוסף כל יומיים נספג טוב יותר מתוסף כל יום. תוספים רק באישור רופא.

## מותסס אחד ביום

מותסס אחד ביום הוא ההרגל שעשה אצלי את ההבדל הכי גדול. זה אוכל חי, עם מגוון זנים של חיידקים שאף קפסולה פרוביוטית לא נותנת. החיידקים במעי עוזרים להוריד דלקת, והדלקת היא מה שחוסם את ספיגת הברזל.

### מאיפה להתחיל

- **כרוב כבוש לא מפוסטר.** הכי זול והכי קל. פסטור הורג את החיידקים, אז קונים אותו מהמקרר, או מכינים בבית.
- **קפיר.** יש בו יותר זנים מביוגורט רגיל, ובדרך כלל קל יותר לעיכול.
- **מלפפון חמוץ במלח ולבן.** נמצאים בכל סופר. מלפפון בחומץ הוא כבוש, ואין בו חיידקים חיים.
- **טמפה ומיסו.** מצוינים, ופחות זמינים.

מתחילים מכף ביום ומעלים לאט. נפיחות קלה בימים הראשונים סבירה. אם היא חזקה, מאטים. קפיר ולבן הם מוצרי חלב, אז אוכלים אותם שעתיים לפני או אחרי ארוחת הברזל.

### למה להכין בבית

מותססים מהמדף יקרים, ורובם מפוסטרים, כלומר בלי חיידקים חיים. בבית זה עולה שקלים בודדים, ואת יודעת בדיוק מה נכנס לצנצנת.

# איך מכינים כרוב כבוש בבית



## כלי התססה עם שסתום

מה שהעלה לי את אחוזי ההצלחה היה כלי התססה עם שסתום. השסתום מוציא את הגז החוצה ולא מכניס חמצן, ומתקן מחזיק את הירקות מתחת לנוזל. בלי חמצן, חיידקי החומצה הלקטית גדלים בלי הפרעה, ועובש ושמרים לא מתפתחים. ככה הצנצנת מצליחה בכל פעם. בצנצנת רגילה זה נגמר אצלי בעובש 4 פעמים.

### [לצנצנת ולקורס בהנחה ←](#)

### [הדבר היחיד שעזר לבטן שלי אחרי ההליקובקטר ←](#)

הסרטון שבו אני מכינה כרוב כבוש, שלב אחרי שלב.

### [כמה כרוב לפי גודל הצנצנת ←](#)

כמה כרוב ומלח צריך לכל גודל של צנצנת.

## הקשר בין דלקת לפריטין

כשיש דלקת בגוף, הכבד מייצר יותר הורמון שנקרא הפסידין. ההורמון הזה מונע מהברזל לעבור מהמעיי אל הדם. הגוף משאיר את הברזל שאכלת במעי, ומוציא אותו כמה ימים אחר כך.

לכן אפשר לאכול הרבה ברזל ולראות שהפריטין לא זז. קודם מורידים את הדלקת, ואז הגוף יכול לספוג.

וגם כשהדלקת יורדת, המאגר לא מתמלא לבד. מהאוכל נספגים רק 10 עד 15 אחוז מהברזל, אז צריך לדעת מה לאכול, כמה ומתי.

### נכה זה היה אצלי

הפריטין שלי היה 37, בתוך הטווח, והייתי מותשת כבר בבוקר. בבדיקת צואה התגלה הליקובקטר, והמעיי שלי לא ספג ברזל כמו שצריך. אכלתי לפי תפריט שמוריד דלקת ומעלה ברזל באותה צלחת, עם מותסס כל יום. **תוך 3 חודשים הפריטין שלי עלה כמעט ל-70**, בלי תוספי ברזל.

### מה יש במדריך המלא

- **תפריט שבועי**, 7 ימים ו-5 ארוחות ביום, עם כמויות וערכים תזונתיים.
- **ארוחת ברזל מסומנת בכל יום**, כדי לדעת איזו ארוחה הכי חשובה.
- **מה עוזר לברזל להיספג ומה מונע ממנו**, לפני כל ארוחה.
- **מה לבקש בבדיקה הבאה**, ולאיזה מספר לכוון.

### המדריך המלא לפריטין ←

עם התפריט שעזר לי לעלות מ-37 כמעט ל-70.

המדריך המלא לפריטין



# המדריך המלא לפריטין

תפריט שבועי לברזל ולהורדת דלקת, ואיתו עוד 3 מדריכי בונוס.

איך להעלות פריטין ועדיין לאכול מתוק

משבשי הורמונים, הגורמים הנסתרים להזדקנות מואצת

הכל מתחיל בסופר, רשימת קניות לחיזוק הברזל והספיגה

הבונוסים כלולים רק ברכישה עד 20.10

[למדריך המלא ←](#)