



בּוֹנוֹס 2

איך להעלות פריטין ועדיין לאכול מתוק

הקשר בין סוכר לספיגת ברזל,
7 המתוקים שבתפריט
ו-2 כללים חשובים.

בּוֹנוֹס למדריך
המלא לפריטין

דנית בן סימון

בת 42, נושקת ל-30

הקשר בין סוכר לספיגת ברזל

תפריט שמחייב אותך לאכול בריא מאה אחוז מהזמן נשבר בשבוע השני. לכן יש מתוק בכל יום בתפריט הזה – אבל יש הבדל עצום בין מתוק שמשתלב לבין מתוק שמוחק לך את ההתקדמות.

מה סוכר עושה לברזל שלך

הקשר לא מובן מאליו, אז שווה לעצור עליו. סוכר מוסף בכמות גדולה, בבת אחת ועל קיבה ריקה, מעלה במהירות את הסוכר בדם. הגוף מגיב בנחשול אינסולין, ובעקבותיו נוצר **עומס דלקתי קצר**. הדלקת הזו היא בדיוק מה שמעלה הפקדין – ההורמון שסוגר את דלת הכניסה של הברזל אל הדם, ושהסברתי עליו בפרק 4.

שווה לשים לב למה בדיוק גורם לזה: לא **המתיקות** אלא הקצב. אותה כמות סוכר, כשהיא מגיעה עם סיבים, חלבון או שומן, נכנסת לדם לאט והתגובה הדלקתית כמעט לא מתרחשת. זו כל התורה בשורה אחת, וממנה נגזרים שני הכללים הבאים.

כלל 1: המתוק בא אחרי הארוחה, לא לפני

אותה חתיכת שוקולד אחרי צהריים מלאים היא אירוע אחר לגמרי מאותה חתיכה בארבע אחר הצהריים על בטן ריקה. האוכל שכבר נמצא בקיבה מאט את כניסת הסוכר לדם. אז אם בא לך מתוק, תצמידי אותו לסוף ארוחה.

כלל 2: המתוק אף פעם לא לבד בצלחת

תמר לבד קופץ. תמר עם טחינה כמעט לא. פרי לבד קופץ פחות, פרי עם אגוזים עוד פחות. השומן והחלבון שמלווים את המתוק הם מה שמשטח את העקומה, ולכן כל מתוק בתפריט מגיע בזוג.

7 המתוקים שבתפריט

אלה המתוקים שאני חוזרת אליהם, לפי הסדר שבו הם משרתים אותך.

1. תמרים עם טחינה · פריטין

שניים־שלושה תמרים עם כף טחינה גולמית. התמר נותן ברזל וסיבים, הטחינה מוסיפה ברזל ושומן שמרכך את קפיצת הסוכר. זה המתוק היחיד כאן שבפועל תורם למאגר.

2. שוקולד מריר 70% ומעלה · תזמון

שני ריבועים. יש בו ברזל, אבל גם פוליפנולים שנקשרים לברזל וחוסמים אותו — בדיוק כמו בתה ובקפה. לכן הוא נהדר, רק לא באותה שעה עם ארוחת הברזל. שעתיים הפרש ואין בעיה.

3. גלידת פירות ביתית

אוכמניות או מנגו קפואים עם יוגורט או לבן בבלנדר. מתוקה, קרה, בלי סוכר מוסף, ומגיעה עם חלבון וסיבים מובנים. יש בה מוצר חלב, אז זו גם ארוחת הסידן של היום — שעתיים מארוחת הברזל.

4. חלבה

25–30 גרם. בסיס הטחינה מביא איתו ברזל ושומן, ולכן היא יושבת הרבה יותר טוב מסוכריות. חשוב לקרוא רכיבים: חלבה טובה היא טחינה, סוכר וסבונריה, בלי שמן דקלים וצבעי מאכל.

ו-3 האחרונים

5. עוגיית שיבולת שועל ביתית

שיבולת שועל, בננה מעוכה, טחינה או חמאת אגוזים, וקצת סילאן. הסיבים והשומן עושים את העבודה, והיא נשמרת שלושה ימים בקופסה. זו התשובה שלי לרגע שבו חייבים לנגוס במשהו אפוי.

6. פרי שלם עם חופן אגוזים • אנטי־דלקתי

תפוח וחמישה אגוזי מלך, ענבים ושקדים, אגס ופיסטוקים. הכי פשוט, הכי זמין, ואגוזי המלך מוסיפים אומגה 3 שעובדת על הצד הדלקתי.

7. יוגורט עם סילאן וקינמון • תזמון

כף סילאן ביוגורט, עם קינמון מעל. החלבון ביוגורט מאט את הסוכר, והסילאן מוסיף מעט ברזל. שוב — מוצר חלב, אז במרחק מארוחת הברזל.

ומה עם עוגה אמיתית, גלידה מהקיוסק ובורקס?

התשובה הכנה היא שהם נשארים בחיים שלך, והשאלה היחידה היא באיזו תדירות ובאיזה רגע.

הטעות הנפוצה היא לחשוב שקינוח אחד הורס שבוע. הוא לא. מה שהורס הוא הדפוס: קפיצת סוכר על קיבה ריקה, כמה פעמים ביום, כל יום. פעם או פעמיים בשבוע, אחרי ארוחה מלאה, זה רעש שהגוף יודע לבלוע.

והחלק שהכי קל לפספס

קפה עם המתוק זו טעות כפולה. הקפה חוסם ספיגת ברזל בפני עצמו, והמתוק מוסיף את העומס הדלקתי. אם בא לך קפה ומשהו מתוק, קבעי את זה לפחות שעתיים אחרי ארוחת הברזל של היום — ואז שניהם בסדר גמור.

2 כללים חשובים

מה שכן שווה להקפיד עליו

שהמתוק יגיע **אחרי** ארוחה ולא במקומה, שלא יהיה צמוד לארוחת הברזל של אותו יום, ושלא יגרור אחריו עוד אחד. הכלל שעובד עליו: המתוק יושב על הצלחת, לא בשקית שנשארת פתוחה על השיש.

ואיך זה מסתדר עם הפרק הקודם

בפרק 8 ביקשתי להוריד מאפים תעשייתיים ארוזים ומשקאות ממותקים, ולא עוגות בכלל. עוגה שנאפתה בבית או נקנתה במאפייה, אחרי ארוחה, היא לא אותו דבר כמו בורקס קפוא בעשר בבוקר על בטן ריקה. ההבדל הוא לא בקמח — הוא בשמנים, בתוספים, ובשעה שבה זה נכנס.

אכילה בריאה שאי אפשר לקיים אינה אכילה בריאה

שלושה חודשים עם מתוק יומי מתוזמן נכון יעלו לך את הפריטין. שבועיים של איפוק מוחלט, ואז שבוע של פיצוי, לא יעלו כלום.