

KKT Matrix

Convex Optimization

Major sources:
Govind Chari
Skye Mceowen

Spring 2023 - Dan Calderone

Quadratic Optimization & KKT System

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \end{aligned}$$

Primal Variables:

 $x \in \mathbb{R}^n$

Dual Variables:

 $v \in \mathbb{R}^m$

$Q \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad Q = Q^\top \succ 0 \quad c \in \mathbb{R}^n$

$A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad b \in \mathbb{R}^m$

fat ($m < n$),
full row rank ($\text{rank} = m$)

Lagrangian:

$$\mathcal{L}(x, v) = \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x + v^\top (Ax - b)$$

KKT Conditions:

1. Stationarity:
- $$x^\top Q + c^\top + v^\top A = 0$$
2. Feasibility:
- $$Ax - b = 0$$

KKT System:

$$\begin{bmatrix} Q & A^\top \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c \\ b \end{bmatrix}$$

KKT Matrix

Solution:

$$\begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q & A^\top \\ A & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -c \\ b \end{bmatrix}$$

KKT Solutions

\min_x	$\frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x$	Primal Variables:	$x \in \mathbb{R}^n$	$Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$	$Q = Q^\top \succ 0$	$c \in \mathbb{R}^n$
s.t.	$Ax = b$	Dual Variables:	$v \in \mathbb{R}^m$	$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$		$b \in \mathbb{R}^m$

fat ($m < n$),
full row rank ($\text{rank} = m$)

Lagrangian: $\mathcal{L}(x, v) = \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x + v^\top (Ax - b)$

KKT Conditions:

- Stationarity: $x^\top Q + c^\top + v^\top A = 0$
- Feasibility: $Ax - b = 0$

KKT System:

$$\begin{bmatrix} Q & A^\top \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c \\ b \end{bmatrix}$$

KKT Matrix

Solution:

$$\begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q^{-1} - Q^{-1}A^\top(AQ^{-1}A^\top)^{-1}AQ^{-1} & Q^{-1}A^\top(AQ^{-1}A^\top)^{-1} \\ (AQ^{-1}A^\top)^{-1}AQ^{-1} & -(AQ^{-1}A^\top)^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -c \\ b \end{bmatrix}$$

...using **block matrix inversion** (or just directly verify).

KKT Solutions

$$\begin{array}{ll} \min_x & \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x \\ \text{s.t.} & Ax = b \end{array}$$

Primal Variables: $x \in \mathbb{R}^n$

Dual Variables: $v \in \mathbb{R}^m$

$$Q \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad Q = Q^\top \succ 0 \quad c \in \mathbb{R}^n$$

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad b \in \mathbb{R}^m$$

fat ($m < n$),
full row rank ($\text{rank} = m$)

Lagrangian: $\mathcal{L}(x, v) = \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x + v^\top (Ax - b)$

KKT Conditions:

1. Stationarity: $x^\top Q + c^\top + v^\top A = 0$

2. Feasibility: $Ax - b = 0$

KKT System:

$$\begin{bmatrix} Q & A^\top \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c \\ b \end{bmatrix}$$

KKT Matrix

Solution:

$$\begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q^{-1} \left[I - A^\top (AQ^{-1}A^\top)^{-1} AQ^{-1} \right] & Q^{-1} A^\top (AQ^{-1}A^\top)^{-1} \\ (AQ^{-1}A^\top)^{-1} AQ^{-1} & -(AQ^{-1}A^\top)^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -c \\ b \end{bmatrix}$$

...using **block matrix inversion** (or just directly verify).

KKT Solutions

$$\min_x \quad \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x$$
$$\text{s.t.} \quad Ax = b$$

Primal Variables:

$$x \in \mathbb{R}^n$$

Dual Variables:

$$v \in \mathbb{R}^m$$

$Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ $Q = Q^\top \succ 0$

$c \in \mathbb{R}^n$ $b \in \mathbb{R}^m$

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$
fat ($m < n$),
full row rank ($\text{rank} = m$)

Lagrangian:

$$\mathcal{L}(x, v) = \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x + v^\top (Ax - b)$$

KKT Conditions:

1. Stationarity:
- $$x^\top Q + c^\top + v^\top A = 0$$
2. Feasibility:
- $$Ax - b = 0$$

KKT System:

$$\begin{bmatrix} Q & A^\top \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c \\ b \end{bmatrix}$$

KKT Matrix

Solution:

$$x = Q^{-1}A^\top(AQ^{-1}A^\top)^{-1}(AQ^{-1}c + b) - Q^{-1}c$$
$$v = -(AQ^{-1}A^\top)^{-1}(AQ^{-1}c + b)$$

KKT Matrix Properties

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \end{aligned}$$

Primal Variables: $x \in \mathbb{R}^n$

Dual Variables: $v \in \mathbb{R}^m$

$Q \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad Q = Q^\top \succ 0 \quad c \in \mathbb{R}^n$

$A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad b \in \mathbb{R}^m$

Lagrangian:

$$\mathcal{L}(x, v) = \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x + v^\top (Ax - b)$$

fat ($m < n$),

full row rank ($\text{rank} = m$)

KKT Conditions:

1. Stationarity: $x^\top Q + c^\top + v^\top A = 0$
2. Feasibility: $Ax - b = 0$

KKT System:

$$\begin{bmatrix} Q & A^\top \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c \\ b \end{bmatrix}$$

KKT Matrix

Matrix Properties:

$$M = \begin{bmatrix} Q & A^\top \\ A & 0 \end{bmatrix}$$

M indefinite

$$\text{spec}(M) = \rho_+ \sqcup \rho_-$$

Positive:

$$\rho_+ = \{ \lambda_1, \dots, \lambda_n \} > 0$$

Negative:

$$\rho_- = \{ \lambda_{n+1}, \dots, \lambda_{n+m} \} < 0$$

Cardinality

$$|\rho_+| = n$$

$$|\rho_-| = m$$

Conditioned KKT Matrix

Coordinate Transforms

$$\begin{array}{ll}
 \min_x & \frac{1}{2}x'^{\top}P^{\top}QPx' + c^{\top}Px' \\
 \text{s.t.} & W^{\top}APx' = W^{\top}b
 \end{array}$$

Primal: $x = Px' \in \mathbb{R}^n$
 Dual: $v = Wv' \in \mathbb{R}^m$

$Q \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad Q = Q^{\top} \succ 0 \quad c \in \mathbb{R}^n$
 $A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad \text{fat } (m < n), \quad b \in \mathbb{R}^m$

Lagrangian: $\mathcal{L}(x', v') = \frac{1}{2}x'^{\top}P^{\top}QPx' + c^{\top}Px' + v'^{\top}W^{\top}(APx' - b)$

KKT Conditions:

$$\begin{array}{l}
 1. \text{ Stationarity: } x'^{\top}P^{\top}QP + c^{\top}P + v'^{\top}W^{\top}AP = 0 \\
 2. \text{ Feasibility: } W^{\top}APx' - W^{\top}b = 0
 \end{array}$$

KKT System:

$$\begin{bmatrix} P^{\top}QP & P^{\top}A^{\top}W \\ W^{\top}AP & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ v' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -P^{\top}c \\ W^{\top}b \end{bmatrix}$$

Conditioning:

$$M \Rightarrow \begin{bmatrix} P^{\top}QP & P^{\top}A^{\top}W \\ W^{\top}AP & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P^{\top} & 0 \\ 0 & W^{\top} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q & A^{\top} \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & W \end{bmatrix}$$

Conditioned KKT Matrix

Coordinate Transforms

$$\begin{array}{ll}
 \min_x & \frac{1}{2}x'^{\top}P^{\top}QPx' + c^{\top}Px' \\
 \text{s.t.} & W^{\top}APx' = W^{\top}b
 \end{array}$$

Primal: $x = Px' \in \mathbb{R}^n$
 Dual: $v = Wv' \in \mathbb{R}^m$

$Q \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad Q = Q^{\top} \succ 0 \quad c \in \mathbb{R}^n$
 $A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad \text{fat } (m < n), \quad b \in \mathbb{R}^m$

Lagrangian: $\mathcal{L}(x', v') = \frac{1}{2}x'^{\top}P^{\top}QPx' + c^{\top}Px' + v'^{\top}W^{\top}(APx' - b)$

KKT Conditions:

1. Stationarity: $x'^{\top}P^{\top}QP + c^{\top}P + v'^{\top}W^{\top}AP = 0$

2. Feasibility: $W^{\top}APx' - W^{\top}b = 0$

KKT System:

$$\begin{bmatrix} P^{\top}QP & P^{\top}A^{\top}W \\ W^{\top}AP & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ v' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -P^{\top}c \\ W^{\top}b \end{bmatrix}$$

Conditioning: $AQ^{-\frac{1}{2}} = U[\Sigma \ 0]V^{\top}$ (SVD) \Rightarrow $P = Q^{-\frac{1}{2}}V \quad W = U$

$$M \Rightarrow \begin{bmatrix} P^{\top}QP & P^{\top}A^{\top}W \\ W^{\top}AP & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P^{\top} & 0 \\ 0 & W^{\top} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q & A^{\top} \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & W \end{bmatrix}$$

Conditioned KKT Matrix

Coordinate Transforms

$$\begin{array}{ll}
 \min_x & \frac{1}{2}x'^{\top}P^{\top}QPx' + c^{\top}Px' \\
 \text{s.t.} & W^{\top}APx' = W^{\top}b
 \end{array}$$

Primal: $x = Px' \in \mathbb{R}^n$
 Dual: $v = Wv' \in \mathbb{R}^m$

$Q \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad Q = Q^{\top} \succ 0 \quad c \in \mathbb{R}^n$
 $A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad \text{fat } (m < n), \quad b \in \mathbb{R}^m$

Lagrangian: $\mathcal{L}(x', v') = \frac{1}{2}x'^{\top}P^{\top}QPx' + c^{\top}Px' + v'^{\top}W^{\top}(APx' - b)$

KKT Conditions:

1. Stationarity: $x'^{\top}P^{\top}QP + c^{\top}P + v'^{\top}W^{\top}AP = 0$

2. Feasibility: $W^{\top}APx' - W^{\top}b = 0$

KKT System:

$$\begin{bmatrix} P^{\top}QP & P^{\top}A^{\top}W \\ W^{\top}AP & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ v' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -P^{\top}c \\ W^{\top}b \end{bmatrix}$$

Conditioning: $AQ^{-\frac{1}{2}} = U[\Sigma \ 0]V^{\top}$ (SVD) \Rightarrow $P = Q^{-\frac{1}{2}}V \quad W = U$

$$M \Rightarrow \begin{bmatrix} P^{\top}QP & P^{\top}A^{\top}W \\ W^{\top}AP & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 & \Sigma \\ 0 & I & 0 \\ \Sigma & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Permute...}} \begin{bmatrix} I & \Sigma & 0 \\ \Sigma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}$$

Conditioned KKT Matrix

Coordinate Transforms

$$\begin{array}{ll} \min_x & \frac{1}{2}x'^{\top}P^{\top}QPx' + c^{\top}Px' \\ \text{s.t.} & W^{\top}APx' = W^{\top}b \end{array}$$

Primal: $x = Px' \in \mathbb{R}^n$
 Dual: $v = Wv' \in \mathbb{R}^m$

$$Q \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad Q = Q^{\top} \succ 0 \quad c \in \mathbb{R}^n$$

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad \text{fat } (m < n), \quad b \in \mathbb{R}^m$$

Lagrangian: $\mathcal{L}(x', v') = \frac{1}{2}x'^{\top}P^{\top}QPx' + c^{\top}Px' + v'^{\top}W^{\top}(APx' - b)$

KKT Conditions:

1. Stationarity: $x'^{\top}P^{\top}QP + c^{\top}P + v'^{\top}W^{\top}AP = 0$

2. Feasibility: $W^{\top}APx' - W^{\top}b = 0$

KKT System:

$$\begin{bmatrix} P^{\top}QP & P^{\top}A^{\top}W \\ W^{\top}AP & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ v' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -P^{\top}c \\ W^{\top}b \end{bmatrix}$$

Conditioning: $AQ^{-\frac{1}{2}} = U[\Sigma \ 0]V^{\top}$ (SVD) \Rightarrow $P = Q^{-\frac{1}{2}}V \quad W = U$

$$M \Rightarrow \begin{bmatrix} P^{\top}QP & P^{\top}A^{\top}W \\ W^{\top}AP & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} I & \Sigma & 0 \\ \Sigma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}$$

Subblocks:

$$\begin{bmatrix} 1 & \sigma_j \\ \sigma_j & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} s(s-1) - \sigma_j^2 = 0 \\ \lambda_{j,j+1} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + \sigma_j^2} \end{array}$$

Conditioned KKT Matrix

Coordinate Transforms

$$\begin{array}{ll} \min_x & \frac{1}{2}x'^{\top}P^{\top}QPx' + c^{\top}Px' \\ \text{s.t.} & W^{\top}APx' = W^{\top}b \end{array}$$

Primal: $x = Px' \in \mathbb{R}^n$
 Dual: $v = Wv' \in \mathbb{R}^m$

$$Q \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad Q = Q^{\top} \succ 0 \quad c \in \mathbb{R}^n$$

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad \text{fat } (m < n), \quad b \in \mathbb{R}^m$$

Lagrangian: $\mathcal{L}(x', v') = \frac{1}{2}x'^{\top}P^{\top}QPx' + c^{\top}Px' + v'^{\top}W^{\top}(APx' - b)$

KKT Conditions:

1. Stationarity: $x'^{\top}P^{\top}QP + c^{\top}P + v'^{\top}W^{\top}AP = 0$

2. Feasibility: $W^{\top}APx' - W^{\top}b = 0$

KKT System:

$$\begin{bmatrix} P^{\top}QP & P^{\top}A^{\top}W \\ W^{\top}AP & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ v' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -P^{\top}c \\ W^{\top}b \end{bmatrix}$$

Conditioning: $AQ^{-\frac{1}{2}} = U[\Sigma \ 0]V^{\top}$ (SVD) \Rightarrow $P = Q^{-\frac{1}{2}}V \quad W = U$

Subblocks:

$$M \Rightarrow \begin{bmatrix} P^{\top}QP & P^{\top}A^{\top}W \\ W^{\top}AP & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} I & \Sigma & 0 \\ \Sigma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & \sigma_j \\ \sigma_j & 0 \end{bmatrix}$$

$s(s-1) - \sigma_j^2 = 0$
 $\times (n-m) \quad \times m \quad \times m$
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$

$\lambda_{j,j+1} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + \sigma_j^2}$

$$\text{spec} = \underbrace{\left\{ 1, \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \sigma_j^2}, \frac{1}{2} - \sqrt{\frac{1}{4} + \sigma_j^2} \right\}}_{+}$$

Conditioned KKT Matrix

Coordinate Transforms

$$\begin{array}{ll} \min_x & \frac{1}{2}x'^{\top}P^{\top}QPx' + c^{\top}Px' \\ \text{s.t.} & W^{\top}APx' = W^{\top}b \end{array}$$

Primal: $x = Px' \in \mathbb{R}^n$
 Dual: $v = Wv' \in \mathbb{R}^m$

$Q \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad Q = Q^{\top} \succ 0 \quad c \in \mathbb{R}^n$
 $A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad \text{fat } (m < n), \quad b \in \mathbb{R}^m$

Lagrangian: $\mathcal{L}(x', v') = \frac{1}{2}x'^{\top}P^{\top}QPx' + c^{\top}Px' + v'^{\top}W^{\top}(APx' - b)$

KKT Conditions:

1. Stationarity: $x'^{\top}P^{\top}QP + c^{\top}P + v'^{\top}W^{\top}AP = 0$
 2. Feasibility: $W^{\top}APx' - W^{\top}b = 0$

KKT System:

$$\begin{bmatrix} P^{\top}QP & P^{\top}A^{\top}W \\ W^{\top}AP & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ v' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -P^{\top}c \\ W^{\top}b \end{bmatrix}$$

Conditioning: $AQ^{-\frac{1}{2}} = U[\Sigma \ 0]V^{\top}$ (SVD) \Rightarrow $P = Q^{-\frac{1}{2}}V \quad W = U\Sigma^{-1}$

$M \Rightarrow \begin{bmatrix} P^{\top}QP & P^{\top}A^{\top}W \\ W^{\top}AP & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} I & \Sigma & 0 \\ \Sigma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}$

Subblocks:
 $\begin{bmatrix} 1 & \sigma_j \\ \sigma_j & 0 \end{bmatrix}$

$s(s-1) - \sigma_j^2 = 0 \quad \lambda_{j,j+1} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + \sigma_j^2}$

$\times(n-m)$
 \downarrow

$\times m$
 \downarrow

$\times m$
 \downarrow

$$\text{spec} = \underbrace{\left\{ 1, \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \sigma_j^2}, \frac{1}{2} - \sqrt{\frac{1}{4} + \sigma_j^2} \right\}}_{+}$$