

Содержание

1	Предельные теоремы и законы больших чисел	2
2	Вариационные ряды и их характеристики	2
2.1	Генеральная и выборочная совокупности, объём выборки.	2
2.2	Вариационный ряд, варианта, частота. Виды вариационных рядов. Гистограмма, полигон.	2
2.3	Формулы числовых характеристик. Эмперическая функция распределения (ЭФР). Свойства ЭФР.	4
2.4	Эмперическая функция распределения ЭФР. Свойства ЭФР. . .	5
3	Оценки параметров распределения	6
3.1	Понятия статистики, оценки, выборочной характеристики. . . .	6
3.2	Несмещённые, состоятельные и эффективные оценки	6
3.3	Теорема о несмещённой состоятельной оценке мат. ожидания .	7
3.4	Дополнительная информация	8
3.5	Теорема о несмещённой и состоятельной оценке дисперсии . . .	8
3.6	Теорема о несмещённой и состоятельной оценке функции распределения	9
3.7	Теорема об эффективной оценке математического ожидания . .	11
3.8	Теорема о единственности эффективной оценки	12
3.8.1	Определение регулярной параметрической модели. Информация Фишера.	13
3.9	Неравенство Рао-Крамера. Построение эффективной по Рао-Крамеру оценки для пуассоновского распределения	14

1 Предельные теоремы и законы больших чисел

2 Вариационные ряды и их характеристики

2.1 Генеральная и выборочная совокупности, объём выборки.

Рассмотрим постановку задачи математической статистики: по результатам наблюдения за некоторой случайной величиной ξ требуется сделать выводы о неизвестном законе распределения этой величины $\mathcal{L}(x, \theta)$ либо о неизвестных параметрах $\Theta_1, \dots, \Theta_n$ известного распределения.

Пусть ξ — случайная величина с некоторой (теоретической) функцией распределения $F_\xi(x) = P\{\xi < x\}$, $x \in R$.

Определение:

Совокупность n независимых одинаково распределённых случайных величин X_1, X_2, \dots, X_n называется выборкой (выборочной совокупностью), извлечённой из распределения случайной величины ξ .

Определение:

Под генеральной совокупностью понимается множество всех возможных значений случайной величины ξ .

Определение:

Объёмом совокупности называется количество всех её элементов, объём выборки или выборочной совокупности обозначается n , генеральной совокупности — N .

2.2 Вариационный ряд, варианта, частота. Виды вариационных рядов. Гистограмма, полигон.

Определение:

Пусть x_1, x_2, \dots, x_n — выборка из генеральной совокупности значений.

Вариационным рядом называется последовательность $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$ элементов выборки расположенных в порядке неубывания, т.е. $x_1^* \leq x_2^* \leq \dots \leq x_n^*$.

x_i^* — варианта.

n_i — частота появления варианты x_i^* в выборке.

Определение:

Точечным вариационным рядом называется:


x_i	x_1	x_2	\dots	x_m
n_i	n_1	n_2	\dots	n_m

x_i — варианты, n_i — частота соответствующей варианты.

m — количество групп (различных вариантов (вариант в таблице)).

$n = \sum_{i=1}^m n_i$, где n_i — объём выборки.

Для графического представления точечных вариационных рядов используется полигон частот — ломанная с вершинами в точках (x_i, n_i) .



Определение:

Интервальным вариационным рядом называется:


x_i	$[x_1, x_2]$	$(x_2, x_3]$	\dots	$(x_m, x_{m+1}]$
n_i	n_1	n_2	\dots	n_m

x_i — варианты, n_i — частота.

m — количество групп (интервалов).

$n = \sum_{i=1}^m n_i$, где n_i — объём выборки.

Для графического представления интервальных вариационных рядов используется гистограмма частот — фигура, составленная из прямоугольников, одной стороной которых служат интервалы $(x_i, x_{i+1}]$, а длина второй равна n_i .



2.3 Формулы числовых характеристик. Эмперическая функция распределения (ЭФР). Свойства ЭФР.

Определение:

Выборочным средним называется величина:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Если данные представлены в виде точечного или интервального вариационного ряда, то для вычисления используют формулу:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i * n_i,$$

где m — количество групп в точечном или интервалов в интервальном вариационном ряду, n_i — частота, т.е. количество элементов выборки, принадлежащих i -той группе или i -тому интервалу, x_i — варианта для точечного ряда и середина i -того интервала для интервального ряда.

Определение:

Выборочной дисперсией (смещённой) называется величина:

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2.$$

Она характеризует среднее из квадратов отклонений наблюдаемой величины от выборочного среднего. Величина $S = \sqrt{S^2}$ называется выборочным средним

квадратическим отклонением (смещённым) величин выборки от выборочного среднего.

Если данные представлены в виде точечного или интервального вариационного ряда, то для вычисления используют формулу:

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2 n_i.$$

или

$$S^2 = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^m x_i^2 n_i \right) - \bar{x}^2.$$

Здесь m — количество групп в точечном или интервалах в интервальном вариационных рядах, n_i — частота. т.е. количество элементов выборки, принадлежащих i -той группе или i -тому интервалу, x_i — варианта для точечного ряда и середина i -того интервала для интервального ряда.

Определение:

Выборочной дисперсией (несмещённой) называется величина:

$$\bar{\sigma} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2.$$

Аналогично, величина $\bar{\sigma} = \sqrt{\bar{\sigma}^2}$ называется выборочным несмещённым средним квадратическим отклонением.

Очевидно, что смещённая и несмещённая выборочные дисперсии связаны формулой:

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{n}{n-1} S^2.$$

2.4 Эмпирическая функция распределения ЭФР. Свойства ЭФР.

Эмпирическая функция распределения ЭФР

Эмпирической функцией распределения (ЭФР) называется функция

$$\tilde{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e(x - X_i),$$

где $e(x) = 1$, при $x > 0$ $e(x) = 0$, при $x \leq 0$.

Таким образом, если X_i , то $e(x) = 1$, если $X_i \geq x$, то $e(x) = 0$, а сумма $e(x - X_i)$ будет равна количеству элементов выборки, которые приняли значение, строго меньше некоторого $x \in R$.

Пусть x_1, x_2, \dots, x_n — реализация выборки X_1, X_2, \dots, X_n , т.е. наблюдавшиеся значения случайной величины ξ .

Обозначим $\mu(x)$ — число элементов выборки, строго меньших $x \in R$. Тогда эмпирическая функция распределения $\tilde{F}_n(x)$ может быть определена как

$$\tilde{F}_n(x) = \frac{\mu(x)}{n}.$$

Свойства ЭФР:

1. $0 \leq \tilde{F}_n(x) \leq 1$, т.к. $0 \leq \mu(x) \leq n$;
2. неубывающая непрерывная слева функция;
3. $\tilde{F}_n(x)$ — ступенчатая функция для всех типов распределений;
4. $\tilde{F}_n(x)$ сходится по распределению к $F_\xi(x)$.

3 Оценки параметров распределения

3.1 Понятия статистики, оценки, выборочной характеристики.

Определение:

Пусть $g(t_1, \dots, t_n)$ — непрерывная функция. Оценкой θ назовём $\tilde{\theta} = g(X_1, \dots, X_n)$. Если $g(X_1, \dots, X_n) = T$ некоторая функция, то T — статистика.

Определение:

Выборочными характеристиками называются функции от наблюдений (точечные оценки), приближённо оценивающие соответствующие числовые характеристики случайной величины.

3.2 Несмещённые, состоятельные и эффективные оценки

Определение:

Оценка $\tilde{\theta}_n$ называется несмещённой оценкой параметра θ , если $M(\tilde{\theta}_n) = \theta$.

Определение:

Оценка $\tilde{\theta}_n$ называется состоятельной оценкой параметра θ , если $\tilde{\theta}_n$ сходится по вероятности к θ .

Определение:

Оценка $\tilde{\theta}_n$ называется эффективной, или оптимальной, или наилучшей несмещённой оценкой с минимальной дисперсией (НОМД), если $M(\tilde{\theta}_n) = \theta$ и $D(\tilde{\theta}_n) = \inf_{\tilde{\theta}_n^*} D\tilde{\theta}_n^*$.

3.3 Теорема о несмещённой состоятельной оценке мат. ожидания

Пусть $\xi \sim L(x, \theta)$, $L(x, \theta)$ — закон распределения известен с точностью до параметра.

$$\bar{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_n)$$

По результатам X_1, \dots, X_n наблюдений за ξ требуется построить оценку θ .

Теорема:

Пусть $X_1, \dots, X_n \sim L_\xi(x, \theta)$, где ξ — случайная величина с $M\xi = a < +\infty$ $D\xi = \sigma^2$. Тогда выборочное среднее $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ является несмещённой и состоятельной оценкой $M\xi$.

Доказательство:

$$\begin{aligned} M\bar{x} &= M\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Mx_i = \\ &= |x_i \text{ — н. о. р. случайной величины} \Rightarrow Mx_i = M\xi \quad \forall i| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M\xi = \\ &= \frac{1}{n} * n * a = a \Rightarrow \bar{x} \text{ — несмещённое} \end{aligned}$$

Состоятельность $\forall \epsilon > 0 \quad P\{|\bar{x} - a| < \epsilon\} \rightarrow_{n \rightarrow \infty} 1$

По неравенству Чебышёва:

$$\begin{aligned} \forall \epsilon > 0 \quad P\{|\bar{x} - a| < \epsilon\} &\geq 1 - \frac{D\bar{x}}{\epsilon^2} = 1 - \frac{1}{\epsilon^2} D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \\ &= | \text{н. о. р.} \quad Dx_i = \sigma^2 | = \\ &= 1 - \frac{1}{n^2} \epsilon^2 D\xi = 1 - \frac{n\sigma^2}{n^2 \epsilon^2} = 1 - \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2} \rightarrow_{n \rightarrow \infty} 1 - 0 \end{aligned}$$

Т.к. $P(A) \leq 1 \quad \forall A$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{x} - a| < \epsilon\} = 1 \Rightarrow \bar{x}$ — состоятельная.

3.4 Дополнительная информация

Определение:

Выборочной дисперсией (смещённой) называется величина $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$.

Для группированных данных: $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2 * n_i$.

Определение:

Выборочной дисперсией (несмещённой) называется оценка $\tilde{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$.

Для группированных данных: $\tilde{\sigma}^2 = \frac{n}{n-1} * S^2$.

3.5 Теорема о несмещённой и состоятельной оценке дисперсии

Теорема:

Пусть $X_1, \dots, X_n \sim L(x, \theta)$, где $M\xi = a < +\infty$, $D\xi = \sigma^2$. Тогда несмещённой и состоятельной оценкой $D\xi$ является величина $\tilde{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$.

Доказательство:

1. Докажем несмещённость ($M\tilde{\sigma}^2 = \sigma^2$):

$$M\tilde{\sigma}^2 = M\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2)\right) = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n (Mx_i^2 - 2M(x_i\bar{x}) + M\bar{x}^2)\right) \quad \textcircled{=}$$

Найдём значения слагаемых:

$$Mx_i^2 = M\bar{s}^2 = D\bar{s} + (M\bar{s})^2 = \sigma^2 + a^2 \quad \left| \begin{array}{l} D\bar{s} = M\bar{s}^2 - (M\bar{s})^2 \\ \sigma^2 = M\bar{s}^2 - a^2 \Rightarrow M\bar{s}^2 = \sigma^2 + a^2 \end{array} \right|$$

$$Mx_i\bar{x} = M\left(x_i \cdot \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j\right) = \frac{1}{n} (M(x_i x_1) + M(x_i x_2) + \dots + Mx_i^2 + \dots +$$

$$+ M(x_i x_n)) \stackrel{x_i \text{ н.о.р.}}{=} \frac{1}{n} (Mx_i Mx_1 + Mx_i Mx_2 + \dots + Mx_i^2 + \dots + Mx_i Mx_n) =$$

$$= \frac{1}{n} (a^2 + a^2 + \dots + (\sigma^2 + a^2) + \dots + a^2) = \frac{n a^2 + \sigma^2}{n} = a^2 + \frac{\sigma^2}{n}$$

$$M\bar{x}^2 = M\bar{x} \cdot \bar{x} = M\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \bar{x}\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Mx_i \bar{x} = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \left(a^2 + \frac{\sigma^2}{n}\right) = a^2 + \frac{\sigma^2}{n}$$

$$\textcircled{=} \frac{1}{n-1} \cdot n \left(\sigma^2 + a^2 - 2\left(a^2 + \frac{\sigma^2}{n}\right) + \left(a^2 + \frac{\sigma^2}{n}\right)\right) = \frac{n}{n-1} \left(\sigma^2 + a^2 - a^2 - \frac{\sigma^2}{n}\right) =$$

$$= \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \sigma^2 = \sigma^2$$

Т.к. $M\tilde{\sigma}^2 = \sigma^2$, то оценка несмещённая.

Состоятельность не доказывается.


3.6 Теорема о несмещённой и состоятельной оценке функции распределения

Определение:

Эмпирическая функция распределения: $\tilde{F}_n(x) = \frac{M_n(x)}{n}$; $M_n(x)$ — кол-во значений выборки строго меньших x .

$$\text{Пусть } e(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad \sum_{i=1}^n e(x - x_i)$$

$$\text{Таким образом, } \tilde{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e(x - x_i).$$



Теорема:

Пусть $X_1, \dots, X_n \sim L_\xi(x, \theta)$, где $F_\xi(x)$ — функция распределения случайной величины ξ . Тогда эмпирическая функция распределения $\tilde{F}_n(x)$ является несмещённой и состоятельной оценкой функции распределения $F_\xi(x)$.

Доказательство:

Покажем несмещённость $(M(\tilde{F}_n(x)) = F_\xi(x) = P\{\xi \leq x\})$:

$$M \tilde{F}_n(x) = M\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e(x - x_i)\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M e(x - x_i) \quad \textcircled{=}$$

Построим ряд р-я ш.в. $e(x - x_i)$:

$e(x - x_i)$	0	1
p	$P\{x - x_i \leq 0\}$	$P\{x - x_i > 0\}$

$$P\{x - x_i \leq 0\} = P\{x \leq x_i\} = P\{x_i \geq x\} = 1 - F_{x_i}(x)$$

$$P\{x - x_i > 0\} = P\{x > x_i\} = P\{x_i < x\} = F_{x_i}(x)$$

$$M e(x - x_i) = 0 \cdot (1 - F_{x_i}(x)) + 1 \cdot F_{x_i}(x) = F_{x_i}(x) \quad \forall_i$$

$$M e^2(x - x_i) = 0^2 (1 - F_{x_i}(x)) + 1^2 \cdot F_{x_i}(x) = F_{x_i}(x)$$

$$D e(x - x_i) = F_{x_i}(x) - F_{x_i}^2(x) = \underbrace{F_{x_i}(x)}_{0 \leq \cdot \leq 1} \underbrace{(1 - F_{x_i}(x))}_{0 \leq \cdot \leq 1}$$

$$\textcircled{=} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F_{x_i}(x) = \left[\begin{matrix} x_i \\ \text{н.о.р} \end{matrix} \right] = \frac{1}{n} \cdot n F_\xi(x) = F_\xi(x)$$

Покажем состоятельность $\tilde{F}_n(x) \xrightarrow{P} F_\xi(x)$:

По неравенству Чебышёва:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad P\{|\tilde{F}_n(x) - F_\xi(x)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D \tilde{F}_n(x)}{\varepsilon^2} = 1 - \frac{1}{\varepsilon^2} P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e(x - x_i)\right) =$$

$$= 1 - \frac{1}{n \varepsilon^2} \cdot n F_\xi(x) (1 - F_\xi(x)) = 1 - \frac{F_\xi(x) (1 - F_\xi(x))}{n \varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - 0$$

$$\text{т.е. } P(A) \leq 1, \text{ то } \tilde{F}_n(x) \xrightarrow{P} F_\xi(x)$$

3.7 Теорема об эффективной оценке математического ожидания

Определение:

Пусть $\tilde{\theta}_n$ — несмещённая оценка. $\tilde{\theta}_n$ — называется эффективной оценкой, если

$$D\tilde{\theta}_n = \inf_{\tilde{\theta}_n^*} D\tilde{\theta}_n^*$$

Теорема:

Пусть $X_1, \dots, X_n \sim L_\xi(x, \theta)$, где ξ — случайная величина с $M\xi = a < +\infty$. Тогда выборочное среднее $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ является эффективной оценкой $M\xi$ в классе линейных несмещённых оценок.

Доказательство:

Расс-м произвольную лм оценку $\tilde{\theta}_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i X_i$:

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 ; \alpha_i > 0 \forall i$$

Найдём дисперсию оценки $\tilde{\theta}_n$:

$$D \tilde{\theta}_n = D \sum_{i=1}^n \alpha_i X_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 D X_i = \begin{bmatrix} X_1 - \\ \text{н.о.р.} \\ \text{сл. в.} \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \sigma^2 = \sigma^2 \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 = \sigma^2 g(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

$D \tilde{\theta}_n$ достигнет мин на тех α_i , при которых $g(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \rightarrow \min$

Для док-ва воспользуемся методом Лагранжа поиска условного минимума

$$g(\alpha_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2$$

$$L(\alpha_i, \lambda) = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 + \lambda \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i - 1 \right)$$

↙
константа Лагранжа

Найдём производные $L(\alpha_i, \lambda)$, λ - const Лагранжа.

$$\begin{cases} \frac{\partial L(\alpha_i, \lambda)}{\partial \lambda} = \sum_{i=1}^n \alpha_i - 1 = 0 \\ \frac{\partial L(\alpha_i, \lambda)}{\partial \alpha_i} = 2\alpha_i + \lambda = 0 \Rightarrow \alpha_i = -\frac{\lambda}{2} \end{cases} \quad \leftarrow -\sum_{i=1}^n \frac{\lambda}{2} - 1 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{n\lambda}{2} = -1 ; \lambda = \frac{-2}{n} \Rightarrow \alpha_i = -\left(\frac{-2}{n}\right) \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha_i = \frac{1}{n} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow g(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \text{ имеет мин значение, если } g(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n}\right)^2$$

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} = 1$$

Следовательно, эффективной оценкой является $\tilde{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$.

3.8 Теорема о единственности эффективной оценки

теорема:

Пусть $X_1, \dots, X_n \sim L_\xi(x, \theta)$, где θ — параметр распределения, и пусть $\tilde{\theta}(\bar{X}_n)$ и $\hat{\theta}_n(\bar{X}_n)$ — две эффективные оценки θ . Тогда $\tilde{\theta}_n(\bar{X}_n) = \hat{\theta}_n(\bar{X}_n)$. То есть $P\{(x_1, \dots, x_n) : \tilde{\theta}_n(\bar{X}_n) \neq \hat{\theta}_n(\bar{X}_n)\} = 0$.

Доказательство:

Док-во: т.к. $\tilde{\theta}_1$ и $\tilde{\theta}_2$ — эфф., то по опр. $M\tilde{\theta}_1 = M\tilde{\theta}_2 = \theta$. $D\tilde{\theta}_1$ и $D\tilde{\theta}_2$ есть илф $D\tilde{\theta}_n$, т.к. илф единст., то $D\tilde{\theta}_1 = D\tilde{\theta}_2$. Ракм. $\tilde{\theta} = \frac{\tilde{\theta}_1 + \tilde{\theta}_2}{2}$:
 $M\tilde{\theta} = \frac{1}{2}(M\tilde{\theta}_1 + M\tilde{\theta}_2) = \frac{1}{2}(\theta + \theta) = \theta \Rightarrow \tilde{\theta}$ — несмещ. оценка
 $D\tilde{\theta} = \frac{1}{4}(D\tilde{\theta}_1 + D\tilde{\theta}_2 + 2\text{cov}(\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2)) = \frac{1}{2}(D\tilde{\theta}_1 + \text{cov}(\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2))$ (*)
 $|\text{cov}(\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2)| = |M(\tilde{\theta}_1 - M\tilde{\theta}_1)(\tilde{\theta}_2 - M\tilde{\theta}_2)| \leq \sqrt{M(\tilde{\theta}_1 - M\tilde{\theta}_1)^2} \cdot \sqrt{M(\tilde{\theta}_2 - M\tilde{\theta}_2)^2} =$
 $= \sqrt{D\tilde{\theta}_1} \cdot \sqrt{D\tilde{\theta}_2} = D\tilde{\theta}_1$, т.е. $|\text{cov}(\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2)| \leq D\tilde{\theta}_1$
 $D\tilde{\theta} = |D\tilde{\theta}| = \frac{1}{2}|D\tilde{\theta}_1 + \text{cov}(\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2)| \leq \frac{1}{2}(|D\tilde{\theta}_1| + |\text{cov}(\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2)|) \leq \frac{1}{2}(|D\tilde{\theta}_1| + |D\tilde{\theta}_1|) =$
 $= D\tilde{\theta}_1 = \text{илф } D\tilde{\theta}_n \Rightarrow D\tilde{\theta} = D\tilde{\theta}_1$
Решим (*): $D\tilde{\theta}_1 = \frac{1}{2}(D\tilde{\theta}_1 - \text{cov}(\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2)) \Rightarrow D\tilde{\theta}_1 = \text{cov}(\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2)$
Коэфф. корреляции $\rho(\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2) = \frac{\text{cov}(\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2)}{\sqrt{D\tilde{\theta}_1} \sqrt{D\tilde{\theta}_2}} = \frac{D\tilde{\theta}_1}{D\tilde{\theta}_1} = 1 \Rightarrow \tilde{\theta}_2 = a\tilde{\theta}_1 + b$
 $M\tilde{\theta}_2 = aM\tilde{\theta}_1 + b$ (несм.)
 $\theta = a\theta + b$
 $1 \cdot \theta + 0 = a\theta + b \Rightarrow \text{эфф. оценка единст.} \Rightarrow !$

3.8.1 Определение регулярной параметрической модели. Информация Фишера.

Определение:

Пусть ξ — наблюдаемая случайная величина.

Выборочным пространством X_n называется $\{\bar{X}_n = (X_1, \dots, X_n)\}$.

Параметрическим множеством называется Θ — множество значений параметра θ .

Определение:

Параметрической моделью называется

$$\{X_n; F_\xi(x, \theta) : \theta \in \Theta\}$$

Определение:

Параметрическая модель называется регулярной, если:

1. параметрическое множество Θ — открытое множество;
2. носитель распределён, то есть множество $A = \{x : f(x) > 0\}$ — не зависит от параметров;
3. $\forall \theta$ и $x \in A$ существует производная $\frac{\partial f(x, \theta)}{\partial \theta} < +\infty$;
4. $\forall \theta \in \Theta \quad M\left(\frac{\partial \ln f(x, \theta)}{\partial \theta}\right) = 0 \quad M\left(\frac{\partial \ln f(x, \theta)}{\partial \theta}\right)^2 < +\infty$;

5. Дважды допустимо дифференцирование под знаком интеграла по параметру.

Определение:

Пусть ξ — случайная величина с функцией плотности $f(x, \theta)$. Тогда информацией Фишера для случайного вектора \bar{X}_n называется $I_n(\theta) = M\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x, \theta)\right)^2$

3.9 Неравенство Рао-Крамера. Построение эффективной по Рао-Крамеру оценки для пуассоновского распределения

Неравенство Рао-Крамера:

Пусть дана регулярная параметрическая модель. Тогда для любой несмещённой оценки $\tilde{\theta}$ параметра θ $D\tilde{\theta} \geq \frac{1}{nI_n(\theta)}$.

Определение:

Величину $e(\theta) = \frac{1}{nI(\theta) * D\tilde{\theta}}$ называют показателем эффективности по Рао-Крамеру.

Для любой несмещённой оценки $0 < e(\theta) \leq 1$. Если $e(\theta) = 1$, то $\tilde{\theta}_n$ называется эффективной по Рао-Крамеру, следовательно, просто эффективна.

Построение эффективной по Рао-Крамеру оценки для пуассоновского распределения:

$(X_1, \dots, X_n) \sim \text{Pois}(\lambda)$. Построить эфф. (оптимальную) оценку λ .

$P\{Z=k\} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \Rightarrow \forall X_i: P\{X_i=k\} = P\{Z=k\}$

$M_{X_i} = \lambda, D_{X_i} = \lambda^*$ (из ТВ) $M_{X_i^*} = \lambda^* + \lambda$

Пусть $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ — оценка λ .

$M\bar{X} = \lambda, D\bar{X} = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \cdot \sum_{i=1}^n D_{X_i}^* = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \lambda = \frac{\lambda}{n}$.

Найдём $I(\lambda)$ — в одном наблюдении:

$$I(\lambda) = M\left(\frac{\partial \ln\left(\frac{e^{-\lambda} \lambda^{\xi}}{\xi!}\right)}{\partial \lambda}\right)^2 = M\left(\frac{\partial}{\partial \lambda} (\xi \ln \lambda - \lambda - \ln \xi!)\right)^2 = M\left(\frac{\xi}{\lambda} - 1\right)^2 = M\left(\frac{\xi^2}{\lambda^2} - \frac{2\xi}{\lambda} + 1\right) = \frac{1}{\lambda^2} M\xi^2 - \frac{2}{\lambda} M\xi + 1 =$$

$$= \frac{1}{\lambda^2} (\lambda^2 + \lambda) - \frac{2}{\lambda} \cdot \lambda + 1 = 1 + \frac{1}{\lambda} - 2 + 1 = \frac{1}{\lambda}.$$

Вычислим $e(\bar{X}) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \frac{1}{\lambda} = 1 \Rightarrow \bar{X}$ — оптимальная оценка параметра λ .