

# Содержание

<b>1</b>	<b>Глава 1</b>	<b>2</b>
1.1	Случайные события, классификация событий, операции над ними.	2
1.2	Определения: кольцо, алгебра, $\sigma$ -алгебра, минимальная $\sigma$ -алгебра над классом $K$ . Борелевская $\sigma$ -алгебра. . . . .	2
1.3	Теорема Каратеодори. . . . .	3
1.4	Определения: мера, конечно-аддитивная, счётно-аддитивная мера	4
1.5	Построение меры Лебега. Верхняя мера Лебега, нижняя мера Лебега, мера Лебега. Измеримое по Лебегу множество. . . . .	4
1.6	Вероятностная мера, её свойства, непрерывность вероятностной меры. . . . .	7
1.7	Классическое вероятностное пространство. Классическое определение вероятности. . . . .	9
1.8	Дискретное вероятностное пространство. . . . .	9
1.9	Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. . . . .	10
1.10	Формулы полной вероятности и Байеса. . . . .	10
1.11	Независимость событий. Независимость в совокупности. . . . .	11
1.12	Теорема о независимости противоположных событий. Критерий независимости случайных событий. . . . .	11
<b>2</b>	<b>Глава 2</b>	<b>12</b>
2.1	Определение измеримой функции, абстрактной и действительной. Критерий измеримости действительных функций. . . . .	12
2.2	Случайная величина. Виды случайных величин (дискретная и абсолютно непрерывная). . . . .	13
2.3	Функция распределения и её свойства. . . . .	13
2.4	Теорема о существовании случайной величины, соответствующей функции со свойствами функции распределения. . . . .	14
2.5	Функция плотности распределения случайной величины и её свойства. . . . .	14
2.6	Дискретная случайная величина. Основные типы дискретных распределений (постановка задачи, закон распределения): распределение Бернулли, равномерное дискретное, биномиальное, пуассоновское, геометрическое распределения. . . . .	14
2.7	Равномерное непрерывное распределение (построение функций распределения и плотности, графики). . . . .	15
2.8	Показательное (экспоненциальное) распределение (построение функции распределения, функции плотности, графики, свойство отсутствия последействия) . . . . .	17

# 1 Глава 1

## 1.1 Случайные события, классификация событий, операции над ними.

### Определение случайного события:

Пусть  $\Omega$  — множество элементарных исходов эксперимента. Случайным событием называется любое подмножество множества  $\Omega$ .

### Определение достоверного события:

Достоверным событием называется событие  $\Omega$ , которому благоприятствует каждый исход эксперимента.

### Определение невозможного события:

Невозможным событием называется пустое множество, которому не благоприятствует ни один исход эксперимента.

### Определение суммы событий:

Суммой событий  $A$  и  $B$  называется событие  $C = A \cup B$ , которому благоприятствуют исходы, принадлежащие хотя одному из событий  $A$  или  $B$ .

### Определение произведения событий:

Произведением событий  $A$  и  $B$  называется событие  $C = A \cap B$ , которому благоприятствуют исходы и события  $A$ , и события  $B$ .

### Определение несовместных событий:

Случайные события  $A$  и  $B$  называются несовместными, если  $A \cap B = \emptyset$ .

### Определение противоположного события:

Событием, противоположным событию  $A$  называется событие  $\bar{A}$ , которое состоит из исходов, не благоприятствующих  $A$ .

## 1.2 Определения: кольцо, алгебра, $\sigma$ -алгебра, минимальная $\sigma$ -алгебра над классом $K$ . Борелевская $\sigma$ -алгебра.

### Определение кольца:

Кольцом  $R$  называется непустой класс множества замкнутый относительно операций сложения и взятия разности.

### Определение алгебры:

Алгеброй  $A$  называется непустой класс множества замкнутый относительно сложения и отрицания.

**Определение  $\sigma$ -алгебры:**

$\sigma$ -алгебра  $\mathcal{F}$  — это непустой класс множества замкнутый относительно счётного количества сумм и отрицаний:

1. Если  $A \in \mathcal{F}$ , то  $\overline{A} \in \mathcal{F}$ ;
2.  $\Omega \in \mathcal{F}$ ;
3. Если  $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \in \mathcal{F}$ , то  $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$ .

**Определение  $\sigma$ -алгебры событий:**

Сигма алгеброй событий называется множество  $\mathcal{F}$  подмножеств  $A \subset \Omega$ , удовлетворяющее условиям:

1. если  $A \in \mathcal{F}$ , то  $\overline{A} \in \mathcal{F}$ ;
2.  $\Omega \in \mathcal{F}$ ;
3. если  $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \in \mathcal{F}$ , то  $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$ .

**Определение минимальной  $\sigma$ -алгебры над классом  $K$ :**

Пусть  $K$  — некоторый класс подмножеств из  $\Omega$ .  $\sigma$ -алгебра  $\sigma(K)$  называется наименьшей  $\sigma$ -алгеброй, содержащей класс  $K$ , если  $K \in \sigma(K)$ ; любая  $\sigma$ -алгебра  $\mathcal{F}$ , которая содержит  $K$  ( $K \subset \mathcal{F}$ ), содержит и  $\sigma(K) \subset \mathcal{F}$ .

**Определение Борелевской  $\sigma$ -алгебры:**

Борелевской  $\sigma$ -алгеброй  $\beta$  называется минимальная  $\sigma$ -алгебра над классом полуинтервалов  $K = \{[a, b]\}$  из  $R$ , то есть:

$$\Omega = (-\infty, \infty) = R \quad K = \{[a, b), [a, +\infty), (a, +\infty), (-\infty, b), (-\infty, b], (a, b]\}.$$

**1.3 Теорема Каратеодори.**

Пусть  $Q(A)$  — счётно аддитивная вероятностная мера на алгебре  $\mathcal{A}$ . Тогда существует единственная счётно аддитивная вероятностная мера  $P(A)$ , заданная на минимальной  $\sigma$ -алгебре  $\mathcal{F}$  и являющаяся её продолжением, то есть  $\forall A \in \mathcal{A} \quad P(A) = Q(A)$ .

## 1.4 Определения: мера, конечно-аддитивная, счётно-аддитивная мера

Пусть  $\Omega$  — множество элементарных исходов эксперимента. Некоторое его подмножество  $A \subset \Omega$  называется случайным событием.

### Определение конечно аддитивной вероятностной меры

Конечно аддитивной вероятностной мерой  $Q(A)$  называется функция множества  $Q : \mathcal{A} \rightarrow [0; 1]$ , такая, что:

1.  $\forall A \in \mathcal{A} \quad Q(A) \geq 0$ ;
2.  $Q(\Omega) = 1$ ;
3.  $\forall A, B \in \mathcal{A} : \quad A \cap B = \emptyset \quad Q(A \cup B) = Q(A) + Q(B) \quad Q\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} Q(A_i)$ .

### Определение счётно аддитивной вероятностной меры:


Счётно аддитивно вероятностной мерой  $P(A)$  называется функция множества  $P : \mathcal{F} \rightarrow [0; 1]$ , такая, что:

1.  $\forall A \in \mathcal{F} \quad P(A) \geq 0$ ;
2.  $P(\Omega) = 1$ ;
3.  $\forall \{A_i\}_{i=1}^{\infty} \in \mathcal{F} : \quad \forall i \neq j \quad A_i \cap A_j = \emptyset \quad P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ .

## 1.5 Построение меры Лебега. Верхняя мера Лебега, нижняя мера Лебега, мера Лебега. Измеримое по Лебегу множество.

Пусть  $P = \langle a, b \rangle \times \langle c, d \rangle$ .  $P \subset R^2$  — прямоугольник.

Мерой прямоугольника назовём  $m(P)$ , где  $m(P) = (b - a)(d - c)$



Множество  $A$  назовём элементарным, если оно представимо в виде суммы прямоугольников хотя бы 1 способом:

$$A = \bigcup P_k,$$


где  $\{P_k\}$  — покрытие.

Мерой элементарного множества  $A$  называется

$$m'(A) = \sum m(P_k),$$

где  $\{P_k\}$  — разбиение  $A$ , то есть  $\forall j \neq k \quad P_k \cap P_j = \emptyset$ .


Рассмотрим множество  $E = [0; 1] \times [0; 1]$



### Определение верхней меры Лебега:

Пусть  $A$  — некоторое множество. Рассмотрим  $\{P_k\}$ , такое, что:

$$A \subset P_k$$




Верхней мерой Лебега называется

$$\mu^*(A) = \inf_{\{P_k\}} \sum m(P_k)$$

**Определение нижней меры Лебега:**

Рассмотрим множество  $E \setminus A$ . ( $m(E) = 1$ )



Нижней мерой Лебега называется:

$$\mu_*(A) = 1 - \mu^*(E \setminus A)$$

**Определение меры Лебега и измеримого по Лебегу множества:**

Говорят, что множество  $A$  измеримо по Лебегу, если  $\mu^*(A) = \mu_*(A) = \mu(A)$ .  
Величина  $\mu(A)$  — называется мерой Лебега множества  $A$ .

## 1.6 Вероятностная мера, её свойства, непрерывность вероятностной меры.

### Определение вероятностной меры:

Вероятностной мерой называется функция  $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ , удовлетворяющая условиям:

1.  $P(\Omega) = 1$ ;
2.  $\forall A \in \mathcal{F} \quad P(A) \geq 0$ ;
3.  $\forall \{A_i\}_{i=1}^{\infty} \in \mathcal{F}$ , такой, что  $\forall i \neq j \quad A_i \cap A_j = \emptyset$ ,  $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ .

### Свойства вероятностной меры:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Док-во:

$$\text{и. соф.} \quad \Omega = A \cup \bar{A}; \quad A \cap \bar{A} = \emptyset$$

$$\text{Тогда} \quad 1 \stackrel{(P_1)}{=} P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) \stackrel{(P_3)}{=} P(A) + P(\bar{A})$$

$$\Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$\text{следствие:} \quad P(\emptyset) = 1 - P(\Omega) = 1 - 1 = 0$$

1.

$$\text{Если } A \subseteq B, \text{ то } P(A) \leq P(B)$$

$$\text{и } P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$$

Док-во:



Представим событие B в виде суммы несовместных событий:  $B = A \cup (B \setminus A) \Rightarrow$

$$\Rightarrow P(B) = P(A \cup B \setminus A) = P(A) + P(B \setminus A)$$

т.к. по аксиоме  $(P_2) \quad P(\cdot) \geq 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow P(B) \geq P(A)$$


2.

Теория сложения вероятностей:

Пусть  $A$  и  $B$  - некоторые события,  $A, B \in \mathcal{F}$ . Тогда  
(могут быть совместные)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Док-во:



$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A \cup (B \setminus A \cap B)) = \\ &= P(A) + P(B \setminus A \cap B) \stackrel{\text{свой-во 2}}{=} \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \end{aligned}$$

следствие:  $\forall A \in \mathcal{F} \quad \forall B \in \mathcal{F}$

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$$


3.

Непрерывность вероятностной меры:

Пусть  $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$  - монотонный класс событий, т.е.

①  $A_i \subset A_{i+1}$  или ②  $A_i \supset A_{i+1}$

↑  
расширяющаяся / сужающаяся последовательность событий



Тогда

$$P(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

4.

Док-во:

Пусть  $A_i \subset A_{i+1}$ . Тогда

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \text{ и назовем } A = \lim_{i \rightarrow \infty} A_i$$

По аксиоме  $P(A) \leq 1$ . Тогда

$$\begin{aligned} P(A) &= P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \left| \begin{array}{l} B_1 = A_1 \\ B_i = A_i \setminus A_{i-1} \end{array} \right| = \\ &\stackrel{(P3)}{=} \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^i P(B_j) = \lim_{i \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{j=1}^i B_j\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i) \end{aligned}$$

Пусть  $A_i \supset A_{i+1}$ . Тогда

$$\begin{aligned} P(A) &= P\left(\lim_{i \rightarrow \infty} A_i\right) = P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = 1 - P\left(\overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i}\right) = \\ &= 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i}\right) = 1 - \lim_{i \rightarrow \infty} P(\overline{A_i}) = \lim_{i \rightarrow \infty} (1 - P(\overline{A_i})) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i) \end{aligned}$$



## 1.7 Классическое вероятностное пространство. Классическое определение вероятности.

Вероятностной моделью стохастического эксперимента называется тройка  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ , где  $\Omega$  — множество элементарных исходов эксперимента,  $\mathcal{F}$  — алгебра событий,  $P$  — вероятностная мера.

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$  — вероятностное пространство.

### Определение классического вероятностного пространства:

Классическим вероятностным пространством, называется вероятностное пространство  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ , в конечном множестве элементарных исходов которого все элементарные исходы равновозможны.

Построим вероятностную меру:

Пусть  $\Omega = \{w_1, \dots, w_n\}$ .

Рассмотрим  $\{A_i\}_{i=1}^n$ , где  $A_i = \{w_i\}$ . Тогда

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega.$$

$$1 = P(\Omega) = P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) = |P(A_i) = P(w_i) = p| = \sum_{i=1}^n p \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p = \frac{1}{n} \Rightarrow \forall w_i \quad P(w_i) = \frac{1}{n}$$

Пусть  $A = \{w_{i_1}, \dots, w_{i_k}\}$   $0 \leq k \leq n$ . Тогда вероятностная мера в классическом вероятностном пространстве имеет вид

$$P(A) = P\left(\bigsqcup_{j=1}^k w_{i_j}\right) = \sum_{j=1}^k P(w_{i_j}) = \sum_{j=1}^k \frac{1}{n} = \frac{k}{n},$$

$P(A) = \frac{k}{n}$  — называется классической вероятностью,

где  $k$  — количество благоприятных  $A$  элементарных исходов,  $n$  — количество элементарных исходов эксперимента.

## 1.8 Дискретное вероятностное пространство.

### Определение дискретного вероятностного пространства:

Дискретным вероятностным пространством называется вероятностное пространство  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ , такое, что  $\Omega$  — конечное или счётное множество неравно-возможных исходов.

Вероятностную меру зададим числами  $p_i = P(w_i) > 0$ , такими, что  $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$ . Тогда  $\forall A \in \mathcal{F}$  вероятность вычисляется как  $P(A) = P(\bigcup_{w_i \in A} w_i) = \sum_{w_i \in A} P(w_i)$ .

## 1.9 Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей.

**Определение условной вероятности:**

Пусть  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  — вероятностное пространство и  $A, B \in \mathcal{F}$ ;  $P(B) > 0$ .

Условной вероятностью события  $A$  при условии, что наступило событие  $B$  называется число:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

**Теорема умножения вероятностей:**

Пусть  $A$  и  $B$  — случайные события и  $P(B) > 0$ . Тогда

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$$

Пусть  $A_1, A_2, A_3$  — случайные события и  $P(A_1) > 0$  и  $P(A_1 \cap A_2) > 0$ . Тогда

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2)$$

## 1.10 Формулы полной вероятности и Байеса.

**Теорема (формула полной вероятности):**

Пусть  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  — вероятностное пространство и  $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \in \mathcal{F}$  — полная группа попарно несовместных событий;  $P(A_i) \geq 0$ . Пусть  $A \in \mathcal{F}$  — непустое событие  $P(A|A_i) \geq 0$ . Тогда  $P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \cdot P(A|A_i)$ .

Доказательство:

$$P(A) = P(A \cap \Omega) = P(A \cap (\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i)) = P(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} (A \cap A_i)) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} P(A \cap A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) P(A|A_i)$$

.

**Теорема (формула Байеса):**

Пусть  $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \in \mathcal{F}$  — полная группа попарно несовместных событий и пусть для некоторого  $P(A) > 0$ . Тогда

$$\forall i = \overline{1, \infty} \quad P(A_i|A) = \frac{P(A_i)P(A|A_i)}{P(A)}$$

Доказательство:

$$P(A_i|A) = \frac{P(A \cap A_i)}{P(A)} = \frac{P(A_i) \cdot P(A|A_i)}{P(A)}$$

## 1.11 Независимость событий. Независимость в совокупности.

**Определение независимости событий:**

Случайные события  $A$  и  $B$  называются независимыми, если:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

**Определение независимости в совокупности:**

$\{A_i\}_{i=1}^n$  — называются независимыми в совокупности, если

$$\forall 2 \leq k \leq n \quad P\left(\bigcap_{j=1}^k A_{ij}\right) = \prod_{j=1}^k P(A_{ij})$$

## 1.12 Теорема о независимости противоположных событий. Критерий независимости случайных событий.

**Теорема о независимости противоположных событий:**

Пусть  $A$  и  $B$  — независимы. Тогда события  $A$  и  $\overline{B}$ ,  $\overline{A}$  и  $B$ .  $\overline{A}$  и  $\overline{B}$  — попарно независимы.

Доказательство:

Рассмотрим  $A$  и  $\overline{B}$ . Тогда  $P(A \cap \overline{B})$ . Можем заметить, что  $P(A \cap \overline{B}) = P(A \setminus (A \cap B)) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\overline{B})$ .

Остальные случаи аналогичны.

**Критерий независимости случайных событий:**

Пусть  $A$  и  $B$  такие, что  $P(B) > 0$ . Тогда Случайные события  $A$  и  $B$  независимы, тогда и только тогда, когда:

$$P(A|B) = P(A)$$

Доказательство:

Необходимость:

Пусть  $A$  и  $B$  независимы:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A)$$

Достаточность:

Пусть выполняется:  $P(A|B) = P(A)$ . Тогда из определения условной вероятности следует, что  $P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) = P(A) \cdot P(B)$ , то есть выполняется определение.

## 2 Глава 2

### 2.1 Определение измеримой функции, абстрактной и действительной. Критерий измеримости действительных функций.

**Определение измеримой функции:**

Пусть  $X$  и  $Y$  — некоторые множества и пусть  $S_x$  и  $S_y$  — классы подмножества.  $f : X \rightarrow Y$  — некоторая функция.

Функция  $f : X \rightarrow Y$  называется  $(S_x, S_y)$  — измеримой, если:

$$\forall B \in S_y \quad \exists f^{-1}(B) \in S_x$$

**Определение измеримой действительной функции:**

Действительная функция  $f(x)$  с областью определения  $X \subset R$  называется  $\mu$ -измеримой или  $S_\mu$ -измеримой, если для любого борелевского множества  $b \in \beta(R)$   $f^{-1}(b) \in S_\mu$ .

**Определение (критерий измеримости действительных функций):**

Действительная функция  $f(x)$  измерима  $\Leftrightarrow$

$$\begin{aligned} \forall C \in R \quad f^{-1}(b) = f^{-1}(-\infty, C) \text{ — измерима} \\ \text{или} \\ \{x : f(x) < C\} \end{aligned}$$

## 2.2 Случайная величина. Виды случайных величин (дискретная и абсолютно непрерывная).

### Определение случайной величины:

Пусть  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  — вероятностное пространство. Случайной величиной называется вещественно значащая функция  $\xi$  такая, что

$$\xi : \Omega \rightarrow R \quad \forall x \in R \quad \{w : \xi(w) < x\} \in \mathcal{F}$$

### Определение дискретной случайной величины:

Дискретной случайной величиной называется случайная величина  $\xi$ , множество значений которой конечно или счётно, то есть

$$\xi \in \{x_1, x_2, \dots\}$$

### Определение абсолютно непрерывной случайной величины:

Абсолютно непрерывной случайной величиной называется случайная величина  $\xi$ , такая, что

$$F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x f_\xi(t) dt$$

## 2.3 Функция распределения и её свойства.

### Определение функции распределения:

Функцией распределения вероятностей случайной величины  $\xi$  называется функция  $F_\xi(x) = P\{w : \xi(w) < x\}$

### Свойства функции распределения:

1.  $0 \leq F_\xi(x) \leq 1 \quad \forall x \in R;$
2.  $F_\xi(x)$  — неубывающая, непрерывная слева функция;
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_\xi(x) = 1$   
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_\xi(x) = 0;$
4.  $P\{a \leq \xi < b\} = F_\xi(b) - F_\xi(a);$
5.  $P\{\xi = x_0\} = F_\xi(x_0 + 0) - F_\xi(x_0).$

## 2.4 Теорема о существовании случайной величины, соответствующей функции со свойствами функции распределения.

**Теорема (о существовании случайной величины, заданной функцией распределения):**

Пусть  $F(x)$  принимает значение на  $[0, 1]$ , неубывающая и  $F(-\infty) = 0$ ,  $F(+\infty) = 1$ . Тогда  $\exists$  вероятностное пространство  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  и  $\xi$  на нём, для которой  $P\{\xi < x\} = F(x)$ .

## 2.5 Функция плотности распределения случайной величины и её свойства.

**Определение функции плотности распределения:**

Функцией плотности распределения вероятностей случайной величины  $\xi$  называется функция  $f_\xi(x)$  такая, что:

1.  $\forall x \in R \quad f_\xi(x) \geq 0$ ;
2.  $F'_\xi(x) = f_\xi(x)$ ;
3.  $\int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(x) dx = 1$ ;
4.  $P\{a \leq \xi \leq b\} = \int_a^b f_\xi(x) dx$ .

## 2.6 Дискретная случайная величина. Основные типы дискретных распределений (постановка задачи, закон распределения): распределение Бернулли, равномерное дискретное, биномиальное, пуассоновское, геометрическое распределения.

**Распределение Бернулли ( $\xi \sim \text{Bern}(p)$ ):**

Пусть в множестве  $\Omega$  различают два события  $A$  и  $\bar{A}$ . Случайное событие  $A$  — успех  $P(A) = p$ ,  $\bar{A}$  — неудача  $P(\bar{A}) = q$ .

$A \cup \bar{A} = \Omega$  и  $A \cap \bar{A} = \emptyset$ , следовательно,  $p + q = 1$ .

Пусть  $\xi = 1$ , если наступил успех и  $\xi = 0$ , если наступила неудача. Ряд распределения имеет вид:

$\xi$	0	1
$P$	$p$	$q$

Закон распределения:  $P\{\xi = k\} = p^k q^{1-k}, \quad k \in \{0; 1\}$ .

**Биномиальное распределение** ( $\xi \sim \text{Bin}(n; p)$ ):

Произведено  $n$  независимых, одинаковых, испытаний Бернули.

Вероятность успеха  $p(n) \simeq p$  — почти не зависит от номера испытания.

$\Omega = \{\bar{w} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) : \xi_i \in \{0, 1\}\}$ .

Введём случайную величину  $\xi$  — количество успехов в  $n$  испытаниях Бернули. Тогда  $\xi \in \{0, 1, \dots, n\}$ .

Закон распределения:  $P\{\xi = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}$ .

**Пуассоновское распределение** ( $\xi \sim \text{Pois}(\lambda)$ ):

Произведено большое количество испытаний Бернулли, то есть  $\text{Bin}(n, p)$ , но  $n$  — велико  $\gg 1000$ .

Условие применения пуассоновского приближения:  $p \leq 0, 1; \quad npq \leq 9$ .

$\xi = 0, 1, \dots$

Закон распределения:  $P_n(k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$ , где  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$ .

**геометрическое распределение:**

Испытания производятся до тех пор пока не появится первый успех.

$\xi = 1, 2, \dots$  — количество произведённых испытаний.

Закон распределения:  $P\{\xi = k\} = pq^{k-1} \quad 0 < p < 1 \quad q = 1 - p \quad k = 1, 2, \dots$

**Равномерное дискретное распределение** ( $\xi \sim R(N)$ ):

Конечное множество равновозможных исходов (классическое вероятностное пространство).

$\xi$  — номер наступившего исхода.

$P\{\xi = k\} = \frac{1}{N}; \quad k = \overline{1, N},$

где  $N$  — общее количество исходов.

## 2.7 Равномерное непрерывное распределение (построение функций распределения и плотности, графики).


**Равномерное непрерывное распределение:**

$$\xi \sim R[a, b] \quad (\xi \sim U[a, b])$$

Случайная величина  $\xi$  - ошибка округления измерений „прибором со шкалой“

Построим её распределение:

$$F_{\xi}(x) = P\{\xi \leq x\}$$



Из условия эксперимента следует, что  $f(x) = c = \text{const}$  на  $[a, b]$ , и

$$f(x) = 0, \text{ вне } [a, b]$$

Воспользуемся фактом  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ :

$$\int_{-\infty}^a 0 dx + \int_a^b c dx + \int_b^{\infty} 0 dx = cx \Big|_a^b = c(b-a) = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{b-a}$$

Таким образом, плотность имеет вид:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & ; a < x \leq b \\ 0 & ; x \leq a \text{ или } x > b \end{cases}$$



Построим функ-ию распределения по функ-ии плотности:


Пусть  $x \leq a$ . Тогда  $F_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$

Пусть  $a < x \leq b$ . Тогда  $F_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^a 0 dt + \int_a^x \frac{1}{b-a} dt = \frac{x-a}{b-a}$

Пусть  $x > b$ . Тогда  $F_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^a 0 dt + \int_a^b \frac{1}{b-a} dt + \int_b^x 0 dt = 1$

Функ-ия распределения имеет вид:

$$F_{\xi}(x) = \begin{cases} 0; & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}; & a < x \leq b \\ 1; & x > b \end{cases}$$



## 2.8 Показательное (экспоненциальное) распределение (построение функции распределения, функции плотности, графики, свойство отсутствия последствия)

р-с:  $\xi \sim \Pi(\lambda)$   $\lambda$  - параметр распределения

$\xi$  - время безотказной работы "прибора"

Построим распределение  $\xi$  По условию

$$\xi \geq 0$$

Предположим, что прибор проработал безотказно  $t$  времени

Предположим, что вероятность выйти из строя в интервале  $\Delta t$  времени =  $\lambda \Delta t + o(\Delta t)$

Таким образом,

$$P\{t \leq \xi < t + \Delta t \mid \xi \geq t\} =$$

$$= \frac{P\{(t \leq \xi < t + \Delta t) \cap \xi \geq t\}}{P\{\xi \geq t\}} = \frac{F(t + \Delta t) - F(t)}{1 - F(t)}$$

Воспользуемся предположением и получим

$$\frac{F(t+\Delta t) - F(t)}{\Delta t} = \lambda \Delta t + o(\Delta t)$$

Решая

$$F(t+\Delta t) - F(t) = \lambda (1 - F(t)) \Delta t + o(\Delta t) (1 - F(t)) \quad | : \Delta t$$

$$\frac{F(t+\Delta t) - F(t)}{\Delta t} = \lambda (1 - F(t)) + \frac{o(\Delta t) (1 - F(t))}{\Delta t}$$

$$\Delta t \rightarrow 0$$

$$\frac{dF(t)}{dt} = \lambda (1 - F(t))$$

$$\frac{dF(t)}{1 - F(t)} = \lambda dt$$

$$C_1 | 1 - F(t) | = -\lambda t + C \quad ; \propto F(t) < 1$$

$$1 - F(t) = C_1 e^{-\lambda t}$$

$$F(t) = 1 - C_1 e^{-\lambda t}$$

Заметим, что  $F(t) = P\{\xi < t\}$


$P\{\xi < 0\} = 0$  - начальное условие

$$\text{Тогда } F(0) = 1 - C_1 = 0 \Rightarrow C_1 = 1$$

Таким образом, мы построили функ-ию распределения закона.


Таким образом, функ-ия рас-ия величины  $\xi \sim \Pi(\lambda)$  имеет вид:

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda t}, & t > 0 \end{cases}$$



Функ-ия плотности имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ \lambda e^{-\lambda t}, & t > 0 \end{cases}$$



**Свойство отсутствия последствия:**

Пусть известно, что прибор проработал без отказа  $t$  единиц времени.  $P\{S \geq t\}$

Найдем  $P\{t < S \leq s | S \geq t\} =$

$$= \frac{P\{t < S \leq s \cap S \geq t\}}{P\{S \geq t\}} =$$

$$= \frac{P\{t < S \leq s\}}{P\{S \geq t\}} = \frac{F(s) - F(t)}{1 - F(t)} =$$

$$= \frac{1 - e^{-\lambda s} + 1 - e^{-\lambda t}}{1 - 1 + e^{-\lambda t}} = 1 - e^{-\lambda(s-t)} = F(s-t) = P\{0 \leq S < (s-t)\}$$

