

# Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

## Seminarul 10: Memorie lungă și rough volatility



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

# Acronime folosite în acest material (1/2)

- **ACF**: Autocorrelation Function (funcția de autocorelație)
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- **ARCH**: AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă)
- **ARFIMA**: AutoRegressive Fractionally Integrated Moving Average (model) — model autoregresiv fracționar integrat cu medie mobilă
- **ARMA**: AutoRegressive Moving Average (model) — model autoregresiv cu medie mobilă
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BNR**: Banca Națională a României
- **BUX**: Budapesti Értéktőzsde index (indicele Bursei din Budapesta)
- **CAC**: Cotation Assistée en Continu (CAC 40 index, Paris) — indicele CAC 40 al bursei din Paris
- **DM**: Diebold–Mariano (test) — testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor
- **ELW**: Exact Local Whittle (estimator) — estimatorul local Whittle exact
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **FCVAR**: Fractionally Cointegrated VAR (model VAR cointegrat fracționar)
- **FFT**: Fast Fourier Transform (transformata Fourier rapidă)

# Acronime folosite în acest material (2/2)

- **FIGARCH**: Fractionally Integrated GARCH (GARCH integrat fracționar)
- **FTSE**: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) — furnizorul de indici FTSE Russell
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- **GPH**: Geweke–Porter-Hudak (estimator) — estimatorul Geweke–Porter-Hudak al parametrului de memorie lungă
- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație
- **HAR**: Heterogeneous AutoRegressive (model) — model autoregresiv heterogen
- **LW**: Local Whittle (estimator) — estimatorul local Whittle
- **MSE**: Mean Squared Error (eroarea pătratică medie)
- **OLS**: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- **PX**: Prague Stock Exchange index (index Burzy cenných papírů Praha) — indicele Bursei din Praga
- **QLIKE**: Quasi-LIKElihood loss (pierderea de tip cvasi-verosimilitate)
- **RFSV**: Rough Fractional Stochastic Volatility (model) — modelul de volatilitate stochastică fracționară rugoasă
- **RV**: Realised Variance (varianța realizată)
- **SE**: Standard Error (eroare standard)
- **VECM**: Vector Error Correction Model (model vectorial cu corecția erorii)
- **WIG20**: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

# Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **cum măsurăm, testăm și folosim memoria lungă și neregularitatea volatilității și inflației?**
- Rezultate de obținut
  - răspunsurile la exercițiile A
  - cîte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B
  - analiza cerută în C1 și verdictele asupra răspunsului AI din C2, fiecare cu un rînd de justificare
  - o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

# Harta exercițiilor

| Cerința | Întrebarea | Tipul | Model |
|---|---|---|---|
| A1, A2 | autocorelațiile ARFIMA și media; ponderile fracționare | Rezolvat, Propus | A1 |
| A3, A4 | erorile standard GPH și LW; deplasarea și lățimea de bandă | Rezolvat, Propus | A3 |
| A5, A6 | zgomotul gaussian fracționar; nucleul RFSV | Rezolvat, Propus | A5 |
| A7, A8 | scufundarea circulantă calculată de mînă; schimbarea de regim și memoria lungă aparentă | Rezolvat, Propus | A7, A1 |
| B1, B2 | memoria logaritmului RV pentru FTSE 100; BET și EUR/RON cu testul Qu | Rezolvat, Propus | B1 |
| B3, B4 | neregularitatea Euro Stoxx 50; Bitcoin după intervalul de eșantionare | Rezolvat, Propus | B3 |
| B5, B6 | prognoza RV pentru FTSE 100 și CAC 40 | Rezolvat, Propus | B5 |
| C1, C2 | cointegrarea fracționară a două volatilități; ce este greșit într-un răspuns AI? | Propus | B1, A1–A8 |

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model; soluția se discută la seminar
- Partea A: derivări și calcule pe hîrtie; Partea B: date reale, fiecare exercițiu încheiat cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

# Datele folosite

| Seria | Sursa | Frecvența | Perioada |
|---|---|---|---|
| RV pentru FTSE 100, Euro Stoxx 50, DAX, CAC 40 | Heber et al. (2009) | zilnic, din randamente de 5 minute | 2000–2022 |
| RV pentru Bitcoin | prețuri Binance la un minut | zilnic, 1–60 de minute | 2018–2026 |
| BET | EODHD | zilnic | 2000–2026 |
| EUR/RON | cursul de referință BNR | zilnic | 2005–2026 |

- RV în $\%^2$, randamente în %
- Funcțiile din notebook
  - `gph`, `local_whittle`, `elw`, `qu_stat`, `gjr_scaling`, `h_with_noise`, `rfsv_kernel`, `forecast_rv`, `fcvar_fit`
- Nu este nevoie de cont sau de cheie

# Noțiuni necesare azi (1/24): autocorelația și memoria

- **Autocovarianța** și **autocorelația** unei serii staționare $X_t$ la lagul $k$


$$\gamma(k) = \mathrm{Cov}(X_t, X_{t+k}), \qquad \rho(k) = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)} \in [-1, 1]$$

  - $\gamma(0) = \mathrm{Var} X_t$; staționar: media și $\gamma(k)$ nu depind de $t$
- **Memoria scurtă**: autocorelațiile scad exponențial și sînt sumabile
  - AR(1) $X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t$, $|\phi| < 1$: $\rho(k) = \phi^k$, deci $\sum_k |\rho(k)| < \infty$
  - $\varepsilon_t$: zgomot alb (necorelat, medie 0, varianță $\sigma^2$)
- **Memoria lungă**: descreștere hiperbolică, nesumabilă, un pol spectral în frecvența zero

$$\rho(k) \sim c\, k^{2d-1} \ (k \to \infty), \qquad f(\lambda) \sim G \lambda^{-2d} \ (\lambda \to 0), \qquad 0 < d < 1/2$$


  - $d$: parametrul de memorie; $c, G > 0$: constante; $f(\lambda)$: densitatea spectrală la frecvența $\lambda$ (definită mai jos)
  - $a_k \sim b_k$: raportul $a_k / b_k \to 1$; exponentul Hurst $H = d + 1/2$

# Noțiuni necesare azi (2/24): descreșterea hiperbolică față de cea exponențială




- ARFIMA$(0; 0{,}4; 0)$ (definit mai jos) și un AR(1) cu același $\rho(1)$, $\phi = 0{,}67$; ambele simulate, $n = 1000$
- La lagul 100: $\rho = 0{,}27$ pentru ARFIMA, practic 0 pentru AR(1); pe scări logaritmice ACF hiperbolică este o dreaptă cu panta $2d - 1$
- Traiectoria ARFIMA se abate de la medie în episoade lungi

# Noțiuni necesare azi (3/24): varianța mediei de eșantion




- Pentru orice serie staționară

$$\mathrm{Var}(\bar{X}_n) = \frac{1}{n} \sum_{|k|<n} \Big(1 - \frac{|k|}{n}\Big)\gamma(k)$$

  - $\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} X_t$; $n$: mărimea eșantionului
  - i.i.d.: rămîne doar $k = 0$, $\gamma(0)/n$

- Memoria lungă: de ordinul $n^{2d-1}$, nu $n^{-1}$
  - raportul din grafic crește ca $n^d$
  - $n = 1000$: 1,9; 5,3; 15,3 pentru $d = 0{,}1$; 0,25; 0,4
  - eroarea standard i.i.d. este de atîtea ori prea mică


# Noțiuni necesare azi (4/24): operatorul lag și diferențierea fracționară

- **Operatorul lag** $L$: $LX_t = X_{t-\mathbf{1}}$, $L^k X_t = X_{t-k}$; diferența de ordinul întîi $(1-L)X_t = X_t - X_{t-\mathbf{1}}$
- **Diferența fracționară**: seria binomială a lui $(1-L)^d$ pentru $d$ real

$$(1-L)^d X_t = \sum_{k=\mathbf{0}}^{\infty} \pi_k X_{t-k}, \qquad \pi_{\mathbf{0}} = 1, \quad \pi_k = \pi_{k-\mathbf{1}} \frac{k-1-d}{k}$$

  - $\pi_k$: ponderea lui $X_{t-k}$; $d = 1$: $\pi_{\mathbf{1}} = -1$, $\pi_k = 0$ pentru $k \geq 2$ (diferența obișnuită)
  - $0 < d < 1$: intră toate valorile trecute, cu ponderile $\pi_k \sim k^{-d-\mathbf{1}}/\Gamma(-d)$
  - $\Gamma(z) = \int_{\mathbf{0}}^{\infty} u^{z-\mathbf{1}} e^{-u} du$: funcția gamma, $\Gamma(n) = (n-1)!$; $\Gamma(-d) < 0$ pentru $0 < d < 1$
  - $\sum_k \pi_k = (1-1)^d = 0$: un nivel constant este eliminat doar de filtrul infinit

# Noțiuni necesare azi (5/24): ponderile fracționare




- Stînga: $\pi_{\mathbf{1}} = -d$, apoi ponderi negative mici, care scad lent
- Dreapta: pe scări logaritmice $|\pi_k|$ este o dreaptă cu panta $-(d+1)$: o descreștere hiperbolică, nu exponențială
- Un filtru trunchiat după $K$ laguri omite coada ponderilor

# Noțiuni necesare azi (6/24): modelul ARFIMA

- **ARFIMA**$(0, d, 0)$ Hosking (1981): zgomot alb după diferențierea fracționară

$$(1-L)^d X_t = \varepsilon_t, \qquad -\tfrac{1}{2} < d < \tfrac{1}{2} \text{ (staționar și inversabil)}$$

  - $d > 0$: memorie lungă; $d < 0$: antipersistență ($\sum_k \rho(k) = 0$); $d \geq 1/2$: nestaționar
- Autocorelațiile: o recursie și limita ei

$$\rho(0) = 1, \quad \rho(k) = \rho(k-1)\frac{k-1+d}{k-d}, \qquad \rho(k) \sim \frac{\Gamma(1-d)}{\Gamma(d)} k^{2d-1}$$

- **ARFIMA**$(1, d, 0)$: $(1-\phi L)(1-L)^d X_t = \varepsilon_t$
  - $\phi$: coeficientul AR, $|\phi| < 1$; modifică lagurile mici, $d$ pe cele mari
  - ARFIMA$(p, d, q)$: un ARMA$(p, q)$ pentru $(1-L)^d X_t$

# Noțiuni necesare azi (7/24): densitatea spectrală și periodograma

- **Densitatea spectrală**: varianța lui $X_t$ descompusă pe frecvențe

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \gamma(k) e^{-i\lambda k}, \qquad \gamma(0) = \int_{-\pi}^{\pi} f(\lambda)\, d\lambda$$

  - $\lambda \in [-\pi, \pi]$: frecvența unghiulară, un ciclu de $2\pi/\lambda$ perioade; $\lambda$ mic: cicluri lungi
  - ARFIMA$(0, d, 0)$: $f(\lambda) = \frac{\sigma^2}{2\pi} \left(4 \sin^2(\lambda/2)\right)^{-d} \sim \frac{\sigma^2}{2\pi} \lambda^{-2d}$

- **Periodograma** în frecvențele Fourier: corespondentul de eșantion al lui $f$

$$I(\lambda_j) = \frac{1}{2\pi n} \left| \sum_{t=1}^{n} X_t e^{-i\lambda_j t} \right|^2, \qquad \lambda_j = \frac{2\pi j}{n}, \quad j = 1, \ldots, \lfloor n/2 \rfloor$$

  - $I(\lambda_j)/f(\lambda_j)$ are aproximativ distribuția exponențială cu media 1, independent între $j$: foarte zgomotoasă
  - lățimea de bandă $m$: numărul frecvențelor celor mai joase $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ folosite pentru estimarea lui $d$; $m \to \infty$, $m/n \to 0$


# Noțiuni necesare azi (8/24): estimatorul GPH

- **GPH** Geweke și Porter-Hudak (1983): logaritmăm $I(\lambda_j) \approx f(\lambda_j)\,\xi_j$ lîngă zero și aplicăm OLS

$$\log I(\lambda_j) = a + d\left[-\log\left(4\sin^2(\lambda_j/2)\right)\right] + u_j, \qquad j = 1, \ldots, m$$

  - $\xi_j$: eroarea exponențială cu media 1; $u_j = \log \xi_j - \mathbb{E}\log \xi_j$; $a$: termenul liber
  - $\hat{d}$: panta OLS; regresorul $\approx -2\log\lambda_j$, deci panta pe scări logaritmice este $-2d$
- Eroarea standard asimptotică
  - $\mathrm{Var} u_j = \pi^2/6$, iar regresorul are varianța $\approx 4$: $\mathrm{SE}(\hat{d}) = \pi/\sqrt{24m}$
  - $\sqrt{m}(\hat{d} - d) \to N(0, \pi^2/24)$; intervalul de 95%: $\hat{d} \pm 1{,}96\,\mathrm{SE}$
- Precizia crește doar cu $\sqrt{m}$, nu cu $\sqrt{n}$: estimarea lui $d$ cere eșantioane lungi

# Noțiuni necesare azi (9/24): logaritmul periodogramei lîngă zero




- ARFIMA$(0; 0{,}35; 0)$ simulat, $n = 4096$
- Cele $m = n^{\mathbf{0{,}65}} = 222$ ordonate cele mai joase (închise) se așază în jurul unei drepte
  - GPH: $\hat{d} = 0{,}46$; local Whittle: 0,44
  - ambele la mai puțin de două erori standard de $d = 0{,}35$
- Dispersia în jurul dreptei este zgomotul exponențial $\xi_j$: nu scade cu $n$
- Departe de zero (punctele deschise), dinamica de termen scurt curbează $f$: trebuie lăsată în afara regresiei


# Noțiuni necesare azi (10/24): estimatorul local Whittle

- **Local Whittle** Robinson (1995b): verosimilitatea gaussiană a lui $f(\lambda_j) = G\lambda_j^{-2d}$ pe cele $m$ frecvențe joase

$$\hat{d} = \arg\min_d R(d), \qquad R(d) = \log \hat{G}(d) - \frac{2d}{m}\sum_{j=1}^{m} \log \lambda_j, \quad \hat{G}(d) = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} \lambda_j^{2d} I(\lambda_j)$$

  - $\hat{G}(d)$: nivelul $G$ cel mai potrivit pentru un $d$ dat; $R(d)$: funcția obiectiv profilată (o potrivire de tip QLIKE)
- Inferența
  - $\sqrt{m}(\hat{d} - d) \to N(0, 1/4)$: $\mathrm{SE} = 1/(2\sqrt{m})$, mai mică decît la GPH pentru același $m$
  - eficiența relativă: raportul celor două variațe asimptotice, $(\pi^2/24)/(1/4)$
  - consistent pentru $-1/2 < d \leq 1$; pentru $d > 1$ converge la 1
- **Local Whittle exact** (ELW) Shimotsu și Phillips (2005), Shimotsu (2010)
  - înlocuiește $\lambda_j^{2d} I(\lambda_j)$ cu periodograma lui $(1-L)^d(X_t - \hat{\mu})$, $\hat{\mu}$: media estimată
  - $N(d, 1/(4m))$ pentru orice $d$ din intervalul de căutare, și pentru $d \geq 1/2$ (nestaționar)

# Noțiuni necesare azi (11/24): deplasarea și alegerea lățimii de bandă




- Dinamica de termen scurt deplasează $\hat{d}$; pentru ARFIMA$(1, d, 0)$

$$\mathbb{E}\hat{d} - d \approx C\left(\frac{m}{n}\right)^2, \quad C = \frac{2\pi^2}{9} \cdot \frac{2\phi}{(1-\phi)^2}$$

  - $\phi > 0$: deplasare pozitivă, care crește cu $m$
- MSE = deplasarea$^2$ + $\frac{1}{4m}$; minim în

$$m^* = \left(\frac{n^4}{16C^2}\right)^{1/5}$$

  - MSE: eroarea medie pătratică; $m^*$ crește ca $n^{4/5}$
  - graficul: $\phi = 0{,}3$, $n = 2000$: $C = 2{,}69$, $m^* = 169 = n^{0{,}68}$


# Noțiuni necesare azi (12/24): salturi de nivel care imită memoria lungă

- **Lanț Markov cu două stări** $S_t \in \{-1, 1\}$: rămîne în stare cu probabilitatea $q$, trece în cealaltă cu $1 - q$

$$X_t = \mu S_t + \varepsilon_t, \qquad \mathbb{E}(S_t S_{t+k}) = (2q-1)^k$$

  - $\mu$: mărimea nivelului; $\varepsilon_t$: i.i.d. $N(0,1)$, independent de $S$; durata medie a unui regim $1/(1-q)$
  - ACF scade exponențial: memorie scurtă în sens strict
- **Timpul de înjumătățire** al unei descreșteri geometrice $\rho(k) = \rho(0)\, r^k$
  - $k_{\mathbf{1/2}} = \ln 0{,}5 / \ln r$: lagul la care autocorelația s-a înjumătățit
- Salturile rare, rupturile structurale și trendurile lente pun putere în frecvențele cele mai joase Diebold și Inoue (2001)
  - $\hat{d}$ este atunci mare, deși procesul are memorie scurtă: **memorie lungă falsă**

# Noțiuni necesare azi (13/24): o serie simulată cu schimbări de regim




- $q = 0{,}99$ (regimurile durează în medie 100 de perioade), $\mu = 0{,}8$, $n = 4000$
- Local Whittle cu $m = n^{\mathbf{0{,}65}}$ dă $\hat{d} = 0{,}52$, o valoare tipică unei serii cu memorie lungă
- Pe cîteva sute de laguri, descreșterea geometrică lentă nu se distinge de una hiperbolică


# Noțiuni necesare azi (14/24): testul Qu

- **Testul Qu** Qu (2011): $H_0$ memorie lungă staționară, $f(\lambda) = G\lambda^{-2d}$ pe cele $m$ frecvențe joase

$$W = \sup_{r\in[\varepsilon,1]} \Big(\sum_{j=1}^{m} \nu_j^2\Big)^{-1/2} \Big|\sum_{j\le mr} \nu_j \Big(\frac{\lambda_j^{2\hat{d}} I(\lambda_j)}{\hat{G}} - 1\Big)\Big|$$

  - $\hat{d}$, $\hat{G} = \hat{G}(\hat{d})$: estimațiile local Whittle; $\nu_j = \log\lambda_j - \frac{1}{m}\sum_i \log\lambda_i$
  - paranteza este scorul local Whittle la frecvența $j$; suma ei completă este zero în $\hat{d}$
  - $r$: fracțiunea din cele $m$ frecvențe însumate; $\varepsilon$: trimming, primele $\varepsilon m$ sume parțiale se omit
- Interpretarea
  - sub $H_0$, sumele parțiale rămîn mici la orice $r$; salturile de nivel fac ordonatele cele mai joase prea mari: $W$ mare
  - respingem pentru $W$ peste valoarea critică; cu $m = n^{0,7}$, $\varepsilon = 0{,}02$ (simulate): 1,09 (10%), 1,22 (5%), 1,56 (1%)

# Noțiuni necesare azi (15/24): sumele parțiale Qu




- Două serii simulate, $n = 4000$
- ARFIMA$(0; 0{,}35; 0)$: curba rămîne jos
  - $W = 0{,}61$: nu respingem
- Salturi de nivel Markov ($q = 0{,}997$, $\mu = 0{,}8$)
  - $\hat{d}$ arată ca o memorie lungă
  - dar curba sare la $r$ mic: $W = 2{,}85$, respingem la 1%
- O respingere spune doar că memoria lungă staționară nu se potrivește: rupturile, salturile sau trendurile sînt alternative

# Noțiuni necesare azi (16/24): cointegrarea fracționară

- **Cointegrarea fracționară**: $p$ serii, fiecare cu memoria $d$, ale căror combinații $\beta' X_t$ au memoria $d - b$, $b > 0$
- **FCVAR** Johansen și Nielsen (2012): un VECM scris în diferențe fracționare

$$\Delta^d X_t = \alpha\beta' L_b \Delta^{d-b} X_t + \sum_{i=\mathbf{1}}^{k} \Gamma_i \Delta^d L_b^i X_t + \varepsilon_t, \qquad \Delta^d = (1-L)^d, \quad L_b = 1 - \Delta^b$$

  - $\beta$ ($p \times r$): vectorii de cointegrare; $\alpha$ ($p \times r$): vitezele de ajustare; $r$: rangul de cointegrare
  - $L_b$: operatorul lag fracționar (doar valori trecute); $k$: numărul termenilor de termen scurt, $\Gamma_i$ matricele lor; $b = d = 1$: VECM obișnuit
- Estimarea și testele de rang
  - pentru $(d, b)$ fixat: regresia de rang redus Johansen; verosimilitatea profilată: maximizare pe o grilă de $(d, b)$
  - testul trace al rangului $r$ față de $p$: $LR = 2(\ell_p - \ell_r)$, $\ell$: log-verosimilitățile maxime; $\chi^2_{(p-r)^2}$ când $b < 1/2$

# Noțiuni necesare azi (17/24): mișcarea browniană fracționară

- **Mișcarea browniană fracționară** (fBm) $W_t^H$ Mandelbrot și Van Ness (1968): gaussiană, $W_0^H = 0$, medie 0, covarianța

$$\mathbb{E}(W_t^H W_s^H) = \tfrac{1}{2}\left(t^{2H} + s^{2H} - |t-s|^{2H}\right), \qquad \mathbb{E}|W_{t+\Delta}^H - W_t^H|^2 = \Delta^{2H}$$


  - $H \in (0,1)$: exponentul Hurst; $H = 1/2$: mișcarea browniană, creșteri independente
  - $H < 1/2$: traiectorii neregulate (rough), creșteri corelate negativ; $H > 1/2$: traiectorii netede, creșteri persistente

- **Zgomotul gaussian fracționar** (fGn): creșterile unitare $W_{t+1}^H - W_t^H$

$$\gamma_k = \rho(k) = \tfrac{1}{2}\left(|k+1|^{2H} - 2|k|^{2H} + |k-1|^{2H}\right)$$

  - $\rho(1) = 2^{2H-1} - 1$; pentru $H > 1/2$, $\rho(k) \sim H(2H-1)k^{2H-2}$: memorie lungă cu $d = H - 1/2$

# Noțiuni necesare azi (18/24): traiectorii neregulate și netede




- Stînga: traiectorii fBm din aceleași numere aleatoare pentru $H = 0{,}1;\ 0{,}5;\ 0{,}8$
- Dreapta: $H = 0{,}1$ dă $\rho(1) \approx -0{,}43$ și aproape nimic dincolo: traiectoria revine imediat
- $H = 0{,}8$: autocorelații pozitive care scad lent, memoria lungă din cadrele anterioare

# Noțiuni necesare azi (19/24): scufundarea circulantă

- **Scopul**: simularea exactă a $n$ puncte dintr-o serie gaussiană staționară cu autocovariațele $\gamma_0, \ldots, \gamma_{n-1}$
  - factorizarea Cholesky a covarianței $n \times n$ costă $O(n^3)$
- **Davies–Harte** Davies și Harte (1987): covarianța se scufundă într-o matrice circulantă de dimensiune $M = 2(n-1)$

$$c = (\gamma_0, \gamma_1, \ldots, \gamma_{n-1}, \gamma_{n-2}, \ldots, \gamma_1), \qquad \lambda_k = \sum_{j=0}^{M-1} c_j e^{-2\pi ijk/M}$$

  - circulantă: fiecare rînd este cel anterior deplasat cu o poziție; $c$: primul ei rînd
  - $\lambda_k$: valorile ei proprii, FFT (transformata Fourier rapidă) a lui $c$, reale pentru că $c$ este simetric
  - dacă toate $\lambda_k \geq 0$: $Y = \mathrm{FFT}\left(\sqrt{\lambda/M}\, Z\right)$, $Z$ gaussian complex; primele $n$ valori au covarianța dorită
  - cost $O(n \log n)$; pentru fGn, toate $\lambda_k \geq 0$ pentru orice $H$

# Noțiuni necesare azi (20/24): varianța realizată și scalarea momentelor

- **Varianța realizată** a zilei $t$ din $N_t$ randamente intraday $r_{t,i}$ (de exemplu, de 5 minute)

$$RV_t = \sum_{i=\mathbf{1}}^{N_t} r_{t,i}^{\mathbf{2}}, \qquad \sigma_t = \sqrt{RV_t}$$


  - o măsură zgomotoasă a variației zilnice; mai puține randamente pe zi: o eroare de măsurare mai mare

- **Scalarea momentelor** Gatheral, Jaisson și Rosenbaum (2018): pentru $\log \sigma_t = \nu W_t^H$, momentele creșterilor sînt legi putere

$$m(q, \Delta) = \frac{1}{N} \sum_t |\log \sigma_{t+\Delta} - \log \sigma_t|^q \propto \Delta^{\zeta_q}, \qquad \zeta_q = qH$$

  - $q$: ordinul momentului; $\Delta$: lagul în zile; $N$: numărul de perechi; $\nu$: volatilitatea volatilității (vol-of-vol)
  - $\zeta_q$: panta lui $\log m(q, \Delta)$ în funcție de $\log \Delta$; apoi $\hat{H} = \sum_q q\zeta_q / \sum_q q^{\mathbf{2}}$ (regresie prin origine)
  - o eroare de măsurare i.i.d. cu varianța $s^{\mathbf{2}}$ adaugă un termen liber: $m(2, \Delta) = \nu^{\mathbf{2}} \Delta^{\mathbf{2}H} + 2s^{\mathbf{2}}$

# Noțiuni necesare azi (21/24): regresia de scalare




- Logaritmul volatilității zilnice simulat, $0{,}3\, W_t^H$ cu $H = 0{,}12$, 4000 de zile, fără eroare de măsurare
- Stînga: drepte pe scări logaritmice, cîte una pentru fiecare $q$; dreapta: pantele stau pe o dreaptă prin origine, $\hat{H} = 0{,}112$
- Abaterile de la liniaritate în $q$ (multifractalitate, creșteri cu cozi groase) apar la $q$ mare

# Noțiuni necesare azi (22/24): HAR, FIGARCH și prognozele lognormale

- **HAR** Corsi (2009): mediile zilnică, săptămînală și lunară ale trecutului, $y_t = \log RV_t$

$$y_{t+h} = \beta_{\mathbf{0}} + \beta_d y_t + \beta_w \bar{y}_t^{(\mathbf{5})} + \beta_m \bar{y}_t^{(\mathbf{22})} + u_{t+h}, \qquad \bar{y}_t^{(K)} = \frac{1}{K} \sum_{j=\mathbf{0}}^{K-\mathbf{1}} y_{t-j}$$

  - $h$: orizontul; OLS; un AR(22) cu memorie scurtă și ponderi restricționate, care imită memoria lungă


- **FIGARCH** Baillie, Bollerslev și Mikkelsen (1996): varianța GARCH cu o diferență fracționară a pătratelor șocurilor $e_t^{\mathbf{2}}$

$$\sigma_t^{\mathbf{2}} = \omega + \left[1 - (1-\beta L)^{-\mathbf{1}}(1-\varphi L)(1-L)^d\right] e_t^{\mathbf{2}}$$

  - $\omega > 0$, $\beta$, $\varphi$: coeficienți de tip GARCH; paranteza este un filtru ARCH($\infty$) cu ponderile de sumă unu

- **Corecția lognormală**: modelele prognozează $\log RV$, ținta este $RV$
  - dacă $\log RV_{t+h} \sim N(\mu, s^{\mathbf{2}})$: $\mathbb{E}RV_{t+h} = e^{\mu + s^{\mathbf{2}}/\mathbf{2}}$; doar $e^{\mu}$ este mediana, prea mică

# Noțiuni necesare azi (23/24): predictorul RFSV




- RFSV: $\log \sigma_t = \nu W_t^H$; prognoza este o medie cu nucleu putere a trecutului


$$\widehat{\log \sigma^2_{t+h}} = \sum_k w_k \log \sigma^2_{t-k}$$

  - $w_k \propto \int_k^{k+1} \frac{du}{(u+h)u^{H+1/2}}$, normalizate la suma 1; $h$: orizontul
- Prognoza varianței

$$\exp\left(\widehat{\log \sigma^2_{t+h}} + 2c\nu^2 h^{2H}\right)$$

  - $c = \frac{\Gamma(3/2-H)}{\Gamma(H+1/2)\Gamma(2-2H)}$; $4c\nu^2 h^{2H}$: varianța erorii de prognoză a lui $\log \sigma^2$, înjumătățită ca în corecția lognormală
- Graficul: nucleul pune ponderea cea mai mare pe ultima zi și o coadă lungă și subțire; HAR folosește trei trepte plate

# Noțiuni necesare azi (24/24): QLIKE și testul Diebold–Mariano




- **QLIKE** Patton (2011) pentru o prognoză de varianță $F$

$$\mathrm{QLIKE} = \frac{RV}{F} - \log\frac{RV}{F} - 1 \geq 0$$

  - 0 doar dacă $F = RV$; ordonează corect prognozele deși $RV$ este un proxy zgomotos
  - penalizează mai mult subestimarea (graficul)
- **Testul DM** (Capitolul 1): $\delta_t$ = pierderea modelului 1 minus pierderea modelului 2

$$DM = \frac{\bar{\delta}}{\sqrt{\hat{\Omega}/T}} \to N(0,1)$$

  - $\bar{\delta}$: media pe $T$ prognoze; $\hat{\Omega}$: varianța Newey–West $\hat{\gamma}_0 + 2\sum_{k=1}^{L}(1 - \frac{k}{L+1})\hat{\gamma}_k$ a lui $\delta_t$
  - $DM < -1{,}96$: modelul 1 semnificativ mai bun la 5%

# A1: autocorelațiile ARFIMA și media [Rezolvat]

## Cerință

- ARFIMA$(0; 0{,}3; 0)$.
- 1. Arătați că $\rho(1) = d/(1-d)$ și calculați $\rho(1)$, $\rho(10)$, $\rho(100)$ cu recursia.
- 2. Comparați $\rho(100)$ cu forma ei asimptotică.
- 3. Pentru $n = 1000$, calculați raportul dintre abaterea standard adevărată a lui $\bar{X}$ și formula i.i.d. $\sqrt{\gamma(0)/n}$ (notebook A1).
- Raportați: trei numere; două numere; un număr și o frază.

## Rezolvare

- 1. $\rho(1) = \rho(0) \cdot \frac{0+d}{1-d}$; $\rho(1) = 0{,}429$, $\rho(10) = 0{,}173$, $\rho(100) = 0{,}069$
- 2. Formula asimptotică: 0,069, practic egală deja la $k = 100$
- 3. Raportul 7,55: eroarea standard i.i.d. este de 7,55 ori prea mică
- Interpretare: cu $d = 0{,}3$, 1000 de observații conțin tot atîta informație cît un număr mult mai mic de observații independente; HAC cu lățime de bandă fixă nu poate repara aceasta

Înapoi Lista exercițiilor

# A2: ponderile diferențierii fracționare [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

## Cerință

- $d = 0{,}4$. Model: A1.
- 1. Calculați $\pi_1, \ldots, \pi_5$ pentru $(1 - L)^{0{,}4}$.
- 2. Comparați $\pi_{100}$ cu forma lui asimptotică.
- 3. Calculați $\sum_{k=0}^{1000} \pi_k$; care este limita sumei și ce înseamnă diferența pentru un filtru trunchiat?
- Raportați: cinci numere; două numere; un număr și o frază.

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

# A3: erorile standard GPH și local Whittle [Rezolvat]

## Cerință

- $n = 5000$, $m = \lfloor n^{\mathbf{0,65}} \rfloor$; o estimație local Whittle $\hat{d} = 0{,}45$.
- 1. Calculați $m$ și erorile standard asimptotice GPH și local Whittle.
- 2. Dați intervalul de 95% pentru $d$ și eficiența relativă a LW față de GPH.
- 3. Ce $m$ dă o semilățime de 0,05?
- Raportați: trei numere; un interval și un număr; un număr.

## Rezolvare

- 1. $m = 253$; GPH $\pi/\sqrt{24m} = 0{,}0403$; LW $1/(2\sqrt{m}) = 0{,}0314$
- 2. $[0{,}388; 0{,}512]$; eficiența $(\pi^{\mathbf{2}}/24)/(1/4) = \pi^{\mathbf{2}}/6 = 1{,}645$
- 3. $1{,}96/(2\sqrt{m}) \leq 0{,}05 \Rightarrow m \geq 385$
- Interpretare: intervalul include 1/2, deci staționaritatea nu este stabilită; precizia se obține mărind lățimea de bandă, iar o lățime de bandă mai mare aduce deplasare (A4)

Înapoi Lista exercițiilor

# A4: deplasarea și lățimea de bandă optimă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

## Cerință

- ARFIMA$(1, d, 0)$ cu $\phi = 0{,}5$, $n = 5000$. Model: A3.
- 1. Calculați constanta deplasării $C$.
- 2. Pentru $m = \lfloor n^{\mathbf{0{,}8}} \rfloor$, calculați deplasarea și abaterea standard local Whittle.
- 3. Calculați $m^*$, exponentul $\log m^* / \log n$ și deplasarea și abaterea standard în $m^*$.
- Raportați: un număr; două numere; patru numere și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

# A5: zgomotul gaussian fracționar și scalarea [Rezolvat]

## Cerință

- fGn cu $H = 0{,}1$; $0{,}3$ și $0{,}7$.
- 1. Calculați autocorelațiile fGn $\rho(1)$ și $\rho(2)$ pentru fiecare $H$.
- 2. Calculați $m(2,22)/m(2,1) = 22^{2H}$: cu cît se mișcă mai mult logaritmul volatilității într-o lună decît într-o zi?
- 3. Arătați că $\zeta_q = qH$ pentru fBm.
- Raportați: șase numere; trei numere; o derivare.

## Rezolvare

- 1. $H = 0{,}1$: $-0{,}426$; $-0{,}026$; $H = 0{,}3$: $-0{,}242$; $-0{,}049$; $H = 0{,}7$: $0{,}320$; $0{,}189$
- 2. $1{,}86$; $6{,}39$; $75{,}75$: cu $H = 0{,}1$, varianța modificărilor lunare este sub dublul celei zilnice
- 3. $W^H_{t+\Delta} - W^H_t \sim N(0, \Delta^{2H})$: $\mathbb{E}|\cdot|^q = \Delta^{qH}\mathbb{E}|Z|^q$; logaritmăm
- Interpretare: logaritmul volatilității, neregulat, se mișcă mult de la o zi la alta, dar deviază puțin: corelație negativă puternică a modificărilor zilnice

Înapoi Lista exercițiilor

# A6: nucleul RFSV și corecția variației [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

## Cerință

- $H = 0{,}1$, $\nu = 0{,}3$, orizontul $h = 1$; nucleul trunchiat la 500 de zile. Model: A5.
- 1. Calculați ponderea totală pe ultima zi, pe ultimele 5 și pe ultimele 22 de zile (notebook A6).
- 2. Calculați $c(H)$ și corecția variației pentru $h = 1$; 5; 22.
- 3. Cu cît ar subestima prognoza variației la $h = 22$ ignorarea corecției?
- Raportați: trei ponderi; patru numere; un număr.

# A7: scufundarea circulantă calculată de mînă [Rezolvat]

## Cerință

- Trei puncte de fGn cu $H = 0{,}3$: $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2$.
- 1. Calculați $\gamma_1$ și $\gamma_2$.
- 2. Scrieți primul rînd al matricei circulante $4 \times 4$ și valorile ei proprii $\lambda_k$ ($M = 4$).
- 3. Se poate folosi metoda Davies–Harte?
- Raportați: două numere; un rînd și patru numere; o frază.

## Rezolvare

- 1. $\gamma_1 = \frac{1}{2}(2^{0,6} - 2) = -0{,}2421$,
  $\gamma_2 = \frac{1}{2}(3^{0,6} - 2 \cdot 2^{0,6} + 1) = -0{,}0491$
- 2. $c = (\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_1)$; $\lambda_0 = \gamma_0 + 2\gamma_1 + \gamma_2 = 0{,}4666$,
  $\lambda_1 = \lambda_3 = \gamma_0 - \gamma_2 = 1{,}0491$, $\lambda_2 = \gamma_0 - 2\gamma_1 + \gamma_2 = 1{,}4352$
- 3. Da: toate valorile proprii sînt pozitive, deci matricea circulantă este o covariață validă, iar primele 3 coordonate au covariația fGn
- Interpretare: scufundarea dublează dimensiunea, dar transformă o factorizare $O(n^3)$ în două FFT

Înapoi Lista exercițiilor

# A8: schimbarea de regim și memoria lungă aparentă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

## Cerință


- $X_t = \mu S_t + \varepsilon_t$, $S_t \in \{-1, 1\}$ un lanț Markov care rămîne în stare cu probabilitatea $q = 0{,}995$, $\mu = 1$, $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$. Model: A1.
- 1. Arătați că $\rho(k) = \frac{\mu^2}{\mu^2+1}(2q-1)^k$ și calculați $\rho(1)$, $\rho(100)$, $\rho(500)$.
- 2. Calculați timpul de înjumătățire al autocorelației.
- 3. Ajustați $\log \rho(k)$ pe $\log k$ pentru $k = 5, \ldots, 200$ și transformați panta în $d$.
- Raportați: trei numere; un număr; un număr și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

# B1: memoria variantei realizate pentru FTSE 100 [Rezolvat]

- **Întrebarea**: cît de mare este $d$ pentru logaritmul variantei realizate a FTSE 100 și este el robust la lățimea de bandă și la salturile de nivel?
- **Date**: RV de 5 minute Oxford-Man pentru FTSE 100, $n = 5\,586$ zile pînă la 25 februarie 2022
- **Cerințe**
  1. Estimați $d$ pentru $\log RV$ prin GPH, local Whittle și local Whittle exact pentru $m = n^{0,5}, n^{0,6}, n^{0,7}$, cu erorile standard.
  2. Reprezentați grafic $\hat{d}(m)$ pentru $m = n^{0,40}, \ldots, n^{0,85}$.
  3. Calculați statistica Qu cu $m = n^{0,7}$ și $\varepsilon = 0{,}02$.
  4. Interpretare: este reală memoria volatilității FTSE 100 și este ea staționară?
- **Raportați**: un tabel cu nouă estimații și erorile standard, un grafic, o statistică, o frază
- Notebook: secțiunea B1

# B1: rezolvare (1/2) [Rezolvat]




ATS_ch10_seminar

# B1: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

| $m$ | GPH (SE) | LW | ELW | SE (LW, ELW) |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 0,604 (0,075) | 0,601 | 0,639 | 0,058 |
| 177 | 0,611 (0,048) | 0,578 | 0,603 | 0,038 |
| 419 | 0,620 (0,031) | 0,606 | 0,618 | 0,024 |

- Qu: $W = 0{,}33$ față de valoarea de 10% 1,09: nicio evidență de salturi de nivel
- Interpretare: $\hat{d} \approx 0{,}6$ la orice lățime de bandă, cu $\hat{d}(m)$ plat: memorie lungă reală, la limita staționarității sau puțin dincolo de ea; raportați ELW

ATS_ch10_seminar

# B2: BET și EUR/RON cu testul Qu [Propus]


- **Întrebarea**: este reală memoria lui $|r_t|$ pe piața din București și pentru leu sau provine din schimbări de regim?
- **Date**: BET 2000–2026 și din 2010; EUR/RON (BNR) 2005–2026 și din 2014; model: B1
- **Cerințe**
  1. Estimați $d$ pentru $|r_t|$ prin local Whittle cu $m = n^{\mathbf{0,65}}$ pe eșantionul complet și după data de tăiere.
  2. Calculați statistica Qu ($m = n^{\mathbf{0,7}}$, $\varepsilon = 0{,}02$) pe aceleași eșantioane.
  3. Interpretare: care dintre cele două piețe are memorie lungă reală a volatilității?
- **Raportați**: patru estimații cu erorile standard, patru statistici, o frază
- Notebook: secțiunea B2

# B3: neregularitatea Euro Stoxx 50 [Rezolvat]

- **Întrebarea**: este valabilă scalarea Gatheral–Jaisson–Rosenbaum pentru Euro Stoxx 50 și cît de neregulată este volatilitatea lui?
- **Date**: RV de 5 minute Oxford-Man, $n = 5\,635$ zile; $\sigma_t = \sqrt{RV_t}$; $q = 0{,}5; 1; 1{,}5; 2; 3$; $\Delta = 1, \ldots, 50$
- **Cerințe**
  1. Calculați $m(q, \Delta)$ și pantele $\zeta_q$; estimați $H$ regresînd $\zeta_q$ pe $q$ prin origine.
  2. Estimați $H$ cu termenul liber pentru eroarea de măsurare.
  3. Repetați prima estimație pe cele două jumătăți ale eșantionului.
  4. Interpretare: este $\zeta_q$ liniar în $q$ și ce înseamnă o abatere?
- **Raportați**: cinci pante, trei valori ale lui $H$, $\nu$, o frază
- Notebook: secțiunea B3

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

# B3: rezolvare [Rezolvat]




- $\zeta_q$ = 0,069; 0,132; 0,183; 0,217; 0,218; $\hat{H} = 0{,}093$, $\hat{\nu} = 0{,}38$; cu termenul liber pentru eroare 0,109; jumătățile 0,091 și 0,095
- Interpretare: liniar pînă la $q = 2$, plat între $q = 2$ și 3: momentele mari sînt determinate de cîteva zile extreme (cozi groase ale creșterilor), deci $H$ din $q \leq 2$ este lectura mai sigură; neregularitatea este stabilă în timp

ATS_ch10_seminar

## B4: neregularitatea Bitcoin după intervalul de eșantionare [Propus]

- **Întrebarea**: depinde estimația lui $H$ pentru Bitcoin de intervalul de eșantionare al variației realizate?
- **Date**: RV Binance pentru Bitcoin din randamente de 1, 5, 15, 30 și 60 de minute, 2018–2026; model: B3
- **Cerințe**
  1. Estimați $H$ pentru fiecare RV prin regresia momentelor și cu termenul liber pentru eroare.
  2. Estimați $d$ pentru $\log RV$ prin local Whittle cu $m = n^{\mathbf{0.65}}$.
  3. Interpretare: în ce direcție împinge $H$ o grilă mai rară și de ce?
- **Raportați**: zece valori ale lui $H$, cinci valori ale lui $d$, o frază
- Notebook: secțiunea B4


◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

# B5: prognoza variației realizate pentru FTSE 100 [Rezolvat]

- **Întrebarea**: prognozează un model de tip rough volatility sau unul cu memorie lungă varianța realizată a FTSE 100 mai bine decît HAR?
- **Date**: fereastră mobilă de 1000 de zile, reestimare la fiecare 20 de zile; în afara eșantionului 30 decembrie 2003 – 26 ianuarie 2022 ($T = 4\,565$); orizonturi de 1, 5 și 22 de zile
- **Cerințe**
  1. Prognozați $RV_{t+h}$ cu HAR, ARFIMA$(0, d, 0)$ și RFSV, cu corecțiile lognormale.
  2. Calculați QLIKE mediu al fiecărui model și raportul față de HAR.
  3. Calculați statisticile DM față de HAR.
  4. Interpretare: ce model ați folosi la fiecare orizont?
- **Raportați**: nouă pierderi, șase rapoarte, șase statistici DM, o frază
- Notebook: secțiunea B5

Înapoi Lista exercițiilor

# B5: rezolvare (1/2) [Rezolvat]




ATS_ch10_seminar

# B5: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

| $h$ | QLIKE HAR | ARFIMA / HAR | DM | RFSV / HAR | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,230 | 0,985 | −0,98 | 1,038 | 1,49 |
| 5 | 0,324 | 0,968 | −1,94 | 0,968 | −1,33 |
| 22 | 0,561 | 0,895 | −2,12 | 0,914 | −1,93 |

- Interpretare: HAR la o zi (RFSV este mai slab); la 22 de zile, ARFIMA ($p = 0{,}034$) și RFSV ($p = 0{,}053$) sînt mai bune decît HAR cu aproximativ o zecime; mediana lui $\hat{H}$ mobil $= 0{,}11$

ATS_ch10_seminar

# B6: prognoza variației realizate pentru CAC 40 [Propus]

- **Întrebarea**: se transferă ordonarea de la FTSE 100 la CAC 40?
- **Date**: aceeași schemă, în afara eșantionului 22 decembrie 2003 – 26 ianuarie 2022 ($T = 4\,631$); model: B5
- **Cerințe**
  1. Repetați cele trei prognoze și rapoartele QLIKE.
  2. Calculați statisticile DM față de HAR.
  3. Interpretare: există un singur model cel mai bun pentru ambii indici?
- **Raportați**: șase rapoarte, șase statistici DM, o frază
- Notebook: secțiunea B6

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

# C1: memoria comună a volatilității DAX și CAC 40 [Propus]

- **Întrebarea**: au volatilitățile a două piețe vecine un trend fracționar comun?
- **Date**: logaritmul RV de 5 minute pentru DAX și CAC 40 (Oxford-Man), $n = 5\,600$ zile comune; FCVAR cu $k = 0$; model: B1
- **Cerințe**
  1. Scrieți o preînregistrare de cinci rînduri: ipoteza, modelul, grila $(d, b)$, testele, ce v-ar face să vă schimbați concluzia.
  2. Estimați $d$ pentru fiecare serie și pentru combinația $\beta' X_t$ prin local Whittle, apoi FCVAR prin verosimilitate profilată, cu testele trace.
  3. Interpretare: ce susțin datele și ce ați adăuga modelului?
- **Raportați**: un plan de cinci rînduri, cinci estimații, două teste, un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

# C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI un rezumat despre memoria lungă și rough volatility. Răspunsul:
- (a) Un ARFIMA cu d = 0,3 are autocorelații care scad exponențial, doar mai încet decît un AR(1).
- (b) Eroarea standard a estimatorului local Whittle este pi/sqrt(24m).
- (c) O lățime de bandă m mai mare este întotdeauna mai bună, pentru că varianța scade.
- (d) Dacă testul Qu respinge, seria are rupturi structurale.
- (e) H = 0,1 înseamnă că volatilitatea are memorie scurtă, pentru că H < 0,5 înseamnă antipersistență.
- (f) FIGARCH cu 0 < d < 1 este staționar în covarianță, cu o varianță necondiționată finită.
- (g) Local Whittle exact rămîne consistent pentru d = 1,2, în timp ce local Whittle nu.
- Cerințe
  - 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (secțiunea C2 din notebook).
  - 2. Raportați: o listă de șapte verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Înapoi Lista exercițiilor

## Idei de reținut

- Memoria lungă face erorile standard i.i.d. și HAC mult prea mici
- Local Whittle este alegerea implicită; local Whittle exact cînd $d$ poate depăși $1/2$; variați întotdeauna $m$
- Testați împotriva salturilor de nivel înainte de a afirma memoria lungă
- Logaritmul volatilității este neregulat ($H \approx 0{,}1$) și persistent; proxy-ul influențează $H$
- Cîștigurile de prognoză față de HAR sînt mici și depind de orizont

## După seminar

- Cursul 10 dezvoltă fiecare temă de azi: teoria spectrală, asimptotica estimatorilor, testul Qu, FCVAR, FIGARCH, rough volatility și prognozele ei
- C1 poate deveni un proiect de echipă: memoria comună a volatilităților din Europa Centrală și de Est
- Lectură: Robinson (1995b); Shimotsu și Phillips (2005); Qu (2011); Gatheral, Jaisson și Rosenbaum (2018)
- **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează**

# Bibliografie (1/2)


- Baillie, R. T., Bollerslev, T., & Mikkelsen, H. O. (1996). Fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 74(1), 3–30. doi:10.1016/S0304-4076(95)01749-6
- Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196. doi:10.1093/jjfinec/nbp001
- Davies, R. B., & Harte, D. S. (1987). Tests for Hurst effect. *Biometrika*, 74(1), 95–101. doi:10.1093/biomet/74.1.95
- Diebold, F. X., & Inoue, A. (2001). Long memory and regime switching. *Journal of Econometrics*, 105(1), 131–159. doi:10.1016/S0304-4076(01)00073-2
- Gatheral, J., Jaisson, T., & Rosenbaum, M. (2018). Volatility is rough. *Quantitative Finance*, 18(6), 933–949. doi:10.1080/14697688.2017.1393551
- Geweke, J., & Porter-Hudak, S. (1983). The estimation and application of long memory time series models. *Journal of Time Series Analysis*, 4(4), 221–238. doi:10.1111/j.1467-9892.1983.tb00371.x
- Heber, G., Lunde, A., Shephard, N., & Sheppard, K. K. (2009). Oxford-Man Institutes realized library, version 0.3. Oxford-Man Institute, University of Oxford. web.archive.org
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional differencing. *Biometrika*, 68(1), 165–176. doi:10.1093/biomet/68.1.165

# Bibliografie (2/2)


- Johansen, S., & Nielsen, M. Ø. (2012). Likelihood inference for a fractionally cointegrated vector autoregressive model. *Econometrica*, 80(6), 2667–2732. doi:10.3982/ECTA9299
- Mandelbrot, B. B., & Van Ness, J. W. (1968). Fractional Brownian motions, fractional noises and applications. *SIAM Review*, 10(4), 422–437. doi:10.1137/1010093
- Patton, A. J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256. doi:10.1016/j.jeconom.2010.03.034
- Qu, Z. (2011). A test against spurious long memory. *Journal of Business & Economic Statistics*, 29(3), 423–438. doi:10.1198/jbes.2010.09153
- Robinson, P. M. (1995b). Gaussian semiparametric estimation of long range dependence. *The Annals of Statistics*, 23(5), 1630–1661. doi:10.1214/aos/1176324317
- Shimotsu, K. (2010). Exact local Whittle estimation of fractional integration with unknown mean and time trend. *Econometric Theory*, 26(2), 501–540. doi:10.1017/S0266466609100075
- Shimotsu, K., & Phillips, P. C. B. (2005). Exact local Whittle estimation of fractional integration. *The Annals of Statistics*, 33(4), 1890–1933. doi:10.1214/009053605000000309