



Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Seminarul 10: Memorie lungă și rough volatility



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ARCH: AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă)
- ARFIMA: AutoRegressive Fractionally Integrated Moving Average (model) — model autoregresiv fracționar integrat cu medie mobilă
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- BNR: Banca Națională a României
- BUX: Budapesti Értéktőzsde index (indicele Bursei din Budapesta)
- CAC: Cotation Assistée en Continu (CAC 40 index, Paris) — indicele CAC 40 al bursei din Paris
- DM: Diebold–Mariano (test) — testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor
- ELW: Exact Local Whittle (estimator) — estimatorul local Whittle exact
- EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- FCVAR: Fractionally Cointegrated VAR (model VAR cointegrat fracționar)
- FFT: Fast Fourier Transform (transformata Fourier rapidă)
- FIGARCH: Fractionally Integrated GARCH (GARCH integrat fracționar)
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) — furnizorul de indici FTSE Russell
- GPH: Geweke–Porter–Hudak (estimator) — estimatorul Geweke–Porter–Hudak al parametrului de memorie lungă
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație
- HAR: Heterogeneous AutoRegressive (model) — model autoregresiv heterogen
- LW: Local Whittle (estimator) — estimatorul local Whittle
- MSE: Mean Squared Error (eroarea pătratică medie)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- PX: Prague Stock Exchange index (index Burzy cenných papírů Praha) — indicele Bursei din Praga
- QLIKE: Quasi-LIKelihood loss (pierdere de tip cvasi-verosimilitate)
- RFSV: Rough Fractional Stochastic Volatility (model) — modelul de volatilitate stohastică fracționară rugoasă
- RV: Realised Variance (varianța realizată)
- SE: Standard Error (eroare standard)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **WIG20: Warszawski Indeks Giełdowy 20** (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cum măsurăm, testăm și folosim memoria lungă și rugozitatea volatilității și inflației?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 10: secțiunea „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
 - ▶ Partea A: autocorelațiile ARFIMA, ponderile fracționare, erorile standard și deplasarea estimatorilor, zgomotul gaussian fracționar, nucleul RFSV, scufundarea circulantă, schimbările de regim care imită memoria lungă
 - ▶ Partea B: memoria varianței realizate pentru FTSE 100, BET și EUR/RON; rugozitatea pentru Euro Stoxx 50 și Bitcoin; prognoza varianței realizate pentru FTSE 100 și CAC 40
 - ▶ Partea C: memoria comună a volatilității DAX și CAC 40; un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	autocorelațiile ARFIMA și media; ponderile fracționare	Rezolvat,	A1
A3, A4	erorile standard GPH și LW; deplasarea și lățimea de bandă	Propus	
A5, A6	zgomotul gaussian fracționar; nucleul RFSV	Rezolvat,	A3
A7, A8	scufundarea circulantă de mînă; schimbări de regim care imită memoria lungă	Propus	
B1, B2	memoria logaritmului RV pentru FTSE 100; BET și EUR/RON cu testul Qu	Rezolvat,	A5
B3, B4	rugozitatea Euro Stoxx 50; Bitcoin după intervalul de eșantionare	Propus	
B5, B6	prognoza RV pentru FTSE 100 și CAC 40	Rezolvat,	A7, A1
C1, C2	cointegrarea fracționară a două volatilități; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	
		Propus	B1
			B3
			B5
			B1, A1–A8

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
RV pentru FTSE 100, Euro Stoxx 50, DAX, CAC 40	Heber et al. (2009)	zilnic, din randamente de 5 minute	2000–2018
RV pentru Bitcoin	prețuri Binance la un minut	zilnic, 1–60 de minute	2018–
BET	EODHD	zilnic	2000–
EUR/RON	cursul de referință BNR	zilnic	2005–

- RV în $\%^2$, randamente în %; în notebook: `gph`, `local_whittle`, `elw`, `qu_stat`, `gjr_scaling`, `h_with_noise`, `rfsv_kernel`, `forecast_rv`, `fcvar_fit`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/4): memoria lungă

- Memoria lungă: $\rho(k) \sim c k^{2d-1}$ și $f(\lambda) \sim G\lambda^{-2d}$ lângă zero, $0 < d < 1/2$; exponentul Hurst $H = d + 1/2$
 - ARFIMA(0, d , 0): $(1 - L)^d X_t = \varepsilon_t$; $(1 - L)^d = \sum_k \pi_k L^k$, $\pi_0 = 1$, $\pi_k = \pi_{k-1}(k - 1 - d)/k$ [Hosking \(1981\)](#)
 - $\rho(k) = \rho(k-1)(k-1+d)/(k-d)$, $\rho(k) \sim \frac{\Gamma(1-d)}{\Gamma(d)} k^{2d-1}$; $\pi_k \sim k^{-d-1}/\Gamma(-d)$
- Varianța mediei: $\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{1}{n} \sum_{|k| < n} (1 - |k|/n) \gamma(k)$, de ordinul n^{2d-1} , nu n^{-1}
- Periodograma $I(\lambda_j) = \frac{1}{2\pi n} |\sum_t X_t e^{-i\lambda_j t}|^2$ în frecvențele Fourier $\lambda_j = 2\pi j/n$; lățimea de bandă m : numărul de frecvențe joase folosite

Noțiuni necesare azi (2/4): estimatorii lui d

- ▣ **GPH** Geweke și Porter-Hudak (1983): OLS al lui $\log I(\lambda_j)$ pe $-\log(4 \sin^2(\lambda_j/2))$, $j \leq m$; SE $\pi/\sqrt{24m}$
- ▣ **Local Whittle** Robinson (1995b): $\hat{d} = \arg \min_d \log \left(\frac{1}{m} \sum_j \lambda_j^{2d} I(\lambda_j) \right) - \frac{2d}{m} \sum_j \log \lambda_j$; SE $1/(2\sqrt{m})$
 - ▶ **local Whittle exact** Shimotsu și Phillips (2005), Shimotsu (2010): periodograma lui $(1-L)^d(X_t - \hat{\mu})$ în loc de $\lambda_j^{2d} I(\lambda_j)$; valabil și pentru $d \geq 1$
- ▣ Deplasarea pentru ARFIMA(1, d , 0): $\mathbb{E}\hat{d} - d \approx C(m/n)^2$, $C = \frac{2\pi^2}{9} \cdot \frac{2\phi}{(1-\phi)^2}$; m optim în MSE:
 $m^* = (n^4/(16C^2))^{1/5}$

Noțiuni necesare azi (3/4): rupturi și memorie comună

- Salturile de nivel, rupturile și schimbările rare de regim creează un pol spectral: $\hat{d}$ este mare, deși procesul are memorie scurtă [Diebold și Inoue \(2001\)](#)
 - ▶ **testul Qu Qu (2011):** $W = \sup_{r \in [\varepsilon, 1]} (\sum_j \nu_j^2)^{-1/2} |\sum_{j \leq mr} \nu_j (\lambda_j^{2\hat{d}} I(\lambda_j) / \hat{G} - 1)|$, $\nu_j = \log \lambda_j - \overline{\log \lambda}$; respingem memoria lungă staționară pentru W mare
 - ▶ $m = n^{0,7}$, $\varepsilon = 0,02$; valori critice simulate (10%, 5%, 1%): 1,09; 1,22; 1,56
- **FCVAR Johansen și Nielsen (2012):** $\Delta^d X_t = \alpha \beta' L_b \Delta^{d-b} X_t + \varepsilon_t$, $L_b = 1 - \Delta^b$; $\beta' X_t$ are memoria $d - b$
 - ▶ pentru (d, b) fixat: regresia de rang redus Johansen; testele trace $\chi^2_{(p-r)^2}$ când $b < 1/2$

Noțiuni necesare azi (4/4): rough volatility

- fBm W^H : $\mathbb{E}|W_{t+\Delta}^H - W_t^H|^2 = \Delta^{2H}$; creșterile (fGn) $\rho(k) = \frac{1}{2}(|k+1|^{2H} - 2|k|^{2H} + |k-1|^{2H})$ Mandelbrot și Van Ness (1968)
 - scufundarea circulantă Davies și Harte (1987): primul rînd $(\gamma_0, \dots, \gamma_{n-1}, \gamma_{n-2}, \dots, \gamma_1)$, valorile proprii = FFT al rîndului; exactă dacă toate sînt ≥ 0
- Gatheral, Jaisson și Rosenbaum (2018): $m(q, \Delta) = \text{media } |\log \sigma_{t+\Delta} - \log \sigma_t|^q \propto \Delta^{\zeta_q}$, $\zeta_q = qH$, $\sigma_t = \sqrt{RV_t}$; cu eroare i.i.d.: $m(2, \Delta) = \nu^2 \Delta^{2H} + 2s^2$
- Predictorul RFSV: $\widehat{\log \sigma_{t+h}^2} = \sum_k w_k \log \sigma_{t-k}^2$, $w_k \propto \int_k^{k+1} \frac{du}{(u+h)u^{H+1/2}}$; varianța: $\exp(\cdot + 2c\nu^2 h^{2H})$,
 $c = \frac{\Gamma(3/2-H)}{\Gamma(H+1/2)\Gamma(2-2H)}$
 - pierderea QLIKE $RV/F - \log(RV/F) - 1$ Patton (2011); testul DM cu varianță Newey–West (Capitolul 1)

A1: autocorelațiile ARFIMA și media [Rezolvat]

Cerință

- ▣ ARFIMA(0; 0,3; 0).
- ▣ 1. Arătați că $\rho(1) = d/(1-d)$ și calculați $\rho(1)$, $\rho(10)$, $\rho(100)$ cu recursia.
- ▣ 2. Comparați $\rho(100)$ cu $\frac{\Gamma(1-d)}{\Gamma(d)} 100^{2d-1}$.
- ▣ 3. Pentru $n = 1000$, calculați raportul dintre abaterea standard adevărată a lui $\bar{X}$ și formula i.i.d. $\sqrt{\gamma(0)/n}$ (notebook A1).
- ▣ Raportați: trei numere; două numere; un număr și o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $\rho(1) = \rho(0) \cdot \frac{0+d}{1-d}$; $\rho(1) = 0,429$, $\rho(10) = 0,173$, $\rho(100) = 0,069$
- ▣ 2. Formula asimptotică: 0,069, practic egală deja la $k = 100$
- ▣ 3. Raportul 7,55: eroarea standard i.i.d. este de 7,55 ori prea mică
- ▣ Interpretare: cu $d = 0,3$, 1000 de observații conțin informația mult mai puținor observații independente; HAC cu lățime de bandă fixă nu poate repara aceasta

A2: ponderile diferențierii fracționare [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ $d = 0,4$. Model: A1.
- ▣ 1. Calculați $\pi_1, \dots, \pi_5$ pentru $(1 - L)^{0,4}$.
- ▣ 2. Comparați π_{100} cu $100^{-d-1}/\Gamma(-d)$.
- ▣ 3. Calculați $\sum_{k=0}^{1000} \pi_k$; care este limita sumei și ce înseamnă diferența pentru un filtru trunchiat?
- ▣ Raportați: cinci numere; două numere; un număr și o frază.

A3: erorile standard GPH și local Whittle [Rezolvat]

Cerință

- $n = 5000$, $m = \lfloor n^{0,65} \rfloor$; o estimatie local Whittle $\hat{d} = 0,45$.
- 1. Calculați m și erorile standard asimptotice GPH și local Whittle.
- 2. Dați intervalul de 95% pentru d și eficiența relativă a LW față de GPH.
- 3. Ce m dă o semilățime de 0,05?
- Raportați: trei numere; un interval și un număr; un număr.

Rezolvare

- 1. $m = 253$; GPH $\pi/\sqrt{24m} = 0,0403$; LW $1/(2\sqrt{m}) = 0,0314$
- 2. $[0,388; 0,512]$; eficiența $(\pi^2/24)/(1/4) = \pi^2/6 = 1,645$
- 3. $1,96/(2\sqrt{m}) \leq 0,05 \Rightarrow m \geq 385$
- Interpretare: intervalul include $1/2$, deci staționaritatea nu este stabilită; precizia se cumpără cu lățime de bandă, iar lățimea de bandă costă deplasare (A4)

A4: deplasarea și lățimea de bandă optimă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ ARFIMA(1, d , 0) cu $\phi = 0,5$, $n = 5000$. Model: A3.
- ▣ 1. Calculați constanta deplasării C .
- ▣ 2. Pentru $m = \lfloor n^{0,8} \rfloor$, calculați deplasarea și abaterea standard local Whittle.
- ▣ 3. Calculați m^* , exponentul $\log m^* / \log n$ și deplasarea și abaterea standard în m^* .
- ▣ Raportați: un număr; două numere; patru numere și o frază.

A5: zgomotul gaussian fracționar și scalarea [Rezolvat]

Cerință

- ▣ fGn cu $H = 0,1; 0,3$ și $0,7$.
- ▣ 1. Calculați $\rho(1) = 2^{2H-1} - 1$ și $\rho(2)$ pentru fiecare H .
- ▣ 2. Calculați $m(2, 22)/m(2, 1) = 22^{2H}$: cu cît se mișcă mai mult logaritmul volatilității într-o lună decît într-o zi?
- ▣ 3. Arătați că $\zeta_q = qH$ pentru fBm.
- ▣ Raportați: șase numere; trei numere; o derivare.

Rezolvare

- ▣ 1. $H = 0,1$: $-0,426$; $-0,026$; $H = 0,3$: $-0,242$; $-0,049$;
 $H = 0,7$: $0,320$; $0,189$
- ▣ 2. $1,86$; $6,39$; $75,75$: cu $H = 0,1$, varianța modificărilor lunare este sub dublul celei zilnice
- ▣ 3. $W_{t+\Delta}^H - W_t^H \sim N(0, \Delta^{2H})$: $\mathbb{E}|\cdot|^q = \Delta^{qH} \mathbb{E}|Z|^q$; logaritmăm
- ▣ Interpretare: logaritmul volatilității rugos se mișcă mult de la o zi la alta, dar deviază puțin: corelație negativă puternică a modificărilor zilnice

A6: nucleul RFSV și corecția varianței [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ $H = 0,1$, $\nu = 0,3$, orizontul $h = 1$; nucleul trunchiat la 500 de zile. Model: A5.
- ▣ 1. Calculați ponderea totală pe ultima zi, pe ultimele 5 și pe ultimele 22 de zile (notebook A6).
- ▣ 2. Calculați $c(H)$ și corecția $2c\nu^2h^{2H}$ pentru $h = 1; 5; 22$.
- ▣ 3. Cu cît ar subestima prognoza varianței la $h = 22$ ignorarea corecției?
- ▣ Raportați: trei ponderi; patru numere; un număr.

A7: scufundarea circulantă de mîină [Rezolvat]

Cerință

- Trei puncte de fGn cu $H = 0,3$: $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2$.
- 1. Calculați γ_1 și γ_2 .
- 2. Scrieți primul rînd al matricei circulante 4×4 și valorile ei proprii $\lambda_k = \sum_j c_j e^{-2\pi ijk/4}$.
- 3. Se poate folosi metoda Davies–Harte?
- Raportați: două numere; un rînd și patru numere; o frază.

Rezolvare

- 1. $\gamma_1 = \frac{1}{2}(2^{0,6} - 2) = -0,2421$,
 $\gamma_2 = \frac{1}{2}(3^{0,6} - 2 \cdot 2^{0,6} + 1) = -0,0491$
- 2. $c = (\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_1)$; $\lambda_0 = \gamma_0 + 2\gamma_1 + \gamma_2 = 0,4666$,
 $\lambda_1 = \lambda_3 = \gamma_0 - \gamma_2 = 1,0491$, $\lambda_2 = \gamma_0 - 2\gamma_1 + \gamma_2 = 1,4352$
- 3. Da: toate valorile proprii sînt pozitive, deci matricea circulantă este o covarianță validă, iar primele 3 coordonate au covarianța fGn
- Interpretare: scufundarea dublează dimensiunea, dar transformă o factorizare $O(n^3)$ în două FFT

A8: schimbări de regim care imită memoria lungă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar


Cerință

- ▣ $X_t = \mu S_t + \varepsilon_t$, $S_t \in \{-1, 1\}$ un lanț Markov care rămîne în stare cu probabilitatea $q = 0,995$, $\mu = 1$, $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$. Model: A1.
- ▣ 1. Arătați că $\rho(k) = \frac{\mu^2}{\mu^2 + 1} (2q - 1)^k$ și calculați $\rho(1)$, $\rho(100)$, $\rho(500)$.
- ▣ 2. Calculați timpul de înjumătățire al autocorelației.
- ▣ 3. Ajustați $\log \rho(k)$ pe $\log k$ pentru $k = 5, \dots, 200$ și transformați panta în d .
- ▣ Raportați: trei numere; un număr; un număr și o frază.

B1: memoria varianței realizate pentru FTSE 100 [Rezolvat]

- **Întrebarea:** cât de mare este d pentru logaritmul varianței realizate a FTSE 100 și este el robust la lățimea de bandă și la salturile de nivel?
- **Date:** RV de 5 minute Oxford-Man pentru FTSE 100, $n = 5\,586$ zile pînă la 25 februarie 2022
- **Cerințe**
 1. Estimați d pentru $\log RV$ prin GPH, local Whittle și local Whittle exact pentru $m = n^{0,5}, n^{0,6}, n^{0,7}$, cu erorile standard.
 2. Reprezentați grafic $\hat{d}(m)$ pentru $m = n^{0,40}, \dots, n^{0,85}$.
 3. Calculați statistica Qu cu $m = n^{0,7}$ și $\varepsilon = 0,02$.
 4. Interpretare: este reală memoria volatilității FTSE 100 și este ea staționară?
- **Raportați:** un tabel cu nouă estimatii și erorile standard, un grafic, o statistică, o frază
- **Notebook:** secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



m	GPH (SE)	LW	ELW	SE (LW, ELW)
74	0,604 (0,075)	0,601	0,639	0,058
177	0,611 (0,048)	0,578	0,603	0,038
419	0,620 (0,031)	0,606	0,618	0,024

- Qu: $W = 0,33$ față de valoarea de 10% 1,09: nicio evidență de salturi de nivel
- Interpretare: $\hat{d} \approx 0,6$ la orice lățime de bandă, cu $\hat{d}(m)$ plat: memorie lungă reală, la limita staționarității sau puțin dincolo de ea; raportați ELW


B2: BET și EUR/RON cu testul Qu [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** este reală memoria lui $|r_t|$ pe piața din București și pentru leu sau provine din schimbări de regim?
- ▣ **Date:** BET 2000–2026 și din 2010; EUR/RON (BNR) 2005–2026 și din 2014; model: B1
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați d pentru $|r_t|$ prin local Whittle cu $m = n^{0,65}$ pe eșantionul complet și după data de tăiere.
 2. Calculați statistica Qu ($m = n^{0,7}$, $\varepsilon = 0,02$) pe aceleași eșantioane.
 3. Interpretare: care dintre cele două piețe are memorie lungă reală a volatilității?
- ▣ **Raportați:** patru estimări cu erorile standard, patru statistici, o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B2

B3: rugozitatea Euro Stoxx 50 [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** este valabilă scalarea Gatheral–Jaisson–Rosenbaum pentru Euro Stoxx 50 și cât de rugoasă este volatilitatea lui?
- ▣ **Date:** RV de 5 minute Oxford-Man, $n = 5\,635$ zile; $\sigma_t = \sqrt{RV_t}$; $q = 0,5; 1; 1,5; 2; 3$; $\Delta = 1, \dots, 50$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $m(q, \Delta)$ și pantele ζ_q ; estimați H regresînd ζ_q pe q prin origine.
 2. Estimați H cu termenul liber pentru eroarea de măsurare, $m(2, \Delta) = \nu^2 \Delta^{2H} + 2s^2$.
 3. Repetați prima estimatie pe cele două jumătăți ale eșantionului.
 4. Interpretare: este ζ_q liniar în q și ce înseamnă o abatere?
- ▣ **Raportați:** cinci pante, trei valori ale lui H , ν , o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



- $\zeta_q = 0,069; 0,132; 0,183; 0,217; 0,218; \hat{H} = 0,093, \hat{\nu} = 0,38$; cu termenul liber pentru eroare 0,109; jumătățile 0,091 și 0,095
- Interpretare: liniar pînă la $q = 2$, plat între $q = 2$ și 3: momentele mari sînt determinate de cîteva zile extreme (cozi groase ale creșterilor), deci H din $q \leq 2$ este lectura mai sigură; rugozitatea este stabilă în timp


B4: rugozitatea Bitcoin după intervalul de eșantionare [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** depinde estimația lui H pentru Bitcoin de intervalul de eșantionare al varianței realizate?
- ▣ **Date:** RV Binance pentru Bitcoin din randamente de 1, 5, 15, 30 și 60 de minute, 2018–2026; model: B3
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați H pentru fiecare RV prin regresia momentelor și cu termenul liber pentru eroare.
 2. Estimați d pentru $\log RV$ prin local Whittle cu $m = n^{0,65}$.
 3. Interpretare: în ce direcție împinge H o grilă mai rară și de ce?
- ▣ **Raportați:** zece valori ale lui H , cinci valori ale lui d , o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B4

B5: prognoza varianței realizate pentru FTSE 100 [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** prognozează un model rugos sau unul cu memorie lungă varianța realizată a FTSE 100 mai bine decât HAR?
- ▣ **Date:** fereastră mobilă de 1000 de zile, reestimare la fiecare 20 de zile; în afara eșantionului 30 decembrie 2003 – 26 ianuarie 2022 ($T = 4565$); orizonturi de 1, 5 și 22 de zile
- ▣ **Cerințe**
 1. Prognozați RV_{t+h} cu HAR, ARFIMA(0, d , 0) și RFSV, cu corecțiile lognormale.
 2. Calculați QLIKE mediu al fiecărui model și raportul față de HAR.
 3. Calculați statisticile DM față de HAR.
 4. Interpretare: ce model ați folosi la fiecare orizont?
- ▣ **Raportați:** nouă pierderi, șase rapoarte, șase statistici DM, o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B5

B5: rezolvare [Rezolvat]



h	QLIKE HAR	ARFIMA / HAR	DM	RFSV / HAR	DM
1	0,230	0,985	-0,98	1,038	1,49
5	0,324	0,968	-1,94	0,968	-1,33
22	0,561	0,895	-2,12	0,914	-1,93

- Interpretare: HAR la o zi (RFSV este mai slab); la 22 de zile, ARFIMA ($p = 0,034$) și RFSV ($p = 0,053$) bat HAR cu aproximativ o zecime; mediana lui $\hat{H}$ mobil = 0,11

B6: prognoza varianței realizate pentru CAC 40 [Propus]

- **Întrebarea:** se transferă ordonarea de la FTSE 100 la CAC 40?
- **Date:** același design, în afara eșantionului 22 decembrie 2003 – 26 ianuarie 2022 ($T = 4\,631$); model: B5
- **Cerințe**
 1. Repetați cele trei prognoze și rapoartele QLIKE.
 2. Calculați statisticile DM față de HAR.
 3. Interpretare: există un singur model cel mai bun pentru ambii indici?
- **Raportați:** șase rapoarte, șase statistici DM, o frază
- **Notebook:** secțiunea B6

C1: memoria comună a volatilității DAX și CAC 40 [Propus]

- **Întrebarea:** au volatilitățile a două piețe vecine un trend fracționar comun?
- **Date:** logaritmul RV de 5 minute pentru DAX și CAC 40 (Oxford-Man), $n = 5\,600$ zile comune; FCVAR cu $k = 0$; model: B1
- **Cerințe**
 1. Scrieți o preînregistrare de cinci rînduri: ipoteza, modelul, grila (d, b) , testele, ce v-ar face să vă schimbați concluzia.
 2. Estimați d pentru fiecare serie și pentru combinația $\beta' X_t$ prin local Whittle, apoi FCVAR prin verosimilitate profilată, cu testele trace.
 3. Interpretare: ce susțin datele și ce ați adăuga modelului?
- **Raportați:** un plan de cinci rînduri, cinci estimății, două teste, un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI un rezumat despre memoria lungă și rough volatility. Răspunsul:
- (a) Un ARFIMA cu $d = 0,3$ are autocorelații care scad exponențial, doar mai încet decât un $AR(1)$.
- (b) Eroarea standard a estimatorului local Whittle este $\pi/\sqrt{24m}$.
- (c) O lățime de bandă m mai mare este întotdeauna mai bună, pentru că varianța scade.
- (d) Dacă testul Qu respinge, seria are rupturi structurale.
- (e) $H = 0,1$ înseamnă că volatilitatea are memorie scurtă, pentru că $H < 0,5$ înseamnă antipersistență.
- (f) FIGARCH cu $0 < d < 1$ este staționar în covarianță, cu o varianță necondiționată finită.
- (g) Local Whittle exact rămâne consistent pentru $d = 1,2$, în timp ce local Whittle nu.
- Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (secțiunea C2 din notebook).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de șapte verdicte, fiecare cu un rând de justificare.

Idei de reținut

- ▣ Memoria lungă face erorile standard i.i.d. și HAC mult prea mici
- ▣ Local Whittle este alegerea implicită; local Whittle exact când d poate depăși $1/2$; variați întotdeauna m
- ▣ Testați împotriva salturilor de nivel înainte de a afirma memoria lungă
- ▣ Logaritmul volatilității este rugos ($H \approx 0,1$) și persistent; proxy-ul influențează H
- ▣ Cîștigurile de prognoză față de HAR sînt mici și depind de orizont

După seminar

- ▣ Cursul 10 dezvoltă fiecare temă de azi: teoria spectrală, asimptotica estimatorilor, testul Q_u , FCVAR, FIGARCH, rough volatility și prognozele ei
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook
- ▣ C1 poate deveni un proiect de echipă: memoria comună a volatilităților din Europa Centrală și de Est
- ▣ Lectură: Robinson (1995b); Shimotsu și Phillips (2005); Qu (2011); Gatheral, Jaisson și Rosenbaum (2018)
- ▣ **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar**

Bibliografie

- ▣ Davies, R. B., & Harte, D. S. (1987). Tests for Hurst effect. *Biometrika*, 74(1), 95–101. doi:10.1093/biomet/74.1.95
- ▣ Diebold, F. X., & Inoue, A. (2001). Long memory and regime switching. *Journal of Econometrics*, 105(1), 131–159. doi:10.1016/S0304-4076(01)00073-2
- ▣ Gatheral, J., Jaisson, T., & Rosenbaum, M. (2018). Volatility is rough. *Quantitative Finance*, 18(6), 933–949. doi:10.1080/14697688.2017.1393551
- ▣ Geweke, J., & Porter-Hudak, S. (1983). The estimation and application of long memory time series models. *Journal of Time Series Analysis*, 4(4), 221–238. doi:10.1111/j.1467-9892.1983.tb00371.x
- ▣ Heber, G., Lunde, A., Shephard, N., & Sheppard, K. K. (2009). Oxford-Man Institute's realized library, version 0.3. Oxford-Man Institute, University of Oxford. web.archive.org
- ▣ Hosking, J. R. M. (1981). Fractional differencing. *Biometrika*, 68(1), 165–176. doi:10.1093/biomet/68.1.165
- ▣ Johansen, S., & Nielsen, M. Ø. (2012). Likelihood inference for a fractionally cointegrated vector autoregressive model. *Econometrica*, 80(6), 2667–2732. doi:10.3982/ECTA9299
- ▣ Mandelbrot, B. B., & Van Ness, J. W. (1968). Fractional Brownian motions, fractional noises and applications. *SIAM Review*, 10(4), 422–437. doi:10.1137/1010093
- ▣ Patton, A. J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256. doi:10.1016/j.jeconom.2010.03.034
- ▣ Qu, Z. (2011). A test against spurious long memory. *Journal of Business & Economic Statistics*, 29(3), 423–438. doi:10.1198/jbes.2010.09153
- ▣ Robinson, P. M. (1995b). Gaussian semiparametric estimation of long range dependence. *The Annals of Statistics*, 23(5), 1630–1661. doi:10.1214/aos/1176324317
- ▣ Shimotsu, K. (2010). Exact local Whittle estimation of fractional integration with unknown mean and time trend. *Econometric Theory*, 26(2), 501–540. doi:10.1017/S0266466609100075
- ▣ Shimotsu, K., & Phillips, P. C. B. (2005). Exact local Whittle estimation of fractional integration. *The Annals of Statistics*, 33(4), 1890–1933. doi:10.1214/009053605000000309