



Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Seminarul 15: Recapitulare și susținerea proiectelor



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ ACI: Adaptive Conformal Inference (inferență conformală adaptivă)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ CW: Clark–West (test for nested models) — testul Clark–West pentru modele imbricate
- ▣ DM: Diebold–Mariano (test) — testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor
- ▣ EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- ▣ FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație
- ▣ HLN: Harvey–Leybourne–Newbold (small-sample correction of the DM test) — corecția Harvey–Leybourne–Newbold a testului DM pentru eșantioane mici
- ▣ LR: Likelihood Ratio (test) — testul raportului de verosimilitate
- ▣ MA: Moving Average (medie mobilă)
- ▣ PIB: Produsul intern brut
- ▣ QML: Quasi-Maximum Likelihood (verosimilitate cvasi-maximă)
- ▣ RMSE: Root Mean Squared Error (rădăcina erorii pătratice medii)
- ▣ RMSPE: Root Mean Squared Prediction Error (rădăcina erorii pătratice medii de predicție)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ SVAR: Structural Vector AutoRegression (model vector autoregresiv structural)
- ▣ VAR: Vector AutoRegression (model vector autoregresiv)
- ▣ VECM: Vector Error Correction Model (model vectorial cu corecția erorii)

Întrebarea de azi și traseul

- **Întrebarea:** puteți folosi rapid instrumentele întregului curs și apăra un rezultat de replicare atunci când sînteți întrebat?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 15 și este o clinică de proiect: secțiunea „Noțiuni necesare azi” este o fișă de formule a cursului
- Traseul
 - ▶ Partea A: zece probleme scurte din [Capitolele 0–14](#), de tipul celor de la susținere
 - ▶ Partea B: patru susțineri simulate pe rezultate de replicare (Meese–Rogoff pentru EUR/RON, marja la termen, un audit al scurgerii de informație, o căutare de reguli pe BET)
 - ▶ Partea C: preînregistrarea propriului proiect; un răspuns AI de verificat
- Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	varianța de termen lung a unei medii (Cap. 0); un test DM de mînă (Cap. 1)	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	răspunsuri Cholesky (Cap. 3); timpul de înjumătățire al unei abateri de la echilibru (Cap. 4)	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	un pas Kalman (Cap. 6); un lanț Markov cu două stări (Cap. 7)	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	testul Kupiec (Cap. 9); persistența GARCH (Cap. 8)	Rezolvat, Propus	A7
A9, A10	cuantila split conformal (Cap. 13); valori p placebo și Holm (Cap. 14, 0)	Rezolvat, Propus	A9
B1, B2	susțineri simulate: Meese–Rogoff pentru EUR/RON; marja la termen	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	susțineri simulate: un audit al scurgerii de informație; o căutare de reguli pe BET	Rezolvat, Propus	B3
C1, C2	preînregistrarea dumneavoastră, cu un calcul al puterii; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1, A1–A10

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
Cursul de referință EUR/RON	BNR	lunar (sfârșitul lunii)	2005–2026
PIB real SUA, randamentele titlurilor de stat la 10 ani și 3 luni	FRED	trimestrial	1962–2025
Indicele BET	EODHD	zilnic	2001–2012
Date simulate (auditul scurgerii de informație)	–	–	–

- În notebook: `dm_test`, `lr_v`, `ols_se`, `leakage_r2`, `stationary_bootstrap_index`, `p_required`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/4): inferență și evaluarea prognozelor

- ▣ Varianța de termen lung: $\Omega = \gamma_0 + 2 \sum_{j \geq 1} \gamma_j$; AR(1): $\gamma_0 = \sigma^2/(1 - \phi^2)$, $\Omega = \sigma^2/(1 - \phi)^2$, $\Omega/\gamma_0 = (1 + \phi)/(1 - \phi)$
 - ▶ Newey–West: $\hat{\Omega} = \hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{j=1}^L (1 - \frac{j}{L+1}) \hat{\gamma}_j$, $\hat{\gamma}_j = \frac{1}{T} \sum_{t > j} (x_t - \bar{x})(x_{t-j} - \bar{x})$, $L = \lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$ Newey și West (1987)
- ▣ Testul DM Diebold și Mariano (1995): $d_t = L(e_{1t}) - L(e_{2t})$, $DM = \bar{d}/\sqrt{\hat{\Omega}_d/P}$; HLN Harvey, Leybourne și Newbold (1997): $DM^* = DM \sqrt{(P+1-2h+h(h-1)/P)/P}$, comparat cu t_{P-1}
 - ▶ Clark–West pentru modele imbricate Clark și West (2007): $f_t = e_{1t}^2 - [e_{2t}^2 - (\hat{y}_{1t} - \hat{y}_{2t})^2]$, test unilateral pentru $\mathbb{E}f_t \leq 0$ (1 = modelul mai mic)
- ▣ Puterea unui test DM: $P \approx \Omega_d (z_{1-\alpha/2} + z_\pi)^2 / \delta^2$ pentru un câștig mediu de δ abateri standard și puterea π ; diferență AR(1): $\Omega_d = (1 + \rho)/(1 - \rho)$

Noțiuni necesare azi (2/4): structură și stări latente

- ▣ SVAR recursiv: $u_t = B_0 \varepsilon_t$, $B_0 = \text{chol}(\Sigma_u)$ inferior triunghiulară; răspunsurile $\Theta_h = A^h B_0$ pentru un VAR(1)
 - 2×2 : $b_{11} = \sqrt{\sigma_{11}}$, $b_{21} = \sigma_{21}/b_{11}$, $b_{22} = \sqrt{\sigma_{22} - b_{21}^2}$
- ▣ VECM $\Delta y_t = \alpha \beta' y_{t-1} + \varepsilon_t$: abaterea de la echilibru $z_t = \beta' y_t$ urmează $z_t = (1 + \beta' \alpha) z_{t-1} + \beta' \varepsilon_t$; timpul de înjumătățire $\ln 0,5 / \ln(1 + \beta' \alpha)$
- ▣ Nivel local: $y_t = \mu_t + \varepsilon_t$, $\mu_{t+1} = \mu_t + \eta_t$; $F = P + \sigma_\varepsilon^2$, $K = P/F$, $a_{t|t} = a + K(y - a)$, $P_{t|t} = P(1 - K)$, $P_{t+1} = P_{t|t} + \sigma_\eta^2$
 - regim staționar: $\bar{P} = \sigma_\varepsilon^2(q + \sqrt{q^2 + 4q})/2$, $q = \sigma_\eta^2/\sigma_\varepsilon^2$
- ▣ Lanț Markov cu două stări: $\mathbb{E}D_i = 1/(1 - p_{ii})$, $\pi_1 = (1 - p_{22})/(2 - p_{11} - p_{22})$, persistența $\lambda = p_{11} + p_{22} - 1$

Noțiuni necesare azi (3/4): volatilitate, risc și predicție conformală

- ▣ GARCH(1,1): $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$; persistența $\alpha + \beta$; timpul de înjumătățire $\ln 0,5 / \ln(\alpha + \beta)$;
 $\sigma^2 = \omega / (1 - \alpha - \beta)$
- ▣ VaR 1%: $\text{VaR}_\alpha = -q_\alpha$; x depășiri în T zile; Kupiec: $LR_{uc} = -2 \ln \frac{(1 - \alpha)^{T-x} \alpha^x}{(1 - \hat{\pi})^{T-x} \hat{\pi}^x} \sim \chi_1^2$, $\hat{\pi} = x/T$
 - Semaforul Basel pentru 250 de zile la 1%: verde 0–4, galben 5–9, roșu 10 sau mai multe depășiri
- ▣ Split conformal [Romano, Patterson și Candès \(2019\)](#): scorurile $S_1, \dots, S_n$ pe un set de calibrare; $\hat{q} = S_{(k)}$,
 $k = \lceil (n+1)(1 - \alpha) \rceil$
 - sub interschimbabilitate: $1 - \alpha \leq \Pr(Y_{n+1} \in \hat{C}) \leq 1 - \alpha + 1/(n+1)$ (fără egalități); ACI [Gibbs și Candès \(2021\)](#): $\alpha_{t+1} = \alpha_t + \gamma(\alpha - \text{err}_t)$

Noțiuni necesare azi (4/4): căutări, placebo și susținerea

- m teste la nivelul a : Bonferroni respinge $p_j \leq a/m$; Holm: ordonăm $p_{(1)} \leq \dots \leq p_{(m)}$, respingem cât timp $p_{(i)} \leq a/(m - i + 1)$, ne oprim la primul eșec
 - max- t (logica Reality Check [White \(2000\)](#)): comparăm cel mai bun t cu distribuția bootstrap a lui $\max_k t_k^*$, reeșantionată pe blocuri
- Placebo pentru controlul sintetic [Abadie, Diamond și Hainmueller \(2015\)](#): $p = \#\{j : r_j \geq r_1\}/(J + 1)$; cu J donatori, cea mai mică valoare p este $1/(J + 1)$
- Scurgerea de informație: orice alegere (selecție, scalare, calibrare) care folosește date de după originea prognozei [Kaufman et al. \(2012\)](#)
- La susținere: individual, trei blocuri de întrebări (cod, rezultate, capitole), fără instrumente AI
 - un răspuns bun: rezultatul, incertitudinea lui, ipoteza din spatele lui, ce l-ar schimba

A1: cât de precisă este o medie? (Capitolul 0) [Rezolvat]

Cerință

- ▣ O serie este AR(1) cu $\phi = 0,6$ și $\sigma^2 = 1$. O echipă raportează $t = 2,5$ pentru media ei, cu erori standard i.i.d.
- ▣ 1. Calculați γ_0 și Ω .
- ▣ 2. Cu ce factor este eroarea standard i.i.d. prea mică?
- ▣ 3. Calculați t corectat și formulați concluzia la 5%.
- ▣ Raportați: două numere; un număr; un număr și o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $\gamma_0 = 1/(1 - 0,36) = 1,5625$; $\Omega = 1/(1 - 0,6)^2 = 6,25$
- ▣ 2. $\Omega/\gamma_0 = (1 + \phi)/(1 - \phi) = 4$: eroarea standard este prea mică cu un factor $\sqrt{4} = 2$
- ▣ 3. $t = 2,5/2 = 1,25 < 1,96$: nesemnificativ
- ▣ Interpretare: la susținere, prima întrebare despre orice statistică t este „ce eroare standard?”

A2: un test Diebold–Mariano de mînă (Capitolul 1) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Diferențele erorilor pătratice d_t (reper minus model), $h = 1$: 0,8; -0,2; 0,5; 1,1; 0,3; -0,4; 0,9; 0,6; 0,2; 0,4. Model: A1.
- ▣ 1. Calculați $\bar{d}$, $\hat{\gamma}_0$ și $\hat{\gamma}_1$ (împărțiți la P).
- ▣ 2. Calculați $\hat{\Omega}$ cu nucleul Bartlett și $L = 1$, apoi DM și HLN.
- ▣ 3. Comparați cu valoarea critică a lui t_9 și formulați concluzia.
- ▣ Raportați: trei numere; trei numere; o frază.

A3: răspunsuri Cholesky (Capitolul 3) [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Un VAR(1) $y_t = Ay_{t-1} + u_t$ cu $A = \begin{pmatrix} 0,5 & 0 \\ 0,2 & 0,4 \end{pmatrix}$,
 $\Sigma_u = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, ordonare recursivă.
- ▣ 1. Calculați B_0 .
- ▣ 2. Calculați $\Theta_1 = AB_0$ și $\Theta_2 = A^2B_0$.
- ▣ 3. Ce se schimbă dacă ordonarea este inversată?
- ▣ Raportați: o matrice; două matrice; o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $b_{11} = \sqrt{4} = 2,0$, $b_{21} = 2/2 = 1,0$, $b_{22} = \sqrt{5-1} = 2,0$
- ▣ 2. $\Theta_1 = \begin{pmatrix} 1,00 & 0,00 \\ 0,80 & 0,80 \end{pmatrix}$, $\Theta_2 = \begin{pmatrix} 0,50 & 0,00 \\ 0,52 & 0,32 \end{pmatrix}$
- ▣ 3. Cu ordonarea inversată, prima variabilă răspunde imediat la al doilea șoc, iar a doua nu mai răspunde imediat la primul; cu $\sigma_{12} \neq 0$ toate răspunsurile se schimbă: ordonarea este ipoteza de identificare
- ▣ Interpretare: o întrebare de susținere este mereu „de ce această ordonare?”

A4: timpul de înjumătățire al unei abateri de la echilibru (Capitolul 4) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Un VECM bivariat cu $\beta = (1, -1)'$ și $\alpha = (-0,2; 0,05)'$, fără termeni de termen scurt. Model: A3.
- ▣ 1. Derivați procesul AR(1) al lui $z_t = \beta' y_t$ și coeficientul lui.
- ▣ 2. Calculați timpul de înjumătățire al unei abateri.
- ▣ 3. Ce variabilă este slab exogenă dacă $\alpha_2 = 0$ și cum se testează?
- ▣ Raportați: o ecuație și un număr; un număr; o frază.

A5: un pas al filtrului Kalman (Capitolul 6) [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Nivel local cu $\sigma_\varepsilon^2 = 4$, $\sigma_\eta^2 = 1$; starea prognozată $a = 10$, $P = 2$; observația $y = 13$.
- ▣ 1. Calculați v , F și K .
- ▣ 2. Calculați $a_{t|t}$, $P_{t|t}$ și P_{t+1} .
- ▣ 3. Calculați $\bar{P}$ și câștigul în regim staționar.
- ▣ Raportați: trei numere; trei numere; două numere.

Rezolvare

- ▣ 1. $v = 3$, $F = 2 + 4 = 6$, $K = 2/6 = 0,333$
- ▣ 2. $a_{t|t} = 10 + K \cdot 3 = 11$; $P_{t|t} = 2(1 - K) = 1,333$; $P_{t+1} = 2,333$
- ▣ 3. $q = 0,25$: $\bar{P} = 2,562$, $\bar{K} = \bar{P}/(\bar{P} + 4) = 0,390$
- ▣ Interpretare: filtrul se deplasează o treime din distanța pînă la surpriză; raportul semnal-zgomot q fixează singur câștigul pe termen lung

A6: un lanț Markov cu două stări (Capitolul 7) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Regimul 1 (expansiune) cu $p_{11} = 0,95$, regimul 2 (recesiune) cu $p_{22} = 0,80$, date lunare. Model: A5.
- ▣ 1. Calculați duratele așteptate.
- ▣ 2. Calculați probabilitatea ergodică a regimului 1 și persistența λ .
- ▣ 3. De ce nu poate un test LR al unui regim față de două să folosească χ^2_2 ?
- ▣ Raportați: două numere; două numere; o frază.

A7: testul Kupiec pentru VaR 1% (Capitolul 9) [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Un model VaR 1% are $x = 6$ depășiri în $T = 250$ de zile.
- ▣ 1. Calculați rata depășirilor și numărul așteptat de depășiri.
- ▣ 2. Calculați LR_{UC} și valoarea p ; comparați cu coada binomială exactă $\Pr(X \geq 6)$.
- ▣ 3. Precizați zona Basel și concluzia.
- ▣ Raportați: două numere; trei numere; o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. 2,4%; număr așteptat 2,5
- ▣ 2. $LR_{UC} = 3,56$, $p = 0,059$; valoarea p binomială exactă, unilaterală = 0,041
- ▣ 3. Zona galbenă; testul asimptotic nu respinge la 5%, coada exactă respinge: cu $\alpha = 1\%$ și 250 de zile, raportați ambele
- ▣ Interpretare: backtest-urile pe câteva zile din coadă au putere mică; o singură depășire schimbă verdictul

A8: persistența GARCH (Capitolul 8) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Randamente zilnice în %, GARCH(1,1) cu $\omega = 0,02$, $\alpha = 0,08$, $\beta = 0,90$. Model: A7.
- ▣ 1. Calculați persistența și timpul de înjumătățire al unui șoc de volatilitate.
- ▣ 2. Calculați varianța necondiționată și volatilitatea anualizată (250 de zile).
- ▣ 3. De ce sînt înșelătoare erorile standard din hessiană pentru α cînd randamentele au cozi groase?
- ▣ Raportați: două numere; două numere; o frază.

A9: cuantila split conformal (Capitolul 13) [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Reziduurile absolute a 19 puncte de calibrare: 0,12; 0,85; 0,40; 1,30; 0,07; 0,66; 2,10; 0,95; 0,31; 1,75; 0,52; 0,22; 1,05; 0,48; 0,90; 1,42; 0,18; 0,73; 1,20; $\alpha = 0,1$.
- ▣ 1. Calculați k și $\hat{q}$.
- ▣ 2. Precizați limitele acoperirii pentru $\hat{y} \pm \hat{q}$.
- ▣ 3. Ce ipoteză nu este îndeplinită pentru randamentele zilnice și ce o înlocuiește?
- ▣ Raportați: două numere; două numere; o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $k = \lceil 20 \cdot 0,9 \rceil = 18$: al 18-lea cel mai mic scor, $\hat{q} = 1,75$
- ▣ 2. Între 0,90 și $0,9 + 1/20 = 0,950$, marginal
- ▣ 3. Interschimbabilitatea nu este îndeplinită când există volatility clustering; ACI sau conformal ponderat restabilesc acoperirea pe termen lung, acoperirea condiționată trebuie testată
- ▣ Interpretare: o garanție este atât de bună cât este ipoteza ei; spuneți pe care vă bazați

A10: valori p placebo și Holm (Capitolele 14 și 0) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar


Cerință

- ▣ Un control sintetic cu 19 donatori; unitatea tratată are cel mai mare raport RMSPE după/înainte. Echipa testează cinci rezultate cu $p = 0,010; 0,020; 0,040; 0,200; 0,030$. Model: A9.
- ▣ 1. Calculați valoarea p placebo și cea mai mică valoare posibilă.
- ▣ 2. Câte rezultate sînt semnificative la 5% fără corecție, cu Bonferroni și cu Holm?
- ▣ 3. Ce ar fi trebuit să spună preînregistrarea?
- ▣ Raportați: două numere; trei numere; o frază.

B1: Meese și Rogoff pentru EUR/RON [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** o echipă replică **Meese și Rogoff (1983)**: poate un AR(1) să depășească mersul aleator pentru variația lunară EUR/RON? Sînteți în același timp examinator și candidat
- ▣ **Date:** cursul de referință BNR, sfîrșitul lunii, $100 \times$ variația logaritmică; fereastră mobilă de 60 de luni; 128 de prognoze la o lună, din ianuarie 2016
- ▣ **Cerințe**
 1. Produceți rezultatele: RMSE pentru ambele modele, raportul lor, DM–HLN și Clark–West.
 2. Întrebare de susținere: de ce este Clark–West testul potrivit aici și ce testează?
 3. Întrebare de susținere: este nerespingerea o dovadă că mersul aleator este cel mai bun? Folosiți formula puterii.
 4. Interpretare: scrieți concluzia de o frază pe care ați susține-o.
- ▣ **Raportați:** patru numere și două statistici de test, două răspunsuri scurte, o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



- ▣ RMSE: mers aleator 0,509, AR(1) 0,524; raport 1,028; DM–HLN = 1,19 ($p = 0,235$); Clark–West = 1,11 (p unilateral = 0,134)
- ▣ Clark–West: mersul aleator este inclus în AR(1); sub ipoteza nulă coeficienții estimați adaugă zgomot modelului mai mare, ceea ce deplasează DM în favoarea mersului aleator; CW corectează aceasta [Clark și West \(2007\)](#)
- ▣ Puterea: autocorelația de ordinul întâi a lui d_t $-0,01$; un câștig de 0,2 abateri standard cere aproximativ 196 de prognoze pentru o putere de 80%, mai multe decât cele 128 disponibile
- ▣ Interpretare: „rezultatul Meese–Rogoff se menține pentru leu în 2016–2026: AR(1) nu depășește mersul aleator, iar eșantionul nostru ar fi putut detecta doar un câștig mare”

B2: marja la termen și creșterea [Propus]

- **Întrebarea:** o echipă replică [Estrella și Hardouvelis \(1991\)](#) și raportează „marja prognozează creșterea SUA, $t = 4,7$ ”.
Susțineți sau corectați
- **Date:** FRED: PIB real, randamentele la 10 ani și la 3 luni (medii trimestriale), 1962–2025; $y_t = (400/4) \ln(\text{PIB}_{t+4}/\text{PIB}_t)$
pe marjă; model: B1
- **Cerințe**
 1. Estimați panta cu erori standard clasice, de tip Hansen–Hodrick (3 decalaje) și Newey–West.
 2. Întrebare de susținere: de ce trebuie erorile să fie cel puțin MA(3)? Raportați autocorelația reziduurilor.
 3. Întrebare de susținere: este relația stabilă? Estimați-o înainte de 1989 și din 1989.
 4. Interpretare: rescrieți fraza echipei astfel încât să corespundă dovezilor.
- **Raportați:** o pantă, trei erori standard și statistici t , o autocorelație, două pante pe subeșantioane, o frază
- Notebook: secțiunea B2

B3: un audit al scurgerii de informație [Rezolvat]

- **Întrebarea:** o echipă selectează cei mai buni 5 din 100 de predictorii candidați după corelația cu ținta pe întregul eșantion, apoi raportează un R^2 pozitiv în afara eșantionului pe ultimele 60 de perioade. Este câștigul real?
- **Date:** o simulare cu predictorii și țintă de tip zgomot pur, $T = 240$, 1000 de replicări (designul din Cursul 15); model: B1
- **Cerințe**
 1. Rulați protocolul echipei și protocolul corect (selecție doar pe eșantionul de antrenare).
 2. Raportați R^2 mediu în afara eșantionului și proporția valorilor pozitive pentru ambele.
 3. Întrebare de susținere: ce linie de cod produce scurgerea și cum se corectează?
 4. Interpretare: ce ați cere înainte de a crede un R^2 raportat de 10%?
- **Raportați:** patru numere, o linie de cod, o frază
- **Notebook:** secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]

- Protocolul echipei: R^2 mediu = 5,9%, pozitiv în 81% din replicări (percentila 90: 14,4%)
- Protocolul corect: R^2 mediu = -13,3%, pozitiv în 8%: predictorii sînt zgomot
- Scurgerea: corelațiile sînt calculate pe `rows = slice(0, T)`; corecția este `slice(0, n_train)`, iar într-un design cu fereastră mobilă selecția se repetă la fiecare origine
- Interpretare: un R^2 de 10% se află în intervalul produs doar de scurgere; cereți codul selecției, un placebo cu ținte permutate și o perioadă de test neatinsă

B4: o căutare de reguli pe BET [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** o echipă raportează „regula cu medie mobilă de 5 zile depășește buy-and-hold pe BET, $p = 0,006$ ”. A încercat 20 de reguli. Susțineți sau corectați
- ▣ **Date:** randamentele logaritmice zilnice ale BET, 2001–2012 (2 993 de zile); reguli „poziție lungă dacă închiderea este peste media pe n zile”, $n = 5, 10, \dots, 100$; t HAC al randamentului excedentar mediu; model: B3
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați statistica t a fiecărei reguli și valoarea p naivă a celei mai bune.
 2. Calculați valoarea p max- t cu bootstrap staționar (bloc mediu de 10 zile, 999 de reeșantionări).
 3. Întrebare de susținere: de ce reeșantionează bootstrap-ul cele 20 de serii împreună, pe blocuri?
 4. Interpretare: ce ați adăuga înainte de a o numi o regulă profitabilă?
- ▣ **Raportați:** 20 de statistici, două valori p , o valoare critică, o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B4

C1: preînregistrarea proiectului dumneavoastră [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** poate evaluarea planificată să răspundă la întrebarea dumneavoastră?
- ▣ **Date:** lucrarea de referință și datele echipei dumneavoastră; formula puterii din fișa de azi; model: B1
- ▣ **Cerințe**
 1. Scrieți cele șapte secțiuni ale modelului de preînregistrare (Cursul 15, Anexa) în cel mult o pagină.
 2. Scrieți regula care decide „replicat”, „parțial” sau „nereplicat”.
 3. Calculați lungimea evaluării necesare pentru o putere de 80% la câștigul raportat de lucrare, cu ρ estimat pe datele de antrenare.
 4. Interpretare: dacă lungimea necesară depășește datele disponibile, cum schimbați întrebarea?
- ▣ **Raportați:** o pagină, o regulă, un număr, o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI sfaturi pentru pregătirea proiectului de replicare și a susținerii. Răspunsul:
 - (a) Folosește testul Diebold-Mariano pentru a compara AR(1) cu mersul aleator; este valid pentru modele imbricate.
 - (b) Cu 19 donatori, o valoare p placebo de 0,01 se poate obține dacă efectul este mare.
 - (c) Dacă rezultatul nu este semnificativ, mersul aleator este modelul adevărat.
 - (d) Pentru un AR(1) cu $\phi = 0,6$, erorile standard i.i.d. ale mediei sînt prea mici cu un factor de 2.
 - (e) Standardizează predictorii o singură dată pe întregul eșantion înainte de bucla walk-forward: economisești timp și nu se schimbă nimic.
 - (f) Holm respinge mai multe ipoteze decît Bonferroni și controlează aceeași rată a erorii la nivel de familie.
 - (g) Poți folosi asistentul în timpul susținerii orale dacă îl declari în AI_USE.md.
- Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (secțiunea C2 din notebook).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de șapte verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Idei de reținut

- ▣ Fiecare rezultat de la susținere vine cu eroarea lui standard, iar eroarea standard cu ipoteza ei
- ▣ Modelele imbricate cer Clark–West; o nerespingere cere un calcul al puterii
- ▣ Țintele suprapuse și persistența măresc erorile standard; stabilitatea pe subeșantioane face parte din dovezi
- ▣ Selecția pe întregul eșantion creează câștiguri în afara eșantionului din zgomot; o căutare are nevoie de o valoare p ajustată pentru căutare
- ▣ Scrieți preînregistrarea și regula verdictului înaintea primei estimări

După seminar

- ▣ Cursul 15 dezvoltă fiecare temă de azi: harta cursului, cîte o recapitulare pentru fiecare capitol, fluxul de cercetare, tabloul replicărilor, erorile frecvente, susținerea orală și regulile pentru AI
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook
- ▣ C1 este prima variantă a propunerii și preînregistrării echipei dumneavoastră
- ▣ Lectură: [Clemens \(2017\)](#); [Nosek et al. \(2018\)](#); [Diebold \(2015\)](#)
- ▣ **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar**

Bibliografie

- ▣ Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2015). Comparative politics and the synthetic control method. *American Journal of Political Science*, 59(2), 495–510. doi:10.1111/ajps.12116
- ▣ Clark, T. E., & West, K. D. (2007). Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models. *Journal of Econometrics*, 138(1), 291–311. doi:10.1016/j.jeconom.2006.05.023
- ▣ Clemens, M. A. (2017). The meaning of failed replications: A review and proposal. *Journal of Economic Surveys*, 31(1), 326–342. doi:10.1111/joes.12139
- ▣ Diebold, F. X. (2015). Comparing predictive accuracy, twenty years later: A personal perspective on the use and abuse of Diebold–Mariano tests. *Journal of Business & Economic Statistics*, 33(1), 1–9. doi:10.1080/07350015.2014.983236
- ▣ Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263. doi:10.1080/07350015.1995.10524599
- ▣ Estrella, A., & Hardouvelis, G. A. (1991). The term structure as a predictor of real economic activity. *The Journal of Finance*, 46(2), 555–576. doi:10.1111/j.1540-6261.1991.tb02674.x
- ▣ Gibbs, I., & Candès, E. (2021). Adaptive conformal inference under distribution shift. *Advances in Neural Information Processing Systems 34*; arXiv:2106.00170. [arxiv.org](https://arxiv.org/abs/2106.00170)
- ▣ Harvey, D., Leybourne, S., & Newbold, P. (1997). Testing the equality of prediction mean squared errors. *International Journal of Forecasting*, 13(2), 281–291. doi:10.1016/S0169-2070(96)00719-4
- ▣ Kaufman, S., Rosset, S., Perlich, C., & Stitelman, O. (2012). Leakage in data mining: Formulation, detection, and avoidance. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*, 6(4), 15. doi:10.1145/2382577.2382579
- ▣ Meese, R. A., & Rogoff, K. (1983). Empirical exchange rate models of the seventies: Do they fit out of sample? *Journal of International Economics*, 14(1–2), 3–24. doi:10.1016/0022-1996(83)90017-X
- ▣ Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708. doi:10.2307/1913610
- ▣ Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., & Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), 2600–2606. doi:10.1073/pnas.1708274114
- ▣ Romano, Y., Patterson, E., & Candès, E. (2019). Conformalized quantile regression. *Advances in Neural Information Processing Systems 32*; arXiv:1905.03222. [arxiv.org](https://arxiv.org/abs/1905.03222)
- ▣ White, H. (2000). A reality check for data snooping. *Econometrica*, 68(5), 1097–1126. doi:10.1111/1468-0262.00152