



Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Seminarul 8: Modelarea avansată a volatilității: măsuri realizate, HAR și GARCH multivariat



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- ▣ BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian (Schwarz))
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ BV: Bipower Variation (variația bipower)
- ▣ CDS: Credit Default Swap (contract swap pe riscul de nerambursare)
- ▣ DCC: Dynamic Conditional Correlation (corelație condiționată dinamică)
- ▣ DCC-NL: DCC with Nonlinear shrinkage of the target (Engle–Ledito–Wolf 2019) — DCC cu shrinkage neliniar al țintei (Engle–Ledito–Wolf 2019)
- ▣ DM: Diebold–Mariano (test) — testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor
- ▣ EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ FTX: FTX (cryptocurrency exchange, bankrupt in November 2022) — FTX (bursă de criptomonede, intrată în faliment în noiembrie 2022)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GARCH-MIDAS: GARCH with a Mixed Data Sampling long-run component (Engle–Ghysels–Sohn 2013) — GARCH cu o componentă de termen lung MIDAS (Engle–Ghysels–Sohn 2013)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație
- ▣ HAR: Heterogeneous AutoRegressive (model) — model autoregresiv heterogen
- ▣ HARQ: HAR with realised Quarticity (HAR cu cuarticitatea realizată)
- ▣ IQ: Integrated Quarticity (cuarticitatea integrată)
- ▣ ML: Machine Learning (învățare automată)
- ▣ MSE: Mean Squared Error (eroarea pătratică medie)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ OPG: Outer Product of the Gradient (scores) — produsul exterior al scorurilor
- ▣ QLIKE: Quasi-LIKelihood loss (pierderea de tip cvasi-verosimilitate)
- ▣ QML: Quasi-Maximum Likelihood (verosimilitate cvasi-maximă)
- ▣ QMLE: Quasi-Maximum Likelihood Estimator (estimatorul de verosimilitate cvasi-maximă)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ RQ: Realised Quarticity (cuarticitatea realizată)
- ▣ RV: Realised Variance (varianța realizată)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ TLC: Teorema Limită Centrală
- ▣ TQ: Tripower Quarticity (cuarticitatea tripower)
- ▣ TSA: Time Series Analysis (Serii de timp, cursul de licență)
- ▣ TSRV: Two-Scales Realised Variance (varianța realizată cu două scale de timp)
- ▣ UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) — timpul universal coordonat
- ▣ VR: Variance Ratio (raportul varianțelor)

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cît știm cu adevărat despre o estimatie a volatilității și cînd o măsurare mai bună dă o prognoză mai bună?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 8: secțiunea „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
 - ▶ Partea A: erorile standard robuste ale QML, deplasarea din zgomot a varianței realizate, două scale de timp și ponderile kernel, variația bipower și un test de salt de mîină, HAR ca AR(22), atenuarea și HARQ, funcții de pierdere robuste, un pas DCC
 - ▶ Partea B: salturi pentru Ether; HAR pentru DAX; HARQ pentru Ether în afara eșantionului; GARCH pentru EUR/RON cu erori standard robuste; GARCH-MIDAS pentru BET cu producția industrială a României
 - ▶ Partea C: s-a schimbat volatilitatea Bitcoin după ETF-urile spot din SUA? Un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	eroarea standard robustă a unei varianțe QML; un sandwich de mână	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	deplasarea din zgomot și eșantionarea optimă; două scale și ponderile Parzen	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	RV, BV și testul de salt pe o zi-jucărie; cel mai mic salt detectabil	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	HAR ca AR(22) restricționat; atenuarea și HARQ	Rezolvat, Propus	A7
A9, A10	funcții de pierdere robuste și nerobuste; un pas DCC și un pas cDCC	Rezolvat, Propus	A9
B1, B2	salturi pentru Ether; HAR pentru DAX	Rezolvat	–
B3	HARQ pentru Ether în afara eșantionului	Propus	B2, A8
B4, B5	QML pentru EUR/RON; GARCH-MIDAS pentru BET	Rezolvat, Propus	B4
C1, C2	Bitcoin înainte și după ETF-urile spot; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1–B5

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
Ether, Bitcoin: măsuri realizate	Binance, prețuri la un minut	zilnic	2018–2026
DAX: RV și BV la 5 minute	Heber, Lunde, Shephard și Sheppard (2009)	zilnic	2000–2022
cursul de referință EUR/RON; BET	BNR; EODHD	zilnic	2003–2026
producția industrială a României (ajustată)	Eurostat sts_inpr_m	lunar	2000–2026
S&P 500	EODHD	zilnic	2021–2026

- În notebook: `fit_garch`, `sandwich`, `bipower`, `tripower`, `ht_stat`, `har_X`, `har_forecasts`, `qlike`, `dm_test`, `fit_garch_midas`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/4): verosimilitatea cvasi-maximă

- GARCH(1,1) (TSA, Capitolul 5): $\varepsilon_t = \sigma_t \eta_t$, $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$, η_t i.i.d. cu media 0, varianța 1, coeficientul de boltire $\kappa_\eta = \mathbb{E}\eta_t^4$
- QML: maximizăm log-verosimilitatea gaussiană $\sum_t \ell_t$, $\ell_t = -\frac{1}{2}(\ln \sigma_t^2 + \varepsilon_t^2 / \sigma_t^2)$, chiar dacă η_t nu este gaussian; consistent dacă ecuația varianței este corectă
- Sandwich-ul: $\text{Var}(\hat{\theta}) \approx \frac{1}{T} A^{-1} B A^{-1}$, A = minus hessiana medie, B = media produsului exterior al scorurilor; doar hessiana: $\frac{1}{T} A^{-1}$; doar OPG: $\frac{1}{T} B^{-1}$
- Pentru GARCH, sandwich-ul este de $(\kappa_\eta - 1)/2$ ori varianța obținută doar din hessiană (erorile standard Bollerslev–Wooldridge)
- GARCH-MIDAS: $r_{i,t} = \mu + \sqrt{\tau_t g_{i,t}} \eta_{i,t}$, $\ln \tau_t = m + \theta \sum_{k=1}^K \varphi_k(w) X_{t-k}$ pentru un X lunar; g un GARCH cu media 1; raportul de varianță $\text{VR} = \text{Var}(\ln \tau) / \text{Var}(\ln \tau g)$

Noțiuni necesare azi (2/4): măsuri realizate și zgomot

- Cu n randamente intraday r_i : $RV = \sum r_i^2$; fără zgomot, $RV \rightarrow QV = \text{varianța integrată IV plus pătratele salturilor}$;
 $\text{Var}(RV - IV) \approx 2IQ/n$, $\widehat{IQ} = RQ = \frac{n}{3} \sum r_i^4$
- Zgomotul: observăm $Y = X + u$, u i.i.d. $(0, \omega^2)$: $\mathbb{E} RV = IV + 2n\omega^2$; numărul optim de randamente $n^* \approx (IQ/(4\omega^4))^{1/3}$
- Două scale de timp: $TSRV = \overline{RV}^{(K)} - \frac{\bar{n}}{n} RV^{(n)}$, $\bar{n} = (n - K + 1)/K$, $\overline{RV}^{(K)}$ media RV pe cele K grile decalate
- Realised kernel: $RK = \gamma_0 + 2 \sum_{h=1}^H k\left(\frac{h}{H+1}\right) \gamma_h$, $\gamma_h = \sum_i r_i r_{i-h}$; Parzen $k(x) = 1 - 6x^2 + 6x^3$ ($x \leq \frac{1}{2}$), $2(1-x)^3$ ($\frac{1}{2} < x \leq 1$)

Noțiuni necesare azi (3/4): salturi și HAR

- Variația bipower $BV = \mu_1^{-2} \frac{n}{n-1} \sum_{i \geq 2} |r_i| |r_{i-1}|$, $\mu_1 = \sqrt{2/\pi}$: estimează IV chiar și cu salturi; cuarticitatea tripower $TQ = n \mu_{4/3}^{-3} \frac{n}{n-2} \sum_{i \geq 3} \prod_{j=0}^2 |r_{i-j}|^{4/3}$
- Huang–Tauchen: $z = \frac{(RV - BV)/RV}{\sqrt{\vartheta n^{-1} \max(1, TQ/BV^2)}}$, $\vartheta = \frac{\pi^2}{4} + \pi - 5 \approx 0,609$; respingem „niciun salt” dacă $z > z_{1-\alpha}$ ($z_{0,999} = 3,09$)
- HAR: $RV_{t+1} = \beta_0 + \beta_d RV_t + \beta_w RV_t^{(w)} + \beta_m RV_t^{(m)} + u_{t+1}$, mediile săptămînală și lunară pe 5 și 22 de zile; OLS cu erori standard Newey–West
- HARQ: β_d este înlocuit cu $\beta_d + \beta_{dQ} \sqrt{RQ_t}$; erori în variabile: panta OLS pe un regresor zgomotos tinde către $\phi\lambda$, $\lambda = \text{Var}(IV)/(\text{Var}(IV) + \text{Var}(e))$

Noțiuni necesare azi (4/4): evaluare și corelații

- $QLIKE = \frac{\hat{\sigma}^2}{h} - \ln \frac{\hat{\sigma}^2}{h} - 1$ și $MSE = (\hat{\sigma}^2 - h)^2$ sînt robuste: cu un proxy $\hat{\sigma}^2$ nedeplasat și zgomotos, ele ordonează prognozele h la fel ca varianța adevărată (Patton 2011)
- Pentru $z \sim N(0, 1)$: $\mathbb{E} \ln z^2 = \psi(\frac{1}{2}) + \ln 2 \approx -1,27$, $\text{Var} \ln z^2 = \pi^2/2$
- Filtrul de plauzibilitate: o prognoză din afara intervalului RV din eșantionul de estimare este înlocuită cu media din eșantion; Diebold–Mariano: statistica t a diferenței medii a pierderilor, cu varianță HAC
- DCC: $Q_t = (1 - a - b)S + az_{t-1}z'_{t-1} + bQ_{t-1}$, $\rho_{12,t} = q_{12,t}/\sqrt{q_{11,t}q_{22,t}}$; cDCC: z_{t-1} este înlocuit cu $\text{diag}(Q_{t-1})^{1/2}z_{t-1}$

A1: varianța QML și eroarea ei standard robustă [Rezolvat]

Cerință

- Randamentele zilnice ale BET (%), centrate, 2016–2026, $T = 2\,674$; modelul $r_t = \sigma \eta_t$, cu η_t i.i.d., media 0, varianța 1, coeficientul de boltire κ .
- 1. Derivați QMLE $\hat{\sigma}^2$ și varianța lui obținută doar din hessiană, sub normalitate.
- 2. Derivați varianța sandwich și calculați ambele erori standard din $\hat{\sigma}^2 = 0,993$ și $\hat{\kappa} = 20,79$.
- 3. Precizați cu cît subestimează hessiana incertitudinea.
- Raportați: un estimator, două erori standard, un raport, o frază.

Rezolvare

- 1. $\ell_t = -\frac{1}{2}(\ln \sigma^2 + r_t^2/\sigma^2)$; $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{T} \sum r_t^2$; $A = \frac{1}{2\sigma^4}$, deci varianța doar din hessiană este $2\sigma^4/T$
- 2. $s_t = \frac{r_t^2 - \sigma^2}{2\sigma^4}$, $B = \frac{(\kappa - 1)\sigma^4}{4\sigma^8}$; $A^{-1}B A^{-1} = (\kappa - 1)\sigma^4$: erorile standard 0,0272 (hessiană) și 0,0854 (sandwich)
- 3. Raportul $\sqrt{(\hat{\kappa} - 1)/2} = 3,15$: cu cozile groase ale BET, intervalele din hessiană sînt de aproximativ trei ori prea înguste

A2: un sandwich de mînă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ GARCH(1,1) prin QML, $T = 4000$; medii pe observație pentru (α, β) : $A = \begin{pmatrix} 50 & 40 \\ 40 & 36 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 120 & 90 \\ 90 & 72 \end{pmatrix}$. Model: A1.
- ▣ 1. Calculați A^{-1} și erorile standard doar din hessiană $\sqrt{\text{diag}(A^{-1})/T}$.
- ▣ 2. Calculați $A^{-1}B A^{-1}$ și erorile standard sandwich.
- ▣ 3. Calculați erorile standard OPG și spuneți pe care dintre cele trei le-ați raporta.
- ▣ Raportați: trei perechi de erori standard, o frază.

A3: deplasarea din zgomot și frecvența optimă de eșantionare [Rezolvat]

Cerință

- O zi de 6,5 ore, volatilitate constantă cu $IV = IQ = 1$ (%², %⁴), zgomot i.i.d. cu $\omega^2 = 1,6 \times 10^{-5}$.
- 1. Calculați $\mathbb{E}RV$ la 1 secundă ($n = 23\,400$), 1 minut ($n = 390$) și 5 minute ($n = 78$).
- 2. Calculați MSE aproximativ $2IQ/n + (2n\omega^2)^2$ la cele trei frecvențe.
- 3. Derivați n^* și transformați-l în secunde.
- Raportați: trei medii, trei valori MSE, un interval optim.

Rezolvare

- 1. $\mathbb{E}RV = 1 + 2n\omega^2$: 1,7488; 1,0125; 1,0025
- 2. MSE: 0,5608 (domină deplasarea), 0,0053; 0,0256 (domină varianța)
- 3. $\frac{d}{dn} \left[\frac{2}{n} + 4n^2\omega^4 \right] = 0 \Rightarrow n^* = (4\omega^4)^{-1/3} = 992$: un randament la fiecare 23,6 secunde

A4: două scale de timp și ponderile kernel [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ O zi: $RV^{(n)} = 1,75$ la o secundă ($n = 23\,400$), media RV la cinci minute pe cele $K = 300$ de grile decalate $\overline{RV}^{(K)} = 1,005$. Model: A3.
- ▣ 1. Calculați $\bar{n}$, TSRV și versiunea lui pentru eșantioane mici $TSRV/(1 - \bar{n}/n)$.
- ▣ 2. Estimați ω^2 prin $RV^{(n)}/(2n)$ și spuneți de ce este deplasat în sus.
- ▣ 3. Calculați ponderile Parzen $k(h/5)$ pentru $h = 1, \dots, 4$ ($H = 4$).
- ▣ Raportați: trei cifre, o estimăție și o frază, patru ponderi.

A5: RV, BV și testul de salt pe o zi-jucărie [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Opt randamente (%):
0,10; -0,12; 0,08; 1,20; -0,09; 0,11; -0,07; 0,10.
- ▣ 1. Calculați RV și BV; calculați RV fără al patrulea randament.
- ▣ 2. Calculați TQ, raportul $(RV - BV)/RV$ și statistica z Huang-Tauchen.
- ▣ 3. Decideți la 0,1% și explicați de ce $n = 8$ face testul slab.
- ▣ Raportați: trei cifre, trei cifre, o decizie și o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $RV = 1,5059$; $BV = 0,4492$; fără salt, $RV = 0,0659$: saltul domină RV, BV este mult mai puțin afectat
- ▣ 2. $TQ = 0,1360$, $TQ/BV^2 < 1$, deci $\max = 1$; raportul 0,7017;
 $z = 0,7017 / \sqrt{0,609/8} = 2,54$
- ▣ 3. $z < 3,09$: nu respingem la 0,1% ($p = 0,0055$); cu opt randamente, BV preia încă saltul prin două produse, iar ϑ/n este mare

A6: cel mai mic salt detectabil [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Volatilitate constantă, $IV = 1$, deci $BV \approx 1$, $TQ/BV^2 \approx 1$; un salt de mărime J (în unități $\sqrt{IV}$), deci $RV \approx 1 + J^2$. Model: A5.
- ▣ 1. Scrieți z ca funcție de J și n .
- ▣ 2. Rezolvați $z = 3,09$ în raport cu J pentru $n = 78$ și $n = 390$.
- ▣ 3. Comparați cu curba de putere din curs și spuneți ce limitează eşantionarea mai fină.
- ▣ Raportați: o formulă, două praguri, o frază.

A7: HAR ca AR(22) restricționat [Rezolvat]

Cerință

- HAR cu $\beta_0 = 0,10$, $\beta_d = 0,30$, $\beta_w = 0,40$, $\beta_m = 0,20$.
- 1. Scrieți coeficienții AR(22) implicați ϕ_j ai lui RV_{t+1-j} .
- 2. Calculați suma lor și media necondiționată a lui RV.
- 3. Numărați restricțiile pe care HAR le impune unui AR(22).
- Raportați: trei coeficienți distincți, două cifre, un număr de restricții.

Rezolvare

- 1. $\phi_1 = \beta_d + \frac{\beta_w}{5} + \frac{\beta_m}{22} = 0,3891$;
 $\phi_{2..5} = \frac{\beta_w}{5} + \frac{\beta_m}{22} = 0,0891$; $\phi_{6..22} = \frac{\beta_m}{22} = 0,0091$
- 2. $\sum \phi_j = \beta_d + \beta_w + \beta_m = 0,90$; media $\beta_0 / (1 - \sum \phi_j) = 1,00$
- 3. 23 de coeficienți reduși la 4: 19 restricții liniare (trei trepte)

A8: atenuarea și HARQ [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ $IV_{t+1} = c + 0,95 IV_t + v_{t+1}$, $\text{Var}(IV) = 0,8$; $RV_t = IV_t + e_t$, cu $\mathbb{E}\text{Var}(e_t) = 0,2$; $n = 78$. Model: A7.
- ▣ 1. Calculați λ și limita în probabilitate a pantei OLS a lui RV_{t+1} pe RV_t .
- ▣ 2. Calculați λ_t și panta într-o zi liniștită ($IQ_t = 0,5$) și într-o zi agitată ($IQ_t = 5$), cu $\text{Var}(e_t) = 2IQ_t/n$.
- ▣ 3. Explicați semnul lui β_{dQ} în HARQ.
- ▣ Raportați: două cifre, patru cifre, o frază.

A9: funcții de pierdere robuste și nerobuste față de pătratul randamentului [Rezolvat]

Cerință

- ▣ $r_t = \sigma_t z_t$, $z_t \sim N(0, 1)$, $\sigma_t^2 = 1$; proxy $\hat{\sigma}_t^2 = r_t^2$; prognozele $h = 1$ (adevărată) și $h = 0,6$ (deplasată).
- ▣ 1. Găsiți prognoza care minimizează $\mathbb{E}(\ln r_t^2 - \ln h)^2$.
- ▣ 2. Calculați pierderile MSE-log și QLIKE așteptate pentru ambele prognoze.
- ▣ 3. Spuneți care funcție de pierdere ordonează corect prognozele.
- ▣ Raportați: o cifră, patru cifre, o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $h^* = \exp(\mathbb{E} \ln z^2) = \exp(-1,2704) = 0,2807$: mult sub varianța adevărată
- ▣ 2. MSE-log: $\frac{\pi^2}{2} + (\mathbb{E} \ln z^2 - \ln h)^2$: 6,5486 ($h = 1$) și 5,5117 ($h = 0,6$); QLIKE: $\frac{1}{h} + 1,27 + \ln h - 1$: 1,2704 și 1,4262
- ▣ 3. MSE-log preferă prognoza deplasată; QLIKE (și MSE: 2 față de 2,16) o preferă pe cea adevărată

A10: o actualizare DCC și o actualizare cDCC [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar


Cerință

- $S = \begin{pmatrix} 1 & 0,5 \\ 0,5 & 1 \end{pmatrix}$, $a = 0,05$, $b = 0,93$, $Q_{t-1} = \begin{pmatrix} 1,2 & 0,7 \\ 0,7 & 0,9 \end{pmatrix}$, $z_{t-1} = (1,5; -0,5)'$. Model: A9.
- 1. Calculați Q_t și $\rho_{12,t}$ cu DCC.
- 2. Calculați z_{t-1}^* , Q_t și $\rho_{12,t}$ cu cDCC.
- 3. Comparați cu $\rho_{12,t-1}$ și explicați direcția schimbării.
- Raportați: o matrice și o corelație, un vector, o matrice și o corelație, o frază.

B1: salturi pentru Ether [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** cât de des are Ether salturi și cât din variația lui explică salturile?
- ▣ **Date:** RV, BV și TQ zilnice calculate de noi din randamente la 5 minute ($n = 288$ pe zi UTC), 2018–2026, $T = 3\,165$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați statistica Huang–Tauchen pentru fiecare zi și numărați zilele peste valoarea critică de 0,1%.
 2. Comparați cu numărul de respingeri false așteptat sub ipoteza nulă și repetați cu un prag Bonferroni pentru 5% pe toate zilele.
 3. Calculați ponderea în RV total a salturilor semnificative.
 4. Interpretare: sînt salturile frecvente, mari sau ambele?
- ▣ **Raportați:** două numărători, un număr așteptat, o pondere, o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]




- La 0,1%: 355 de zile cu salturi (11,2%), unde ne așteptăm la 3,2 respingeri false; pragul Bonferroni $z > 4,16$: tot 137 de zile
- Cele mai mari statistici: 22.07.2023 ($z = 13,1$), 23.03.2026 (10,9), 19.01.2019 (10,5); ponderea salturilor în RV total 2,3%
- Interpretare: respingerile sînt mult prea frecvente pentru ipoteza nulă (media lui $z = 1,19$), dar salturile au o pondere mică în variație: „salturile” mici și frecvente reflectă parțial sezonabilitatea intraday și randamentele nule, iar cîteva zile sînt salturi mari reale

B2: HAR pentru DAX [Rezolvat]

- **Întrebarea:** cât de persistentă este varianța realizată a DAX și este HAR mai bun decât mersul aleator în afara eșantionului?
- **Date:** RV la 5 minute pentru DAX din biblioteca Oxford-Man ($\%^2$), 2000–2022, $T = 5\,589$; fereastră mobilă de 1 000 de zile cu filtrul de plauzibilitate
- **Cerințe**
 1. Estimați HAR prin OLS pe tot eșantionul și raportați erorile standard Newey–West (5 decalaje), R^2 și persistența.
 2. Construiți prognoze cu un pas pentru HAR, log-HAR și mersul aleator (RV_t) și calculați QLIKE mediu.
 3. Testați HAR față de fiecare alternativă cu Diebold–Mariano.
 4. Interpretare: ce componentă de orizont contează cel mai mult pentru DAX?
- **Raportați:** patru coeficienți cu erori standard, două statistici, trei pierderi medii, două statistici DM, o frază
- Notebook: secțiunea B2

B2: rezolvare [Rezolvat]



- $\hat{\beta}_d = 0,414 (0,069)$, $\hat{\beta}_w = 0,279 (0,107)$, $\hat{\beta}_m = 0,210 (0,060)$, $\hat{\beta}_0 = 0,151$; $R^2 = 0,561$; persistența 0,903
- În afara eșantionului din 22.01.2004 (4 589 zile): QLIKE HAR 0,1863, mers aleator 0,2280 (DM 2,75), log-HAR 0,1597 (DM -2,09)
- Interpretare: pentru DAX, componenta zilnică are cea mai mare pondere, iar cea lunară ancorează prognoza; HAR este clar mai bun decât mersul aleator și este depășit de versiunea în logaritmi


B3: HARQ pentru Ether în afara eșantionului [Propus]

- **Întrebarea:** se regăsește câștigul HARQ al lui Bollerslev, Patton și Quaadvlieg (2016) pentru Ether?
- **Date:** RV și RQ la 5 minute pentru Ether, 2018–2026; fereastră mobilă de 1 000 de zile; model: B2 și A8
- **Cerințe**
 1. Construiți prognoze HAR și HARQ cu filtrul de plauzibilitate și calculați rapoartele QLIKE și MSE HARQ/HAR, cu statisticile DM.
 2. Numărați prognozele HARQ brute din afara intervalului din eșantion și pe cele negative.
 3. Înlocuiți filtrul cu o limită inferioară egală cu cel mai mic RV din eșantion și repetați.
 4. Interpretare: este câștigul robust la tratarea prognozelor neplauzibile?
- **Raportați:** patru rapoarte cu statistici DM, două numărători, o frază
- **Notebook:** secțiunea B3

B4: QML pentru EUR/RON [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** cât de persistentă este volatilitatea EUR/RON și cât contează alegerea erorilor standard?
- ▣ **Date:** randamentele logaritmice zilnice ale cursului de referință BNR (%), centrate, 2010–2026, $T = 4\,207$
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați GARCH(1,1) prin QML gaussian; raportați erorile standard din hessiană și Bollerslev–Wooldridge.
 2. Calculați coeficientul de boltire al reziduurilor standardizate și comparați raportul erorilor standard cu $\sqrt{(\hat{\kappa} - 1)/2}$.
 3. Estimați GARCH- t prin ML și comparați log-verosimilitățile.
 4. Interpretare: ce spune persistența despre un curs administrat?
- ▣ **Raportați:** un tabel cu trei parametri, fiecare cu două erori standard, un coeficient de boltire, un câștig de log-verosimilitate, o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B4

B4: rezolvare [Rezolvat]



- $\hat{\omega} = 0,00049$ (0,00004; 0,00027), $\hat{\alpha} = 0,166$ (0,015; 0,040), $\hat{\beta} = 0,833$ (0,012; 0,027); în paranteze: hessiană; sandwich
- Coeficientul de boltire al reziduurilor standardizate 61,8 (randamente brute 15,4); raportul sandwich/hessiană pentru α 2,71; GARCH- t : $\hat{\nu} = 7,9$, log-verosimilitatea mai mare cu 861,0
- Interpretare: persistența 0,9998, aproape integrată: perioade lungi de calm cu episoade rare de agitație (2012–2013, finalul lui 2022, 2025, 2026); coeficientul de boltire extrem chiar după filtrarea GARCH arată că o singură ecuație a varianței nu poate descrie un curs de schimb administrat

B5: GARCH-MIDAS pentru BET [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** determină producția industrială a României volatilitatea de termen lung a BET?
- ▣ **Date:** randamentele zilnice ale BET din 2003; producția industrială Eurostat (B–D, ajustată sezonier și cu numărul de zile lucrătoare), creșterea lunară în logaritmi; $K = 24$ de decalaje; model: B4
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați GARCH-MIDAS cu τ_t în logaritmi și ponderi beta restricționate prin QML; raportați $\hat{\theta}$ și $\hat{w}$ cu erori standard sandwich.
 2. Calculați raportul de varianță.
 3. Comparați cu GARCH(1,1) pe aceleași zile prin BIC.
 4. Interpretare: este vizibil canalul macroeconomic în volatilitatea acțiunilor românești?
- ▣ **Raportați:** două estimări cu erori standard, un raport, două valori BIC, o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B5

C1: Bitcoin înainte și după ETF-urile spot [Propus]

- **Întrebarea:** a devenit volatilitatea Bitcoin mai asemănătoare cu cea a acțiunilor după ce ETF-urile spot din SUA au început să se tranzacționeze, pe 11 ianuarie 2024?
- **Date:** măsurile realizate Bitcoin calculate de noi, 2021–2026; randamentele zilnice ale S&P 500; model: B1–B3
- **Cerințe**
 1. Scrieți o preînregistrare de cinci rînduri: ipoteza, împărțirea eșantionului, statisticile, testele, ce ar infirma afirmația.
 2. Pentru 2021–2023 și de la 11 ianuarie 2024, calculați volatilitatea anualizată (din realised kernel), ponderea zilelor cu salturi, ponderea salturilor în RV, persistența HAR și corelația cu S&P 500.
 3. Spuneți ce diferențe ați putea atribui ETF-urilor și ce diferențe altor evenimente.
 4. Interpretare: ce se poate și ce nu se poate concluziona și cum ați transforma acest lucru într-un proiect?
- **Raportați:** un plan de cinci rînduri, un tabel cu două rînduri, un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI un rezumat despre modelarea volatilității cu date de înaltă frecvență. Răspunsul:
 - (a) QML gaussian este inconsistent când randamentele au cozi groase; folosiți în schimb ML Student-t.
 - (b) Eșantionarea prețurilor cât mai des face întotdeauna varianța realizată mai precisă.
 - (c) Într-o zi fără salturi, variația bipower este egală cu varianța realizată.
 - (d) HAR este un model cu memorie lungă.
 - (e) MSE pe logaritmi varianțelor este o funcție de pierdere robustă pentru compararea prognozelor cu pătratele randamentelor.
 - (f) În DCC, ținta S este corelația necondiționată a reziduurilor standardizate, deci estimatorul este consistent.
 - (g) În Realized GARCH, măsura realizată poate fi un semnal deplasat și zgomotos al varianței condiționate.
- Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați o cifră din cerințele de azi (secțiunea C2 din notebook).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de șapte verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Idei de reținut

- ▣ QML are nevoie doar de ecuația varianței; erorile lui standard au nevoie de coeficientul de boltire: folosiți sandwich-ul
- ▣ Varianța realizată echilibrează varianța estimatorului cu deplasarea din zgomot; kernel-urile și cele două scale folosesc toate datele
- ▣ Testele de salt resping des în datele reale; salturile explică puțin din variație
- ▣ HAR este un AR(22) restricționat; HARQ lasă precizia lui RV să stabilească ponderea zilei de ieri
- ▣ Ordonăți prognozele de volatilitate cu QLIKE sau MSE; un răspuns AI este o ciornă de verificat

După seminar

- ▣ Cursul 8 dezvoltă fiecare temă de azi: teoria QML, component GARCH și GARCH-MIDAS, TLC pentru RV, zgomotul și kernel-urile, testele de salt, HAR și HARQ, Realized GARCH, funcțiile de pierdere robuste, DCC, cDCC și DCC-NL
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook
- ▣ C1 poate deveni un proiect de echipă: volatilitatea realizată a criptoactivelor în jurul unei schimbări de structură a pieței
- ▣ Lectură: Bollerslev și Wooldridge (1992); Barndorff-Nielsen și Shephard (2002); Corsi (2009); Bollerslev, Patton și Quaadvlieg (2016); Patton (2011)
- ▣ **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar**

Bibliografie (1/2)

- ▣ Aielli, G. P. (2013). Dynamic conditional correlation: On properties and estimation. *Journal of Business & Economic Statistics*, 31(3), 282–299. doi:10.1080/07350015.2013.771027
- ▣ Bandi, F. M., & Russell, J. R. (2008). Microstructure noise, realized variance, and optimal sampling. *The Review of Economic Studies*, 75(2), 339–369. doi:10.1111/j.1467-937X.2008.00474.x
- ▣ Barndorff-Nielsen, O. E., Hansen, P. R., Lunde, A., & Shephard, N. (2008). Designing realized kernels to measure the ex post variation of equity prices in the presence of noise. *Econometrica*, 76(6), 1481–1536. doi:10.3982/ECTA6495
- ▣ Barndorff-Nielsen, O. E., & Shephard, N. (2002). Econometric analysis of realized volatility and its use in estimating stochastic volatility models. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 64(2), 253–280. doi:10.1111/1467-9868.00336
- ▣ Barndorff-Nielsen, O. E., & Shephard, N. (2004). Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps. *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 1–37. doi:10.1093/jjfinec/nbh001
- ▣ Bollerslev, T., Patton, A. J., & Quaedvlieg, R. (2016). Exploiting the errors: A simple approach for improved volatility forecasting. *Journal of Econometrics*, 192(1), 1–18. doi:10.1016/j.jeconom.2015.10.007
- ▣ Bollerslev, T., & Wooldridge, J. M. (1992). Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time-varying covariances. *Econometric Reviews*, 11(2), 143–172. doi:10.1080/07474939208800229
- ▣ Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196. doi:10.1093/jjfinec/nbp001
- ▣ Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263. doi:10.1080/07350015.1995.10524599
- ▣ Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. *Journal of Business & Economic Statistics*, 20(3), 339–350. doi:10.1198/073500102288618487
- ▣ Engle, R. F., Ghysels, E., & Sohn, B. (2013). Stock market volatility and macroeconomic fundamentals. *The Review of Economics and Statistics*, 95(3), 776–797. doi:10.1162/REST_a_00300
- ▣ Heber, G., Lunde, A., Shephard, N., & Sheppard, K. (2009). *Oxford-Man Institute's realized library*, version 0.3. Oxford-Man Institute, University of Oxford (discontinued in 2022; copy of 28 February 2022 preserved by the Internet Archive). web.archive.org

Bibliografie (2/2)

- ▣ Huang, X., & Tauchen, G. (2005). The relative contribution of jumps to total price variance. *Journal of Financial Econometrics*, 3(4), 456–499. doi:[10.1093/jjfinec/nbi025](https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbi025)
- ▣ Patton, A. J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256. doi:[10.1016/j.jeconom.2010.03.034](https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2010.03.034)
- ▣ Zhang, L., Mykland, P. A., & Aït-Sahalia, Y. (2005). A tale of two time scales: Determining integrated volatility with noisy high-frequency data. *Journal of the American Statistical Association*, 100(472), 1394–1411. doi:[10.1198/016214505000000169](https://doi.org/10.1198/016214505000000169)