



Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Seminarul 9: VaR, ES și backtesting: elicitalitate, funcții de scor și riscul de model



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ACI: Adaptive Conformal Inference (inferență conformală adaptivă)
- ADAPT: Adaptive (CAViaR specification) — specificația CAViaR adaptivă
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ARMA-GARCH: ARMA mean with GARCH variance (medie ARMA cu varianță GARCH)
- AS: Asymmetric Slope (CAViaR specification) — specificația CAViaR cu pantă asimetrică
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- BNR: Banca Națională a României
- DM: Diebold–Mariano (test) — testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor
- DQ: Dynamic Quantile (test of Engle and Manganelli) — testul dinamic pe cuantile al lui Engle și Manganelli
- EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- ES: Expected Shortfall (pierdere așteptată în coadă)
- FHS: Filtered Historical Simulation (simulare istorică filtrată)
- FZ-1F: One-factor GAS model for VaR and ES (label of Patton, Ziegel and Chen) — model GAS cu un factor pentru VaR și ES (eticheta lui Patton, Ziegel și Chen)
- FZ0: Zero-homogeneous Fissler–Ziegel loss (Patton, Ziegel and Chen) — pierdere Fissler–Ziegel omogenă de grad zero (Patton, Ziegel și Chen)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GARCH-EDF: GARCH with innovations from the empirical distribution function (GARCH cu inovații din funcția de repartiție empirică)
- GARCH-FZ: GARCH model estimated by FZ0 minimisation (model GARCH estimat prin minimizarea pierderii FZ0)
- GARCH-N: GARCH with Normal innovations (GARCH cu inovații din distribuția Normală)
- GAS-1F: One-factor GAS model for VaR and ES (model GAS cu un factor pentru VaR și ES)
- GAS-FZ: GAS models for VaR and ES driven by the FZ0 loss (modele GAS pentru VaR și ES determinate de pierdere FZ0)
- GCH-FZ: GARCH model estimated by FZ0 minimisation (table label) — model GARCH estimat prin minimizarea pierderii FZ0 (etichetă de tabel)
- GJR-GARCH: Glosten–Jagannathan–Runkle GARCH (GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle)
- IG: Indirect GARCH (CAViaR specification) — specificația CAViaR GARCH indirect
- LR: Likelihood Ratio (test) — testul raportului de verosimilitate
- MCS: Model Confidence Set (mulțimea de încredere a modelelor)
- PZC: Patton, Ziegel and Chen (2019) — Patton, Ziegel și Chen (2019)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- RW-125: Rolling Window of 125 days (historical simulation) — fereastră mobilă de 125 de zile (simulare istorică)
- RW-250: Rolling Window of 250 days (historical simulation) — fereastră mobilă de 250 de zile (simulare istorică)
- RW-500: Rolling Window of 500 days (historical simulation) — fereastră mobilă de 500 de zile (simulare istorică)
- SAV: Symmetric Absolute Value (CAViaR specification) — specificația CAViaR cu valoare absolută simetrică

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cum evaluăm prin scoruri, estimăm, testăm și comparăm prognozele VaR și ES?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 9: secțiunea „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
 - ▶ Partea A: consistența pierderii pinball, ES la amestecare, FZ0 de mână, durate, regula rădăcinii pătrate sub GARCH, recursii CAViaR, teste ES de mână, zone comparative
 - ▶ Partea B: CAViaR pentru S&P 500 și BET; replicarea lui Patton, Ziegel și Chen; DAX până în 2026; MCS pentru Bitcoin și EUR/RON; VaR pe 10 zile pentru DAX
 - ▶ Partea C: corecția conformală a VaR pentru BET; un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	ce prognoză minimizează pierderea pinball; ES la amestecare	Rezolvat,	A1
A3, A4	pierderea FZ0 de mînă; duratele dintre depășiri	Propus	
A5, A6	regula rădăcinii pătrate sub GARCH; recursii CAViaR	Rezolvat,	A3
A7, A8	Acerbi–Székely și McNeil–Frey de mînă; zonele Nolde–Ziegel	Propus	
B1, B2	VaR 1% CAViaR pentru S&P 500 și BET	Rezolvat,	A5
B3, B4	Patton–Ziegel–Chen pe S&P 500; DAX pînă în 2026	Propus	
B5, B6	MCS în perioadele de criză; VaR pe 10 zile pentru DAX	Rezolvat,	A7
C1, C2	corecția conformală a unui VaR; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	
			B1, A1–A8

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
S&P 500, DAX	EODHD	zilnic	1990–2026
BET	EODHD	zilnic	2000–2026
EUR/RON	cursul de referință BNR	zilnic	2005–2026
Bitcoin	EODHD	zilnic, 7 zile pe săptămână	2014–2026

- Randamente logaritmice zilnice în %; în notebook: `pinball`, `fz0`, `caviar_fit`, `caviar_se`, `dq_test`, `fz_fit`, `pzc_gof`, `cp_duration_test`, `dm_test`, `mcs`, `aci_levels`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/4): VaR, ES și scoruri

- ▣ Nivelul α (VaR 1%: $\alpha = 0,01$); $v = q_\alpha$ cuantila randamentelor, $\text{VaR}_\alpha = -v$; $e = \mathbb{E}[Y \mid Y \leq v]$, $\text{ES}_\alpha = -e$; $e \leq v < 0$
 - ▶ distribuția Normală: $v = \Phi^{-1}(\alpha)$, $e = -\varphi(\Phi^{-1}(\alpha))/\alpha$; pentru $\alpha = 2,5\%$: $(-1,960; -2,338)$
- ▣ Un scor $S(x, y)$ este **consistent** pentru T dacă $\mathbb{E}_F S(T(F), Y) \leq \mathbb{E}_F S(x, Y)$ pentru orice x ; T este **elicitabilă** dacă există un S strict consistent [Gneiting \(2011\)](#)
 - ▶ pinball: $\rho_\alpha(y, x) = (1\{y \leq x\} - \alpha)(x - y)$, consistent pentru q_α
- ▣ ES singur nu este elicitabil; perechea este [Fissler și Ziegel \(2016\)](#); **FZ0** [Patton, Ziegel și Chen \(2019\)](#):

$$L(y, v, e) = -\frac{1\{y \leq v\}(v - y)}{\alpha e} + \frac{v}{e} + \ln(-e) - 1$$
 - ▶ condiția necesară a elicitabilității: mulțimi de nivel convexe (un amestec de două distribuții cu aceeași funcțională o păstrează)

Noțiuni necesare azi (2/4): CAViaR și DQ

- ▣ **CAViaR Engle și Manganelli (2004)**, scris pentru $\text{VaR}_t > 0$: SAV $\beta_1 + \beta_2 \text{VaR}_{t-1} + \beta_3 |y_{t-1}|$; AS $\beta_1 + \beta_2 \text{VaR}_{t-1} + \beta_3 y_{t-1}^+ + \beta_4 y_{t-1}^-$
 - ▶ IG $(\beta_1 + \beta_2 \text{VaR}_{t-1}^2 + \beta_3 y_{t-1}^2)^{1/2}$; adaptiv: crește VaR după o depășire; $y^+ = \max(y, 0)$, $y^- = \max(-y, 0)$
 - ▶ estimare: minimizăm pierderea pinball medie a lui $q_t = -\text{VaR}_t$ din multe puncte de pornire aleatoare
- ▣ Testul **DQ**: $\text{Hit}_t = 1\{y_t < q_t\} - \alpha$ pe (1, patru depășiri întârziate, q_t); $\text{DQ} = \text{Hit}' X (X' X)^{-1} X' \text{Hit} / (\alpha(1 - \alpha)) \sim \chi_6^2$ în afara eșantionului
- ▣ **GAS-1F Patton, Ziegel și Chen (2019)**: $(v_t, e_t) = (a, b)e^{\kappa_t}$, $\kappa_t = \beta \kappa_{t-1} + \gamma(-1/e_{t-1})(1\{y_{t-1} \leq v_{t-1}\}y_{t-1}/\alpha - e_{t-1})$, estimat prin minimizarea FZ0

Noțiuni necesare azi (3/4): backtesting

- Kupiec: LR pentru rata de depășire față de α , χ_1^2 ; Christoffersen: adaugă dependența de ordinul întâi, χ_2^2 **Kupiec (1995), Christoffersen (1998)**
 - ▶ **durate Christoffersen și Pelletier (2004)**: pentru un VaR corect distanțele dintre depășiri sînt geometrice, cu media $1/\alpha$; forma Weibull $b < 1$ înseamnă grupare
- Regresiile PZC: $1\{y_t \leq v_t\} - \alpha$ și $1\{y_t \leq v_t\}y_t/(\alpha e_t) - 1$ pe $(1, \text{propriul decalaj}, v_t \text{ sau } e_t)$, Wald χ_3^2
- În unități de pierdere $L_t = -y_t$, cu $\text{VaR}_t, \text{ES}_t > 0$ și $I_t = 1\{L_t > \text{VaR}_t\}$:
 - ▶ **Acerbi și Székely (2014)**: $Z_2 = 1 - \frac{1}{T\alpha} \sum_t L_t I_t / \text{ES}_t$, $\mathbb{E}Z_2 = 0$ sub H_0 , negativ dacă riscul este subestimat
 - ▶ **McNeil și Frey (2000)**: reziduurile $r_t = (L_t - \text{ES}_t)/\sigma_t$ în zilele cu depășiri au media 0 sub H_0 ; media pozitivă: ES prea mic

Noțiuni necesare azi (4/4): comparație și orizont

- DM: statistica t a diferenței medii de pierdere cu varianță Newey–West ([Capitolul 1](#)) [Diebold și Mariano \(1995\)](#)
 - ▶ Zonele Nolde–Ziegel [Nolde și Ziegel \(2017\)](#): teste unilaterale la 5% pentru modelul intern minus cel standard; verde dacă este semnificativ mai bun, roșu dacă este semnificativ mai slab, galben altfel
- MCS [Hansen, Lunde și Nason \(2011\)](#): eliminăm cel mai slab model pînă cînd egalitatea capacității predictive nu se mai respinge; valoarea p MCS $\geq 0,10$: în mulțimea de 90%
- Orizontul: scalarea cu $\sqrt{h}$ este exactă doar pentru randamente i.i.d. din distribuția Normală; GARCH(1,1):
$$\mathbb{E}_t \sum_{k=1}^h \sigma_{t+k}^2 = \sum_{k=0}^{h-1} [\bar{\sigma}^2 + (\alpha + \beta)^k (\sigma_{t+1}^2 - \bar{\sigma}^2)]$$
- ACI [Gibbs și Candès \(2021\)](#): $\alpha_{t+1} = \alpha_t + \gamma(\alpha - \text{err}_t)$, cuantila modelului la nivelul α_t ; frecvența depășirilor pe termen lung $\rightarrow \alpha$ pentru orice date

A1: pierderea pinball și minimul ei [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Zece randamente:
 $-3,1; -1,2; -0,4; 0,3; 0,9; 1,5; 2,2; -2,0; 0,1; 0,6; \alpha = 0,1$.
- ▣ 1. Arătați că $\frac{d}{dx} \mathbb{E} \rho_\alpha(Y, x) = F(x) - \alpha$.
- ▣ 2. Calculați pierderea pinball medie în
 $x = -3,1; -2,6; -2,0; -1,2$.
- ▣ 3. Ce prognoze o minimizează și de ce minimul nu este unic?
- ▣ Raportați: o derivare; patru numere; un interval și o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $\mathbb{E} \rho = (1 - \alpha) \int_{-\infty}^x (x - y) dF + \alpha \int_x^{\infty} (y - x) dF$; derivata
 $(1 - \alpha)F(x) - \alpha(1 - F(x)) = F(x) - \alpha$
- ▣ 2. 0,299; 0,299; 0,299; 0,379
- ▣ 3. Orice $x \in [-3,1; -2,0]$: acolo $F_n(x) = 0,1 = \alpha$, iar funcția obiectiv empirică este plată
- ▣ Interpretare: cînd $n\alpha$ este întreg, cuantila de eșantion este un interval; cu puține puncte în coadă, pierderea abia separă prognozele

A2: ES nu este elicibil [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ $F_0 = N(0, 1)$ și $F_1 = o\ t(3)$ scalată cu s astfel încît ambele să aibă ES 2,5% egal cu cel al lui $N(0, 1)$. Model: A1.
- ▣ 1. Folosind $e_t = -s\ t_3(q)(3 + q^2)/(2\alpha)$ în $q = t_3^{-1}(\alpha)$, găsiți s .
- ▣ 2. Pentru amestecul $0,4F_0 + 0,6F_1$, calculați cuantila de 2,5% și media cozii (secțiunea A2 din notebook).
- ▣ 3. Explicați de ce aceasta demonstrează că nu există o pierdere strict consistentă pentru ES singur.
- ▣ Raportați: un număr; două numere; trei fraze.

A3: pierderea FZ0 de mîină [Rezolvat]

Cerință

- ▣ $\alpha = 0,025$; prognoza 1: $(v, e) = (-1,96; -2,34)$; prognoza 2: $(-2,5; -3,2)$.
- ▣ 1. Calculați FZ0 pentru ambele prognoze în $y = -3$ și în $y = 0,5$.
- ▣ 2. Care prognoză este mai bună într-o zi cu depășire și care într-o zi calmă?
- ▣ 3. Dacă $Y \sim N(0, 1)$, care prognoză are pierderea așteptată mai mică (notebook: 10^6 extrageri)?
- ▣ Raportați: patru numere; două fraze; două numere.

Rezolvare

- ▣ 1. $y = -3$: 18,466 și 7,194; $y = 0,5$: 0,688 și 0,944
- ▣ de exemplu prognoza 1 în $y = -3$:

$$-\frac{1,04}{0,025 \cdot (-2,34)} + \frac{-1,96}{-2,34} + \ln 2,34 - 1$$
- ▣ 2. Prognoza prudentă 2 câștigă în ziua cu depășire, prognoza 1 în ziua calmă: o singură zi nu spune nimic
- ▣ 3. $\mathbb{E}L_1 = 0,8486$, $\mathbb{E}L_2 = 0,9689$: prognoza 1 este perechea corectă $(v, e) = (-1,960; -2,338)$ și câștigă în medie

A4: duratele dintre depășiri [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ VaR 1%; douăsprezece durate (zile) între depășiri consecutive: 3, 41, 2, 160, 95, 1, 4, 230, 12, 2, 68, 7. Model: A3.
- ▣ 1. Calculați durata medie și hazardul de verosimilitate maximă al modelului exponențial; comparați cu α .
- ▣ 2. Calculați ponderea duratelor de cel mult 5 zile și valoarea ei pentru un VaR corect, $1 - 0,99^5$.
- ▣ 3. Ar da o estimare Weibull $b < 1$ sau $b > 1$? Explicați.
- ▣ Raportați: două numere și o frază; două numere; o frază.

A5: regula rădăcinii pătrate a timpului sub GARCH [Rezolvat]

Cerință

- ▣ GARCH(1,1): $\omega = 0,02$, $\alpha = 0,08$, $\beta = 0,90$; inovații din distribuția Normală; orizontul $h = 10$.
- ▣ 1. Calculați varianța necondiționată $\bar{\sigma}^2$.
- ▣ 2. Pentru $\sigma_{t+1}^2 = 4$ (criză) și 0,5 (calm), calculați $\sum_{k=0}^9 \mathbb{E}_t \sigma_{t+1+k}^2$ și raportul $\sqrt{\text{suma}/(10\sigma_{t+1}^2)}$.
- ▣ 3. Când supraestimează scalarea cu $\sqrt{10}$ volatilitatea pe 10 zile?
- ▣ Raportați: un număr; patru numere; o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $\bar{\sigma}^2 = 0,02/(1 - 0,98) = 1,00$
- ▣ 2. Criză: suma 37,44, raportul 0,967; calm: suma 5,43, raportul 1,042
- ▣ 3. Când varianța de azi depășește $\bar{\sigma}^2$: volatilitatea este așteptată să scadă; cu persistența 0,98 efectul pe 10 zile este de cîteva procente
- ▣ Interpretare: revenirea la medie mută singură VaR pe 10 zile cu cîteva procente; cozile groase și efectul de levier (Cursul 9) îl mută mai mult

A6: recursii CAViaR [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ SAV $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (0,36; 0,70; 0,60)$; AS $(0,26; 0,81; 0,04; 0,62)$; $\text{VaR}_{t-1} = 2,0$; $y_{t-1} = -3,0$, apoi $y_t = 1,0$. Model: A5.
- ▣ 1. Calculați VaR_t și VaR_{t+1} pentru SAV și pentru AS.
- ▣ 2. Calculați valoarea AS a lui VaR_t după $y_{t-1} = +3,0$.
- ▣ 3. Interpretați β_4/β_3 și β_2 .
- ▣ Raportați: patru numere; un număr; două fraze.

A7: teste pentru ES de mîină [Rezolvat]

Cerință

- $T = 250$, ES 2,5%; șapte zile cu depășiri, cu pierderea L , VaR, ES, σ (%): (3,9; 2,6; 3,3; 1,2), (2,8; 2,5; 3,1; 1,1), (4,6; 2,9; 3,6; 1,3), (3,1; 2,7; 3,4; 1,2), (6,2; 3,0; 3,8; 1,4), (2,9; 2,6; 3,2; 1,15), (3,4; 2,8; 3,5; 1,25).
- 1. Calculați Z_2 și $Z_1 = 1 - \frac{1}{N} \sum L_t / ES_t$.
- 2. Calculați reziduurile McNeil–Frey, media lor și statistica t .
- 3. Comparați cu valoarea critică de referință de 5% a lui Z_2 , circa $-0,70$ pentru $T = 250$.
- Raportați: două numere; șapte reziduuri și două numere; o frază.

Rezolvare

- 1. $\sum L/ES = 7,784$; $Z_2 = 1 - 7,784/6,25 = -0,245$; $Z_1 = -0,112$
- 2. Reziduuri 0,500; $-0,273$; 0,769; $-0,250$; 1,714; $-0,261$; $-0,080$; media 0,303, $t = 1,07$
- 3. Z_2 este negativ, dar peste $-0,70$: șapte depășiri în loc de 6,25 și o singură pierdere mare nu sînt suficiente pentru respingere
- Interpretare: Z_2 combină frecvența și mărimea; Z_1 și McNeil–Frey privesc doar mărimea condiționat de depășire, cu șapte observații

A8: zonele backtesting-ului comparativ [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar


Cerință

- ▣ Trei modele interne A, B, C față de un model standard; statisticile DM ale pierderii FZ0 medii a modelului intern minus cea a modelului standard: $-2,31$; $0,84$; $2,05$. Model: A7.
- ▣ 1. Dați valoarea critică unilaterală de 5%.
- ▣ 2. Încadrați fiecare model în zona verde, galbenă sau roșie.
- ▣ 3. Explicați de ce un model galben nu este „la fel de bun” ca modelul standard.
- ▣ Raportați: un număr; trei zone; o frază.

B1: CAViaR pentru S&P 500 [Rezolvat]

- **Întrebarea:** ce specificație CAViaR dă un VaR 1% calibrat pentru S&P 500 în afara eșantionului?
- **Date:** ultimele 3 392 de randamente zilnice pînă la 18 septembrie 2026: 2 892 pentru estimare, 500 în afara eșantionului (designul lui Engle și Manganelli 2004)
- **Cerințe**
 1. Estimați SAV, AS, IG și modelul adaptiv cu căutarea Engle–Manganelli.
 2. Raportați coeficienții cu erorile lor standard asimptotice.
 3. Raportați ratele de depășire în afara eșantionului și testul DQ în afara eșantionului.
 4. Interpretare: ce model ați folosi și cît de mult v-ați baza pe test?
- **Raportați:** un tabel de coeficienți, patru rate de depășire, patru statistici DQ cu valorile p , o frază
- Notebook: secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



Modelul	β_1	β_2	β_3	β_4	DQ (p)
SAV	0,359 (0,217)	0,702 (0,118)	0,604 (0,243)	—	14,43 (0,025)
AS	0,264 (0,137)	0,805 (0,080)	0,044 (0,185)	0,616 (0,149)	15,81 (0,015)
IG	0,942 (0,467)	0,674 (0,105)	1,429 (0,702)	—	2,29 (0,891)
ADAPT	1,190 (0,069)	—	—	—	27,50 (<0,001)

- Ratele de depășire în afara eșantionului: SAV 1,4%, AS 1,2%, IG 1,2%, adaptiv 0,8% (5 depășiri așteptate în 500 de zile)
- Interpretare: IG trece testul DQ, SAV și AS sînt respinse la 5%, modelul adaptiv clar; cu circa cinci depășiri decizia depinde de grupul din aprilie 2025: folosiți IG sau AS și raportați testul ca fragil


B2: CAViaR pentru BET [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** descrie panta asimetrică și coada pieței din București?
- ▣ **Date:** BET, ultimele 3392 de randamente zilnice (21 februarie 2013 – 18 septembrie 2026), în afara eșantionului din 12 septembrie 2024; model: B1
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați SAV și AS pentru VaR 1% și raportați coeficienții cu erorile standard.
 2. Estimați un GARCH(1,1) cu inovații Student-t pe aceeași fereastră și calculați VaR 1%.
 3. Comparați cele trei modele în afara eșantionului: rata de depășire, valoarea p DQ și pierderea pinball medie.
 4. Interpretare: este coada BET asimetrică și aduce asimetria un câștig în afara eșantionului?
- ▣ **Raportați:** doi vectori de coeficienți cu erorile standard, un tabel cu nouă numere, o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B2

B3: replicarea lui Patton, Ziegel și Chen [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** reproducem ordonarea în afara eșantionului din Tabelul S5 ($\alpha = 2,5\%$) pe datele noastre?
- ▣ **Date:** S&P 500, estimare ianuarie 1990 – decembrie 1999, parametri ficși pentru 2000–2016 ($T = 4\,275$); cele zece modele din lucrare
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați modelele cu fereastră mobilă, ARMA-GARCH și FZ0 ca în lucrare.
 2. Calculați pierderea FZ0 medie în afara eșantionului pentru fiecare model și comparați-o cu lucrarea.
 3. Calculați statisticile DM pentru GARCH-EDF, RW-250 și GARCH-N față de GAS-1F.
 4. Interpretare: ce concluzii ale lucrării rămân valabile pe datele noastre?
- ▣ **Raportați:** zece perechi de pierderi, trei statistici DM, o frază
- ▣ Notebook: secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



- Noi (lucrarea): RW-125 1,120 (1,119), RW-500 1,247 (1,245), GARCH-N 1,089 (1,089), GARCH-EDF 1,028 (1,028), GAS-1F 1,038 (1,032), GARCH-FZ 1,040 (1,020)
- DM față de GAS-1F: GARCH-EDF 0,52, RW-250 3,87, GARCH-N 1,95
- Interpretare: pierderile coincid la circa două sutimi; ferestrele mobile sînt clar mai slabe, iar GARCH-EDF, GAS-1F și GARCH-FZ nu pot fi separate: mesajul principal al lucrării rămîne, identitatea cîștigătorului nu


B4: DAX pînă în 2026 [Propus]

- **Întrebarea:** își păstrează modelele semiparametrice avantajul pe alt indice și pe o perioadă mai lungă?
- **Date:** DAX, estimare 1990–1999, în afara eșantionului ianuarie 2000 – septembrie 2026 ($T = 6\,787$), $\alpha = 2,5\%$; model: B3
- **Cerințe**
 1. Raportați pierderea FZ0 medie și rata de depășire pentru RW-250, GARCH-Skt, GARCH-EDF și GAS-1F.
 2. Aplicați regresiiile de adecvare PZC pentru VaR și ES.
 3. Calculați statistica DM a GAS-1F față de GARCH-EDF pe toată perioada, înainte de 2017 și din 2017.
 4. Interpretare: ce adaugă DAX la evidența de pe S&P 500?
- **Raportați:** un tabel cu patru modele, cu pierderi, rate de depășire și două valori p , trei statistici DM, o frază
- **Notebook:** secțiunea B4

B5: MCS în perioadele de criză [Rezolvat]

- **Întrebarea:** pot ferestrele de criză să separe modelele ES pentru Bitcoin și EUR/RON?
- **Date:** cele zece modele PZC, $\alpha = 2,5\%$; Bitcoin în afara eșantionului din 1 ianuarie 2020 ($T = 2453$), EUR/RON din 1 iulie 2015 ($T = 2815$); perioadele de criză 2020, 2022, 2025
- **Cerințe**
 1. Calculați MCS de 90% pentru pierderile FZ0 pe toată perioada din afara eșantionului (blocuri de 10 zile, 1000 de replicări).
 2. Repetați calculul în fiecare perioadă de criză (blocuri de 5 zile).
 3. Numărați depășirile GAS-1F în fiecare perioadă.
 4. Interpretare: ce spune mărimea mulțimii MCS?
- **Raportați:** mărimile și membrii mulțimilor MCS, numerele de depășiri, o frază
- Notebook: secțiunea B5

B5: rezolvare [Rezolvat]



- Toată perioada: Bitcoin 10 din 10 modele în MCS (eliminate: niciunul); EUR/RON 8 (eliminate: FZ-1F, GCH-FZ)
- Bitcoin, mărimea MCS (zile, depășiri): 2020 10 (133; 3), 2022 10 (362; 10), 2025 8 (120; 1)
- EUR/RON în 2020: rămân 4 modele (RW-125, RW-250, RW-500, Hybrid), cu 0 depășiri GAS-1F; 2022 și 2025: toate zece
- Interpretare: câteva zile din coadă nu pot ordona zece modele; rezultatul EUR/RON din 2020 provine din supraestimarea riscului, nu din depășiri

B6: VaR pe 10 zile pentru DAX [Propus]

- **Întrebarea:** cât de greșită este regula rădăcinii pătrate a timpului pentru DAX și poate un backtest să o arate?
- **Date:** DAX 2001–2026; GJR-GARCH(1,1), fereastră mobilă de 2000 de zile, reestimat la fiecare 250 de zile; 2000 de traiectorii bootstrap de 10 zile; model: B5
- **Cerințe**
 1. Calculați în fiecare zi VaR 1% pe 10 zile prin FHS și $\sqrt{10}$ înmulțit cu VaR 1% pe o zi.
 2. Raportați raportul median și mediana lui în cele mai calme 20% și cele mai volatile 20% din zile.
 3. Testați ambele pe ferestre de 10 zile fără suprapunere (depășiri, Kupiec p).
 4. Interpretare: este diferența detectabilă economic sau statistic?
- **Raportați:** trei rapoarte, două numere de depășiri și două valori p , o frază
- **Notebook:** secțiunea B6

C1: o corecție conformală pentru VaR BET [Propus]

- **Întrebarea:** poate inferența conformală adaptivă să repare un VaR 1% GARCH cu distribuția Normală necalibrat pentru BET și cu ce cost?
- **Date:** BET 2016–2026 ($T = 2\,675$ de zile); GARCH-N, fereastră mobilă de 1000 de zile, reestimat la fiecare 250 de zile; model: B1
- **Cerințe**
 1. Scrieți o preînregistrare de cinci rînduri: ipoteza, modelele, pașii γ , eșantionul, ce v-ar face să vă schimbați concluzia.
 2. Aplicați ACI cu $\gamma = 0,001; 0,005; 0,02$ și raportați ratele de depășire, valorile p Kupiec și de acoperire condiționată și intervalul lui α_t .
 3. Interpretare: ce corectează ACI și ce nu corectează?
- **Raportați:** un plan de cinci rînduri, un tabel cu trei rînduri, un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI un rezumat despre prognoza riscului. Răspunsul:
- (a) VaR 99% este percentila 99 a randamentelor; pentru distribuția Normală standard este 2,33.
- (b) ES poate fi comparat între modele prin eroarea pătratică medie a prognozelor ES.
- (c) Pierderea pinball este strict consistentă pentru cuantila de nivel α .
- (d) Pentru distribuția Normală standard, ES 2,5% este 1,96, la fel ca cuantila de 2,5%.
- (e) Estimarea modelului pe mai multe date înainte de backtesting nu poate decât să facă testul mai fiabil, deci fereastra fixă nu contează.
- (f) VaR pe 10 zile este întotdeauna $\sqrt{10} = 3,16$ ori VaR pe o zi.
- (g) Dacă mai multe modele sînt în MCS, ele sînt la fel de bune.
- Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (secțiunea C2 din notebook).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de șapte verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Idei de reținut

- ▣ Evaluați o cuantilă cu pierderea pinball și perechea (VaR, ES) cu FZ0; nu evaluați niciodată ES singur
- ▣ CAViaR estimează direct coada; asimetria contează pentru indicii bursieri
- ▣ Pierderile medii publicate se replică; testele publicate sînt fragile
- ▣ Puține zile în coadă: MCS larg, putere redusă, risc de estimare; raportați incertitudinea
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați convențiile, consistența pierderii și orizontul

După seminar

- Cursul 9 dezvoltă fiecare temă de azi: elicitalitate, modele CAViaR și GAS-FZ, backtesting cu risc de estimare, comparație, orizont și riscul de model
- Încercați cerințele [Propus] în notebook
- C1 poate deveni un proiect de echipă: prognoze calibrate ale cozii pentru piețele din Europa Centrală și de Est
- Lectură: Engle și Manganelli (2004); Patton, Ziegel și Chen (2019); Fissler și Ziegel (2016); Nolde și Ziegel (2017)
- **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar**

Bibliografie

- ▣ Acerbi, C., & Székely, B. (2014). Backtesting expected shortfall. *Risk*, December 2014 (MSCI working paper). [msci.com](https://www.msci.com)
- ▣ Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating interval forecasts. *International Economic Review*, 39(4), 841–862. doi:10.2307/2527341
- ▣ Christoffersen, P., & Pelletier, D. (2004). Backtesting value-at-risk: A duration-based approach. *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 84–108. doi:10.1093/jfinec/nbh004
- ▣ Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263. doi:10.1080/07350015.1995.10524599
- ▣ Engle, R. F., & Manganelli, S. (2004). CAViaR: Conditional autoregressive value at risk by regression quantiles. *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(4), 367–381. doi:10.1198/073500104000000370
- ▣ Escanciano, J. C., & Olmo, J. (2010). Backtesting parametric value-at-risk with estimation risk. *Journal of Business & Economic Statistics*, 28(1), 36–51. doi:10.1198/jbes.2009.07063
- ▣ Fissler, T., & Ziegel, J. F. (2016). Higher order elicibility and Osband's principle. *The Annals of Statistics*, 44(4), 1680–1707. doi:10.1214/16-AOS1439
- ▣ Gibbs, I., & Candès, E. (2021). Adaptive conformal inference under distribution shift. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 34; arXiv:2106.00170. arxiv.org
- ▣ Gneiting, T. (2011). Making and evaluating point forecasts. *Journal of the American Statistical Association*, 106(494), 746–762. doi:10.1198/jasa.2011.r10138
- ▣ Hansen, P. R., Lunde, A., & Nason, J. M. (2011). The model confidence set. *Econometrica*, 79(2), 453–497. doi:10.3982/ECTA5771
- ▣ Kupiec, P. H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *The Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84. doi:10.3905/jod.1995.407942
- ▣ McNeil, A. J., & Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: An extreme value approach. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300. doi:10.1016/S0927-5398(00)00012-8
- ▣ Nolde, N., & Ziegel, J. F. (2017). Elicitability and backtesting: Perspectives for banking regulation. *The Annals of Applied Statistics*, 11(4), 1833–1874. doi:10.1214/17-AOAS1041
- ▣ Patton, A. J., Ziegel, J. F., & Chen, R. (2019). Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and value-at-risk). *Journal of Econometrics*, 211(2), 388–413. doi:10.1016/j.jeconom.2018.10.008