



## Modelarea piețelor financiare

### Capitolul 7: VaR și Expected Shortfall



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material (1/2)

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ARMA: AutoRegressive Moving Average (model) (model autoregresiv cu medie mobilă)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BIS: Bank for International Settlements (Banca Reglementelor Internaționale)
- BNR: Banca Națională a României
- BVB: Bursa de Valori București
- CF: Cornish–Fisher (expansion) (dezvoltarea Cornish–Fisher)
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- CQFE: Conditional Quantile Forecast Encompassing (test) (testul de includere a prognozelor cuantilelor condiționate)
- CV: Cross-Validation (validare încrucișată)
- DM: Diebold–Mariano (test) (testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor)
- ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- EVT: Extreme Value Theory (teoria valorilor extreme)
- FHS: Filtered Historical Simulation (simulare istorică filtrată)
- FRTB: Fundamental Review of the Trading Book (revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare)
- FZ0: Fissler–Ziegel loss, zero-homogeneous version (funcția de pierdere Fissler–Ziegel, varianta omogenă de grad zero)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GAS: Generalised Autoregressive Score (model) (model cu scor autoregresiv generalizat)
- GEV: Generalised Extreme Value (distribution) (distribuția generalizată a valorilor extreme)
- GPD: Generalised Pareto Distribution (distribuția Pareto generalizată)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- LASSO: Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (regresie penalizată L1 cu selecția variabilelor)
- MIDAS: MIXed DATA Sampling (regression) (regresie cu date de frecvențe mixte)
- MSE: Mean Squared Error (eroarea pătratică medie)

## Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ QML: Quasi-Maximum Likelihood (cvasi-verosimilitate maximă)
- ▣ RMSFE: Root Mean Squared Forecast Error (rădăcina erorii pătratice medii de prognoză)
- ▣ SAV: Symmetric Absolute Value (CAViaR specification) (specificația CAViaR cu valoare absolută simetrică)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SHAP: SHapley Additive exPlanations (explicații aditive Shapley)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ UE: Uniunea Europeană
- ▣ XFG: Quantlet prefix of Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck) (prefixul Quantlet-urilor din Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck))

## Structura capitolului și rezultatele învățării

### Structura capitolului

- ▣ Partea I: definiții, coerență, metode de estimare necondiționate și precizia lor
- ▣ Partea a II-a: prognoze condiționate (FHS, CAViaR), teoria valorilor extreme, orizontul, portofoliul, reglementarea, un studiu de caz și un exemplu de buclă de cercetare asistată de AI
- ▣ Exemplul principal: pierderile zilnice ale S&P 500, 2000–2026; comparații pe BET, Bitcoin, EUR/RON (cursul de referință BNR) și aur; date pînă la 18 septembrie 2026 (inventarul complet în [► Anexă](#))
- ▣ Unități: randamente log zilnice în %,  $r_t = 100 (\ln P_t - \ln P_{t-1})$ ; detaliile tehnice se află în [► Anexă](#)

### La sfîrșitul capitolului veți putea

- ▣ defini VaR și ES și explica de ce ES este coerent, iar VaR nu
- ▣ estima ambele măsuri istoric, parametric, prin simulare filtrată și prin teoria valorilor extreme, fiecare cu o eroare standard sau un interval
- ▣ le scala la 10 zile, le descompune pe active și interpreta regulile Basel și FRTB

## Cît putem pierde? RiskMetrics și VaR



Clădirea J.P. Morgan & Co., 23 Wall Street, New York

Foto: Beyond My Ken (2012); CC BY-SA 4.0; Wikimedia

[Commons](#)

- Valoarea de mîine a portofoliului este aleatoare; conducerea și autoritățile au nevoie de **un singur număr**: un prag de pierdere depășit rar, folosit la stabilirea limitelor și a cerințelor de **capital**
- J.P. Morgan a publicat **RiskMetrics** în octombrie 1994, o metodologie și un set de date gratuite pentru riscul de piață; documentul tehnic (ed. a 4-a, 1996) a devenit referința pentru VaR [J.P. Morgan/Reuters \(1996\)](#)
- Manuale: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), [McNeil, Frey & Embrechts \(2015\)](#), [Dánielsson \(2011\)](#)


## Pierderi, orizonturi și probabilități ale cozii

- ▣ Randamentul pe o zi:  $X_{t+1} = r_{t+1}$ , randamentul log în %; **pierdere**  $L_{t+1} = -X_{t+1}$ , o **pierdere log**
  - ▶  $L$  pozitiv = poziția a pierdut bani;  $L$  negativ = un câștig
  - ▶ În bani, cu  $V_t$  valoarea poziției: pierdere =  $V_t (1 - e^{-L_{t+1}/100}) \approx V_t L_{t+1}/100$  pentru  $L$  mic; cu randamente simple  $R$ ,  $V_t (-R_{t+1})/100$  este exactă
  - ▶ VaR se convertește exact prin această transformare monotonă; pentru ES, convertim pierderea din fiecare scenariu, apoi calculăm media
- ▣ **Orizontul  $h$** : numărul de zile pe care se măsoară pierderea (1 zi, 10 zile)
- ▣ **Nivelul  $\alpha$** : **probabilitatea cozii**, de regulă  $\alpha = 1\%$  sau  $2,5\%$ : „VaR 1%”, „ES 2,5%”
- ▣ **Convenția de semn în acest curs**: VaR și ES sînt numere **pozitive** atunci cînd sînt pierderi

## Definiții: valoarea la risc și Expected Shortfall

- ▣ **VaR** la nivelul  $\alpha$ : pierderea depășită cu probabilitatea  $\alpha$  (exact pentru  $L$  continuă, cel mult  $\alpha$  în general)
  - ▶  $\text{VaR}_\alpha(X) = -\inf\{x \in \mathbb{R} : P(X \leq x) > \alpha\} = -q_\alpha(X)$ ; pentru o pierdere continuă  $L = -X$ :  
 $\text{VaR}_\alpha = q_{1-\alpha}(L)$
  - ▶ Interpretarea VaR 1%: „cu probabilitatea de 1%, pierderea de mâine va depăși  $\text{VaR}_{1\%}$ ”; **nu** spune cât de mare este pierderea dincolo de VaR
- ▣ **Expected Shortfall** (pierderea așteptată în coadă): media tuturor cuantilelor din coada de probabilitate  $\alpha$ 
  - ▶  $\text{ES}_\alpha(X) = -\frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha q_u(X) du = \frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha \text{VaR}_u(X) du$ ; pentru o distribuție continuă  
 $\text{ES}_\alpha(X) = -\mathbb{E}[X \mid X \leq q_\alpha(X)]$
  - ▶ Întotdeauna  $\text{ES}_\alpha \geq \text{VaR}_\alpha$ : ES privește **în interiorul** cozii, VaR doar la intrarea în ea; două portofolii cu același VaR pot avea ES foarte diferite
- ▣ Alte denumiri: Conditional VaR (CVaR), Tail VaR, Average VaR [Rockafellar & Uryasev \(2002\)](#), [Acerbi & Tasche \(2002\)](#)
- ▣ Estimarea istorică a ES: media pierderilor observate mai mari sau egale cu VaR empiric, o aproximare a integralei pe baza distribuției empirice (exactă când  $n\alpha$  este întreg)

## VaR și ES pentru S&P 500



- Pierderile zilnice 2000–2026 față de distribuția Normală cu aceeași medie și abatere standard (stînga); coada (dreapta)
- $VaR_{1\%}$  istoric = 3,45%: în 68 din 6 717 zile (1,01%) pierderea a fost mai mare; în acele zile, pierderea medie,  $ES_{1\%}$ , a fost 5,01%
- $VaR_{2,5\%} = 2,51\%$ ,  $ES_{2,5\%} = 3,76\%$ ; cea mai mare pierdere, 12,77%, pe 2020-03-16 (crahul din pandemia COVID-19), circa zece abateri standard
- Distribuția Normală se potrivește în centru, dar este mult prea subțire în coadă ([Capitolul 1](#))

## Distribuția Normală: ES într-o singură formulă

- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha) < 0$ , cu  $\Phi$ ,  $\varphi$  funcția de repartiție și densitatea distribuției Normale standard
  - ▶  $\text{VaR}_\alpha = -(\mu + \sigma z_\alpha)$ ; deoarece  $\varphi'(u) = -u\varphi(u)$ ,  $\int_{-\infty}^z u\varphi(u) du = -\varphi(z)$
  - ▶  $\text{ES}_\alpha = -\mu - \frac{\sigma}{\alpha} \int_{-\infty}^{z_\alpha} u\varphi(u) du = -\mu + \sigma \frac{\varphi(z_\alpha)}{\alpha}$
- Constante:  $-z_{1\%} = 2,326$ ,  $\varphi(z_{1\%})/0,01 = 2,665$ ;  $-z_{2,5\%} = 1,960$ ,  $\varphi(z_{2,5\%})/0,025 = 2,338$
- S&P 500 ( $\hat{\mu} = 0,025\%$ ,  $\hat{\sigma} = 1,21\%$ ):  $\text{VaR}_{1\%} \text{ Normal} = 2,80\%$  față de  $3,45\%$  istoric
  - ▶ De 1,24 ori mai mic decât valoarea istorică; sub distribuția Normală, pentru  $\mu$  dat, VaR și ES nu aduc informație dincolo de  $\sigma$

## Exemplu lucrat: distribuția Student- $t$

- ▣  $X = m + s T$  cu  $T \sim t_\nu$  (poziție  $m$ , scală  $s$ , grade de libertate  $\nu$ );  $t_\alpha = t_\nu^{-1}(\alpha) < 0$ ,  $g_\nu$  densitatea
  - ▶  $\text{VaR}_\alpha = -(m + s t_\alpha)$ ,  $\text{ES}_\alpha = -m + s \frac{g_\nu(t_\alpha)}{\alpha} \frac{\nu + t_\alpha^2}{\nu - 1}$  (pentru  $\nu > 1$ )
- ▣ Dispersia  $s^2 \nu / (\nu - 2)$  există doar pentru  $\nu > 2$ ;  $\nu$  mai mic = cozi mai grele
- ▣ Estimare de verosimilitate maximă pe randamentele S&P 500:  $\hat{\nu} = 2,67$ 
  - ▶  $\text{VaR}_{1\%} = 3,46\%$  (istoric 3,45%),  $\text{ES}_{1\%} = 5,71\%$  (istoric 5,01%)
- ▣ Distribuția  $t$  corectează VaR, dar cu  $\hat{\nu} < 3$  supraestimează ES: un singur parametru trebuie să descrie și centrul, și coada

## Măsuri de risc coerente: axiome și de ce contează


- O **măsură de risc**  $\rho$  asociază unei pierderi  $L$  un capital; este **coerentă** dacă Artzner, Delbaen, Eber & Heath (1999)
  - ▶ monotonă:  $L_1 \leq L_2 \Rightarrow \rho(L_1) \leq \rho(L_2)$ ; invariantă la translație:  $\rho(L + c) = \rho(L) + c$
  - ▶ pozitiv omogenă:  $\rho(\lambda L) = \lambda \rho(L)$ ,  $\lambda \geq 0$ ; subaditivă:  $\rho(L_1 + L_2) \leq \rho(L_1) + \rho(L_2)$
- **Limite**: prin subaditivitate, riscul întregii bănci nu depășește suma limitelor de risc ale birourilor de tranzacționare,  $\sum_i \rho_i$ ; **fără arbitraj de reglementare** prin divizarea firmei
- **Optimizare**: omogenitate + subaditivitate  $\Rightarrow$  convexitate în ponderile portofoliului
  - ▶ Orice minim local este global; unicitatea ar cere convexitate **strictă**, pe care ES pe scenarii nu o are (este liniar pe porțiuni)
- VaR satisface primele trei axiome, dar **nu** și subaditivitatea în general
  - ▶ Excepție: pierderi cu distribuție eliptică comună (Normală sau Student- $t$  multivariată) și  $\alpha < 50\%$ , când VaR și ES sînt ambele  $\mu_p + \sigma_p \times$  constantă McNeil, Frey & Embrechts (2015); rafinările pentru cozi grele sînt în

▶ Anexă

## Contraexemplu: două obligațiuni, pas cu pas

- ▣ Obligațiunile A și B, independente; fiecare pierde 100 cu probabilitatea  $p = 0,9\%$  (neplată) și 0 altfel
- ▣ **O obligațiune:**  $P(X \leq -100) = p = 0,9\%$ , nu peste 1%, deci  $q_{1\%} = 0$  și  $\text{VaR}_{1\%}(A) = \text{VaR}_{1\%}(B) = 0$ 
  - ▶  $\text{ES}_{1\%}(A) = (100 \cdot 0,009 + 0 \cdot 0,001)/0,01 = 90$
- ▣ **Portofoliul A + B:**  $P(X \leq -100) = 1 - (1 - p)^2 = 1,79\% > 1\%$ ,  $P(X \leq -200) = p^2 = 0,0081\%$ , deci  $q_{1\%} = -100$ 
  - ▶  $\text{VaR}_{1\%}(A + B) = 100 > 0 + 0 = \text{VaR}_{1\%}(A) + \text{VaR}_{1\%}(B)$
  - ▶ Formula generală pentru o pierdere discretă  $L = -X$ :  $\text{ES}_\alpha = \frac{1}{\alpha} (\mathbb{E}[L \mathbf{1}\{L > \text{VaR}_\alpha\}] + \text{VaR}_\alpha (\alpha - P(L > \text{VaR}_\alpha)))$
- ▣  $\text{ES}_{1\%}(A + B) = 100,81 \leq 180 = \text{ES}_{1\%}(A) + \text{ES}_{1\%}(B)$

## Subaditivitatea: VaR eșuează, ES o respectă



- Albastru: suma celor două măsuri individuale; roșu: măsura portofoliului combinat
- Fiecare obligațiune singură își „ascunde” neplata în ultimul 1%; împreună, cel puțin o neplată are probabilitatea  $1,79\% > 1\%$ , iar VaR sare la 100
- O limită VaR ar recompensa **concentrarea**: deținerea doar a obligațiunii A pare fără risc; ES ține cont de mărimea pierderilor din coadă și este coerent [Acerbi & Tasche \(2002\)](#)
- Portofoliile de credit, opțiunile și alte câștiguri asimetrice sînt cazurile în care VaR eșuează în practică

## ES ca problemă de optimizare: Rockafellar–Uryasev

- **Teoremă Rockafellar & Uryasev (2000):** pentru orice pierdere integrabilă  $L$ 
  - ▶  $ES_{\alpha}(L) = \min_{v \in \mathbb{R}} F(v)$ ,  $F(v) = v + \frac{1}{\alpha} \mathbb{E}[(L - v)_{+}]$ ,  $(x)_{+} = \max(x, 0)$
  - ▶ Punctul de minim este  $VaR_{\alpha}(L)$ , valoarea minimă este  $ES_{\alpha}(L)$ ;  $F(VaR_{\alpha})$  este formula ES discretă de pe slide-ul celor două obligațiuni
- $F$  este convexă în  $v$  și, pentru pierderea unui portofoliu  $-w^{\top} R$ , convexă simultan în  $(w, v)$ : ES este convex în ponderi, ceea ce **demonstrează** subaditivitatea (demonstrația în [▶ Anexă](#))
  - ▶ Cu scenarii istorice, minimizarea ES devine o problemă de programare liniară (secțiunea „VaR de portofoliu și contribuțiile la risc”)
- Pierderile S&P 500,  $\alpha = 2,5\%$ :  $\arg \min F = 2,51\%$ ,  $\min F = 3,76\%$ ; VaR și ES istorice (cuantilă interpolată, medie în coadă):  $2,51\%$  și  $3,76\%$ , egale doar după rotunjire (punctul de minim empiric este o statistică de ordine)

## Coerență versus robustețe

- ▣ **Robustețe calitativă:** o mică schimbare a distribuției datelor modifică doar puțin distribuția estimatorului [Cont, Deguest & Scandolo \(2010\)](#)
  - ▶ VaR istoric este calitativ robust în distribuțiile cu  $\alpha$ -cuantilă unică; ES istoric **nu**: o singură pierdere extremă îl poate modifica oricât de mult (secțiunea „Cît de precise sînt VaR și ES?”)
- ▣ S&P 500, ultimele 500 de zile: eliminăm cea mai mare pierdere (6,16%, 2025-04-04)
  - ▶  $ES_{2,5\%}$ : 2,94%  $\rightarrow$  2,60%;  $Var_{1\%}$ : 2,73%  $\rightarrow$  2,68%
- ▣ Există un compromis: subaditivitatea cere informație din coada de dincolo de cuantilă, exact ceea ce face ES sensibil la observații izolate
- ▣ FRTB a ales coerența pentru capital (ES 2,5%) și a păstrat VaR, robust și elicibil, pentru backtesting

## Elicitabilitatea: de ce ES este mai greu de evaluat (Capitolul 8)

- O măsură de risc este **elicitabilă** dacă minimizează valoarea așteptată a unei funcții de scor
  - ▶ VaR: cuantila  $q_\alpha(X)$  minimizează funcția de pierdere pinball  $\mathbb{E}[(1\{X \leq v\} - \alpha)(v - X)]$
- ES, considerat separat, **nu** este elicitabil [Gneiting \(2011\)](#): nu există o funcție de scor strict consistentă pentru prognozele ES evaluate separat
- Perechea (VaR, ES) este elicitabilă împreună [Fissler & Ziegel \(2016\)](#): scoruri comune precum FZ0 ordonează prognozele (VaR, ES) (▶ [Anexă](#); Capitolul 8)
- Consecință: compararea prognozelor de ES este mai dificilă decât a celor de VaR
  - ▶ Precizia ES este dată de numărul de observații din coadă  $n\alpha$ , nu de  $n$  [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2026\)](#); S&P 500, 26 de ani: doar 168 zile în coada lui ES 2,5%


## Simularea istorică

- Luăm ultimele  $n$  pierderi zilnice  $L_{t-n+1}, \dots, L_t$  și le ordonăm:  $L_{(1)} \leq \dots \leq L_{(n)}$ 
  - ▶  $\widehat{\text{VaR}}_\alpha =$  cuantila empirică de ordin  $(1 - \alpha)$ , interpolată liniar în poziția  $1 + (n - 1)(1 - \alpha)$  a pierderilor ordonate (convenția folosită peste tot)
  - ▶  $\widehat{\text{ES}}_\alpha =$  media celor  $k_\alpha$  pierderi  $\geq \widehat{\text{VaR}}_\alpha$ ,  $k_\alpha \approx n\alpha$ ; înlocuirea exactă în integrală dă pierderii de la frontieră ponderea  $n\alpha - \lfloor n\alpha \rfloor$ , deci cele două coincid doar când  $n\alpha$  este întreg (pierderi distincte)
- Alegerea ferestrei  $n$ : estimarea pe 250 de zile reacționează mai repede, iar cea pe 1000 de zile este mai precisă
  - ▶ Cu  $n = 500$ : 5 pierderi se află dincolo de VaR 1%; ES 2,5% este media a  $k = 13$  pierderi ( $n\alpha = 12,5$ )
- Nicio pierdere mai mare decât cea mai rea din fereastră nu poate apărea în estimare
- **Efectul fantomă**: o zi de criză intră în fereastră, rămîne  $n$  zile, apoi iese și VaR scade brusc

## Dezvoltarea Cornish–Fisher


- ▣ Ajustăm cuantila Normală pentru **asimetrie**  $S = \mathbb{E}[(X - \mu)^3]/\sigma^3$  și **excesul de aplatizare**  $K = \mathbb{E}[(X - \mu)^4]/\sigma^4 - 3$  **Cornish & Fisher (1938)**
  - ▶  $\tilde{z}_\alpha = z_\alpha + \frac{(z_\alpha^2 - 1)S}{6} + \frac{(z_\alpha^3 - 3z_\alpha)K}{24} - \frac{(2z_\alpha^3 - 5z_\alpha)S^2}{36}, \quad \text{VaR}_\alpha = -(\mu + \sigma\tilde{z}_\alpha), \text{ cu } z_\alpha < 0$
- ▣ ES: media lui  $-(\mu + \sigma\tilde{z}_u)$  pe  $u \in (0, \alpha)$ , calculată numeric
- ▣ O dezvoltare în jurul distribuției Normale: precisă doar pentru  $S$  și  $K$  **mici**; pentru  $K$  mare, transformarea  $z \mapsto \tilde{z}$  nici măcar nu este monotonă (Seminarul 7, A6)
- ▣ Randamentele S&P 500:  $S = -0,35$ ,  $K = 10,7$ : mult în afara acestui domeniu
  - ▶  $\text{VaR}_{1\%}^{CF} = 6,08\%$  față de valoarea istorică 3,45%: termenul de aplatizare supraestimează puternic VaR

## Cinci metode la diferite niveluri de risc



- ▣ Pierderile zilnice S&P 500 2000–2026,  $\alpha$  de la 5% pînă la 0,1%; EVT = coada Pareto generalizată, o anticipare a secțiunii „Teoria valorilor extreme”
- ▣ VaR 0,1% (o zi în patru ani): istoric 7,22%, EVT 7,04%, Student- $t$  8,58%, Cornish–Fisher 15,06%, distribuția Normală 3,72%, aproximativ jumătate
- ▣ Diferența dintre metode **crește** cînd  $\alpha$  scade, mai mult pentru ES decît pentru VaR; EVT și estimarea istorică coincid pînă la 0,5%, mai jos EVT extrapolează o coadă estimată

## Metodele comparate pe cinci active




- Bare pline:  $\text{VaR}_{1\%}$ ; bare hașurate:  $\text{ES}_{2.5\%}$ ; pierderi zilnice în %, selecțiile complete (toate cifrele în [Anexă](#))
- Distribuția Normală: prea mică peste tot (Bitcoin  $\text{VaR}_{1\%}$  7,99% vs 10,51% istoric); Cornish–Fisher: supraestimează VaR, deoarece excesul de applatizare trece de 7 în toate seriile (BET 7,25% vs 4,13%)
- **Excepție:** Student-t pentru EUR/RON dă  $\hat{\nu} = 1,25$  (dispersie infinită) și un ES absurd de 3,27%: numeroasele variații aproape nule ale cursului de referință împing  $\hat{\nu}$  în jos
- EVT rămâne apropiată de simularea istorică pentru VaR 1% în toate cele cinci serii

## Două erori standard utilizabile

- ▣ **VaR**: pierderi i.i.d. (independente și identic distribuite) cu densitatea  $f$  continuă și pozitivă în  $\text{VaR}_\alpha$ 
  - ▶  $\text{SE}(\widehat{\text{VaR}}_\alpha) \approx \frac{1}{f(\text{VaR}_\alpha)} \sqrt{\frac{\alpha(1-\alpha)}{n}}$  : densitatea în coadă este mică, deci SE este mare
  - ▶  $\sigma = 1,2\%$ ,  $n = 500$ : SE pentru  $\text{VaR}_{1\%} = 0,20$  puncte procentuale (pp) sub distribuția Normală, 0,43 pp sub o  $t_4$  cu același  $\sigma$
- ▣ **ES** [Chen \(2008\)](#): funcția de influență  $\text{IF}(x) = \text{VaR}_\alpha + (x - \text{VaR}_\alpha)_+/\alpha - \text{ES}_\alpha$ , nemărginită în  $x$ ; dacă  $\mathbb{E}[L^2] < \infty$ 
  - ▶  $\text{SE}(\widehat{\text{ES}}_\alpha) \approx \frac{1}{\alpha} \sqrt{\frac{\text{Var}((L - \text{VaR}_\alpha)_+)}{n}}$  ; estimarea VaR nu adaugă niciun termen de ordinul întâi (Rockafellar–Uryasev)
  - ▶ Pentru cozi de tip Pareto, eroarea **relativă** scade ca  $1/\sqrt{n\alpha}$ : numărul de observații din coadă determină precizia [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2026\)](#)
- ▣ Volatility clustering: înlocuim dispersiile cu dispersiile de termen lung (HAC) ale lui  $1\{L_t > \text{VaR}_\alpha\}$  și  $(L_t - \text{VaR}_\alpha)_+$  [Newey & West \(1987\)](#) sau folosim un bootstrap pe blocuri; derivările sînt în [▶ Anexă](#)

## Precizia pentru S&amp;P 500



- Intervale de 95%, lățimea în pp lângă fiecare bară; bootstrap: 2 000 de reeșantionări (Seminarul 7, B6); tabelul complet în [► Anexă](#)

- Selecția completă: volatility clustering lărgțe intervalul ES de la 0,60 (i.i.d.) la 1,00 (HAC), la fel ca bootstrap-ul (0,62 i.i.d., 1,16 pe blocuri); ultimele 500 de zile: ES 2,5% este media a 13 pierderi, lățimea intervalului HAC 2,55 pp

- Aceste intervale privesc VaR și ES **necondiționate**; riscul de mîine este o întrebare condiționată (secțiunea următoare)

## Simularea istorică filtrată

- Ideea Barone-Adesi, Giannopoulos & Vosper (1999), Hull & White (1998): istoria dă **forma** șocurilor, un model GARCH dă **scala** de azi
  - ▶  $r_t = \mu_t + \sigma_t z_t$ ,  $\mu_t = c + \phi r_{t-1}$ ,  $\sigma_t^2 = \omega + \alpha_1 (r_{t-1} - \mu_{t-1})^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2$  (Capitolul 5, Bollerslev (1986);  $\alpha_1$  este un coeficient GARCH, nu nivelul  $\alpha$ )
- Pasul 1: estimăm modelul AR(1)-GARCH(1,1) prin cvasi-verosimilitate maximă (verosimilitate Normală, robustă la alte distribuții ale șocurilor)
- Pasul 2: reziduuri standardizate  $\hat{z}_t = (r_t - \hat{\mu}_t) / \hat{\sigma}_t$ : aproximativ i.i.d., tot cu cozi grele
- Pasul 3: rescalăm cu volatilitatea de mîine
  - ▶  $\text{VaR}_{\alpha, t+1} = -\hat{\mu}_{t+1} + \hat{\sigma}_{t+1} \hat{\xi}_\alpha$ ,  $\hat{\xi}_\alpha = -q_\alpha(\hat{z})$ ;  $\text{ES}_{\alpha, t+1} = -\hat{\mu}_{t+1} - \hat{\sigma}_{t+1} \overline{(\hat{z} \mid \hat{z} \leq q_\alpha(\hat{z}))}$


## Prognoză lucrată: S&P 500 în următoarea zi de tranzacționare

- ▣ AR(1)-GARCH(1,1) pe 2000–2026:  $\hat{\phi} = -0,053$ ,  $\hat{\alpha}_1 = 0,120$ ,  $\hat{\beta}_1 = 0,860$ ; persistența  $\hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1 = 0,981$ 
  - ▶ Prognozele pentru prima zi de tranzacționare de după 18 septembrie 2026:  $\hat{\mu}_{t+1} = 0,056\%$ ,  $\hat{\sigma}_{t+1} = 0,725\%$  (abaterea standard de selecție 1,21%: o piață calmă)
- ▣ Cuantila reziduurilor  $\hat{\xi}_{1\%} = -q_{1\%}(\hat{z}) = 2,79$ , peste  $-z_{1\%} = 2,326$ : șocurile filtrate au tot cozi grele
  - ▶  $\text{VaR}_{1\%,t+1} = -0,056 + 0,725 \times 2,791 = 1,97\%$ ;  $\text{ES}_{1\%,t+1} = 2,55\%$
- ▣ VaR 1% istoric necondiționat: 3,45%; cifrele condiționate se mișcă odată cu piața, cea necondiționată nu
- ▣ Alternative pentru aceeași zi: EVT condiționată 2,03%, GARCH cu șocuri Normale 1,63%; toate cele cinci active în [▶ Anexă](#)

## Cît de incert este VaR de mîine?


- Două intrări estimate: parametrii GARCH  $\theta$  (prin  $\hat{\sigma}_{t+1}$ ) și cuantila reziduurilor  $\hat{\xi}_\alpha$  [Francq & Zakoïan \(2015\)](#)
  - ▶ Bootstrap pe reziduuri [Christoffersen & Gonçalves \(2005\)](#): simulăm traiectorii AR(1)-GARCH(1,1) cu  $\hat{\sigma}$  reeșantionate, re-estimăm pe fiecare traiectorie și prognozăm din istoria **originală** (algoritmul în [▶ Anexă](#))
- S&P 500, 999 traiectorii:  $\text{VaR}_{1\%} \text{ FHS} = 1,97\%$ , interval de 90% [1,90; 2,09]%
- Cele două surse:  $\hat{\sigma}_{t+1} = 0,725$  [0,708; 0,743];  $\hat{\xi}_{1\%} = 2,79$  [2,68; 2,88]
  - ▶ Variaza doar cuantila: [1,89; 2,03]; variaza doar  $\sigma_{t+1}$ : [1,92; 2,02]: cuantila reziduurilor (circa 67 de reziduuri în coadă) este sursa mai mare
- EVT condiționată (2,03%) se află în interval, GARCH cu șocuri Normale (1,63%) mult sub el: alegerea modelului pentru coadă contează mai mult decît eroarea de estimare a unui model dat

## Simulare istorică vs simulare istorică filtrată: S&P 500



- $\text{VaR}_{1\%}$  prognozat pentru ziua următoare; GARCH re-estimat în fiecare ianuarie pe toate datele anterioare, deci fiecare prognoză folosește doar informația disponibilă la momentul ei
- Zile cu pierdere peste VaR 1%, 2006–2026 (5 210 zile; ținta 1%): istoric pe 500 de zile 1,67%, filtrat 1,54%, GARCH cu șocuri Normale 2,34%
- Depășirile VaR istoric apar în **grupuri** (2008, 2020): fereastra reacționează cu luni de întârziere; VaR filtrat a atins 18,01% pe 2020-03-18 și împrăștie depășirile în timp (teste în Capitolul 8)

## Simulare istorică vs simulare istorică filtrată: Bitcoin




- Aceași construcție, prognoze din ianuarie 2017, 7 zile din 7; zile cu pierderi peste VaR (3 548 zile): istoric 1,16%, filtrat 0,76%, GARCH cu șocuri Normale 1,58%
- Volatilitatea a scăzut după 2022, iar fereastra de 500 de zile urmează cu o întârziere mare; criptoactivele ca o clasă distinctă de active: [Pele et al. \(2023\)](#)
- VaR filtrat a atins 54,83% în martie 2020, după crahul din 2020-03-12: o pierdere log de 46,47%, adică o scădere a prețului de 37,17% (pierderile log și simple diferă la mișcări mari)

## Modelarea directă a cuantilei: CAViaR

- CAViaR (Conditional Autoregressive Value at Risk, valoarea la risc condițională autoregresivă) [Engle & Manganelli \(2004\)](#): cuantila urmează propria recursie; specificația SAV
  - ▶  $\text{VaR}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{VaR}_{t-1} + \beta_2 |r_{t-1}|, \quad q_t = -\text{VaR}_t$
- **Regresie cuantilă** [Koenker & Bassett \(1978\)](#): minimizăm pierderea pinball, fără ipoteze asupra distribuției șocurilor
  - ▶  $\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} \sum_t (\alpha - 1\{r_t < q_t(\beta)\})(r_t - q_t(\beta))$  : elicitalitatea folosită direct pentru estimare (setările optimizării în [▶ Anexă](#))
- S&P 500,  $\alpha = 1\%$ , estimat pe 2000–2015 (4 024 zile):  $\hat{\beta}_0 = 0,090$ ,  $\hat{\beta}_1 = 0,897$ ,  $\hat{\beta}_2 = 0,246$ 
  - ▶ Timpul de înjumătățire al unui șoc asupra VaR:  $\ln 0,5 / \ln \hat{\beta}_1 = 6,4$  zile
- CAViaR reacționează liniar la  $|r_{t-1}|$ , GARCH la  $r_{t-1}^2$

## CAViaR vs simulare istorică filtrată, în afara eșantionului




- S&P 500, 2016–2026 (2 693 zile): CAViaR cu parametrii fixați pe 2000–2015; FHS re-estimat în fiecare ianuarie (o schemă diferită de re-estimare)
- Depășiri ale VaR 1%: CAViaR 1,30% (35), FHS 1,30% (35), istoric pe 500 de zile 1,41% (38); pierderea pinball medie (mai mică e preferabilă): 0,039, 0,037, 0,052
- COVID-19, 20 februarie – 30 aprilie 2020 (50 de zile): depășiri 6 / 3 / 9, VaR maxim 13,5% / 18,0% / 4,5%: după un crah, FHS crește mai mult
- Numărul de depășiri nu arată singur că un model este mai bun: semnificația se testează în [Capitolul 8](#)

## Maxime pe blocuri și distribuția GEV

- Împărțim selecția în blocuri de  $n$  zile; păstrăm maximul fiecărui bloc  $M_n = \max(L_1, \dots, L_n)$ 
  - Teorema Fisher–Tippett–Gnedenko [Fisher & Tippett \(1928\)](#), [Gnedenko \(1943\)](#): dacă  $(M_n - b_n)/a_n$  are o limită nedegenerată pentru pierderi i.i.d., aceasta este GEV
- $H_\xi(x) = \exp \left\{ - \left( 1 + \xi \frac{x-\mu}{\sigma} \right)^{-1/\xi} \right\}$ ,  $1 + \xi(x - \mu)/\sigma > 0$  ( $\xi = 0$ :  $\exp\{-e^{-(x-\mu)/\sigma}\}$ )
- **Forma  $\xi$  determină tipul cozii**
  - $\xi > 0$ : Fréchet, coadă de tip putere cu indicele de coadă  $1/\xi$  (randamentele financiare)
  - $\xi = 0$ : domeniul Gumbel, cozi de tip exponențial (de ex. distribuția Normală, distribuția lognormală);  $\xi < 0$ : Weibull, coadă mărginită
- **Nivelul de revenire** pentru  $k$  blocuri: nivelul depășit în medie o dată la  $k$  blocuri,  $H_\xi^{-1}(1 - 1/k)$ ; în finanțe modelăm **doar coada** [Embrechts, Klüppelberg & Mikosch \(1997\)](#), [Longin \(2000\)](#)

## Maximele lunare ale pierderilor S&P 500



- 321 luni calendaristice, 2000–2026; GEV prin verosimilitate maximă
- $\hat{\xi} = 0,22$  (Fréchet),  $\hat{\mu} = 1,37$ ,  $\hat{\sigma} = 0,79$ : o coadă de tip putere
- Niveluri de revenire: 10 ani 8,09%, 30 de ani 10,95%; cel mai mare maxim lunar 12,77%
- Maximele lunare nu dau direct un VaR zilnic: conversia presupune zile independente, ipoteză încălcată de volatility clustering (▶ Anexă)
- Păstrînd o singură valoare pe lună pierdem multe date: metoda următoare folosește toate pierderile mari


## Depășiri de prag și distribuția GPD

- Fixăm un prag ridicat  $u$ ; modelăm excesele  $Y = L - u$ , condiționat de  $L > u$ 
  - Teorema Pickands–Balkema–de Haan [Pickands \(1975\)](#), [Balkema & de Haan \(1974\)](#): pentru o clasă largă de distribuții, când  $u$  se apropie de capătul drept al distribuției, excesele urmează o distribuție Pareto generalizată
- $G_{\xi, \beta}(y) = 1 - (1 + \xi y / \beta)^{-1/\xi}$  ( $\xi \neq 0$ ),  $1 - e^{-y/\beta}$  ( $\xi = 0$ );  $y \geq 0$ , și  $y < -\beta/\xi$  dacă  $\xi < 0$ ; scala  $\beta > 0$ ; același  $\xi$  ca la GEV
- Estimatorul cozii cu  $N_u$  depășiri din  $n$  observații [McNeil, Frey & Embrechts \(2015\)](#)
  - $\widehat{\text{VaR}}_{\alpha} = u + \frac{\hat{\beta}}{\hat{\xi}} \left[ \left( \frac{n}{N_u} \alpha \right)^{-\hat{\xi}} - 1 \right]$ ,  $\widehat{\text{ES}}_{\alpha} = \frac{\widehat{\text{VaR}}_{\alpha}}{1 - \hat{\xi}} + \frac{\hat{\beta} - \hat{\xi}u}{1 - \hat{\xi}}$  ( $\alpha < N_u/n$ ,  $\hat{\xi} \neq 0$ ; ES cere  $\hat{\xi} < 1$ )
- Compromis deplasare–dispersie: un  $u$  mic încalcă teorema limită, un  $u$  mare lasă puține depășiri

## Alegerea pragului: funcția de exces mediu


- **Funcția de exces mediu:**  $e(u) = \mathbb{E}[L - u \mid L > u]$ ; empiric, media exceselor peste  $u$ , reprezentată în funcție de  $u$
- Pentru o coadă GPD,  $e(u)$  este **liniară** în  $u$ 
  - ▶  $e(u) = \frac{\beta + \xi(u - u_0)}{1 - \xi}$  pentru  $u \geq u_0$ , finită doar dacă  $\xi < 1$ ; panta  $\xi/(1 - \xi)$  este pozitivă pentru cozi grele și nulă pentru cozi exponențiale
- Regula practică: alegem  $u$  acolo unde graficul devine aproximativ liniar; verificăm stabilitatea lui  $\hat{\xi}$  pentru mai multe praguri
- Estimatorul Hill din [Capitolul 1 Hill \(1975\)](#) estimează același indice de coadă  $1/\xi$

## Graficul excesului mediu: S&P 500



- Praguri depășite de 20% pînă la 0,5% dintre pierderile zilnice; linia roșie: GPD estimată pe cele mai mari 5%
- Excesul mediu crește cu  $u$ : o coadă grea (de tip Fréchet), nu linia orizontală a unei cozi exponențiale
- Pragul ales  $u_0 = 1,85\%$  lasă  $N_u = 336$  depășiri; excesul mediu 1,09%, panta GPD  $\hat{\xi} / (1 - \hat{\xi}) = 0,23$
- Dincolo de VaR 1% punctele se împrăștie: fiecare este media a foarte puține pierderi

## Cozi GPD: S&amp;P 500 și Bitcoin



- Scală log-log: probabilitatea unei pierderi zilnice peste  $x$ , cele mai mari 5% dintre pierderi; coada Normală cade mult sub date, coada Student- $t$  este apropiată de GPD
- S&P 500:  $\hat{\xi} = 0,19$  (SE 0,065), indicele de coadă 5,3,  $\text{VaR}_{1\%} = 3,54\%$ ; Bitcoin:  $\hat{\xi} = 0,16$  (SE 0,078),  $\text{VaR}_{1\%} = 10,23\%$ ; toate cele cinci serii în [► Anexă](#)
- $\text{SE}(\hat{\xi}) = (1 + \hat{\xi})/\sqrt{N_u}$  presupune depășiri independente; gruparea o face prea mică (slide-ul următor)


## Extreme grupate: indicele extremal

- ▣ Pierderi staționare cu grupare: dacă  $nP(L > u_n) \rightarrow \tau$ , atunci  $P(M_n \leq u_n) \rightarrow e^{-\theta\tau}$ ,  $\theta \in (0, 1]$  [Embrechts, Klüppelberg & Mikosch \(1997\)](#)
  - ▶  $\theta$  = indicele extremal,  $1/\theta$  = mărimea medie a unui grup; date i.i.d.:  $\theta = 1$ ;  $n$  zile dependente se comportă ca  $n\theta$  zile independente
- ▣ S&P 500, pragul GPD  $u = 1,85\%$  ( $N = 336$  depășiri): estimatorul pe intervale [Ferro & Segers \(2003\)](#) dă  $\hat{\theta} = 0,19$ , adică 62 de grupuri de câte 5,4 depășiri în medie
  - ▶ GPD pe maximele grupurilor:  $\hat{\xi} = 0,152$  (SE 0,146) față de 0,188 (SE 0,065) pe toate depășirile: tot pozitiv, dar intervalul lui de 95% include acum 0
- ▣ Reziduurile GARCH standardizate:  $\hat{\theta} = 0,99$ : filtrarea elimină gruparea, de aceea EVT condiționată estimează GPD după filtru
- ▣ Estimatorul, regula de declusterizare și corecția pentru maximele pe blocuri: [▶ Anexă](#)

## EVT condiționată (McNeil și Frey)

- ▣ McNeil & Frey (2000): aceiași pași ca la FHS, cu un singur pas schimbat
- ▣ Filtrul: AR(1)-GARCH(1,1) prin cvasi-verosimilitate maximă, reziduuri  $\hat{z}_t$ , prognoze  $\hat{\mu}_{t+1}$ ,  $\hat{\sigma}_{t+1}$  (ca la FHS)
- ▣ **Pasul cozii:** în locul cuantilei empirice a lui  $-\hat{z}$ , estimăm o GPD pe cele mai mari 10% valori și luăm VaR-ul ei  $\hat{z}_\alpha^{GPD}$  și  $ES \hat{e}_\alpha^{GPD}$ 
  - $VaR_{\alpha,t+1} = -\hat{\mu}_{t+1} + \hat{\sigma}_{t+1}\hat{z}_\alpha^{GPD}$ ,       $ES_{\alpha,t+1} = -\hat{\mu}_{t+1} + \hat{\sigma}_{t+1}\hat{e}_\alpha^{GPD}$
- ▣ O coadă parametrică netedă dincolo de date: contează mai ales adânc în coadă (VaR 0,5%, VaR 0,1%), unde există doar câteva reziduuri

## EVT condiționată pentru S&amp;P 500



- $\text{VaR}_{1\%}$  prognozat pentru ziua următoare, 2018–2026, parametri re-estimați în fiecare ianuarie; depășiri (2 190 zile; ținta 1%): EVT condiționată 1,23%, GARCH cu șocuri Normale 2,42%, istoric pe 500 de zile 1,60%

- GARCH–Normal surprinde corect **momentul**, dar are un **nivel greșit**; EVT condiționată păstrează **momentul** și corectează **nivelul**: contează coada șocurilor, nu doar scala lor



## Regula rădăcinii pătrate a timpului: ipoteze și eșecuri

- Pierderi zilnice i.i.d.  $N(0, \sigma^2)$ :  $\text{VaR}_\alpha^{(h)} = \sqrt{h} \text{VaR}_\alpha^{(1)}$ ,  $\text{ES}_\alpha^{(h)} = \sqrt{h} \text{ES}_\alpha^{(1)}$ ; Basel 1996 a permis  $\sqrt{10} = 3,162$  [Basel Committee \(1996\)](#)
  - Cere medie zero, fără autocorelație, volatilitate constantă și șocuri Normale; fiecare ipoteză este încălcată de date ([Capitolele 1, 2, 5](#))
- **Autocorelație**:  $\text{Var}(r_{t+1} + \dots + r_{t+h}) = h\sigma^2 \text{VR}(h)$  (raportul dispersiilor, [Capitolul 2](#))
  - $\text{VR} > 1$ :  $\sqrt{h}$  **subestimează** riscul pe  $h$  zile
- **Volatility clustering**: volatilitatea revine la medie pe  $h$  zile; calm azi  $\Rightarrow \sqrt{h}$  prea mic, agitație azi  $\Rightarrow$  prea mare
- **Cozi grele**: pentru șocuri i.i.d. cu indice de coadă  $a > 2$ , cuantila extremă a unei sume crește ca  $h^{1/a} < \sqrt{h}$  [Dánielsson \(2011\)](#)
  - Cu salturi, regula poate evalua foarte greșit riscul pe mai multe zile [Dánielsson & Zigrand \(2006\)](#)

## Monte Carlo filtrat pe $h$ zile

- ▣ Simulăm multe traiectorii viitoare din modelul estimat și citim VaR și ES din pierderile simulate: tratează deodată toate cele trei probleme, precum și câștigurile neliniare (opțiuni)
- ▣ Pentru  $j = 1, \dots, M$ 
  - ▶ extragem  $z_{t+1}^{(j)}, \dots, z_{t+h}^{(j)}$  cu revenire din reziduurile standardizate  $\hat{z}$
  - ▶ actualizăm  $\sigma^{(j)}$  și  $r^{(j)}$  zi de zi cu recursia AR(1)-GARCH(1,1), pornind de la starea de azi
  - ▶ agregăm:  $L^{(j)} = -\sum_{i=1}^h r_{t+i}^{(j)}$
- ▣  $\widehat{\text{VaR}}_\alpha, \widehat{\text{ES}}_\alpha$  = estimările istorice pe cele  $M$  pierderi simulate; eroarea de simulare scade ca  $1/\sqrt{M}$

## Regula rădăcinii pătrate în date




- Stînga:  $\text{VaR}_{1\%}$  empiric al pierderilor suprapuse pe  $h$  zile, împărțit la  $\sqrt{h}$  ori valoarea pe o zi (sume suprapuse: mult mai puține observații independente); dreapta: Monte Carlo filtrat, 200 000 de traiectorii
- Raportul la  $h = 10$ : BET 1,22 (autocorelația de ordin 1 0,109) și EUR/RON 1,05:  $\sqrt{h}$  prea mic; S&P 500 0,95, aur 0,92, Bitcoin 0,89: conservatoare
- $\text{VaR}_{1\%}$  pe 10 zile pentru S&P 500: Monte Carlo filtrat 6,29%,  $\sqrt{10} \times \text{VaR}$  filtrat pe o zi 6,22%,  $\sqrt{10} \times \text{VaR}$  istoric pe o zi 10,92%: diferența mare vine din trecerea de la necondiționat la condiționat

## VaR de portofoliu și alocarea Euler

- Ponderi  $w$ , randamente simple  $R$  cu covarianța  $\Sigma$  (randamentele simple se adună între active);  $L_p = -w^\top R$ 
  - ▶ Sub distribuția Normală, neglijând media:  $\text{VaR}_\alpha(L_p) = z_{1-\alpha}\sigma_p$ ,  $\sigma_p = \sqrt{w^\top \Sigma w}$ ; pentru ponderi nenegative  $w \geq 0$ , VaR nediversificat  $\sum_i z_{1-\alpha} w_i \sigma_i$  este mai mare, cu excepția corelațiilor egale cu 1
- **VaR marginal**  $\partial \text{VaR}_\alpha / \partial w_i = z_{1-\alpha}(\Sigma w)_i / \sigma_p$ ; **VaR pe componente**  $C_i = w_i \partial \text{VaR}_\alpha / \partial w_i$ 
  - ▶ Teorema lui Euler pentru o funcție omogenă de grad 1:  $\sum_i w_i \partial \rho / \partial w_i = \rho$ , deci  $\sum_i C_i = \text{VaR}_\alpha$  [Tasche \(2008\)](#)
- ES, fără ipoteză de distribuție (pierderi continue):  $C_i^{ES} = \mathbb{E}[-w_i R_i \mid L_p \geq \text{VaR}_\alpha(L_p)]$ ,  $\sum_i C_i^{ES} = \text{ES}_\alpha(L_p)$ 
  - ▶ Estimarea istorică: media pe zilele din coadă; un  $C_i$  negativ înseamnă că activul **acoperă** riscul portofoliului

## Cine contribuie la risc?



- SPY (ETF pe S&P 500) 40%, TLT (ETF pe obligațiuni de stat americane pe termen lung) 30%, GLD (ETF pe aur) 20%, Bitcoin 10%, rebalansare zilnică; randamente simple în 3 017 zile comune, 2014–2026; turcoaz: ponderi, albastru: cote din  $VaR_{1\%}$  Normal, roșu: cote din  $ES_{2,5\%}$  istoric

- $VaR_{1\%} = 1,77\%$  față de  $3,11\%$  nediversificat ( $-43\%$ );  $ES_{2,5\%} = 2,15\%$  față de  $3,87\%$  ( $-44\%$ )

- Bitcoin: 10% din bani, 37,8% din VaR și 36,6% din ES; TLT: 30% din bani, doar 6,5% din ES (a pierdut 0,47% în zilele cele mai rele ale portofoliului)

## Portofoliul cu ES minim: o problemă de programare liniară

- Cu  $N$  scenarii istorice  $R_s$ , funcția Rockafellar–Uryasev devine o problemă de **programare liniară** Rockafellar & Uryasev (2000)
  - ▶  $\min_{w,v,u} v + \frac{1}{\alpha N} \sum_s u_s$  cu restricțiile  $u_s \geq -w^\top R_s - v$ ,  $u_s \geq 0$ ,  $\sum_i w_i = 1$ ,  $w \geq 0$
- Aceleași patru active, 3017 zile comune,  $\alpha = 2,5\%$ : ponderi 31% / 44% / 25% / 0%
  - ▶  $ES_{2,5\%} = 1,67\%$ , față de 2,15% pentru portofoliul 40/30/20/10
- Dispersie minimă fără vânzări în lipsă: 35% / 43% / 22% / 0%,  $ES_{2,5\%} = 1,67\%$ : pentru aceste active cele două criterii aproape coincid; ele diverg pentru opțiuni și credit
- Mai multe portofolii pot atinge același minim: raportăm soluția împreună cu scenariile ei din coadă

## VaR ajustat la lichiditate


- VaR presupune că pozițiile pot fi vândute la prețul mediu; în realitate plătim jumătate din diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare (spread)
  - ▶ **Spread relativ**  $S = (\text{ask} - \text{bid})/\text{mid}$ ; se lărgeste exact când piețele scad
- **Bangia, Diebold, Schuermann & Stroughair (2001)**:  $\text{LVaR}_\alpha = \text{VaR}_\alpha + \frac{1}{2}(\mu_S + a\sigma_S)$ , cu media  $\mu_S$  și abaterea standard  $\sigma_S$  a spread-ului și un multiplicator  $a$
- Banca Transilvania, 1 milion RON, ultimii doi ani:  $\text{VaR}_{1\%} = 3,16\%$ ; cu  $\mu_S = 0,5\%$ ,  $\sigma_S = 0,3\%$ ,  $a = 3$  presupuse:  $\text{LVaR} = 3,86\%$  (+22%)
- Pozițiile mari mișcă și prețul (lichiditate endogenă): reglementarea tratează acest lucru prin orizonturi mai lungi

## De la Basel 1996 la FRTB (2019)

|                | Basel 1996 <a href="#">Basel Committee (1996)</a>                                                                                                                                                         | FRTB 2019 <a href="#">Basel Committee (2019)</a>                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Măsura de risc | VaR 1%, calculat zilnic                                                                                                                                                                                   | ES 2,5%, calculat zilnic pentru fiecare birou de tranzacționare                                                                              |
| Orizontul      | 10 zile; scalarea cu $\sqrt{10}$ permisă                                                                                                                                                                  | bază de 10 zile, scalată prin orizonturi de lichiditate (acțiuni cu capitalizare mare 10, mică 20, spread-uri de credit pînă la 120 de zile) |
| Datele         | cel puțin un an de istorie                                                                                                                                                                                | calibrat pe cea mai severă perioadă de stres de 12 luni                                                                                      |
| Capitalul      | $\max(\text{VaR de ieri, multiplicator} \geq 3 \times \text{media VaR pe 60 de zile})$ ; multiplicatorul crește cu 0–1 după rezultate slabe la backtesting (zonele semafor, <a href="#">Capitolul 8</a> ) | multiplicator $m_c = 1,5$ , crescut după rezultate slabe la backtesting                                                                      |
| Backtesting    | excepțiile VaR 1% ( <a href="#">Capitolul 8</a> )                                                                                                                                                         | VaR 1% și VaR 2,5% pe o zi: VaR se testează, ES stabilește capitalul                                                                         |

- Critica de după 2008: VaR ignoră mărimea pierderilor din coadă, iar ferestrele de un an uită crizele; în UE, cerințele de fonduri proprii FRTB se aplică de la 1 ianuarie 2027 [Delegated Regulation \(EU\) 2025/1496](#)

## VaR 1% vs ES 2,5% pe cinci active




- Simulare istorică, pierderi zilnice, selecțiile complete; numărul de deasupra fiecărei perechi:  $ES_{2,5\%}/VaR_{1\%}$
- Reperul Normal: 2,338/2,326  $\approx$  1,005, același capital pentru cozi subțiri; Student- $t$ : 1,01 la  $\nu = 30$ , 1,07 la  $\nu = 4$
- Date: S&P 500 1,09, BET 1,11, Bitcoin 1,03, EUR/RON 1,10, aur 1,06: trecerea de la VaR 1% la ES 2,5% crește măsura pe o zi cu 3–11%

- Atenție:  $ES_{\alpha} \geq VaR_{\alpha}$  este valabilă la **același**  $\alpha$ ; între niveluri diferite, cozile grele singure nu o garantează
- Calibrarea pe stres și orizonturile de lichiditate adaugă mai mult: Seminarul 7, C1

## Studiu de caz: întrebarea și schema de evaluare

- **Chronopoulos, Raftapostolos & Kapetanios (2024)** (*Journal of Financial Econometrics*): poate o rețea neuronală adâncă să îmbunătățească prognoza VaR învățând o relație **neliniară, cu formă necunoscută**, între cuantila condiționată și predictorii?
- Modelul (Ec. 5–10):  $Q_{r_t}(\alpha | x_t) \approx G_\alpha(x_t, w)$ , o rețea cu propagare înainte (feed-forward), cu straturi ascunse ReLU ( $\max(\cdot, 0)$ ), estimată prin minimizarea pierderii pinball plus o penalizare (niciuna, LASSO, ridge sau elastic net)
  - Reperul: regresia cuantilă liniară **Koenker & Bassett (1978)** pe aceiași predictorii, adică liniaritatea de tip CAViaR (secțiunea „VaR și ES condiționate”)
- Date (Secțiunea 3 a articolului): randamentele log zilnice ale S&P 500, septembrie 1985 – august 2020; predictorii: volatilitatea GARCH sau RiskMetrics, variabilele de stare CAViaR;  $\alpha = 1\%, 5\%, 10\%$ 
  - Ultimele 2000 de zile în afara eșantionului, o singură fereastră fixă de calibrare; ținta: cuantila randamentului zilnic peste 10 zile,  $\widehat{\text{VaR}}_{t+10|\mathcal{F}_t} = -G_\alpha(x_t, w^*)$  (Ec. 23); detaliile în [► Anexă](#)

## Studiu de caz: erorile relative, $\alpha = 1\%$



- Chronopoulos, Raftapostolos & Kapetanios (2024), Tabelul 6: RMSFE relativ la regresia cuantilă liniară (linia întreruptă = 1), scară logaritmică; S&P 500, ultimele 2 000 de zile pînă în august 2020
- Modelele flexibile fără rețele: 7 din 12 bare la 1 sau peste; toate cele 16 bare ale rețelelor adînci și cele 4 ale MIDAS adînc sub 1 (0,014–0,850), toate semnificative în testul DM, cu excepția MIDAS adînc pentru SAV


- Atenție: RMSFE este minimizată de **media** condiționată, nu de cuantilă; precizia cuantilelor cere pierderea pinball
- O singură fereastră fixă de calibrare: rămîne de văzut dacă o reducere de 98% se păstrează la reestimarea pe fereastră mobilă (Seminarul 7, C3)

## O întrebare deschisă și ce verificăm

- Pot datele zilnice ordona modelele concurente (VaR 1%, ES 1%)? [Nolde & Ziegel \(2017\)](#), [Patton, Ziegel & Chen \(2019\)](#), [Bayer & Dimitriadis \(2022\)](#), [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2026\)](#)
  - ▶ Dificultăți: ES singur nu este elicitol, iar doar circa 1% din zile sînt informative
  - ▶ Scorul FZ0 pentru modelele A și B,  $v_t = -\text{VaR}_{\alpha,t}$ ,  $e_t = -\text{ES}_{\alpha,t}$ :  

$$S(v, e; Y) = -\frac{1}{\alpha e} 1\{Y \leq v\}(v - Y) + \frac{v}{e} + \ln(-e) - 1$$
;  $d_t = S_t^A - S_t^B$
  - ▶  $H_0: \mathbb{E}[d_t] = 0$  față de  $H_1: \mathbb{E}[d_t] \neq 0$ ; statistica  $t$  Diebold–Mariano cu erori HAC; cîte un interval pentru fiecare subperioadă preînregistrată
- Un asistent AI poate schița harta literaturii, codul și un raport de referent; cercetătorul verifică
  - ▶ semnul și nivelul: VaR 1% =  $-q_1\%$ , pozitiv pentru o pierdere (recalculăm FZ0 pentru o zi, pas cu pas)
  - ▶ look-ahead bias: fiecare prognoză folosește doar date de dinaintea zilei ei; scorul: doar scoruri comune (VaR, ES), niciodată MSE pentru ES singur [Gneiting \(2011\)](#)
  - ▶ puterea: numărăm zilele din coadă; fiecare DOI (Digital Object Identifier, identificatorul digital al articolului) verificat; prompturile reutilizabile în [▶ Anexă](#)

## Mini-studiu de caz: putem ordona modelele ES?



- Afirmația testată: „EVT condiționată este cel mai bun model (VaR 1%, ES 1%) pentru S&P 500”; replicăm întâi: rata de depășire FHS 1,54% (80 din 5 210 zile, 2006–2026)
- FZ0 mediu (o valoare mai mică indică un model mai bun): EVT condiționată 1,267, FHS 1,283, GARCH–Normal 1,453; bare: intervale HAC de 95% pentru  $\mathbb{E}[d_t]$
- Forma șocurilor contează, iar rezultatul este robust: șocurile Normale pierd în ambele jumătăți ( $t = -3,24, -3,38$ )
- Câștigul EVT față de FHS este de zece ori mai mic și nesemnificativ în 2016–2026 ( $[-0,018; 0,004]$ ): câștigul nu este demonstrat, dar nici echivalența celor două modele nu este dovedită

## Rîndul vostru: un punct de plecare pentru proiectul de echipă

- ▣ Întrebarea: oferă un model semiparametric dinamic (VaR, ES) [Patton, Ziegel & Chen \(2019\)](#) prognoze mai bune decît FHS și EVT condiționată la ES 2,5%, în afara eșantionului?
  - ▶ Piețe: S&P 500, BET și Bitcoin
- ▣ Replicăm întâi: VaR 1% FHS pentru S&P 500 de 1,97% și ordonarea FZ0 din mini-studiul de caz
- ▣ Livrabile
  - ▶ O pre-înregistrare de o pagină: modele, niveluri, scoruri, subperioade, putere (zile din coadă) și ce ar infirma afirmația
  - ▶ Cod pe datele zilnice de piață ale cursului, un tabel cu toate comparațiile și valorile  $p$  ajustate, o autocritică în stilul unui referent
- ▣ Notăm prompturile și rezultatele acceptate în `AI_USE.md`, fiecare eroare prinsă (semn inversat, etichetă greșită a nivelului, look-ahead bias, DOI inventat) în `AI_ERRORS.md`; codul: [Quantlet](#)

## Ce metodă și când?

| Situația                                    | Metoda                                                  | Eșuează când                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Verificare rapidă, istorie lungă și stabilă | Simulare istorică, 500–1000 de zile                     | volatilitatea se schimbă; nimic dincolo de cea mai mare pierdere |
| Riscul zilnic după un șoc de volatilitate   | FHS sau EVT condiționată, cu interval bootstrap         | modelul GARCH este greșit specificat                             |
| VaR 0,5% și mai adânc, teste de stres       | Depășiri de prag (GPD), condiționate sau nu             | prag ales greșit; depășiri grupate                               |
| Orizont de mai multe zile, opțiuni          | Monte Carlo filtrat                                     | domină riscul de model                                           |
| Bugetarea riscului pe birouri sau active    | Contribuții Euler la ES                                 | fiecare contribuție se bazează pe puține zile din coadă          |
| Capitalul reglementat                       | ES 2,5%, 10 zile, perioadă de stres, backtesting pe VaR | fereastra de stres este scurtă și zgomotoasă                     |

- Orice VaR sau ES este o estimare: îl raportăm cu numărul de observații din coadă și un interval

## Autoevaluare și ce urmează: Capitolul 8

### Întrebări de verificare

- De ce poate VaR recompensa concentrarea?
- De ce nu o poate recompensa ES?
- De ce depinde precizia ES de  $n\alpha$  și nu de  $n$ ?
- Când este scalarea cu  $\sqrt{10}$  prea mică?
- Când este prea mare?

### : backtesting

- Cît de des au depășit pierderile VaR?
- Au fost depășirile independente?
- Testele de acoperire și zonele de tip semafor din Basel
- Compararea prognozelor (VaR, ES) cu scoruri comune Fissler & Ziegel (2016)
- Lecturi suplimentare: Franke, Härdle & Hafner (2019), Härdle, Chen & Overbeck (2017), Čížek, Härdle & Weron (2011), McNeil, Frey & Embrechts (2015)

## Anexă: Datele folosite în acest capitol

| Seria              | Tip                                   | Perioada  | Zile  |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|-------|
| S&P 500            | indice bursier SUA                    | 2000–2026 | 6 717 |
| BET                | indice bursier BVB                    | 2000–2026 | 6 670 |
| Bitcoin            | cripto-activ, 7 zile din 7            | 2014–2026 | 4 384 |
| EUR/RON            | cursul de referință BNR               | 2005–2026 | 5 352 |
| Aur                | USD pe uncie troy, zile lucrătoare    | 2000–2026 | 6 956 |
| Portofoliu         | SPY, TLT, GLD (ETF-uri) și Bitcoin    | 2014–2026 | 3 017 |
| Banca Transilvania | acțiune BVB (exemplul de lichiditate) | 2024–2026 | 496   |

- ▣ Valori zilnice de închidere pînă la 18 septembrie 2026; randamente log zilnice în %,  $r_t = 100 (\ln P_t - \ln P_{t-1})$
- ▣ Fiecare serie pe propriul calendar; portofoliul folosește zilele în care există toate cele patru prețuri
- ▣ ETF-uri: prețuri ajustate pentru dividende; SPY replică S&P 500, TLT obligațiunile de stat americane pe termen lung, GLD aurul

## Anexă: Demonstrația reprezentării Rockafellar–Uryasev

- **Demonstrație:**  $F(v) = v + \mathbb{E}[(L - v)_+]/\alpha$  este convexă, cu derivata la dreapta  $1 - P(L > v)/\alpha$ 
  - ▶ Este  $\geq 0$  exact când  $P(L > v) \leq \alpha$ , adică  $v \geq \text{VaR}_\alpha$ ;  $F(\text{VaR}_\alpha)$  este formula ES discretă de pe slide-ul celor două obligațiuni
- **Corolar:**  $(w, v) \mapsto v + \mathbb{E}[(-w^\top R - v)_+]/\alpha$  este convexă simultan în ambele argumente; minimizarea în raport cu  $v$  păstrează convexitatea
  - ▶ ES este convex în  $w$ ; împreună cu omogenitatea pozitivă, aceasta demonstrează subaditivitatea
- Argumentul înfășurătoarei:  $\partial F/\partial v = 0$  în  $v = \text{VaR}_\alpha$ , deci o mică eroare în VaR schimbă minimul doar la ordinul al doilea: de aici eroarea standard a ES fără termen din VaR

## Anexă: Când este totuși VaR subaditiv?

- Pierderi cu distribuție **eliptică comună** (distribuția Normală multivariată, distribuția Student- $t$  multivariată) și  $\alpha < 0,5$ : VaR este subaditiv [McNeil, Frey & Embrechts \(2015\)](#)
  - ▶ Acolo VaR și ES sînt ambele  $\mu_p + \sigma_p \times$  constantă, cu  $\sigma_p \leq \sum_i \sigma_i$ ; marginale Normale sau  $t$  nu sînt suficiente prin ele însele
- **Cozi grele, dar nu prea grele**: pentru pierderi cu variație regulată multivariată și indice de coadă peste 1, VaR este subaditiv suficient de departe în coadă (asimptotic, cînd  $\alpha \rightarrow 0$ ) [Dánielsson et al. \(2013\)](#)
  - ▶ Indicii de coadă estimați pentru acțiuni și cursuri de schimb sînt în acest domeniu (între 4,8 și 6,5 în secțiunea „Teoria valorilor extreme”), dar rezultatul este asimptotic, nu o garanție la un  $\alpha$  dat
- Eșuează pentru salturi discrete (neplăți), cozi extrem de grele și unele cîștiguri din opțiuni
- VaR vs ES în practică: ES are nevoie de mai multe date pentru aceeași precizie [Yamai & Yoshida \(2005\)](#)

## Anexă: Agregarea VaR sub incertitudinea dependenței

- Marginale  $F_1, \dots, F_d$  cunoscute, copula necunoscută (Capitolul 6):  $\text{VaR}_\alpha(\sum_i L_i)$  se află într-un interval Embrechts, Puccetti & Rüschendorf (2013)
  - ▶ Valoarea comonotonă  $\sum_i \text{VaR}_\alpha(L_i)$  **nu** este capătul superior: VaR nu este subaditiv
- **Algoritmul de rearanjare:** discretizăm coada de dincolo de fiecare  $\text{VaR}_\alpha(L_i)$  în  $N$  puncte (o coloană pe activ)
  - ▶ Ordonăm fiecare coloană invers față de suma celorlalte până când sumele pe rînduri devin uniforme; VaR maxim  $\approx$  cea mai mică sumă pe rînd
- Portofoliul 40/30/20/10 din secțiunea „VaR de portofoliu și contribuțiile la risc”,  $\text{VaR}_{1\%}$  zilnic, marginale empirice,  $N = 2000$ 
  - ▶ Dependența istorică 1,95%; comonotonă 3,63%; cazul cel mai rău 4,76% ( $1,31 \times$  valoarea comonotonă)
- Incertitudinea privind modelul dependenței afectează capitalul bazat pe VaR cu un ordin de mărime comparabil cu beneficiul diversificării

## Anexă: Entropia și riscul de piață

- **Entropia diferențială** a unei densități  $f$ :  $H(L) = - \int f(x) \ln f(x) dx$ , o măsură a dispersiei fără momente
  - Pentru o familie locație-scală  $L = \mu + \sigma Z$ :  $H(L) = \ln \sigma + H(Z)$ , deci  $\text{VaR}_\alpha = \mu + e^{H(L)-H(Z)} q_{1-\alpha}(Z)$
- **Pele, Lazar & Dufour (2017)**: entropia randamentelor intrazilnice este legată de VaR și ES intrazilnice și ajută la prognoza VaR zilnic (EUR/JPY)
- **Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele (2019)**: entropia din date de înaltă frecvență dă cele mai bune prognoze VaR zilnice pentru Bitcoin dintre modelele comparate
- **Pele, Lazar & Mazurencu-Marinescu-Pele (2019)**: o măsură neparametrică bazată pe entropia cozii, ca estimator alternativ pentru ES

## Anexă: VaR și ES pe metode și active

|         | VaR <sub>1%</sub> (%) |                |       |       |       | ES <sub>2,5%</sub> (%) |                |       |       |       |
|---------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|------------------------|----------------|-------|-------|-------|
|         | Ist.                  | Distr. Normală | t     | CF    | EVT   | Ist.                   | Distr. Normală | t     | CF    | EVT   |
| S&P 500 | 3,45                  | 2,80           | 3,46  | 6,08  | 3,54  | 3,76                   | 2,81           | 3,95  | 6,65  | 3,78  |
| BET     | 4,13                  | 3,19           | 4,06  | 7,25  | 4,22  | 4,57                   | 3,21           | 4,76  | 7,93  | 4,58  |
| Bitcoin | 10,51                 | 7,99           | 11,06 | 18,89 | 10,23 | 10,84                  | 8,03           | 13,37 | 20,69 | 10,84 |
| EUR/RON | 0,76                  | 0,64           | 1,36  | 1,43  | 0,78  | 0,84                   | 0,65           | 3,27  | 1,60  | 0,84  |
| Aur     | 3,04                  | 2,50           | 3,00  | 4,64  | 3,07  | 3,23                   | 2,51           | 3,27  | 5,02  | 3,23  |

- Pierderi zilnice, selecțiile complete; CF = Cornish–Fisher, EVT = coada Pareto generalizată estimată pe cele mai mari 5% dintre pierderi (secțiunea „Teoria valorilor extreme”)
- Aplatizare: S&P 500 10,7, BET 11,1, Bitcoin 12,0, EUR/RON 15,1, aur 7,7; Bitcoin necesită o rezervă de aproximativ trei ori mai mare decât S&P 500, EUR/RON de aproximativ o cincime

## Anexă: Teoria asimptotică pentru VaR și ES istorice

- **VaR**: pentru pierderi i.i.d. cu densitatea  $f$  continuă și pozitivă în  $\text{VaR}_\alpha$ ,  

$$\sqrt{n}(\widehat{\text{VaR}}_\alpha - \text{VaR}_\alpha) \rightarrow N\left(0, \frac{\alpha(1-\alpha)}{f(\text{VaR}_\alpha)^2}\right)$$
- **ES Chen (2008)**: funcția de influență  $\text{IF}(x) = \text{VaR}_\alpha + (x - \text{VaR}_\alpha)_+/\alpha - \text{ES}_\alpha$ 
  - Niciun termen din estimarea VaR:  $\partial F/\partial v = 0$  în  $v = \text{VaR}_\alpha$ ; dacă  $\mathbb{E}[(L - \text{VaR}_\alpha)_+^2] < \infty$ , dispersia limitei lui  $\sqrt{n}(\widehat{\text{ES}}_\alpha - \text{ES}_\alpha)$  este avar  $= \text{Var}((L - \text{VaR}_\alpha)_+)/\alpha^2$
  - Coadă de tip Pareto cu indicele  $a > 2$ ,  $\alpha \rightarrow 0$ :  $\text{Var}((L - \text{VaR}_\alpha)_+) \approx \frac{2\alpha \text{VaR}_\alpha^2}{(a-1)(a-2)}$ , deci  $\text{SE} \propto \text{VaR}_\alpha/\sqrt{n\alpha}$  **Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele (2026)**
- Pierderi staționare, slab dependente: înlocuim dispersiile cu dispersiile de termen lung (HAC) ale lui  $1\{L_t > \text{VaR}_\alpha\}$  și  $(L_t - \text{VaR}_\alpha)_+$  **Newey & West (1987)** sau folosim un bootstrap pe blocuri

## Anexă: Precizia pentru S&P 500, tabelul complet

|                      | $n$   | $\widehat{\text{VaR}}_{1\%}$ | SE i.i.d. | SE HAC | $\widehat{\text{ES}}_{2,5\%}$ | SE i.i.d. | SE HAC |
|----------------------|-------|------------------------------|-----------|--------|-------------------------------|-----------|--------|
| 2000–2026            | 6 717 | 3,45                         | 0,13      | 0,19   | 3,76                          | 0,15      | 0,26   |
| Ultimele 500 de zile | 500   | 2,73                         | 0,36      | 0,44   | 2,94                          | 0,48      | 0,65   |

- Densitatea  $f(\text{VaR})$  prin nucleu Gaussian (lățimea de bandă Silverman); HAC: nucleu Bartlett, decalaj  $\lfloor 4(n/100)^{2/9} \rfloor$  (10 și 5) Newey & West (1994)
- Selecția completă,  $n = 6\,717$ : SE a  $\text{VaR}_{1\%}$  sub distribuția Normală cu  $\sigma = 1,2\%$  ar fi 0,055, sub  $t_4$  0,12; volatility clustering crește SE cu 50–70%

## Anexă: Filtrele GARCH și volatilitatea de mîne

|         | $\hat{\phi}$ | $\hat{\alpha}_1$ | $\hat{\beta}_1$ | $\hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1$ | $\hat{\sigma}$ (selecție) | $\hat{\sigma}_{t+1}$ | $-q_1\%(\hat{z})$ |
|---------|--------------|------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| S&P 500 | -0,053       | 0,120            | 0,860           | 0,981                            | 1,21                      | 0,73                 | 2,79              |
| BET     | 0,104        | 0,207            | 0,787           | 0,994                            | 1,40                      | 1,76                 | 2,74              |
| Bitcoin | -0,009       | 0,127            | 0,843           | 0,970                            | 3,49                      | 3,00                 | 2,88              |
| EUR/RON | 0,169        | 0,200            | 0,780           | 0,980                            | 0,28                      | 0,11                 | 2,74              |
| Aur     | -0,022       | 0,046            | 0,943           | 0,989                            | 1,09                      | 1,43                 | 2,68              |

- $\hat{\sigma}_{t+1}$ : prognoza pentru prima zi de tranzacționare de după 18 septembrie 2026 (19 septembrie pentru Bitcoin), în %
- Persistența aproape de 1: șocurile de volatilitate se sting încet ([Capitolul 5](#)); S&P 500 și EUR/RON sînt calme azi, BET și aurul agitate
- $-q_1\%(\hat{z})$  între 2,68 și 2,88, peste  $-z_1\% = 2,326$ : șocurile filtrate au tot cozi grele

## Anexă: VaR și ES condiționate pentru următoarea zi de tranzacționare

|         | VaR <sub>1%</sub> (%) |      |       |       | ES <sub>1%</sub> (%) |       |       |       |
|---------|-----------------------|------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|
|         | GARCH                 | FHS  | c-EVT | Ist.  | GARCH                | FHS   | c-EVT | Ist.  |
| S&P 500 | 1,63                  | 1,97 | 2,03  | 3,45  | 1,88                 | 2,55  | 2,56  | 5,01  |
| BET     | 3,80                  | 4,53 | 4,63  | 4,13  | 4,39                 | 6,16  | 6,20  | 6,28  |
| Bitcoin | 6,89                  | 8,56 | 8,68  | 10,51 | 7,90                 | 12,22 | 12,19 | 14,29 |
| EUR/RON | 0,23                  | 0,27 | 0,26  | 0,76  | 0,27                 | 0,34  | 0,35  | 1,12  |
| Aur     | 3,32                  | 3,82 | 3,86  | 3,04  | 3,80                 | 4,94  | 4,93  | 4,21  |

- GARCH: GARCH cu șocuri Normale; c-EVT: teoria valorilor extreme condiționată (secțiunea „Teoria valorilor extreme”); Ist.: necondiționat, întreaga selecție
- GARCH cu șocuri Normale dă cea mai mică valoare dintre cele trei metode condiționate pe fiecare rând: volatilitatea, singură, nu explică coada


## Anexă: Riscul de estimare în VaR condiționat

- $\text{VaR}_{\alpha,t+1} = -\mu_{t+1}(\theta) + \sigma_{t+1}(\theta) \xi_{\alpha}$ ,  $\xi_{\alpha} = -q_{\alpha}(z)$ : **atît**  $\theta$  (GARCH, prin QML), cît și  $\xi_{\alpha}$  (o cuantilă a reziduurilor) sînt estimați
- **Francq & Zakoïan (2015)**: estimăm împreună **parametrul de risc**  $(\theta, \xi_{\alpha})$ ; sub staționaritate strictă,  $\mathbb{E}[z_t^4] < \infty$  și o densitate pozitivă a lui  $z$  în  $q_{\alpha}(z)$ , VaR condiționat este asimptotic Normal, cu o dispersie provenind din  $\hat{\theta}$ , din  $\hat{\xi}_{\alpha}$  și din covarianța lor
- **Bootstrap pe reziduuri Christoffersen & Gonçalves (2005)**, pentru  $b = 1, \dots, B$ 
  - ▶ simulăm o traiectorie AR(1)-GARCH(1,1) de lungimea selecției cu  $\hat{z}$  reeșantionate și re-estimăm  $\theta^*$  pe ea
  - ▶  $\sigma_{t+1}^*$  din randamentele **originale** cu  $\theta^*$ ;  $\xi_{\alpha}^*$  din reziduurile traiectoriei;  $\text{VaR}_{t+1}^* = -\mu_{t+1}^* + \sigma_{t+1}^* \xi_{\alpha}^*$ ; interval percentil
- Cozile grele și asimetria lui  $z$  încetinesc convergența; **Spierdijk (2016)** compară metodele de construire a intervalelor de încredere pentru VaR ARMA-GARCH în acest caz

## Anexă: Setările estimării CAViaR și modelele comune (VaR, ES)

- Setările de estimare din [Engle & Manganelli \(2004\)](#):  $10^4$  puncte de start aleatoare în  $(0, 1)^3$ , cele mai bune 10 rafinate prin pași simplex și quasi-Newton; valoarea de pornire a recursiei,  $\text{VaR}_1 = -\hat{q}_\alpha$ , este cuantila empirică de ordin  $\alpha$  a primelor 300 de randamente, cu semn schimbat; aceste zile rămân în eșantionul de estimare
- Perechea (VaR, ES) poate fi **estimată** prin minimizarea unui scor comun strict consistent [Fissler & Ziegel \(2016\)](#); [Capitolul 8](#) folosește aceleași scoruri pentru a **evalua** prognozele
  - ▶ [Patton, Ziegel & Chen \(2019\)](#): modele semiparametrice dinamice pentru (VaR, ES), de ex. cu dinamică GAS, estimate prin minimizarea pierderii FZ0; consistență și normalitate asimptotică
  - ▶ [Taylor \(2019\)](#): recursii de tip CAViaR pentru VaR și ES, estimate printr-o verosimilitate Laplace asimetrică
  - ▶ [Dimitriadis & Bayer \(2019\)](#): regresie liniară a cuantilei și a ES pe covariate (volatilitate realizată și implicită), cu erori standard
- Firul comun: funcția de scor care ordonează prognozele este și funcția obiectiv care estimează modelul

## Anexă: Emil Gumbel și statistica extremelor



Emil Julius Gumbel (1891–1966)

Foto: autor necunoscut (c. 1931); domeniu public;

[Wikimedia Commons](#)

- Fisher & Tippett (1928): maximul multor variabile i.i.d., rescalat corespunzător, poate avea doar trei forme limită
- Gnedenko (1943) a demonstrat riguros rezultatul
- Gumbel (1958) a scris primul manual și a aplicat teoria la inundații, secete și durate de viață
  - ▶ Distribuția Gumbel este una dintre cele trei forme limită

## Anexă: De la maxime lunare la un VaR zilnic

- Zile independente:  $P(M_n \leq x) \approx P(L \leq x)^n$ , deci  $\text{VaR}_\alpha \approx H^{-1}((1 - \alpha)^n)$  cu  $n = 20,9$ 
  - ▶  $\text{VaR}_{1\%} \approx H^{-1}(0,810) = 2,83\%$  față de valoarea istorică 3,45%;  $\text{VaR}_{0,1\%} \approx 6,19\%$
- Volatility clustering încalcă ipoteza de independență, iar aproximarea este prea mică aici
- Cu indicele extremal:  $P(M_n \leq x) \approx F(x)^{n^\theta}$ 
  - ▶  $\hat{\theta} = 0,35$  (prag la VaR 1%):  $\text{VaR}_{1\%} \approx H^{-1}(0,929) = 4,14\%$  în loc de 2,83%; cu  $\hat{\theta} = 0,19$ : 5,09%
  - ▶ Corecția mută rezultatul mai mult decât eroarea pe care o corectează: drumul de la maxime pe blocuri la VaR zilnic este fragil

## Anexă: Estimările GPD pentru cinci serii

|         | $u$ (%) | $N_u$ | $\hat{\xi}$ | $SE(\hat{\xi})$ | $1/\hat{\xi}$ | $VaR_{1\%}$ | $ES_{1\%}$ |
|---------|---------|-------|-------------|-----------------|---------------|-------------|------------|
| S&P 500 | 1,85    | 336   | 0,19        | 0,065           | 5,3           | 3,54        | 5,04       |
| BET     | 1,93    | 334   | 0,21        | 0,066           | 4,8           | 4,22        | 6,34       |
| Bitcoin | 5,33    | 220   | 0,16        | 0,078           | 6,1           | 10,23       | 14,36      |
| EUR/RON | 0,38    | 268   | 0,18        | 0,072           | 5,5           | 0,78        | 1,14       |
| Aur     | 1,68    | 348   | 0,15        | 0,062           | 6,5           | 3,07        | 4,22       |

- $\hat{\xi}$  între 0,15 și 0,21 pentru toate cele cinci serii, fiecare la peste două erori standard i.i.d. deasupra lui 0: cozi grele peste tot (gruparea face aceste SE prea mici)
- Indicele de coadă  $1/\hat{\xi}$  între 4,8 și 6,5: cozile superioare estimate au momente de ordinul patru finite, dar fiecare interval de 95% pentru  $\xi$  trece de 0,25, deci existența momentelor de ordinul patru nu este confirmată statistic (comparați cu Capitolul 1)

## Anexă: Indicele extremal: estimatorul și declusterizarea

- ▣ **Estimatorul pe intervale Ferro & Segers (2003)** din cele  $N$  momente de depășire a lui  $u$  și intervalele  $T_i$  dintre ele
  - ▶  $\hat{\theta} = \min \left\{ 1, \frac{2(\sum_i (T_i - 1))^2}{(N - 1) \sum_i (T_i - 1)(T_i - 2)} \right\}$  dacă  $\max T_i > 2$  (altfel cu  $T_i, T_i^2$ )
- ▣ **Declusterizare Ferro & Segers (2003)**: ținta este  $C = \lfloor \hat{\theta} N \rfloor + 1$  grupuri, separate de cele mai mari  $C - 1$  intervale; estimăm GPD pe maximele grupurilor
  - ▶ Egalități: dacă al  $(C - 1)$ -lea și al  $C$ -lea cel mai mare interval sînt egale,  $C$  se reduce pînă cînd diferă, deci numărul realizat de grupuri poate fi sub țintă
- ▣ S&P 500: ținta  $C = 63$ , 62 de grupuri după regula egalităților; la VaR 1% istoric ( $u = 3,45\%$ ,  $N = 68$ ):  
 $\hat{\theta} = 0,35$ 
  - ▶ SE i.i.d. a lui  $\hat{\xi}$  era mai puțin de jumătate din SE obținută din maximele grupurilor

## Anexă: Portofoliul: volatilități, corelații și contribuții

|         | Pondere | $\sigma_i$ (%) | corel. SPY | corel. TLT | corel. GLD |
|---------|---------|----------------|------------|------------|------------|
| SPY     | 40%     | 1,10           | 1,00       |            |            |
| TLT     | 30%     | 0,93           | -0,17      | 1,00       |            |
| GLD     | 20%     | 1,03           | 0,07       | 0,25       | 1,00       |
| Bitcoin | 10%     | 4,14           | 0,23       | -0,02      | 0,09       |

|         | $\sigma_i$ (%)    | VaR marginal | $C_i$ | cotă  | $C_i^{ES}$ | cotă  |
|---------|-------------------|--------------|-------|-------|------------|-------|
| SPY     | 1,10              | 1,68         | 0,67  | 38,1% | 0,98       | 45,4% |
| TLT     | 0,93              | 0,70         | 0,21  | 11,8% | 0,14       | 6,5%  |
| GLD     | 1,03              | 1,08         | 0,22  | 12,3% | 0,25       | 11,4% |
| Bitcoin | 4,14              | 6,68         | 0,67  | 37,8% | 0,79       | 36,6% |
| Total   | $\sigma_p = 0,76$ |              | 1,77  | 100%  | 2,15       | 100%  |

- SPY are o cotă mai mare din ES decât din VaR Normal (45,4% vs 38,1%): pierderile lui se concentrează în zilele cele mai rele ale portofoliului mai mult decât indică covarianțele; pentru a o numi dependență în coadă e nevoie de o analiză separată (Capitolul 6)

## Anexă: Comitetul de la Basel și calendarul UE



Turnul BIS din Basel, sediul Comitetului de la Basel pentru Supraveghere Bancară

Foto: Michal Pleskowicz (2018); CC BY-SA 4.0;  
Wikimedia Commons

- Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară stabilește standardele globale de capital; autoritățile naționale (în UE, prin Regulamentul privind cerințele de capital) le transformă în lege
- **1996:** riscul de piață intră în regulile de capital; băncile pot folosi modele VaR interne [Basel Committee \(1996\)](#)
- **2019:** standardul revizuirii fundamentale a portofoliului de tranzacționare (Fundamental Review of the Trading Book) înlocuiește VaR cu ES în abordarea bazată pe modele interne [Basel Committee \(2019\)](#); fiecare jurisdicție își stabilește data de aplicare
- UE: [Delegated Regulation \(EU\) 2025/1496](#) a amânat cerințele de fonduri proprii FRTB la 1 ianuarie 2027; pînă atunci băncile aplică cadrul anterior, bazat pe VaR

## Anexă: Studiu de caz: date și metodă în detaliu

- **Date** (Secțiunea 3.1 a articolului): randamentele log zilnice ale S&P 500,  $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$ , septembrie 1985 – august 2020,  $T = 9\,053$ ;  $\alpha = 1\%$ ,  $5\%$  și  $10\%$ 
  - ▶ Patru seturi de predictor  $x_t$  (Ec. 14–17, după [Giacomini & Komunjer \(2005\)](#)):  $\sigma_t$  din GARCH(1,1);  $\sigma_t$  RiskMetrics cu  $\lambda = 0,94$ ; CAViaR SAV ( $\text{VaR}_{t-1}, |r_{t-1}|$ ); CAViaR cu pantă asimetrică ( $\text{VaR}_{t-1}, r_{t-1}^+, r_{t-1}^-$ )
  - ▶ În articol,  $\tau$  corespunde nivelului  $\alpha$  din curs;  $\text{VaR}_{\alpha,t} = -Q_{r_t}(\alpha \mid x_t)$ , ca în secțiunea „VaR și Expected Shortfall”
- **Schema de evaluare** (Secțiunea 3.2 a articolului): ultimele 2 000 de zile formează eșantionul de evaluare; primele 7 053 sînt folosite pentru calibrarea unică a modelului (fereastră fixă)
  - ▶ CV pentru serii de timp (Ec. 12): se exclud  $\delta = 5$  zile de fiecare parte a observației evaluate; se aleg aleatoriu  $\kappa = 20$  de observații pentru testare; grile: adîncimea și lățimea din  $\{1, 5, 10\}$ , cîte cinci valori pentru rata de învățare și  $\lambda$  în  $[0,001; 0,01]$ , dimensiunea lotului din  $\{10, 20\}$ ; antrenare: dropout de cel mult 20%, Adam (algoritm de optimizare stocastică cu pas adaptiv), oprire timpurie (Secțiunea 1.4 a articolului)
- **Modele comparate**: regresia cuantilă liniară (modelul de referință), regresiiile cuantile polinomială și cu funcții B-spline, modelul MIDAS liniar (Ec. 18) și o rețea MIDAS adîncă
  - ▶ **Evaluare** (Secțiunea 3.3 a articolului): RMSFE relativ la reperul liniar; testul DM [Diebold & Mariano \(1995\)](#) aplicat pierderilor pinball, cu corecția [Harvey, Leybourne & Newbold \(1997\)](#); testul CQFE [Giacomini & Komunjer \(2005\)](#) cu parametrul de netezire  $\eta = 0,005$
  - ▶ Motivația: [Patton, Ziegel & Chen \(2019\)](#) au extins CAViaR la (VaR, ES) cu dinamică parametrică; acest articol păstrează doar VaR, dar renunță la liniaritate

## Anexă: Studiu de caz: rezultatele complete (Tabelele 6 și 7)

| $\alpha = 1\%$ | Polin. | Spline | MIDAS | Adînc | LASSO | Ridge | Elnet | MIDAS adînc |
|----------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| GARCH          | 0,909  | 0,791  | 1,083 | 0,346 | 0,236 | 0,177 | 0,146 | 0,346       |
| RiskMetrics    | 0,780  | 0,570  | 1,066 | 0,289 | 0,141 | 0,207 | 0,239 | 0,246       |
| SAV            | 1,000  | 1,511  | 0,838 | 0,198 | 0,024 | 0,225 | 0,498 | 0,850       |
| Pantă asim.    | 1,000  | 1,040  | 4,918 | 0,235 | 0,096 | 0,014 | 0,037 | 0,601       |

- RMSFE relativ la regresia cuantilă liniară,  $\alpha = 1\%$  (Tabelul 6; LASSO, Ridge, Elnet = rețele adînci penalizate): toate cele 16 valori ale rețelor adînci sînt sub 1 și semnificative la 1% în testul DM
  - Pe toate nivelurile, rețelele adînci reduc eroarea cu 50%–98%, MIDAS adînc cu 11%–84%; penalizarea cea mai bună se schimbă cu setul de predictorii (elastic net pentru GARCH, LASSO pentru RiskMetrics și SAV, ridge pentru panta asimetrică)
- În majoritatea cazurilor, reperul liniar are erori mai mici decît regresiiile polinomială și cu spline (raport de pînă la 1,716 la alte niveluri  $\alpha$  din Tabelul 6); MIDAS liniar ajunge la 4,918; rezultatele nu separă contribuțiile arhitecturii, penalizării și CV
- CQFE la  $\alpha = 1\%$  (Tabelul 7): prognozele blocului neliniar înglobează informația din prognozele concurente în 757 de comparații (42 de rezultate nefavorabile, 751 neconcludente); pentru blocul liniar, 173 (15, 170); numeroase perechi neconcludente arată că o combinație de prognoze ar putea aduce încă informație

## Anexă: Studiu de caz: replicare și limite

- **Replicare** pe datele zilnice de piață ale cursului: seria S&P 500 începe în ianuarie 1990, deci lipsește perioada 1985–1989 (o limită a datelor)
  - ▶ Păstrăm fereastra de evaluare din articol (ultimele 2 000 de randamente până la 31 august 2020, de la 19 septembrie 2012): 5 726 de zile de calibrare în loc de 7 053
  - ▶ Construim predictorii GARCH și SAV, estimăm regresia cuantilă liniară și regresia cuantilă cu o rețea neuronală adâncă la  $\alpha = 1\%$  și recalculăm aceste două rînduri din Tabelul 6 (Seminarul 7, C3)
- **Limite menționate de autori**
  - ▶ O singură fereastră de estimare: recalibrarea recursivă sau pe fereastră mobilă, repetată pentru 2 000 de zile, necesită un volum mare de calcul (Secțiunea 3.2 a articolului)
  - ▶ Rețelele sînt predispuse la overfitting, de aici penalizările, dropout, CV și oprirea timpurie (Secțiunea 1.4 a articolului); rezultatul se interpretează doar prin valori SHAP și derivate parțiale (Secțiunea 4 a articolului)
- **Extinderi deschise** (Seminarul 7, C3)
  - ▶ Se păstrează câștigul la reestimarea pe fereastră mobilă în 2020–2026 și pe BET?
  - ▶ Poate o rețea antrenată pe pierderea FZ0 a lui [Patton, Ziegel & Chen \(2019\)](#) să prognozeze împreună (VaR, ES), cum cere FRTB?

## Anexă: Bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (1/2)

- Instrumentele sînt interschimbabile: un asistent AI (Claude, ChatGPT, Gemini, GitHub Copilot) și instrumente de căutare în literatura științifică (Semantic Scholar, Elicit, Google Scholar)
- **Literatura:** „*Listează articolele publicate după 2015 despre backtesting-ul comparativ al perechii (VaR, ES) cu funcții de scor strict consistente: DOI, funcția de scor, testul, mărimea eșantionului și rezultatele privind puterea.*”
  - ▶ Verificăm fiecare DOI în Crossref; verificăm în articol convenția de semn a scorului
- **Ipoteze:** „*Pentru FHS, EVT condiționată și GARCH cu șocuri Normale, spune ce trăsături ale cozii surprinde fiecare și ce prezice fiecare pentru diferențele FZ0 în anii calmi și în cei agitați.*”
- **Date și cod:** „*Scrie cod Python care calculează pierderea FZ0 pentru prognozele zilnice VaR 1% și ES 1% pe S&P 500 din datele zilnice de piață ale cursului, cu convenția de semn  $VaR = -q_\alpha$ , și un test Diebold–Mariano cu erori HAC.*”
  - ▶ Replicăm întâi: rata de depășire FHS de 1,54% pe 5 210 zile (secțiunea „VaR și ES condiționate”)

## Anexă: Bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (2/2)

- **Robustețe:** „*Scrie un plan pre-înregistrat: subperioadele 2006–2015 și 2016–2026, nivelurile 1% și 2,5%, FZ0 și un al doilea scor consistent, decalaje HAC 5 și 20, un al doilea indice.*”
  - ▶ Verificarea mărimii testului: simulăm dintr-un GARCH-t estimat și evaluăm două prognoze cu același FZ0 așteptat; testul trebuie să respingă în circa 5% din simulări
- **Critica:** „*Joacă rolul unui referent: este ordonarea mea determinată de 2008 și 2020, de convenția de semn a scorului sau de ferestrele de estimare suprapuse? Indică un test care ar identifica fiecare dintre aceste probleme.*”
- **Raportul:** fiecare pereche de modele, nivel și perioadă; numărul de zile din coadă pe care se bazează fiecare comparație
- **Testare multiplă:** modele  $\times$  niveluri  $\times$  perioade  $\times$  active: fixăm familia dinainte și ajustăm valorile  $p$ ; un DOI care nu duce la nicio lucrare sau un scor atribuit greșit: renunțăm la afirmație și o notăm în `AI_ERRORS.md`
- Fixăm planul înainte de prima rulare: orice specificație aleasă după ce am văzut rezultatele este exploratorie și se raportează ca atare

## Anexă: Studiu suplimentar pe Quantinar

### Cursuri avansate pe quantinar.com

- ▣  Measuring Statistical Risk
- ▣  XFG Advanced Methods in Quantitative Finance

### Cod și date

- ▣ Quantlets: [github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch\\_07](https://github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_07)

## Bibliografie (1/6)

- ▣ Acerbi, C., Tasche, D. (2002). *On the coherence of expected shortfall*. *Journal of Banking & Finance*, 26(7), 1487–1503.
- ▣ Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., Heath, D. (1999). *Coherent measures of risk*. *Mathematical Finance*, 9(3), 203–228.
- ▣ Balkema, A.A., de Haan, L. (1974). *Residual life time at great age*. *Annals of Probability*, 2(5), 792–804.
- ▣ Bangia, A., Diebold, F.X., Schuermann, T., Stroughair, J.D. (2001). *Modeling liquidity risk, with implications for traditional market risk measurement and management*. In *Risk Management: The State of the Art*, Springer, 3–13.
- ▣ Barone-Adesi, G., Giannopoulos, K., Vosper, L. (1999). *VaR without correlations for portfolios of derivative securities*. *Journal of Futures Markets*, 19(5), 583–602.
- ▣ Basel Committee on Banking Supervision (1996). *Amendment to the capital accord to incorporate market risks*. Bank for International Settlements.
- ▣ Basel Committee on Banking Supervision (2019). *Minimum capital requirements for market risk*. Bank for International Settlements.
- ▣ Bayer, S., Dimitriadis, T. (2022). *Regression-based expected shortfall backtesting*. *Journal of Financial Econometrics*, 20(3), 437–471.
- ▣ Bollerslev, T. (1986). *Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity*. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
- ▣ Chen, S.X. (2008). *Nonparametric estimation of expected shortfall*. *Journal of Financial Econometrics*, 6(1), 87–107.

## Bibliografie (2/6)

- ▣ Christoffersen, P., Gonçalves, S. (2005). Estimation risk in financial risk management. *Journal of Risk*, 7(3), 1–28.
- ▣ Chronopoulos, I., Raftapostolos, A., Kapetanios, G. (2024). Forecasting Value-at-Risk using deep neural network quantile regression. *Journal of Financial Econometrics*, 22(3), 636–669.
- ▣ Čížek, P., Härdle, W.K., Weron, R. (Eds.) (2011). *Statistical Tools for Finance and Insurance*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Cont, R., Deguest, R., Scandolo, G. (2010). Robustness and sensitivity analysis of risk measurement procedures. *Quantitative Finance*, 10(6), 593–606.
- ▣ Cornish, E.A., Fisher, R.A. (1938). Moments and cumulants in the specification of distributions. *Revue de l'Institut International de Statistique*, 5(4), 307–320.
- ▣ Daníelsson, J. (2011). *Financial Risk Forecasting*. Wiley.
- ▣ Daníelsson, J., Jorgensen, B.N., Samorodnitsky, G., Sarma, M., de Vries, C.G. (2013). Fat tails, VaR and subadditivity. *Journal of Econometrics*, 172(2), 283–291.
- ▣ Daníelsson, J., Zigrand, J.-P. (2006). On time-scaling of risk and the square-root-of-time rule. *Journal of Banking & Finance*, 30(10), 2701–2713.
- ▣ Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- ▣ Dimitriadis, T., Bayer, S. (2019). A joint quantile and expected shortfall regression framework. *Electronic Journal of Statistics*, 13(1), 1823–1871.

## Bibliografie (3/6)

- ▣ Embrechts, P., Klüppelberg, C., Mikosch, T. (1997). *Modelling Extremal Events for Insurance and Finance*. Springer.
- ▣ Embrechts, P., Puccetti, G., Rüschendorf, L. (2013). *Model uncertainty and VaR aggregation*. *Journal of Banking & Finance*, 37(8), 2750–2764.
- ▣ Engle, R.F., Manganelli, S. (2004). *CAViaR: conditional autoregressive value at risk by regression quantiles*. *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(4), 367–381.
- ▣ Ferro, C.A.T., Segers, J. (2003). *Inference for clusters of extreme values*. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 65(2), 545–556.
- ▣ Fisher, R.A., Tippett, L.H.C. (1928). *Limiting forms of the frequency distribution of the largest or smallest member of a sample*. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 24(2), 180–190.
- ▣ Fissler, T., Ziegel, J.F. (2016). *Higher order elicibility and Osband's principle*. *Annals of Statistics*, 44(4), 1680–1707.
- ▣ Francq, C., Zakoïan, J.-M. (2015). *Risk-parameter estimation in volatility models*. *Journal of Econometrics*, 184(1), 158–173.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Giacomini, R., Komunjer, I. (2005). *Evaluation and combination of conditional quantile forecasts*. *Journal of Business & Economic Statistics*, 23(4), 416–431.
- ▣ Gnedenko, B. (1943). *Sur la distribution limite du terme maximum d'une série aléatoire*. *Annals of Mathematics*, 44(3), 423–453.

## Bibliografie (4/6)

- ▣ Gneiting, T. (2011). [Making and evaluating point forecasts](#). *Journal of the American Statistical Association*, 106(494), 746–762.
- ▣ Gumbel, E.J. (1958). [Statistics of Extremes](#). Columbia University Press.
- ▣ Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (Eds.) (2017). [Applied Quantitative Finance](#), 3rd ed. Springer.
- ▣ Harvey, D., Leybourne, S., Newbold, P. (1997). [Testing the equality of prediction mean squared errors](#). *International Journal of Forecasting*, 13(2), 281–291.
- ▣ Hill, B.M. (1975). [A simple general approach to inference about the tail of a distribution](#). *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- ▣ Hull, J., White, A. (1998). [Incorporating volatility updating into the historical simulation method for value-at-risk](#). *Journal of Risk*, 1(1), 5–19.
- ▣ J.P. Morgan/Reuters (1996). [RiskMetrics – Technical Document](#), 4th ed. New York.
- ▣ Koenker, R., Bassett, G. (1978). [Regression quantiles](#). *Econometrica*, 46(1), 33–50.
- ▣ Longin, F.M. (2000). [From value at risk to stress testing: the extreme value approach](#). *Journal of Banking & Finance*, 24(7), 1097–1130.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R. (2000). [Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach](#). *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.

## Bibliografie (5/6)

- ▣ McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts, P. (2015). *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*, revised ed. Princeton University Press.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). *A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix*. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1994). *Automatic lag selection in covariance matrix estimation*. *Review of Economic Studies*, 61(4), 631–653.
- ▣ Nolde, N., Ziegel, J.F. (2017). *Elicitability and backtesting: perspectives for banking regulation*. *Annals of Applied Statistics*, 11(4), 1833–1874.
- ▣ Patton, A.J., Ziegel, J.F., Chen, R. (2019). *Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and Value-at-Risk)*. *Journal of Econometrics*, 211(2), 388–413.
- ▣ Pele, D.T., Lazar, E., Dufour, A. (2017). *Information entropy and measures of market risk*. *Entropy*, 19(5), 226.
- ▣ Pele, D.T., Lazar, E., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). *Modeling expected shortfall using tail entropy*. *Entropy*, 21(12), 1204.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). *Using high-frequency entropy to forecast Bitcoin's daily value at risk*. *Entropy*, 21(2), 102.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2026). *Finite-sample precision limits for expected shortfall forecast comparisons*. *Mathematics*, 14(13), 2316.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). *Are cryptos becoming alternative assets?*. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.

## Bibliografie (6/6)

- ▣ Pickands, J. (1975). [Statistical inference using extreme order statistics](#). *Annals of Statistics*, 3(1), 119–131.
- ▣ Rockafellar, R.T., Uryasev, S. (2000). [Optimization of conditional value-at-risk](#). *Journal of Risk*, 2(3), 21–41.
- ▣ Rockafellar, R.T., Uryasev, S. (2002). [Conditional value-at-risk for general loss distributions](#). *Journal of Banking & Finance*, 26(7), 1443–1471.
- ▣ Spierdijk, L. (2016). [Confidence intervals for ARMA–GARCH value-at-risk: the case of heavy tails and skewness](#). *Computational Statistics & Data Analysis*, 100, 545–559.
- ▣ Tasche, D. (2008). [Capital allocation to business units and sub-portfolios: the Euler principle](#). arXiv:0708.2542.
- ▣ Taylor, J.W. (2019). [Forecasting value at risk and expected shortfall using a semiparametric approach based on the asymmetric Laplace distribution](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 37(1), 121–133.
- ▣ Yamai, Y., Yoshida, T. (2005). [Value-at-risk versus expected shortfall: a practical perspective](#). *Journal of Banking & Finance*, 29(4), 997–1015.