



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 17: Bule și crahuri — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ **ADF**: Augmented Dickey–Fuller (test) — *testul Dickey–Fuller augmentat*
- ▣ **AI**: Artificial Intelligence — *inteligență artificială*
- ▣ **AIC**: Akaike Information Criterion — *criteriul informațional Akaike*
- ▣ **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return — *model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal*
- ▣ **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — *indicele de referință al Bursei de Valori București*
- ▣ **BET-FI**: BET Financial Investment companies index — *indicele BVB al societăților de investiții financiare*
- ▣ **BIC**: Bayesian Information Criterion — *criteriul informațional bayesian*
- ▣ **BSADF**: Backward Sup Augmented Dickey–Fuller (statistic) — *statistica Dickey–Fuller augmentată supremă, calculată înapoi de la fiecare dată*
- ▣ **CI**: Confidence Interval — *interval de încredere*
- ▣ **EDGAR**: Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval (SEC filings database) — *baza de date a raportărilor depuse la SEC*
- ▣ **EM**: Expectation-Maximisation (algorithm) — *algoritmul expectation-maximization: pasul E (speranța condiționată) și pasul M (maximizarea)*
- ▣ **FCLT**: Functional Central Limit Theorem — *teorema limită centrală funcțională*
- ▣ **FRED**: Federal Reserve Economic Data — *baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis)*

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity — *heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată*
- ▣ **GSADF**: Generalised Sup Augmented Dickey–Fuller (test) — *testul Dickey–Fuller augmentat suprem generalizat*
- ▣ **JLS**: Johansen–Ledoit–Sornette (model) — *modelul Johansen–Ledoit–Sornette*
- ▣ **LPPLS**: Log-Periodic Power Law Singularity (model) — *modelul singularității de tip lege de putere log-periodică*
- ▣ **LR**: Likelihood Ratio (test) — *testul raportului de verosimilitate*
- ▣ **MC**: Monte Carlo (simulation) — *simulare Monte Carlo*
- ▣ **NVIDIA**: NVIDIA Corporation (company name, US chip designer) — *NVIDIA Corporation (nume de companie, proiectant american de cipuri)*
- ▣ **OLS**: Ordinary Least Squares — *metoda celor mai mici pătrate*
- ▣ **PSY**: Phillips–Shi–Yu (bubble test and date-stamping procedure) — *procedura Phillips–Shi–Yu de testare și datare a bulelor*
- ▣ **PWY**: Phillips–Wu–Yu (bubble test and date-stamping procedure) — *procedura Phillips–Wu–Yu de testare și datare a bulelor*
- ▣ **SADF**: Sup Augmented Dickey–Fuller (test) — *testul Dickey–Fuller augmentat suprem*
- ▣ **SE**: Standard Error — *eroare standard*
- ▣ **SEC**: Securities and Exchange Commission — *Comisia americană pentru valori mobiliare*
- ▣ **SUA**: Statele Unite ale Americii

Întrebările de azi și rezultatele cerute

- ▣ Întrebările seminarului
 - ▶ a crescut un preț mai repede decât permite un mers aleator?
 - ▶ de când?
 - ▶ cât de siguri putem fi?
- ▣ Traseul seminarului
 - ▶ Întîi slide-urile „Noțiuni necesare azi” (17 slide-uri, cu toate formulele cerințelor de azi; cursul are loc după seminar); apoi A1, A5 pe hîrtie: bula rațională, un pas al filtrului de regim
 - ▶ B1, B3: episoade explozive în raportul preț/dividend și în Bitcoin, cu valori critice simulate și bootstrap
 - ▶ B5: cât se mută un moment critic LPPLS odată cu fereastra; B7: două regimuri pentru S&P 500
 - ▶ C2: găsiți erorile dintr-un răspuns A1; B4 acasă; A3 (teoria asimptotică a testului) după curs
- ▣ Livrabile: răspunsurile de la A1 și A5, o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B, codul corectat de la C2, o propoziție de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Materiale: slide-urile de pregătire de mai jos; [Capitolul 17](#) urmează după seminar; manualul [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro; drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiu	Întrebarea	Tip	Model
A1	poate un preț depăși valoarea dividendelor și cum crește diferența?	Rezolvat	–
A5	cît modifică o săptămînă cu pierderi mari probabilitatea regimului?	Rezolvat	–
B1	este exploziv raportul preț/dividend S&P 500 și cînd?	Rezolvat	–
B3	schimbă volatilitatea variabilă episoadele Bitcoin?	Rezolvat	B1
B5	cît se mută momentul critic LPPLS odată cu fereastra?	Rezolvat	–
B7	cînd a fost S&P 500 în regimul turbulent?	Rezolvat	A5
C2	ce este greșit într-un răspuns AI despre SADP și LPPLS?	Propus	B1, B5
B4	este Bursa de Valori București explozivă azi?	Propus	B1, B3
Pachete de extindere	A2–A4, A6–A8, B2, B6, B8–B10, C1, C3 (opționale, după curs)	Rezolvate și propuse (indicat la fiecare cerință)	indicat la fiecare cerință



- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați dumneavoastră, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: estimare și inferență pe date reale, fiecare cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Sursa, prețul folosit	Frecvența, perioada	Folosită în
S&P Composite, preț și dividend reale	Robert J. Shiller, shillerdata.com	lunar, ian. 1871–iun. 2026	B1, C2
S&P 500	datele cursului: închiderea zilnică	săptămînal și lunar, 1990–2026	B7, B2
Nasdaq 100	datele cursului: închiderea zilnică	lunar, zilnic, 1990–2026	B2, B6, C1
Bitcoin	datele cursului: închiderea zilnică în USD	săptămînal, zilnic, 2014–2026	B3, B5, B8
BET, BET-FI	datele cursului: închiderea zilnică	lunar, săptămînal, 1997–2026	B4
NVIDIA, Cisco	datele cursului: închiderea zilnică	lunar	C1
Prețurile locuințelor și vânzările de case noi din SUA	ajustată pentru dividende și divizări FRED CSUSHPINSA, HSN1FNISA	lunar, 1990–2011	C3

- Prețurile zilnice din datele cursului, cîte o serie pe activ (cîmpul folosit: close / adjusted close), pînă la 18 septembrie 2026
- Seriile săptămînale și lunare: ultima închidere a săptămînii sau a lunii; testele folosesc logaritmul nivelurilor $y_t = \ln P_t$ (sau $\ln(P_t/D_t)$)

Pregătire: rulați și verificați (1/2)



— S&P Composite real price-dividend ratio, monthly — S&P 500, week-end close — Bitcoin (USD), week-end close
— Nasdaq 100, month-end close

Pregătire: rulați și verificați (2/2)

```
# secțiunea „Date” a notebook-ului definește  
# price(name, freq, start) și shiller()  
pd_ratio = shiller()['PD']          # lunar  
ndx = price('ndx', 'M')             # sfârșit de lună  
spx = price('sp500', 'W', '1990-01-01')  
btc = price('btc', 'W')             # sfârșit de săptămână  
for x in (pd_ratio, ndx, spx, btc):  
    print(len(x), x.index[0].date(),  
          x.index[-1].date())
```

- ▣ Rezultat așteptat: 1866 (P/D, ian. 1871–iun. 2026), 441 (Nasdaq 100), 1 916 (S&P 500), 627 (Bitcoin)
- ▣ Dacă un număr diferă, opriți-vă și verificați numele, frecvența și data de început

Noțiuni necesare azi (1/17): valoarea fundamentală și bula

- **Capitolul 17** este cursul de după acest seminar: aceste slide-uri dau toate formulele folosite în cerințele de azi; demonstrațiile și datele, la curs
- **Ecuția de preț**: cu un randament cerut constant r , prețul de azi este valoarea actualizată a câștigului așteptat de mâine

$$P_t = \frac{\mathbb{E}_t[P_{t+1} + D_{t+1}]}{1 + r}$$

► P_t : prețul la sfârșitul perioadei t ; D_{t+1} : dividendul plătit în perioada $t + 1$; $\mathbb{E}_t$: speranța condiționată de informația de la t

- **Valoarea fundamentală**: valoarea prezentă a dividendelor așteptate; valoarea Gordon dacă dividendele cresc cu rata $g < r$

$$F_t = \sum_{i \geq 1} \frac{\mathbb{E}_t D_{t+i}}{(1+r)^i}, \quad F = \frac{D_1}{r-g}$$

- **Bula Blanchard & Watson (1982)**: partea prețului neexplicată de dividende


$$B_t = P_t - F_t, \quad \mathbb{E}_t B_{t+1} = (1+r) B_t$$

► Ecuția de preț permite $B_t \neq 0$ doar dacă bula crește, în medie, cu rata r (deducție în A1)


Noțiuni necesare azi (2/17): bula rațională în cifre

- Datele: $D_1 = 2$, $r = 6\%$, $g = 2\%$
 - ▶ Valoarea Gordon: $F = 2 / (0,06 - 0,02) = 50$
 - ▶ La prețul $P = 65$ bula este $B = 65 - 50 = 15$
- După 10 ani
 - ▶ Bula: $\mathbb{E}B_{10} = 15 \cdot 1,06^{10} = 26,9$, cu creștere de $r = 6\%$
 - ▶ Valoarea fundamentală: $F_{10} = 50 \cdot 1,02^{10} = 60,9$, cu creștere de $g = 2\%$
- Interpretarea
 - ▶ Bula crește mai repede decât fundamentele, deci ponderea ei în preț crește
 - ▶ Această pondere în creștere este ceea ce caută testele de rădăcină explozivă

Noțiuni necesare azi (3/17): o bulă care se sparge




— fundamental value $F_t = F_0(1+g)^t$
 — price $P_t = F_t + B_t$, three simulated paths



.... expected share $EB_t/(F_t + EB_t)$

- Bula Blanchard–Watson [Blanchard & Watson \(1982\)](#): supraviețuiește cu probabilitatea π și atunci crește mai repede, pentru a compensa riscul de prăbușire
 - ▶ $B_{t+1} = \frac{1+r}{\pi} B_t + \varepsilon_{t+1}$ cu probabilitatea π , altfel repornește aproape de 0; în medie $\mathbb{E}_t B_{t+1} = (1+r)B_t$; aici $\pi = 0,9$, $B_0 = 15$, $F_0 = 50$
 - ▶ Fiecare traiectorie crește exploziv, apoi revine la fundamente: un test pe întregul eșantion vede un amestec, ferestrele mobile văd episoadele

Noțiuni necesare azi (4/17): rădăcini staționare, unitare și explozive



- **AR(1)** pentru logaritmul prețului sau al raportului preț/dividend y_t

$$y_t = \rho y_{t-1} + e_t$$

- ▶ e_t : șoc cu media 0; ρ : rădăcina
- Trei cazuri (aceleași șocuri în grafic)
 - ▶ $|\rho| < 1$: staționar, șocurile se sting
 - ▶ $\rho = 1$: rădăcină unitară (mers aleator), șocurile persistă
 - ▶ $\rho > 1$: exploziv, fiecare creștere o alimentează pe următoarea: semnătura unei bule
- O bulă durează o perioadă: testăm $\rho > 1$ pe ferestre, nu pe întregul eșantion


Noțiuni necesare azi (5/17): regresia ADF și coada dreaptă

- ▣ **Regresia ADF** pe o fereastră, cu termen liber, fără laguri

$$\Delta y_t = a + b y_{t-1} + e_t, \quad t_b = \frac{\hat{b}}{SE(\hat{b})}$$

- ▶ $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$; $b = \rho - 1$; a : termenul liber; $SE(\hat{b})$: eroarea standard a estimației OLS $\hat{b}$
- ▣ **Două direcții** ale aceluiași test
 - ▶ Testul obișnuit (stînga): $H_0: b = 0$ față de $H_1: b < 0$ (staționaritate)
 - ▶ Testul de bulă (dreapta): $H_0: b = 0$ față de $H_1: b > 0$ (explozivitate); respingem pentru t_b **mare**
- ▣ **Distribuția de referință**: sub H_0 , t_b nu are distribuția $N(0, 1)$
 - ▶ Distribuția Dickey–Fuller, deplasată spre stînga: valorile critice provin din mersuri aleatoare simulate (slide-ul următor)

Noțiuni necesare azi (6/17): unde respinge testul pe coada dreaptă




- t_b under a random walk (5000 paths, $T = 200$)
- $N(0, 1)$: not the right reference
- - - 5% quantile -2.88: left-tailed test
- - - 95% quantile -0.07: right-tailed test
- . . . 1.645: almost never exceeded


- 5 000 de mersuri aleatoare simulate, $T = 200$; ADF cu termen liber pe fiecare
- Aproape toată distribuția se află la stînga lui 0
 - ▶ Termenul liber estimat absoarbe o parte din mers și împinge $\hat{b}$ în jos
 - ▶ Valoarea de 5% pe coada stîngă: aproximativ $-2,9$; valoarea de 95% pe coada dreaptă: aproximativ $-0,1$
- Cu 1,645 un test pe coada dreaptă aproape nu respinge niciodată, chiar dacă există o bulă

Noțiuni necesare azi (7/17): SADF, GSADF și BSADF

SADF: start at 0,
end r_2 grows



BSADF $_{r_2}$: end at r_2 ,
start r_1 moves



- ADF'_{r_1} : t_b pe fereastra de la fracția r_1 la fracția r_2 a eșantionului [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)
- Statistici supremum pe ferestre de cel puțin r_0

$$SADF = \sup_{r_2 \geq r_0} ADF'_0{}^2, \quad GSADF = \sup_{r_2 \geq r_0} BSADF_{r_2}$$

$$BSADF_{r_2} = \sup_{0 \leq r_1 \leq r_2 - r_0} ADF'_{r_1}{}^2$$
- SADF: început fix (stînga); BSADF: sfîrșit fix la r_2 , începutul se mută (dreapta); GSADF: se mută ambele
- BSADF folosește doar date pînă la r_2 : poate data un episod în timp real

Noțiuni necesare azi (8/17): regulile ferestrelor și episoadele

- **Fereastra minimă** Phillips, Shi & Yu (2015a), ca fracție din cele T variații și în observații

$$r_0 = 0,01 + \frac{1,8}{\sqrt{T}}, \quad w_0 = \lfloor r_0 T \rfloor$$


- ▶ $\lfloor \cdot \rfloor$: rotunjire în jos; $T = 600$ de luni: $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{600} = 0,083$, $w_0 = 50$ de luni

- **Episod**: BSADF_t peste valoarea critică punctuală de 95% cel puțin L perioade consecutive


$$L = \lceil \ln T \rceil$$

- ▶ $\lceil \cdot \rceil$: rotunjire în sus; $T = 600$: $\ln 600 = 6,40$, deci $L = 7$ luni; secvențele mai scurte nu sînt episoade
- ▶ Începutul este datat retrospectiv, episodul este **confirmat** cu $L - 1$ perioade mai tîrziu; **creștere** sau **scădere**: semnul variației prețului pe episod

Noțiuni necesare azi (9/17): datarea unei bule simulate




— log price y_t — BSADF $_t$
 ■ explosive phase - - - 95% critical value



■ episode ($\geq L$ periods above)

- Stînga: un mers aleator cu o fază explozivă ($\rho = 1,04$), urmată de prăbușire; dreapta: BSADF $_t$ și valoarea critică de 95% din 300 de mersuri simulate
- Episodul este datat de la prima perioadă a unei secvențe de cel puțin $L = 6$ depășiri; după prăbușire, BSADF scade imediat

Noțiuni necesare azi (10/17): valori critice: Monte Carlo și wild bootstrap



□ **Monte Carlo:** simulăm mersuri aleatoare cu același T

- ▶ $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$; recalculăm BSADF și GSADF; cuantilele de 95%
- ▶ Presupunem volatilitate constantă

□ **Wild bootstrap** [Harvey et al. \(2016\)](#): păstrăm fiecare variație observată și îi schimbăm aleator semnul

$$y_t^* = y_{t-1}^* + w_t (\Delta y_t - \overline{\Delta y}), \quad w_t = \pm 1$$

- ▶ w_t : independente, fiecare semn cu probabilitatea $\frac{1}{2}$;
- ▶ $\overline{\Delta y}$: variația medie
- ▶ Variațiile mari rămân unde au apărut (graficul): valorile critice urmează volatilitatea

Noțiuni necesare azi (11/17): regimuri: modelul Markov-switching

- **Două regimuri Hamilton (1989):** media și volatilitatea depind de o stare neobservată s_t

$$r_t = \mu_{s_t} + \sigma_{s_t} \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, 1), \quad s_t \in \{1, 2\}$$

- ▶ $s_t = 1$: calm, $s_t = 2$: turbulent; μ_i, σ_i : media și volatilitatea regimului i

- **Lanțul Markov:** probabilitățile de tranziție, duratele așteptate și probabilitățile staționare

$$p_{ij} = P(s_t = j \mid s_{t-1} = i), \quad \mathbb{E}[\text{durata}_i] = \frac{1}{1 - p_{ii}}, \quad \pi_2 = \frac{p_{12}}{p_{12} + p_{21}}$$

- ▶ $p_{11} = 0,98$: în medie 50 de perioade; π_2 : ponderea de termen lung a timpului petrecut în regimul 2, $\pi_1 = 1 - \pi_2$

- **Momentele necondiționate (legea varianței totale)**

$$\mathbb{E}r = \sum_i \pi_i \mu_i, \quad \text{Var}(r) = \sum_i \pi_i \sigma_i^2 + \sum_i \pi_i (\mu_i - \mathbb{E}r)^2$$

- ▶ Media varianțelor din regimuri plus varianța mediilor regimurilor


Noțiuni necesare azi (12/17): filtrul Hamilton

- **Filtrul Hamilton** = regula lui Bayes în fiecare perioadă; $P_{t-1}(i)$: probabilitatea filtrată a regimului i , dată fiind informația pînă la $t - 1$
- **Predicția**, apoi **actualizarea** cu densitatea Normală $\varphi(r_t; \mu_j, \sigma_j^2)$

$$\hat{P}_t(j) = \sum_i P_{t-1}(i) p_{ij}, \quad P_t(j) = \frac{\hat{P}_t(j) \varphi(r_t; \mu_j, \sigma_j^2)}{\sum_k \hat{P}_t(k) \varphi(r_t; \mu_k, \sigma_k^2)}$$


- ▶ Numitorul este densitatea lui r_t condiționată de trecut; suma logaritmulor lui este log-verosimilitatea $\hat{\ell}$, maximizată după parametri
- Probabilitatea **filtrată** și cea **netezită**
 - ▶ Filtrată: datele pînă la t (utilizabilă în timp real); netezită: întregul eșantion (retrospectiv)
- **Teste (B7)**
 - ▶ $t = \hat{\mu}_2 / \text{SE}(\hat{\mu}_2)$, comparat cu 1,96; $\text{LR} = 2(\hat{\ell}_2 - \hat{\ell}_1)$, două regimuri față de unul
 - ▶ Cu un singur regim, p_{ij} nu sînt identificate: LR nu are distribuția χ^2 , folosim un bootstrap parametric

Noțiuni necesare azi (13/17): un pas al filtrului în cifre



- Date: $P_{t-1}(2) = 0,10$, $p_{11} = 0,98$, $p_{22} = 0,90$
 - Predicția: $0,10 \cdot 0,90 + 0,90 \cdot 0,02 = 0,108$
- Observația: $r_t = -4$, cu $\sigma_1 = 1$, $\sigma_2 = 3$ și medii zero
 - Densitățile: $\varphi(-4; 0, 1) = 0,00013$ și $\varphi(-4; 0, 9) = 0,0547$
 - Actualizarea: $0,108 \cdot 0,0547 / (0,108 \cdot 0,0547 + 0,892 \cdot 0,00013) = 0,98$
- Graficul (scară logaritmică): la $r = -4$ curba turbulentă este mult deasupra celei calme, deci o singură pierdere mare mută probabilitatea de la 0,11 la 0,98

Noțiuni necesare azi (14/17): regimurile într-o simulare



- Randamente săptămânale simulate: calm $\mu_1 = 0,3$, $\sigma_1 = 1,5$; turbulent $\mu_2 = -0,5$, $\sigma_2 = 4$; $p_{11} = 0,98$, $p_{22} = 0,92$
- Probabilitatea filtrată (dreapta, cu parametrii adevărați) crește în câteva săptămîni după începutul fiecărei perioade turbulente; săptămînilor mari izolate dau alarme false scurte


Noțiuni necesare azi (15/17): LPPLS: crahul ca moment critic

- Ideea din [Johansen, Ledoit & Sornette \(2000\)](#): comportamentul de turmă face prețul să accelereze mai repede decât exponențial, cu oscilații tot mai rapide

$$\ln p_t = A + B(t_c - t)^m + (t_c - t)^m [C_1 \cos(\omega \ln(t_c - t)) + C_2 \sin(\omega \ln(t_c - t))]$$

- ▶ t_c : **momentul critic**, sfârșitul cel mai probabil al regimului de bulă, nu data unui crah; A : logaritmul prețului la t_c
- ▶ $B < 0$, $0 < m < 1$: panta $-mB(t_c - t)^{m-1}$ crește nelimitat când $t \rightarrow t_c$
- ▶ ω : frecvența unghiulară a oscilațiilor log-periodice; C_1 , C_2 : amplitudinile lor, $C = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}$
- **Ajustarea Filimonov & Sornette (2013)**
 - ▶ Pentru (t_c, m, ω) fixați, modelul este liniar în (A, B, C_1, C_2) , estimați prin OLS; o căutare numerică acoperă cei trei parametri neliniari

Noțiuni necesare azi (16/17): traiectoria LPPLS și ajustările calificate



- Graficul: legea de putere singură (linia întreruptă) accelerează spre t_c ; oscilațiile din jurul ei devin tot mai rapide în timp calendaristic
- Ajustare **calificată**: parametrii în limitele filtrului din [Shu & Zhu \(2020\)](#)
 - ▶ De ex. $B < 0, m \in [0,01; 0,99], \omega \in [2; 25]$, oscilațiile $O = \frac{\omega}{\pi} \ln \frac{t_c - t_1}{t_c - t_2} \geq 2,5$, amortizarea $D = \frac{m|B|}{\omega|C|} \geq 1$
 - ▶ $[t_1, t_2]$: fereastra de estimare
- Ajustare **la margine**: m sau ω la limita spațiului de căutare
 - ▶ Nu este un optim interior: datele nu determină parametrul
 - ▶ $\hat{t}_c$ se mută când se schimbă începutul ferestrei (B5)

Noțiuni necesare azi (17/17): pentru pachetele de extindere

- **Rădăcină ușor explozivă Phillips & Magdalinos (2007) (A4):** $\rho_T = 1 + c/k_T$, $c > 0$, $k_T \rightarrow \infty$, $k_T/T \rightarrow 0$
 - ▶ Rădăcina tinde la 1 mai lent decât $1/T$: testul este consistent, statistica t crește cu T
- **Algoritmul EM Hamilton (1990) (A6):** date probabilitățile netezite ξ_{tj} , pasul M actualizează
 - ▶ $\hat{\mu}_j = \sum_t \xi_{tj} r_t / \sum_t \xi_{tj}$, $\hat{\sigma}_j^2 = \sum_t \xi_{tj} (r_t - \hat{\mu}_j)^2 / \sum_t \xi_{tj}$: medii ponderate
- **Numărul de regimuri (B8)**
 - ▶ $AIC = -2\hat{\ell} + 2q$, $BIC = -2\hat{\ell} + q \ln T$ (q : numărul de parametri; mai mic este mai bine); p bootstrap
 $= (1 + \#\{LR^* \geq LR\}) / (B + 1)$
- **Indicatorul de încredere LPPLS Shu & Zhu (2020) (B6):** proporția ajustărilor calificate dintre multe ferestre care se încheie la aceeași dată
 - ▶ Semnal: indicatorul > 0 ; modelul liniar de probabilitate $\text{fall}_t = a + b \text{signal}_t + u_t$ cu SE Newey–West
- Mai mult în **Capitolul 17**, după seminar: bulele istorice, dovezile privind predictibilitatea și studiul de caz

Notăția folosită în toate exercițiile

- y_t : logaritmul prețului sau al raportului preț/dividend
 - ▶ ADF pe coada dreaptă: $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + e_t$, cu termen liber, fără laguri; $t_b = \hat{b}/SE(\hat{b})$; $H_0 : b = 0$ față de $H_1 : b > 0$
- T : numărul de variații; fereastra minimă $w_0 = \lfloor r_0 T \rfloor$, $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$
 - ▶ $ADF'_{r_1}^2$: statistica pe fereastra de la fracția r_1 la r_2 ; $\lfloor \cdot \rfloor$: rotunjire în jos
 - ▶ $SADF = \sup_{r_2} ADF_0'^2$; $BSADF_{r_2} = \sup_{r_1} ADF_{r_1}'^2$; $GSADF = \sup_{r_2} BSADF_{r_2}$ Phillips, Shi & Yu (2015a)
- **Episod**: BSADF peste valoarea critică punctuală de 95% cel puțin $L = \lceil \ln T \rceil$ perioade
 - ▶ Începutul este datat retrospectiv, episodul este **confirmat** cu $L - 1$ perioade mai târziu
 - ▶ **Creștere** sau **scădere**: semnul variației prețului pe episod
- Markov-switching: regimul s_t , $p_{ij} = P(s_t = j \mid s_{t-1} = i)$
 - ▶ $\varphi(x; \mu, \sigma^2)$: densitatea distribuției Normale; **filtrată**: datele pînă la t ; **netezită**: întregul eșantion
- LPPLS: ecuația de pe slide-ul 15/17 din „Noțiuni necesare azi”
 - ▶ O ajustare **calificată** trece filtrul Shu și Zhu (ec. 12) Shu & Zhu (2020)

A1 [Rezolvat]: Valoarea prezentă și bula rațională — Cerință

▣ Întrebările

- ▶ poate un preț depăși valoarea prezentă a dividendelor într-o piață rațională?
- ▶ ce se întîmplă cu diferența în timp?

▣ Date de intrare: o acțiune cu prețul $P_t \geq 0$ și dividendele $D_t \geq 0$, a căror sumă așteptată actualizată este finită [Blanchard & Watson \(1982\)](#)

- ▶ Ipoteza modelului, un randament cerut constant $r > 0$: $P_t = \mathbb{E}_t[P_{t+1} + D_{t+1}]/(1 + r)$
- ▶ Cifrele pentru cerința 4: $D_1 = 2$, $g = 2\%$, $r = 6\%$, $P = 65$

▣ Cerințe

1. Substituiți ecuația de preț în ea însăși de h ori și scrieți P_t ca dividende așteptate actualizate pînă la $t + h$ plus un rest.
2. Luați $h \rightarrow \infty$, definiți F_t (valoarea fundamentală) și $B_t = P_t - F_t$ și demonstrați că $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1 + r)B_t$.
3. Demonstrați că $B_t \geq 0$ și că $B_t = 0$ implică $B_{t+k} = 0$ pentru orice $k \geq 1$ [Diba & Grossman \(1988\)](#).
4. În cazul Gordon calculați $F = D_1/(r - g)$, $B = P - F$ și ponderea bulei $\mathbb{E}[B_h]/(F_h + \mathbb{E}[B_h])$ pentru $h = 5, 30, 100$ de ani.

▣ Raportați: derivarea, F , B și cele trei ponderi

▣ Interpretare

- ▶ de ce trebuie o bulă rațională să existe de la prima tranzacție?
- ▶ de ce este o pondere crescătoare a bulei implicația testabilă?

▣ Notebook: secțiunea A1


A1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/3) — Pașii 1–3, derivarea

- Pasul 1: scriem $P_{t+1} = \mathbb{E}_{t+1}[P_{t+2} + D_{t+2}]/(1+r)$ și substituim; speranțele iterate dau $\mathbb{E}_t \mathbb{E}_{t+1} = \mathbb{E}_t$; după h pași

$$P_t = \sum_{i=1}^h \frac{\mathbb{E}_t D_{t+i}}{(1+r)^i} + \frac{\mathbb{E}_t P_{t+h}}{(1+r)^h}$$
- Pasul 2: cu $D \geq 0$ sumele parțiale cresc spre valoarea finită $F_t = \sum_{i \geq 1} \mathbb{E}_t D_{t+i}/(1+r)^i$; restul converge la

$$B_t := P_t - F_t = \lim_h \mathbb{E}_t P_{t+h}/(1+r)^h$$
 - ▶ $(1+r)F_t = \mathbb{E}_t D_{t+1} + \mathbb{E}_t F_{t+1}$ (speranțe iterate, convergență monotonă); o scădem din $(1+r)P_t = \mathbb{E}_t D_{t+1} + \mathbb{E}_t P_{t+1}$:
 $\mathbb{E}_t B_{t+1} = (1+r)B_t$
 - ▶ Transversalitatea, $\lim_h \mathbb{E}_t P_{t+h}/(1+r)^h = 0$, este exact $B_t = 0$
- Pasul 3: B_t este limita resturilor $\mathbb{E}_t P_{t+h}/(1+r)^h \geq 0$, deci $B_t \geq 0$; dacă $B_t = 0$, atunci $\mathbb{E}_t B_{t+1} = 0$ cu $B_{t+1} \geq 0$, deci $B_{t+1} = 0$ aproape sigur și, prin inducție, $B_{t+k} = 0$

A1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/3) — Pasul 4, cifre și grafic



A1 [Rezolvat]: Rezolvare (3/3) — Pasul 4, cifre și grafic

- Pasul 4: $F = 2/(0,06 - 0,02) = 50,0$; $B = 65 - 50,0 = 15,0$, adică 23,1% din preț
- $F_h = 50,0 \cdot 1,02^h$, $\mathbb{E}B_h = 15,0 \cdot 1,06^h$
- Ponderea bulei: 26,7% ($h = 5$), 48,8% ($h = 30$), 93,4% ($h = 100$)
- Interpretare: o bulă nu poate porni mai târziu de la zero; fiindcă $r > g$, valoarea ei **așteptată** ajunge să domine prețul, deci traiectoria așteptată a prețului este explozivă față de fundamente: aceasta este proprietatea căutată de testele pe coada dreaptă


A5 [Rezolvat]: Duratele regimurilor și un pas al filtrului — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** cît modifică o singură săptămîină cu pierderi mari probabilitatea regimului turbulent?
- ▣ **Date de intrare:** randamente săptămîinale în %, $r_t = \mu_{s_t} + \sigma_{s_t} \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$ **Hamilton (1989)**
 - ▶ Calm: $\mu_1 = 0,3$, $\sigma_1 = 2$; turbulent: $\mu_2 = -0,5$, $\sigma_2 = 5$; $p_{11} = 0,98$, $p_{22} = 0,90$
 - ▶ Săptămîina trecută $P(s = 2 \mid \text{date}) = 0,2$; săptămîina aceasta $r_t = -6\%$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați durata așteptată $1/(1 - p_{ii})$ a fiecărui regim.
 2. Calculați probabilitățile staționare $\pi_2 = p_{12}/(p_{12} + p_{21})$ și $\pi_1 = 1 - \pi_2$.
 3. Calculați media și abaterea standard necondiționate ale lui r_t cu legea varianței totale.
 4. Faceți un pas al filtrului Hamilton: probabilitatea prezisă, cele două densități în $r_t = -6$, probabilitatea actualizată.
- ▣ **Raportați:** duratele, π_1 , π_2 , media și abaterea standard și cele trei probabilități de la pasul 4
- ▣ **Interpretare:** de ce schimbă o singură săptămîină atît de mult probabilitatea regimului?
- ▣ Notebook: secțiunea A5

A5 [Rezolvat]: Rezolvare (1/3) — Pașii 1–3


- ▣ Pasul 1: $1/(1 - 0,98) = 50$ de săptămîni (calm), $1/(1 - 0,90) = 10$ săptămîni (turbulent)
- ▣ Pasul 2: $\pi_2 = 0,02/(0,02 + 0,10) = 0,167$, $\pi_1 = 0,833$
- ▣ Pasul 3: $\mathbb{E}r = 0,833 \cdot 0,3 + 0,167 \cdot (-0,5) = 0,167$; $\text{Var}(r) = \sum_i \pi_i \sigma_i^2 + \sum_i \pi_i (\mu_i - \mathbb{E}r)^2 = 7,59$, abaterea standard 2,75

A5 [Rezolvat]: Rezolvare (2/3) — Pasul 4, pasul filtrului



— Calm density, $N(0.3, 2.0^2)$
— Turbulent density, $N(-0.5, 5.0^2)$

— Observed return -6%



■ P(turbulent regime)

A5 [Rezolvat]: Rezolvare (3/3) — Pasul 4, pasul filtrului

- Pasul 4: predicția $0,2 \cdot 0,90 + 0,8 \cdot 0,02 = 0,196$
 - ▶ Densitățile $\varphi(-6; 0,3, 2^2) = 0,00140$, $\varphi(-6; -0,5, 5^2) = 0,04357$
 - ▶ Actualizarea
$$\frac{0,196 \cdot 0,04357}{0,196 \cdot 0,04357 + (1 - 0,196) \cdot 0,00140} = 0,884$$
- Interpretare: -6% se află la peste trei abateri standard ale regimului calm sub media lui, deci densitatea regimului calm este foarte mică: o astfel de săptămîină determină aproape complet regimul

B1 [Rezolvat]: Explozivitatea raportului preț/dividend S&P 500 — Cerință

▣ Întrebările

- ▶ este raportul preț/dividend S&P 500 exploziv?
- ▶ când?
- ▶ depinde răspunsul de fereastra minimă?

▣ **Date:** S&P Composite, preț real și dividend real, lunar 1871–2026; $y_t = \ln(P_t/D_t)$, $T = 1865$ de variații

▣ Cerințe

1. Calculați GSADF (termen liber, fără laguri) cu fereastra minimă $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$.
2. Simulați 1000 de mersuri aleatoare $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + \varepsilon_t$ și luați cuantila de 95% a GSADF și, dată cu dată, a BSADF Phillips, Shi & Yu (2015a).
3. Repetați pașii 1–2 cu $r_0 = 0,03$ și $r_0 = 0,08$.
4. Pentru fiecare r_0 , datați episoadele (cel puțin $L = \lceil \ln T \rceil$ luni peste valoarea critică) și marcați fiecare drept creștere sau scădere a raportului.

▣ **Raportați:** un tabel (r_0 , w_0 , GSADF, valoarea critică, episoade) și un grafic al BSADF față de valorile critice

▣ Interpretare

- ▶ ce episoade rezistă oricărei ferestre?
- ▶ este orice episod exploziv al raportului o bulă?

▣ Notebook: secțiunea B1


B1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Pași și tabel

- Pașii 1–2: logaritmul raportului; pentru fiecare dată finală, ADF pe toate ferestrele de cel puțin w_0 luni; supremul după începuturi este BSADF, după datele finale GSADF; același calcul pe măsurile simulate dă valorile critice
- Pașii 3–4, rezultatele (episoadele care sînt o **scădere** a raportului sînt marcate):

r_0	w_0	GSADF	val. critică 95%	Episoade (BSADF)
0,030	55	3,93	2,55	ian. 1879–apr. 1880; aug. 1917–mai 1918 (scădere); nov. 1928–sept. 1929; dec. 1954–ian. 1956; mai 1997–aug. 2001; sept. 2008–apr. 2009 (scădere)
0,052	96	3,41	2,39	aug. 1917–iun. 1918 (scădere); nov. 1928–sept. 1929; mai 1997–aug. 2001
0,080	149	1,77	2,24	mai 1997–aug. 2001

- Episodul dot-com (1997–2001) este datat cu orice fereastră; cu $r_0 = 0,08$ GSADF este sub valoarea critică, dar BSADF depășește totuși valoarea critică: testul global este mai strict decît datarea
- Fereastra cea mai scurtă adaugă ian. 1879–apr. 1880; dec. 1954–ian. 1956; sept. 2008–apr. 2009 (scădere): mai puține observații pe regresie, statistici ADF mai zgomotoase, mai multe depășiri
- 1917–1918 este o **scădere** a raportului (prețurile reale au scăzut mai repede decît dividendele reale): explozivă, dar nu o bulă
- Interpretare: doar episoadele care rezistă la orice r_0 și corespund unei creșteri susțin interpretarea de bulă

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Grafic




- Roșu: BSADF; verde: valoarea critică punctuală de 95%; hașurat: episoadele date, cu raport în creștere (nisipiu) sau în scădere (turcoaz)

B3 [Rezolvat]: Bitcoin: valori critice simulate și bootstrap — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** schimbă volatilitatea variabilă a Bitcoin verdictul testului și datele episoadelor?
- ▣ **Model** (exerciții rezolvate de urmat): B1
- ▣ **Date:** logaritmul închiderilor săptămânale Bitcoin, septembrie 2014 – septembrie 2026, $T = 626$ de variații săptămânale
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați GSADF cu regula ferestrei minime și valori critice Monte Carlo din 2 000 de mersuri aleatoare gaussiene.
 2. Wild bootstrap: înmulțiți variațiile săptămânale centrate cu semne aleatoare independente $w_t = \pm 1$, reconstruiți traiectoria și recalculați BSADF și GSADF, de 1 000 de ori; luați cuantilele de 95% [Harvey et al. \(2016\)](#).
 3. Datați episoadele cu ambele șiruri de valori critice, durata minimă $\lceil \ln T \rceil$ săptămîni.
 4. Reprezentați BSADF cu ambele șiruri și, deasupra, volatilitatea pe ferestre mobile de 26 de săptămîni.
- ▣ **Raportați:** GSADF, ambele valori critice de 95%, ambele liste de episoade și graficul
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ cînd sînt valorile critice bootstrap mai mari?
 - ▶ ce episod rezistă la alegerea lor?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B3

B3 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2)




B3 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2)

- Pașii 1–2: $GSADF = 3,85$; valoarea critică de 95%: Monte Carlo 2,27, wild bootstrap 2,82; $3,85 > 2,82$: mersul aleator este respins la 5% cu oricare dintre ele
- Pasul 3, episoade Monte Carlo: apr. 2017–iun. 2018; dec. 2020–mai 2021
 - ▶ Wild bootstrap: mai 2017–ian. 2018; dec. 2020–feb. 2021
- Pasul 4: valorile critice bootstrap cresc în perioadele volatile și după ele (maximum 1,80 față de 0,71), fiindcă variațiile reeșantionate păstrează șocurile mari acolo unde au apărut
- Interpretare: episodul din 2017 se menține cu ambele seturi de valori critice, dar este mai scurt cu bootstrap; episodul din 2021 se scurtează: explozivitatea lui este parțial un efect al volatilității

B5 [Rezolvat]: Dependența momentului critic de fereastră — Cerință

- **Întrebarea:** cât se mută momentul critic LPPLS t_c când se schimbă doar începutul ferestrei de estimare?
- **Date:** logaritmul închiderilor zilnice Bitcoin; 61 de ferestre, toate încheiate la $t_2 = 15$ noiembrie 2017, cu începuturi la fiecare 7 zile, între 1 iunie 2016 și 1 august 2017
 - ▶ **Ajustare la margine:** m sau ω la frontiera spațiului de căutare ($m \leq 0,002$ sau $\geq 0,998$; $\omega \leq 1,01$ sau $\geq 49,9$)
- **Cerințe**
 1. Ajustați LPPLS pe fiecare fereastră: (A, B, C_1, C_2) prin OLS, (t_c, m, ω) prin grilă și Nelder–Mead în spațiul de căutare Shu și Zhu (ec. 11) [Filimonov & Sornette \(2013\)](#), [Shu & Zhu \(2020\)](#).
 2. Raportați t_c minim, median și maxim și intervalul intercuartilic al lui t_c minus vârful real.
 3. Raportați ponderile ajustărilor calificate (ec. 12), ale celor la margine și ale celor la cel mult 30 de zile de vîrf.
 4. Reprezentați t_c în funcție de începutul ferestrei, împreună cu vârful real.
- **Raportați:** cele trei date, intervalul intercuartilic, cele trei ponderi și graficul
- **Interpretare:** ați avea încredere într-un singur t_c raportat fără fereastra lui?
- Notebook: secțiunea B5

B5 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2)



B5 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2)

- Pașii 1–2: t_c variază între 15 nov. 2017 și 17 apr. 2018, mediana 23 dec. 2017; vârful real 16 dec. 2017; intervalul intercuartilic al erorii 53 de zile, eroarea mediană 7 zile
- Pasul 3: ajustări calificate 0%; la margine 43%; la cel mult 30 de zile de vîrf 56%
- O ajustare la margine nu este un optim interior: datele nu identifică precis parametrul
- Interpretare: aceeași dată finală dă momente critice la luni distanță, în funcție doar de începutul ferestrei; un singur t_c nu este o prognoză

B7 [Rezolvat]: Markov-switching pe S&P 500 — Cerință

▣ Întrebările

- ▶ când a fost S&P 500 în regimul turbulent?
- ▶ este media regimului turbulent negativă?

▣ Model (exerciții rezolvate de urmat): A5

▣ Date: randamente log săptămânale S&P 500 în %, 1990–2026 (1 915 săptămâni)

▣ Cerințe

1. Estimați $r_t = \mu_{s_t} + \sigma_{s_t} \varepsilon_t$ cu două regimuri prin verosimilitate maximă (filtrul Hamilton, 20 de porniri aleatoare); raportați estimările, erorile standard și duratele așteptate [Hamilton \(1989\)](#).
2. Găsiți prima săptămână din 2000, din toamna lui 2008 și din 2020 cu probabilitatea filtrată a regimului turbulent peste 0,5.
3. Calculați ponderea săptămânilor în care regimul filtrat și cel netezit (probabilitate peste 0,5) coincid.
4. Testați $\mu_{\text{turb}} = 0$ cu un test t la 5% și calculați $LR = 2(\hat{\ell}_2 - \hat{\ell}_1)$ față de un singur regim cu randamente din distribuția Normală ($\hat{\ell}_1, \hat{\ell}_2$: log-verosimilitățile maxime cu unul și două regimuri).

▣ Raportați: tabelul estimărilor, cele trei date, ponderea săptămânilor în care regimurile coincid, t , LR și un grafic al probabilităților regimului

▣ Interpretare

- ▶ este media regimului turbulent semnificativ negativă?
- ▶ de ce LR nu poate fi comparat cu o valoare critică χ^2 ?


▣ Notebook: secțiunea B7

B7 [Rezolvat]: Rezolvare (1/3) — Pașii 1–3

Regim	$\hat{\mu}$	SE	$\hat{\sigma}$	$\hat{p}_{ii}$	Durata (săptămâni)
Calm	0,32	0,04	1,49	0,974	38,1
Turbulent	-0,27	0,17	3,67	0,931	14,4

- Pasul 1: tabelul; regimul calm acoperă 73% din săptămâni; volatilitatea săptămânală este 3,67% în regimul turbulent față de 1,49% în cel calm
- Pasul 2: prima săptămână peste 0,5: 28 ian. 2000 (2000), 3 oct. 2008 (toamna lui 2008), 28 feb. 2020 (2020)
- Pasul 3: regimurile filtrate și netezite coincid în 90% din săptămâni; probabilitățile filtrate folosesc parametrii estimați pe întregul eșantion, deci sînt doar în pseudo-timp real

B7 [Rezolvat]: Rezolvare (2/3) — Pasul 4 și graficul



B7 [Rezolvat]: Rezolvare (3/3) — Pasul 4 și graficul

- Pasul 4: $t = -0,27/0,17$, $|t| < 1,96$: nu respingem $\mu_{\text{turb}} = 0$ la 5%
- $LR = 2(-4\,070,0 - (-4\,326,0)) = 512,1$, dar sub un singur regim probabilitățile de tranziție nu sînt identificate, deci χ^2 nu se aplică; se aplică în schimb un bootstrap parametric (B8)
- Interpretare: regimul turbulent marchează perioadele de tensiune din 2000, 2008 și 2020, dar media lui nu este semnificativ negativă: regimurile descriu riscul, nu pierderi previzibile

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Cererea** trimisă unui asistent AI: „y este logaritmul lunar al raportului preț/dividend pentru S&P 500. Scrie cod Python pentru SADP cu fereastra minimă PSY, decide la 5% dacă există o bulă, datează-o și spune-mi când se va sparge.”
- **Răspunsul:** codul de mai jos și concluzia

```
import numpy as np
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
T = len(y)
w0 = int(np.floor((0.01 + 1.8 / np.sqrt(T)) * T))
adf = lambda x: adfuller(x, maxlag=0, regression='c', autolag=None)[0]
sadf = max(adf(y[:t]) for t in range(w0, T + 1))
cv = adfuller(y, maxlag=0, regression='c', autolag=None)[4]['5%']
print('bubble' if sadf > cv else 'no_bubble')
flag = [adf(y[t - w0:t + w0]) > cv for t in range(w0, T - w0)]
```

- **Concluzia AI:** „O ajustare LPPLS pe ultimele 36 de luni dă $\hat{t}_c = \text{martie } 2027$: atunci se sparge bula.”

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — cerință

- ▣ **Model** (exerciții rezolvate de urmat): B1 și B5; slide-ul de pregătire despre testele pe coada dreaptă
- ▣ Notebook: secțiunea C2
- ▣ **Date**: logaritmul raportului preț/dividend din B1 și mersuri aleatoare simulate de aceeași lungime
- ▣ **Cerințe**
 1. Găsiți cele trei erori din răspuns: rîndul și de ce este greșit.
 2. Pentru fiecare eroare, precizați cum ați detecta-o fără să cunoașteți răspunsul: un test pe date simulate, un eșantion trunchiat cu aceeași specificație și aceeași valoare de inițializare a generatorului aleator, o a doua fereastră.
 3. Scrieți codul corectat: valori critice simulate, BSADF pe ferestre care se încheie la t , episoade de cel puțin $\lceil \ln T \rceil$ luni.
 4. Notați fiecare eroare găsită în formatul [AI_ERRORS.md](#): cererea, răspunsul, eroarea, cum ați găsit-o, corecția.
- ▣ **Interpretare**: după corecturi, ce poate spune codul despre martie 2027?
- ▣ Codul scris de AI rulează de obicei fără mesaje de eroare: greșelile țin de statistică, nu de sintaxă

B4 [Propus]: Bursa de Valori București — Cerință

▣ Întrebările

- ▶ a fost avîntul din 2003–2007 exploziv în timp real?
- ▶ este explozivă creșterea actuală a indicilor BET și BET-FI?

▣ Model (exerciții rezolvate de urmat): B1 și B3

▣ Date: indicele BET oficial, logaritmul închiderilor lunare 1997–2026; BET-FI (societăți de investiții financiare), logaritmul închiderilor săptămînale 2012–2026

▣ Cerințe

1. Pentru fiecare indice calculați GSADF cu valori critice de 95% Monte Carlo (2 000 de traiectorii) și wild bootstrap (1 000 de replici).
2. Datați episoadele cu ambele șiruri de valori critice (durata minimă $\lceil \ln T \rceil$) și clasificați fiecare drept creștere sau scădere.
3. Reprezentați BSADF cu ambele șiruri pentru cei doi indici.
4. Găsiți data de confirmare a episodului 2003–2007 (a L -a depășire consecutivă).

▣ Raportați: un tabel (T , GSADF, ambele valori critice), episoadele cu direcția lor și graficul

▣ Interpretare: este creșterea actuală o bulă doar pentru că este explozivă (comportament de turmă și tipare log-periodice înainte de 2007: [Pele, Mazurencu & Nijkamp \(2013\)](#))?

▣ Notebook: secțiunea B4

Pachetele de extindere: ce cere fiecare

Pachet	Exerciții	Cerințe prealabile
1. Bule raționale și teorie asimptotică	A3 [Rezolvat], A2, A4	A1; pentru A3 și A4 secțiunea de testare din curs
2. Regimuri	A6, B8	A5, B7
3. LPPLS	A7 [Rezolvat], A8, B6	B5, B3; secțiunea LPPLS din curs
4. Nivelul testului la volatilitate variabilă	B9 [Rezolvat], B10	B3
5. Alegerea ferestrelor	B2	B1
6. Puncte de plecare pentru proiect	C1, C3	B1–B7; studiul de caz din curs

- Fiecare pachet are propria secțiune în notebook; în cadrul unui pachet, rezolvați exercițiile în ordine
- Rezolvările exercițiilor [Propus] se discută la seminar

A3 [Rezolvat]: Coadă dreaptă a distribuției Dickey–Fuller — Cerință

▣ Întrebările

- ▶ sub o rădăcină unitară, unde se află statistica ADF folosită pe coada dreaptă?
- ▶ de ce 1,645 este o valoare critică greșită?

▣ Date de intrare: $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$, ε_t iid $(0, \sigma^2)$, $y_0 = 0$; regresia $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + e_t$, $t = 1, \dots, T$

- ▶ FCLT (teorema limită centrală funcțională): $T^{-1/2} y_{\lfloor Tr \rfloor} \Rightarrow \sigma W(r)$, $r \in [0, 1]$ fracția din eșantion, $\lfloor \cdot \rfloor$ rotunjire în jos, $\Rightarrow$ convergența în distribuție, W o mișcare browniană standard; $\tilde{y}_{t-1}$: y_{t-1} minus media lui pe eșantion

▣ Cerințe

1. Scrieți $\hat{b}$ cu regresorul centrat $\tilde{y}_{t-1}$.
2. Folosind FCLT și teorema aplicației continue, găsiți limitele lui $T^{-2} \sum \tilde{y}_{t-1}^2$ și $T^{-1} \sum \tilde{y}_{t-1} \varepsilon_t$.
3. Derivați limita lui t_b și arătați că numărătorul limită are media $-1/2$.
4. Simulați 20 000 de mersuri aleatoare cu $T = 1\,000$ și raportați cuantilele de 5%, 50% și 95% ale lui t_b și ponderea valorilor negative.

▣ Raportați: limita lui t_b , cele trei cuantile, ponderea valorilor negative și o histogramă

▣ Interpretare: ce consecințe are folosirea valorii 1,645 într-un test de bulă?


▣ Notebook: secțiunea A3

A3 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Pașii 1–3, limita

- ▣ Pasul 1: OLS cu termen liber, $\hat{b} = \sum \tilde{y}_{t-1} \Delta y_t / \sum \tilde{y}_{t-1}^2 = \sum \tilde{y}_{t-1} \varepsilon_t / \sum \tilde{y}_{t-1}^2$ sub H_0
- ▣ Pasul 2: $T^{-2} \sum \tilde{y}_{t-1}^2 \Rightarrow \sigma^2 \int_0^1 \tilde{W}^2$, $\tilde{W} = W - \int_0^1 W$; $T^{-1} \sum y_{t-1} \varepsilon_t \Rightarrow \frac{\sigma^2}{2} (W(1)^2 - 1)$, iar centrarea scade $\sigma^2 W(1) \int_0^1 W$
- ▣ Pasul 3: $SE(\hat{b}) = s / \sqrt{\sum \tilde{y}_{t-1}^2}$ cu $s \rightarrow \sigma$, deci σ se simplifică (PSY, ec. 5 cu $r_1 = 0$, $r_2 = 1$) Phillips, Shi & Yu (2015a)
 - ▶ $t_b \Rightarrow \frac{\frac{1}{2}(W(1)^2 - 1) - W(1) \int_0^1 W}{\{\int_0^1 W^2 - (\int_0^1 W)^2\}^{1/2}}$
 - ▶ $\mathbb{E}[W(1)^2] = 1$ și $\mathbb{E}[W(1) \int_0^1 W] = \int_0^1 r dr = \frac{1}{2}$: numărătorul are media $\frac{1}{2}(1 - 1) - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$ (simulat: $-0,50$)

A3 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Pasul 4, simularea

- Pasul 4: 20 000 de mersuri, $T = 1\,000$; cuantilele 5%: $-2,87$; 50%: $-1,57$; 95%: $-0,09$
- 96% dintre t_b sînt negative: distribuția se află la stînga lui zero
- Interpretare: termenul liber estimat absoarbe o parte din mersul aleator și împinge $\hat{b}$ în jos; cu 1,645, un test pe coada dreaptă aproape niciodată nu respinge: nivelul lui este aproape zero, iar puterea foarte mică



- Simulated t_b , 20,000 random walks, $T = 1\,000$
- 5% quantile -2.87
- 95% quantile -0.09 (right-tail critical value)
- · - 1.645, the Normal 95% quantile

A2 [Propus]: Bula Blanchard–Watson — Cerință

▣ Întrebările

- ▶ cum este compensat riscul de crah al unei bule care se sparge?
- ▶ de ce o ratează un test pe întregul eşantion?

▣ Model (exerciții rezolvate de urmat): A1

- ▣ **Date de intrare:** $B_{t+1} = \frac{1+r}{\pi} B_t + \varepsilon_{t+1}$ cu probabilitatea π , $B_{t+1} = \varepsilon_{t+1}$ cu probabilitatea $1 - \pi$, independent de trecut; $\mathbb{E}\varepsilon = 0$; $B_0 = 15$, $r = 6\%$, $\pi = 0,9$ pe an [Blanchard & Watson \(1982\)](#)

- ▶ Forma Evans (repornire pozitivă): colaps la $B_{t+1} = \delta$, $0 < \delta \leq B_0$; supraviețuire $B_{t+1} = \delta + \frac{1+r}{\pi} (B_t - \frac{\delta}{1+r})$; $y = \ln B$, $c = \ln \delta$

▣ Cerințe

1. Derivați $\mathbb{E}_t B_{t+1}$ și comparați cu condiția de martingală din A1.
2. Pentru $\varepsilon \equiv 0$, derivați abaterea standard condiționată $\text{sd}_t(B_{t+1})$ și evaluați-o la $B_t = 15$.
3. Dați distribuția duratei de viață N , apoi $\mathbb{E}N$, $P(N > 5)$ și rata de creștere cât bula supraviețuiește.
4. Pentru forma Evans, verificați $\mathbb{E}_t B_{t+1} = (1+r)B_t$ și derivați $\mathbb{E}[\Delta y_{t+1} | y_t]$ pentru $B_t \gg \delta$ și panta ei în y_t .

▣ Raportați: cele patru derivări cu cifrele

▣ Interpretare

- ▶ ce estimează o regresie ADF pe întregul eşantion pentru $\ln B$?
- ▶ de ce este aceasta capcana Evans?

▣ Notebook: secțiunea A2

A4 [Propus]: O rădăcină ușor explozivă — Cerință

▣ Întrebările

- ▶ este testul pe coada dreaptă consistent față de o bulă cu rădăcina doar puțin peste unu?
- ▶ cât de repede crește statistica lui?

▣ Model (exerciții rezolvate de urmat): A3

- ▣ **Date de intrare:** $y_t = \rho_T y_{t-1} + \varepsilon_t$, $y_0 = 0$, ε_t iid $(0, \sigma^2)$, $\rho_T = 1 + c/k_T$, $c > 0$, $k_T \rightarrow \infty$, $k_T = o(T)$, adică $k_T/T \rightarrow 0$ (c : gradul de explozivitate, k_T : viteza cu care rădăcina se apropie de 1) [Phillips & Magdalinos \(2007\)](#)

▣ Cerințe

1. Scrieți $y_t = \rho_T^t X_t$ cu $X_t = \sum_{j \leq t} \rho_T^{-j} \varepsilon_j$ și găsiți limita lui $\text{Var}(X_T)(\rho_T^2 - 1)$.
2. Arătați că $\sum y_{t-1}^2 \approx X_T^2 \rho_T^{2T} / (\rho_T^2 - 1)$ și că $\frac{\rho_T^T}{\rho_T^2 - 1}(\hat{\rho} - \rho_T)$ este asimptotic un raport de două variabile independente cu distribuția Normală.
3. Descompuneți raportul t al lui $b = \rho - 1$ și derivați viteza de divergență.
4. Simulați 4 000 de traiectorii cu $c = 1$, $k_T = T^{0.8}$, $T = 100, 400, 1\,600$ (regresie cu termen liber); raportați ρ_T^T , mediana raportului t și o histogramă.

▣ Raportați: cele trei derivări și tabelul simulării, cu histograma

▣ Interpretare: ce spune viteza de divergență despre puterea față de bulele scurte și moderate?

▣ Notebook: secțiunea A4

A6 [Propus]: Încă un pas al filtrului și un pas EM — Cerință

▣ Întrebările

- ▶ de ce un randament mic și pozitiv indică regimul calm?
- ▶ de ce actualizarea EM este o medie ponderată?

▣ Model (exerciții rezolvate de urmat): A5

- ▣ **Date de intrare:** calm $\mu_1 = 0,4$, $\sigma_1 = 2$; turbulent $\mu_2 = -1$, $\sigma_2 = 6$; $p_{11} = 0,95$, $p_{22} = 0,80$; randamente săptămânale în %; săptămîna trecută $P(\text{turbulent}) = 0,1$, săptămîna aceasta $r_t = +1\%$

▣ Cerințe

1. Calculați duratele, probabilitățile staționare și media și abaterea standard necondiționate.
2. Faceți un pas al filtrului pentru $r_t = +1\%$.
3. Calculați probabilitatea regimului turbulent peste două săptămîni, $(1 - p, p)P^2$, cu p probabilitatea actualizată de la pasul 2 și P matricea 2×2 a probabilităților p_{ij} .
4. Date probabilitățile netezite ξ_{tj} , maximizați $\sum_t \sum_j \xi_{tj} \ln \varphi(r_t; \mu_j, \sigma_j^2)$ după μ_j și σ_j^2 (pasul M al EM) [Hamilton \(1990\)](#).

- ▣ **Raportați:** cifrele de la pașii 1–3 și cele două formule ale pasului M

- ▣ **Interpretare:** cum contribuie fiecare săptămîină la estimarea fiecărui regim?

- ▣ Notebook: secțiunea A6

B8 [Propus]: Bitcoin: două sau trei regimuri? — Cerință

▣ Întrebările

- ▶ are nevoie Bitcoin de un al treilea regim?
- ▶ căror regimuri le aparțin creșterile lui?

▣ Model (exerciții rezolvate de urmat): B7

▣ Date: randamente log săptămânale Bitcoin în %, 2014–2026 (626 de săptămâni)

▣ Cerințe

1. Estimați două și trei regimuri, cu medie și dispersie care se schimbă (30 de porniri aleatoare; verificați că nicio abatere standard a unui regim nu se apropie de 0).
2. Raportați log-verosimilitatea $\hat{\ell}$, $AIC = -2\hat{\ell} + 2q$, $BIC = -2\hat{\ell} + q \ln T$ (q : numărul de parametri; o valoare mai mică este mai bună) și media, abaterea standard și durata fiecărui regim; reprezentați probabilitățile netezite ale celor trei regimuri.
3. Testați două regimuri față de trei cu $LR = 2(\hat{\ell}_3 - \hat{\ell}_2)$: simulați 199 de eșantioane din modelul cu două regimuri estimat, reestimați ambele modele pe fiecare și calculați $p = (1 + \#\{LR^* \geq LR\})/(B + 1)$, cu LR^* valorile bootstrap, $\#\{\cdot\}$ numărul lor și B numărul eșantioanelor Hansen (1992).
4. Comparați valoarea bootstrap de 95% cu valoarea χ^2_6 .

▣ Raportați: tabelul, graficul, LR, p-value-ul bootstrap și ambele valori critice

▣ Interpretare: de ce χ^2 nu este distribuția de referință corectă?

▣ Notebook: secțiunea B8

A7 [Rezolvat]: LPPLS: eliminarea parametrilor liniari — Cerință

▣ Întrebările

- ▶ de ce se calibrează LPPLS doar după trei parametri neliniari?
- ▶ ce condiții ale filtrului pot fi verificate numai din parametri?

- ▣ **Date de intrare:** $\ln p_t = A + Bf_t + C_1g_t + C_2h_t + u_t$ pe $[t_1, t_2]$, $f_t = (t_c - t)^m$, $g_t = f_t \cos(\omega \ln(t_c - t))$, $h_t = f_t \sin(\omega \ln(t_c - t))$ [Filimonov & Sornette \(2013\)](#)

- ▶ Filtrul Shu și Zhu (ec. 12) [Shu & Zhu \(2020\)](#): $B < 0$; $m \in [0,01; 0,99]$; $\omega \in [2, 25]$; $t_c - t_2 \leq (t_2 - t_1)/5$; oscilațiile $O = \frac{\omega}{\pi} \ln \frac{t_c - t_1}{t_c - t_2} \geq 2,5$; amortizarea $D = \frac{m|B|}{\omega|C|} \geq 1$; eroarea relativă, testele Lomb și al reziduului (acestea cer datele)

▣ Cerințe

1. Pentru (t_c, m, ω) fixați, derivați (A, B, C_1, C_2) în formă închisă.
2. Scrieți funcția obiectiv profilată rămasă pentru căutarea neliniară.
3. Determinați C și ϕ din $C \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi)$ pe baza lui C_1, C_2 .
4. O ajustare pe $[2025,0; 2026,0]$ dă $t_c = 2026,08$, $m = 0,5$, $\omega = 8$, $B = -1,2$, $C_1 = 0,06$, $C_2 = -0,02$: verificați fiecare condiție care poate fi verificată doar din parametri și reprezentați tendința implicită.

- ▣ **Raportați:** forma închisă, profilul, C , ϕ și lista condițiilor îndeplinite și neîndeplinite


- ▣ **Interpretare:** de ce eliminarea parametrilor liniari face calibrarea stabilă?

- ▣ Notebook: secțiunea A7

A7 [Rezolvat]: Rezolvare (1/3) — Pașii 1–3

- ▣ Pasul 1: cu $X_t = (1, f_t, g_t, h_t)$ și $\beta = (A, B, C_1, C_2)^\top$, minimizăm $\sum_t (\ln p_t - X_t \beta)^2$: $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$, un sistem 4×4 cu sume precum N , $\sum f_t$, $\sum f_t g_t$, $\sum h_t^2$
- ▣ Pasul 2: profilul $S(t_c, m, \omega) = y^\top y - y^\top X (X^\top X)^{-1} X^\top y$: doar trei parametri neliniari, ceea ce elimină cele mai multe minime locale ale căutării cu șapte parametri
- ▣ Pasul 3: $C \cos(x - \phi) = C \cos \phi \cos x + C \sin \phi \sin x$, deci $C_1 = C \cos \phi$, $C_2 = C \sin \phi$: $C = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} = 0,0632$, $\phi = \text{atan2}(C_2, C_1)$

A7 [Rezolvat]: Rezolvare (2/3) — Pasul 4 și tendința implicită



A7 [Rezolvat]: Rezolvare (3/3) — Pasul 4 și tendința implicită

- ▣ Pasul 4: $B = -1,2 < 0$; $m = 0,5$ și $\omega = 8$ în intervalele lor: trec
- ▣ $t_c - t_2 = 0,08 \leq 0,2$, adică 29 de zile după fereastră: trece
- ▣ $O = \frac{8}{\pi} \ln \frac{1,08}{0,08} = 6,63 \geq 2,5$; $D = \frac{0,5 \cdot 1,2}{8 \cdot 0,0632} = 1,19 \geq 1$: trec
- ▣ Eroarea relativă, testul Lomb și testul reziduului cer datele de preț: o ajustare candidată, încă necalificată

A8 [Propus]: Originea condiției de amortizare: rata de hazard — Cerință

▣ Întrebările

- ▶ de unde provine condiția de amortizare din filtrul LPPLS?
- ▶ o îndeplinește o ajustare dată?

▣ Model (exerciții rezolvate de urmat): A7

- ▣ **Date de intrare:** JLS: cu dobândă zero și fără dividende, $\mathbb{E}_t[dp] = 0$ înaintea crahului cere drift-ul $\mu(t) = \kappa h(t)$, cu $h(t) \geq 0$ rata de hazard a crahului și $\kappa > 0$ mărimea lui; tendința logaritmului prețului $B\tau^m + C\tau^m \cos(\omega \ln \tau - \phi)$, $\tau = t_c - t$ [Johansen, Ledoit & Sornette \(2000\)](#)

▣ Cerințe

1. Derivați tendința în raport cu t .
2. Găsiți condiția asupra lui (B, C, m, ω) ca $h(t) \geq 0$ la orice fază $\theta = \omega \ln \tau - \phi$.
3. Arătați că pentru $\omega \gg m$ devine condiția de amortizare $D = \frac{m|B|}{\omega|C|} \geq 1$ (Shu și Zhu, ec. 11) [Shu & Zhu \(2020\)](#).
4. Pentru ajustarea $t_c = 2026,45$, $m = 0,95$, $\omega = 3,5$, $B = -0,8$, $C_1 = 0,25$, $C_2 = 0$ pe $[2025,0; 2026,0]$, verificați condiția exactă, D , O și intervalul pentru t_c .

▣ Raportați: cele trei derivări și cele patru verificări

▣ Interpretare

- ▶ ce ar însemna economic o rată de hazard negativă?
- ▶ este ajustarea o semnătură de bulă?

▣ Notebook: secțiunea A8

B6 [Propus]: Indicatorul de încredere comparat cu întâmplarea — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** este un indicator de încredere LPPLS pozitiv pentru Nasdaq 100 urmat de scăderi mari mai des decât în absența semnalului?
- ▣ **Model** (exerciții rezolvate de urmat): B5 și B3
- ▣ **Date:** închiderile zilnice Nasdaq 100; indicatorul de încredere LPPLS din 1997 (grila Shu și Zhu: 141 de ferestre de 750–50 de zile de tranzacționare, t_2 la fiecare 5 zile de tranzacționare) [Shu & Zhu \(2020\)](#)
 - ▶ **Semnal:** indicator > 0 ; **rezultat:** o închidere cu cel puțin 20% sub cea din ziua semnalului în 90 de zile **calendaristice**; datele cu fereastra incompletă se elimină
- ▣ **Cerințe**
 1. Găsiți prima dată cu indicator pozitiv și ponderea datelor pozitive între ianuarie 1999 și vârful din martie 2000.
 2. Estimați $\Delta = \hat{p}_{\text{on}} - \hat{p}_{\text{off}}$ cu un CI de 95% prin bootstrap circular pe blocuri (90 de zile = 13 date, 9 999 de replici) și un test Newey–West (13 laguri) pentru $b = 0$ în regresia liniară de probabilitate $\text{scdere}_t = a + b \text{semnal}_t + u_t$ (ambele variabile 0/1).
 3. Comparați SE bootstrap pe blocuri cu SE pentru date independente și calculați efectul de design $(\text{SE}_{\text{blocuri}}/\text{SE}_{\text{iid}})^2$.
 4. Calculați mărimea eșantionului pentru o putere de 80% (grupuri egale, $p_0 = \hat{p}_{\text{off}}$, $p_1 = p_0 + 10$ puncte, test bilateral la 5%), pentru observații independente și pentru date dependente.
- ▣ **Raportați:** graficul indicatorului, Δ cu CI și p-value-ul, efectul de design și mărimile eșantionului
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ ar fi ajutat indicatorul un investitor în 2000?
 - ▶ este lipsa dovezilor aici o dovadă a lipsei de informație?
- ▣ Notebook: secțiunea B6

B9 [Rezolvat]: Nivelul GSADF la o schimbare de volatilitate — Cerință

▣ Întrebările

- ▶ cât de des respinge GSADF un mers aleator adevărat când volatilitatea se triplează la jumătatea eșantionului?
- ▶ corectează wild bootstrap acest lucru?

▣ Model (exerciții rezolvate de urmat): B3

- ▣ **Date:** simulate; 1000 de mersuri aleatoare $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + \sigma_t z_t$, $z_t \sim N(0, 1)$, $T = 400$, $w_0 = 40$; $\sigma_t = 1$ pînă la $T/2$, apoi 3: fără bulă [Harvey et al. \(2016\)](#)

▣ Cerințe

1. Calculați rata de respingere GSADF la 5% cu valoarea critică Monte Carlo pentru dispersie constantă (2,19).
2. Repetați cu o valoare critică wild bootstrap calculată pentru fiecare traiectorie (199 de replici, ca în B3).
3. Calculați ponderea traiectoriilor cu cel puțin un episod datat fals (BSADF peste valoarea punctuală de 95% timp de $\lceil \ln T \rceil$ perioade).
4. Faceți același calcul pentru volatilitate constantă, ca martor, și reprezentați cele patru rate.


- ▣ **Raportați:** un tabel și un grafic cu bare al ratelor de respingere și de episoade false

▣ Interpretare

- ▶ în ce valoare critică ați avea încredere pentru Bitcoin?
- ▶ rezolvă bootstrap-ul multiplicitatea datării?

- ▣ Notebook: secțiunea B9

B9 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Grafic și tabel



	GSADF, MC	GSADF, wild	ep. fals, MC	ep. fals, wild
Constantă	4,1%	3,9%	49,1%	51,9%
×3 la $T/2$	32,0%	4,1%	63,8%	49,6%

B9 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Pași și interpretare

- Pași: simulăm traiectoria; calculăm GSADF și BSADF; comparăm cu valoarea Monte Carlo fixă și cu valorile wild bootstrap ale traiectoriei; mediem pe cele 1 000 de traiectorii (eroarea Monte Carlo $\pm 1,4$ puncte în jur de 5%)
- Creșterea târzie a volatilității seamănă cu o accelerare: 32,0% respingeri false cu valoarea pentru dispersie constantă; cu wild bootstrap rata coboară la 4,1%
- Episoade false în aproximativ jumătate dintre traiectorii cu oricare valoare: bootstrap-ul corectează nivelul GSADF, nu multiplicitatea datării
- Interpretare: pentru Bitcoin folosim wild bootstrap pentru testul global și valori critice pe familie pentru date

B10 [Propus]: Nivelul sub volatilitate GARCH — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** distorsionează volatilitatea GARCH persistentă sau o scădere a volatilității nivelul GSADF?
- ▣ **Model** (exerciții rezolvate de urmat): B9
- ▣ **Date:** simulate, ca în B9, cu două modele nule noi: șocuri GARCH(1,1) $\sigma_t^2 = 0,02 + 0,10 e_{t-1}^2 + 0,88 \sigma_{t-1}^2$ (dispersia necondiționată 1) și o **scădere** a volatilității de la 3 la 1 la $T/2$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați nivelul GSADF la 5% cu valori critice Monte Carlo și wild bootstrap (1 000 de traiectorii, câte 199 de replici).
 2. Calculați ponderea traiectoriilor cu un episod datat fals și reprezentați ratele ca în B9.
- ▣ **Raportați:** un tabel și un grafic cu bare, ca în B9
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ de ce o scădere a volatilității nu creează bule false, iar o creștere da?
 - ▶ este wild bootstrap exact sub GARCH?
- ▣ Notebook: secțiunea B10

B2 [Propus]: SADF și GSADF — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** ce episoade ratează ADF-ul recursiv (început fix) și găsește BSADF (început mobil)?
- ▣ **Model** (exerciții rezolvate de urmat): B1
- ▣ **Date:** logaritmul închiderilor lunare pentru Nasdaq 100 și S&P 500, 1990–2026 (ultima închidere din lună)
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați SADF și GSADF cu regula ferestrei minime și valorile lor critice de 95% din 2000 de mersuri aleatoare simulate.
 2. Datați cu ADF recursiv al PWY (începutul ferestrei fixat la prima lună) și cu BSADF al PSY, durata minimă $\lceil \ln T \rceil$ luni Phillips, Wu & Yu (2011).
 3. Listați episoadele celor două metode cu direcția lor și reprezentați ambele statistici cu valorile lor critice.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu SADF și GSADF, ambele liste de episoade și graficul
- ▣ **Interpretare:** de ce ratează începutul fix episoadele ulterioare?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B2

C1 [Propus]: Ipoteza unei bule AI — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** seamănă creșterea actuală a NVIDIA și a Nasdaq 100 cu bula dot-com a Cisco sau cu fundamente explozive?
- ▣ **Model** (exerciții rezolvate de urmat): B1, B3, B5; vezi și exercițiul propus B6
- ▣ **Date:** închideri lunare și săptămânale NVIDIA, Cisco și Nasdaq 100; vânzări și profituri trimestriale din rapoartele trimestriale (10-Q) și anuale (10-K) depuse la SEC (baza EDGAR)
- ▣ **Cerințe**
 1. Rulați GSADF și BSADF pe date lunare și săptămânale, cu valori critice Monte Carlo și wild bootstrap; datați semnalele și precizați dacă episodul actual este încă deschis.
 2. Calculați creșterile pe doi ani, brute și în exces față de randamentul Nasdaq 100, ca la Greenwood, Shleifer și You [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#).
 3. Calculați indicatorul de încredere LPPLS pe ultimele 26 de săptămîni.
 4. Construiți dumneavoastră fundamentele: raportările datate la data depunerii (fără informație din viitor), sume pe ultimele patru trimestre, valori pe acțiune ajustate consecvent pentru divizări, vânzările cînd profitul este ≤ 0 .
 5. Testați logaritmul raportului preț/vînzări (sau preț/profit) și datați-l cu valori critice pe familie [Phillips & Shi \(2020\)](#).
- ▣ **Raportați:** o notă de două pagini cu grafice și un folder Quantlet (cod, fișierul Metainfo.txt cu numele, descrierea, cuvintele cheie și autorul, grafice)
- ▣ **Interpretare:** pot fi separate prețurile explozive de profiturile așteptate explozive [Pástor & Veronesi \(2009\)](#)?
- ▣ **Notebook:** secțiunea C1

C3 [Propus]: Volumul ca indicator anticipativ al prețurilor într-un avînt speculativ — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** precede volumul tranzacțiilor prețurile într-un avînt speculativ, ca în ciclul imobiliar din SUA din 2000–2011 [DeFusco, Nathanson & Zwick \(2022\)](#)?
- ▣ **Model** (exerciții rezolvate de urmat): B3 (episoadele Bitcoin); vezi și exercițiul propus B6 (bootstrap pe blocuri) și studiul de caz din curs
- ▣ **Date:** **FRED:** indicele lunar Case-Shiller U.S. National Home Price Index (CSUSHPINSA) și vânzările de case unifamiliale noi, neajustate sezonier (HSN1FNSA), 2000–2011 și 1990–2011
 - ▶ Articolul estimează relația dintre logaritmul centrat al prețului locuințelor și vânzările cu k luni înainte, $p_t = \beta_k v_{t-k} + \eta_t$ (ec. 1, η_t : eroarea), în 115 orașe; corelația este maximă la $k = 24$ (Figura 2)
- ▣ **Cerințe**
 1. Construiți p_t , logaritmul prețului minus media lui pe eșantion, și v_t , vânzările minus media lunii lor calendaristice.
 2. Pentru $k = -12, \dots, 48$ estimați ec. (1) prin OLS fără termen liber, calculați corelația implicită $\hat{\beta}_k \text{sd}(v_{t-k})/\text{sd}(p_t)$ și reprezentați-o în funcție de k .
 3. Dați CI 95% punctuale la lagul maxim, la $k = 24$ și la $k = 0$ printr-un bootstrap circular pe blocuri de 24 de luni; repetați pentru 1990–2011.
 4. Datați acalmia: de la vârful volumului ajustat la ultimul vîrf al prețurilor dinaintea scăderii lor (Figura 1).
 5. Extindere: repetați pașii 1–4 pentru Bitcoin (închiderea de la sfîrșitul lunii în USD, volumul lunar însumat) în jurul unui episod BSADF (B3); justificați orice ajustare sezonieră [Griffin & Shams \(2020\)](#).
- ▣ **Raportați:** curba corelațiilor, lagul maxim cu CI, datele acalmiei, un folder Quantlet și o notă de două pagini
- ▣ **Interpretare:** vânzările de case noi nu includ revînzările cumpărătorilor pe termen scurt: confirmă avansul național al volumului speculația sau îl pot produce ciclurile creditului ori ale construcțiilor?
- ▣ Notebook: secțiunea C3

Bibliografie (1/2)

- ▣ Blanchard, O.J., Watson, M.W. (1982). Bubbles, rational expectations and financial markets. NBER Working Paper 945.
- ▣ Carrasco, M., Hu, L., Ploberger, W. (2014). Optimal test for Markov switching parameters. *Econometrica*, 82(2), 765–784.
- ▣ DeFusco, A.A., Nathanson, C.G., Zwick, E. (2022). Speculative dynamics of prices and volume. *Journal of Financial Economics*, 146(1), 205–229.
- ▣ Demirer, R., Demos, G., Gupta, R., Sornette, D. (2019). On the predictability of stock market bubbles: evidence from LPPLS confidence multi-scale indicators. *Quantitative Finance*, 19(5), 843–858.
- ▣ Diba, B.T., Grossman, H.I. (1988). Explosive rational bubbles in stock prices?. *American Economic Review*, 78(3), 520–530.
- ▣ Filimonov, V., Sornette, D. (2013). A stable and robust calibration scheme of the log-periodic power law model. *Physica A*, 392(17), 3698–3707.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Greenwood, R., Shleifer, A., You, Y. (2019). Bubbles for Fama. *Journal of Financial Economics*, 131(1), 20–43.
- ▣ Griffin, J.M., Shams, A. (2020). Is Bitcoin really untethered?. *Journal of Finance*, 75(4), 1913–1964.
- ▣ Hamilton, J.D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384.
- ▣ Hamilton, J.D. (1990). Analysis of time series subject to changes in regime. *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 39–70.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Hansen, B.E. (1992). [The likelihood ratio test under nonstandard conditions: testing the Markov switching model of GNP](#). *Journal of Applied Econometrics*, 7(S1), S61–S82.
- ▣ Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Sollis, R., Taylor, A.M.R. (2016). [Tests for explosive financial bubbles in the presence of non-stationary volatility](#). *Journal of Empirical Finance*, 38, 548–574.
- ▣ Johansen, A., Ledoit, O., Sornette, D. (2000). [Crashes as critical points](#). *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 3(2), 219–255.
- ▣ Pástor, L., Veronesi, P. (2009). [Technological revolutions and stock prices](#). *American Economic Review*, 99(4), 1451–1483.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu, M., Nijkamp, P. (2013). [Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange](#). SSRN Working Paper.
- ▣ Phillips, P.C.B., Magdalinos, T. (2007). [Limit theory for moderate deviations from a unit root](#). *Journal of Econometrics*, 136(1), 115–130.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S. (2020). [Real time monitoring of asset markets: bubbles and crises](#). In *Handbook of Statistics: Financial, Macro and Micro Econometrics Using R*, Elsevier, 61–80.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S., Yu, J. (2015a). [Testing for multiple bubbles: historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500](#). *International Economic Review*, 56(4), 1043–1078.
- ▣ Phillips, P.C.B., Wu, Y., Yu, J. (2011). [Explosive behavior in the 1990s Nasdaq: when did exuberance escalate asset values?](#). *International Economic Review*, 52(1), 201–226.
- ▣ Shu, M., Zhu, W. (2020). [Detection of Chinese stock market bubbles with LPPLS confidence indicator](#). *Physica A*, 557, 124892.