



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 18: Risc sistemic și rețele — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- **AI:** Artificial Intelligence — *inteligență artificială*
- **BET:** Bucharest Exchange Trading (index) — *indicele de referință al Bursei de Valori București*
- **BIC:** Bayesian Information Criterion — *criteriul informațional bayesian*
- **BNP:** BNP Paribas SA (Euronext Paris ticker; Banque Nationale de Paris) — *BNP Paribas SA (simbolul bursier Euronext Paris)*
- **CDS:** Credit Default Swap — *swap pe riscul de credit (contract de asigurare împotriva neplății)*
- **COVID-19:** COronaVirus Disease 2019 — *boala provocată de coronavirus, 2019*
- **DBK:** Deutsche Bank AG (Xetra ticker) — *Deutsche Bank AG (simbolul bursier Xetra)*
- **DCC:** Dynamic Conditional Correlation — *corelație condiționată dinamică*
- **ES:** Expected Shortfall — *pierdere așteptată în coadă*
- **FEVD:** Forecast Error Variance Decomposition — *descompunerea dispersiei erorii de prognoză*
- **FRM:** Financial Risk Meter — *indicatorul de risc financiar sistemic Financial Risk Meter*
- **FWER:** Family-Wise Error Rate — *probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste*
- **GACV:** Generalized Approximate Cross-Validation — *validare încrucișată aproximativă generalizată*
- **GARCH:** Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity — *heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată*
- **GJR:** Glosten–Jagannathan–Runkle (asymmetric GARCH) — *GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle*
- **HAC:** Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — *erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație*

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ **HSBC:** HSBC Holdings plc (originally the Hongkong and Shanghai Banking Corporation) — *grupul bancar HSBC Holdings plc (inițial Hongkong and Shanghai Banking Corporation)*
- ▣ **ING:** ING Groep (Internationale Nederlanden Groep) — *grupul bancar olandez ING*
- ▣ **JPM:** JPMorgan Chase & Co. (NYSE ticker) — *JPMorgan Chase & Co. (simbolul bursier NYSE)*
- ▣ **LRMES:** Long-Run Marginal Expected Shortfall — *pierdere marginală așteptată în coadă pe termen lung (într-o criză)*
- ▣ **MES:** Marginal Expected Shortfall — *pierdere marginală așteptată în coadă*
- ▣ **OLS:** Ordinary Least Squares — *metoda celor mai mici pătrate*
- ▣ **QFVAR:** Quantile Factor Vector AutoRegression — *autoregresie vectorială cuantilă cu factori comuni*
- ▣ **QML:** Quasi-Maximum Likelihood — *cvasi-verosimilitate maximă*
- ▣ **RTD:** Relative Tail Dependence — *dependența relativă în cozi (coada adversă minus coada favorabilă)*
- ▣ **SG:** Société Générale — *grupul bancar francez Société Générale*
- ▣ **SPX:** Standard and Poor's 500 index (column name in the notebook) — *indicele S&P 500 (numele coloanei din notebook)*
- ▣ **SRISK:** Systemic RISK (capital shortfall measure) — *deficitul de capital al unei bănci într-o criză sistemică*
- ▣ **VAR:** Vector AutoRegression — *model vector autoregresiv*
- ▣ **VIX:** CBOE Volatility Index — *indicele de volatilitate CBOE*

Întrebările de azi și structura seminarului

- ▣ Întrebările seminarului
 - ▶ **care bănci sînt sistemice?**
 - ▶ **cît de siguri putem fi?**
- ▣ Rezultate de obținut
 - ▶ răspunsurile la exercițiile A
 - ▶ un tabel și un grafic pentru fiecare exercițiu B
 - ▶ cifrele corectate din **C1** și jurnalul erorilor
 - ▶ o propoziție de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Manualul: **Franke, Härdle & Hafner (2019)**
- ▣ Notebook-ul de azi: **deschideți notebook-ul seminarului în Colab**
 - ▶ fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- ▣ Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro; drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiul	Întrebarea	Tipul	Model
A1	ΔCoVaR sub distribuția Normală	Rezolvat	–
A2	de ce suma ponderată a MES este ES al portofoliului	Rezolvat	–
A3	descompunerea generalizată a dispersiei	Rezolvat	–
B1	diferă băncile americane prin ΔCoVaR 5%?	Rezolvat	–
B2, B3	robustețea și intervalele conectivității	Rezolvat	–
C1	ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	A1, A2
B4	băncile europene: care este cea mai sistemică?	Propus, temă	B1
Pachete de extindere	A4–A8, B5–B10, C2, C3 (opționale, după curs)	Rezolvate și propuse (indicat la fiecare cerință)	indicat în fiecare enunț

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați dumneavoastră, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: estimare și inferență pe date reale, fiecare încheiată cu o întrebare de interpretare; Partea C: critica unui răspuns AI și întrebări deschise

Datele folosite

Seriile	Activele	Prețul folosit	Folosite în
Bănci americane	JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo	închidere ajustată; maxim și minim zilnic	B1, B2, B3, B6
Bănci europene	Deutsche Bank, BNP Paribas, Santander, ING, HSBC	închidere ajustată; maxim și minim zilnic	B2, B3, B4
Bănci românești	Banca Transilvania, BRD-Groupe SG (se elimină zilele fără tranzacții)	închidere ajustată; maxim și minim zilnic	B2, B3
Indici de piață	S&P 500, Euro Stoxx 50, BET, VIX	închidere	B6, pachete

- Prețurile zilnice din datele cursului, câte o serie pe activ (câmpul folosit: adjusted close pentru bănci, close pentru indici; maximul și minimul zilnic pentru volatilitate); eșantionul 5 ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026
- Randamentele R : aliniem întâi prețurile pe cele 3960 de zile comune tuturor celor 17 serii, apoi calculăm randamentele log zilnice în %; volatilitățile V : logaritmul volatilității Parkinson (din range-ul zilnic maxim–minim) pentru cele 13 bănci

Pregătire: rulați și verificați

```
# notebook section "Data" builds  
# R (returns, %) and V (log volatility)  
print(R.shape, V.shape)  
print(R.index[0].date(),  
      R.index[-1].date())  
print(R[['JPM', 'DBK', 'TLV',  
        'SPX']].head(3).round(2))
```

- Rezultatul așteptat: (3960, 17) (3966, 13); prima și ultima zi 2010-01-05, 2026-09-18; V folosește doar cele 13 bănci, fără indici, deci are mai multe zile comune (3966)

date	JPM	DBK	TLV	SPX
2010-01-05	1.92	1.60	2.73	0.31
2010-01-06	0.55	-1.05	3.09	0.05
2010-01-07	1.96	0.45	0.00	0.40

- Dacă numărul de zile sau primele valori diferă, verificați simbolurile, folosirea prețului ajustat pentru dividende și alinierea pe zilele comune

Noțiuni necesare azi (1/23): Riscul sistemic, cuantilele, VaR și ES

▣ Detalii: [Capitolul 18](#)

▣ Două întrebări despre o bancă

▶ **Expunerea:** cât pierde banca atunci când sistemul este în dificultate? (MES, LRMES, SRISK)

▶ **Contribuția:** cu cât crește pierderea sistemului când banca este în dificultate? (ΔCoVaR)

▣ Cuantila de ordin α , $q_\alpha(X)$, a unui randament X : valoarea sub care X coboară cu probabilitatea α

$$P(X \leq q_\alpha(X)) = \alpha, \quad \text{VaR}_\alpha = -q_\alpha(X), \quad \text{ES}_\alpha = -\mathbb{E}[X \mid X \leq q_\alpha(X)]$$

▶ α : probabilitatea cozii (1% sau 5%); VaR: pierderea depășită într-o fracțiune α a zilelor; ES: pierderea medie în acele zile, deci $\text{ES}_\alpha \geq \text{VaR}_\alpha$

▶ $\mathbb{E}[\cdot \mid A]$: media condiționată de evenimentul A ; VaR, ES, CoVaR, MES se raportează ca pierderi pozitive (%)

Noțiuni necesare azi (2/23): CoVaR și ΔCoVaR : definițiile

- CoVaR_α : VaR-ul sistemului X^{sys} în ziua de dificultate a băncii [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#)

$$P(X^{\text{sys}} \leq -\text{CoVaR}_\alpha \mid X_i = q_\alpha(X_i)) = \alpha$$

- ▶ X_i : randamentul băncii i ; X^{sys} : randamentul sistemului (aici celelalte bănci din regiune); $X_i = q_\alpha(X_i)$: banca este la propriul VaR

- Aceeași mărime în starea mediană a băncii, $X_i = q_{50\%}(X_i)$: $\text{CoVaR}_\alpha^{50\%}$

- ▶ $q_{50\%}(X_i)$: randamentul median, o zi obișnuită pentru bancă

- Contribuția băncii: diferența

$$\Delta\text{CoVaR}_\alpha = \text{CoVaR}_\alpha - \text{CoVaR}_\alpha^{50\%}$$

- ▶ pierderea suplimentară din coada sistemului când banca trece de la o zi obișnuită la dificultate; > 0 când banca și sistemul se mișcă împreună
- ▶ riscul propriu (VaR-ul băncii) și contribuția (ΔCoVaR) sînt mărimi diferite ([A1](#), [B4](#))

Noțiuni necesare azi (3/23): Estimarea CoVaR prin regresie cuantilă

- ▣ **Regresia cuantilă:** o dreaptă pentru cuantila de ordin α a lui X^{sys} , nu pentru media ei

$$q_{\alpha}(X^{sys} | X_i) = a_{\alpha} + b_{\alpha}X_i, \quad (\hat{a}_{\alpha}, \hat{b}_{\alpha}) = \arg \min_{a, b} \sum_{t=1}^n \rho_{\alpha}(X_t^{sys} - a - bX_{i,t})$$

- ▶ b_{α} : cu cât se deplasează cuantila de ordin α a sistemului la un punct în plus al lui X_i ; n : numărul de zile; căciula: valoare estimată

- ▣ **Funcția de verificare** (check function) înlocuiește pătratul reziduului din OLS

$$\rho_{\alpha}(u) = u(\alpha - 1\{u < 0\})$$



- ▶ $1\{\cdot\}$: 1 dacă este adevărat, altfel 0; reziduurile negative au ponderea $1 - \alpha$, cele pozitive α , deci o fracțiune α din puncte rămîne sub dreaptă

- ▣ Înlocuim cuantilele empirice ale băncii, $\hat{q}_{\alpha}(X_i)$ și $\hat{q}_{50\%}(X_i)$

$$\widehat{\text{CoVaR}}_{\alpha} = -(\hat{a}_{\alpha} + \hat{b}_{\alpha} \hat{q}_{\alpha}(X_i)), \quad \widehat{\Delta \text{CoVaR}}_{\alpha} = \hat{b}_{\alpha} (\hat{q}_{50\%}(X_i) - \hat{q}_{\alpha}(X_i))$$

- ▶ panta înmulțită cu distanța dintre ziua mediană și ziua de dificultate; $\hat{a}_{\alpha}$ se simplifică


Noțiuni necesare azi (4/23): Funcția de verificare



— $\alpha = 0.05$ — $\alpha = 0.5$

- Stînga: $\rho_\alpha(u)$ este o valoare absolută înclinată; la $\alpha = 0,5$ este $|u|/2$ (regresia mediană)
- Dreapta: pentru $X \sim N(0, 1)$, $\mathbb{E}[\rho_\alpha(X - q)]$ este minimă în cuantila de ordin α : $-1,64$ la 5%, 0 la 50%
 - minimizarea lui ρ_α estimează o cuantilă, așa cum minimizarea pătratelor estimează o medie

Noțiuni necesare azi (5/23): ΔCoVaR pe date simulate



— 5% line $\hat{a} + \hat{b}X_i$ - - - distress $\hat{q}_{5\%}(X_i)$ - - - median $\hat{q}_{50\%}(X_i)$ — $X^{sys} | \text{median}$ — $X^{sys} | \text{distress}$

- Randamente simulate cu distribuție Normală bivariată: $\sigma_i = 2\%$, $\sigma_{sys} = 1\%$, $\rho = 0,55$, $n = 4\,000$ de zile
 - ▶ stînga: panta $\hat{b}_{5\%} = 0,28$; de la ziua mediană la ziua de dificultate ($\hat{q}_{5\%} = -3,28\%$) dreapta coboară cu $\Delta\text{CoVaR} = 0,91\%$
 - ▶ dreapta: cuantilele de 5% (linii întrerupte) ale celor două densități condiționate ale lui X^{sys} sînt la distanța ΔCoVaR
- Formula închisă sub distribuția Normală [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#): $\Delta\text{CoVaR}_\alpha = \rho \sigma_{sys} |z_\alpha|$, $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha)$ (Φ : funcția de repartiție Normală standard); aici $0,55 \cdot 1\% \cdot 1,645 = 0,90\%$

Noțiuni necesare azi (6/23): Un exemplu de calcul pentru ΔCoVaR

- ▣ Estimările: $\hat{b}_{5\%} = 0,5$, $\hat{q}_{50\%} = 0,05\%$, $\hat{q}_{5\%} = -2,95\%$
 - ▶ $\Delta\text{CoVaR}_{5\%} = 0,5 \cdot (0,05 + 2,95) = 1,5\%$ pierdere suplimentară a sistemului
- ▣ Formula închisă sub distribuția Normală nu conține σ_i : o bancă mai riscantă, cu același ρ , are aceeași contribuție (A1)
- ▣ În B1, B4: sistemul băncii i nu conține banca i
 - ▶ $X_t^{\text{sys}} = \frac{1}{N-1} \sum_{j \neq i} X_{j,t}$, randamentul cu ponderi egale al celorlalte $N - 1$ bănci din regiune

Noțiuni necesare azi (7/23): Expunerea: MES și ES

- **Marginal expected shortfall (MES)** [Acharya et al. \(2017\)](#): pierderea medie a băncii în fracțiunea α a celor mai nefavorabile zile pentru piață

$$\text{MES}_{i,\alpha} = -\mathbb{E}[X_i \mid X_m \leq q_\alpha(X_m)]$$

► X_m : randamentul pieței (sau al portofoliului); condiția privește coada **pieței**, nu pe cea a băncii

- Aditivitatea (**A2**): cu ponderile w_i din portofoliu, suma ponderată a valorilor MES este ES al portofoliului


$$\sum_i w_i \text{MES}_{i,\alpha} = \text{ES}_\alpha(X_p), \quad X_p = \sum_i w_i X_i$$

- Cazul Normal: MES este beta înmulțit cu ES al pieței

$$\text{MES}_{i,\alpha} = \beta_i \text{ES}_\alpha(X_m), \quad \beta_i = \frac{\rho \sigma_i}{\sigma_m}, \quad \text{ES}_\alpha(X_m) = \frac{\sigma_m \varphi(z_\alpha)}{\alpha}$$

- σ_i, σ_m : abaterile standard ale băncii și pieței; ρ : corelația lor; φ : densitatea Normală standard
- de ex. $\beta = 1,2$, $\sigma_m = 1\%$, $\alpha = 5\%$: $\text{ES} = 2,06\%$, $\text{MES} = 2,47\%$

Noțiuni necesare azi (8/23): MES pe un grafic de dispersie



- other days
- market's worst 5%
- $q_{5\%}(X_m) = -1.64\%$
- mean of X_i there = $-MES$

- Zile simulate: $X_i = 1,2 X_m + e_i$, $\sigma_m = 1\%$
 - ▶ e_i : șocul propriu al băncii, independent de piață, cu abaterea standard 1%
- Roșu: cele 125 de zile cu $X_m \leq q_{5\%}(X_m)$
 - ▶ MES = minus media lui X_i în aceste zile (linia orizontală)
 - ▶ estimarea 2,57%, față de valoarea Normală $\beta ES = 2,47\%$: diferența este eroare de selecție din 125 de zile
- O bancă cu $\rho = 0$ ar avea $MES \approx 0$, oricât de volatilă ar fi
 - ▶ MES măsoară mișcarea comună în coadă, nu riscul propriu

Noțiuni necesare azi (9/23): Expunerea într-o criză: LRMES

- **Long-run MES (LRMES)** [Brownlees & Engle \(2017\)](#): scăderea așteptată a capitalului propriu al băncii dacă piața se prăbușește

$$\text{LRMES}_i = -\mathbb{E}[R_{i,t+1:t+h} \mid R_{m,t+1:t+h} < C]$$


- ▶ $R_{t+1:t+h}$: randamentul aritmetic în următoarele h zile; C : pragul de criză al pieței
- ▶ scenarii: $h = 22$ de zile, $C = -10\%$ (o lună); $h = 126$ de zile, $C = -40\%$ (șase luni)

- Prin simulare ([B6](#)): volatilități GARCH și corelație DCC, multe traiectorii, media pe traiectoriile de criză
- Printr-o aproximare din datele zilnice [Acharya, Engle & Richardson \(2012\)](#)

$$\text{LRMES}_i \approx 1 - \exp(-18 \text{MES}_i^{2\%}), \quad \text{MES}_i^{2\%} = -\mathbb{E}[X_i \mid X_m < -2\%]$$

- ▶ X ca fracții; $\text{MES}^{2\%}$: pierderea zilnică medie a băncii în zilele în care piața scade cu peste 2%; constanta 18 se derivă în [A5](#)

Noțiuni necesare azi (10/23): Expunerea într-o criză: SRISK



- **SRISK** Brownlees & Engle (2017): capitalul care i-ar lipsi băncii în criză

$$\text{SRISK} = k[D + (1 - \text{LRMES})W] - (1 - \text{LRMES})W$$

- ▶ k : raportul prudențial de capital; D : datoriile contabile; W : capitalul propriu la valoarea de piață; capitalul cerut minus capitalul rămas
- ▶ echivalent, $kD - (1 - k)(1 - \text{LRMES})W$

- Zero la levierul de echilibru L^*


$$L^* = 1 + \frac{(1 - k)(1 - \text{LRMES})}{k}, \quad L = \frac{D + W}{W}$$

- ▶ $L > L^*$: deficit (graficul: deasupra lui zero); un LRMES mai mare coboară L^*

- Exemplu: $W = 50$, $D = 500$, $k = 8\%$, $\text{LRMES} = 30\%$

- ▶ $\text{SRISK} = 40 - 0,92 \cdot 0,70 \cdot 50 = 7,8$;
 $L = 11 > L^* = 9,05$

Noțiuni necesare azi (11/23): Volatilitatea Parkinson din range-ul zilnic



□ Estimarea Parkinson $\hat{\sigma}_t = \sqrt{252 (\ln H_t - \ln L_t)^2 / (4 \ln 2)}$; H_t , L_t : maximul și minimul zilnic

- ▶ $4 \ln 2$ face ca $\hat{\sigma}_t^2$ să fie nedeplasat pentru un preț brownian fără drift; 252: anualizarea
- ▶ stînga: estimările zilnice (albastru) sînt zgomotoase în jurul volatilității simulate (roșu)
- ▶ dreapta: asimetria este 1,3 în nivel și 0,0 în logaritm; de aceea VAR-ul se estimează pe $\ln \hat{\sigma}_t$

Noțiuni necesare azi (12/23): Autoregresia vectorială (VAR)

- VAR(p) pentru vectorul y_t al celor N volatilități în logaritm: fiecare serie pe p laguri ale tuturor seriilor

$$y_t = c + A_1 y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + \varepsilon_t, \quad \mathbb{E}[\varepsilon_t] = 0, \quad \text{Cov}(\varepsilon_t) = \Sigma = (\sigma_{ij})$$

- c : N termeni liberi; A_l : matrice $N \times N$, $(A_l)_{ij}$ = efectul lui $y_{j,t-l}$ asupra lui $y_{i,t}$; ε_t : șocurile, necorelate în timp, dar corelate între bănci
- estimare prin OLS ecuație cu ecuație; $\hat{\Sigma}$: covarianța reziduurilor

- Ordinul ales prin BIC (B3): cea mai mică valoare a lui

$$\text{BIC}(p) = \ln \det \hat{\Sigma}_p + \frac{\ln T}{T} pN^2$$

- $\det \hat{\Sigma}_p$: dispersia generalizată a reziduurilor cu p laguri (potrivirea); pN^2 coeficienți; T : numărul de zile (penalizarea)

- Forma de medie mobilă a unui VAR stabil (valorile proprii ale matricei companion în interiorul cercului unitate)

$$y_t = \mu + \sum_{h \geq 0} \Phi_h \varepsilon_{t-h}, \quad \Phi_0 = I, \quad \Phi_h = \sum_{l=1}^{\min(h,p)} A_l \Phi_{h-l}$$

- μ : media lui y_t ; Φ_h : efectul după h zile al unui șoc de azi; VAR(1): $\Phi_h = A^h$

Noțiuni necesare azi (13/23): Răspunsurile la impuls: generalizate și Cholesky

- Șocurile sînt corelate, deci „un șoc doar la banca j ” trebuie definit
 - ▶ e_j : al j -lea vector unitar; σ_{jj} : dispersia lui $\varepsilon_{j,t}$
- Răspunsul **generalizat** Pesaran & Shin (1998): șocul j de o abatere standard, celelalte șocuri la media lor condiționată



$$\psi_j^g(h) = \Phi_h \Sigma e_j / \sqrt{\sigma_{jj}}$$

- ▶ $\Sigma e_j / \sqrt{\sigma_{jj}} = \mathbb{E}[\varepsilon_t \mid \varepsilon_{j,t} = \sqrt{\sigma_{jj}}]$ pentru șocuri Normale: se mișcă și băncile corelate; nu depinde de ordine
- Răspunsul **Cholesky** (ortogonalizat): $\Sigma = PP^\top$, P inferior triunghiulară

$$\psi_j^c(h) = \Phi_h P e_j$$

- ▶ prima variabilă preia întregul șoc comun, ultima nimic: ordinea decide
- ▶ pentru variabila pusă prima, cele două răspunsuri coincid

Noțiuni necesare azi (14/23): Răspunsurile la impuls ale unui VAR(1) simulat



● Generalized
 ■ Cholesky, variable 1 first
 ▲ Cholesky, variable 2 first

□ Două variabile: $A = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ 0,2 & 0,6 \end{pmatrix}$, $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0,4 \\ 0,4 & 1 \end{pmatrix}$

- ▶ stînga: cu y_2 prima, y_2 nu reacționează la impact ($h = 0$); generalizat și Cholesky cu y_1 prima coincid
- ▶ dreapta: proporția din dispersia lui y_2 datorată lui y_1 la $H = 10$: 40% sau 12% după ordinea Cholesky, 31% generalizat

Noțiuni necesare azi (15/23): Descompunerea dispersiei erorii de prognoză (FEVD)

- Eroarea de prognoză a lui y_i la H pași și dispersia ei

$$y_{t+H} - \mathbb{E}_t[y_{t+H}] = \sum_{h=0}^{H-1} \Phi_h \varepsilon_{t+H-h}, \quad \text{Var}_i(H) = \sum_{h=0}^{H-1} e_i^\top \Phi_h \Sigma \Phi_h^\top e_i$$

- FEVD generalizată Pesaran & Shin (1998):** proporția acestei dispersii datorată șocurilor lui j

$$\theta_{ij}(H) = \frac{\sigma_{jj}^{-1} \sum_{h=0}^{H-1} (e_i^\top \Phi_h \Sigma e_j)^2}{\text{Var}_i(H)}, \quad \tilde{\theta}_{ij}(H) = \frac{\theta_{ij}(H)}{\sum_{k=1}^N \theta_{ik}(H)}$$

- șocurile corelate sînt numărate la fiecare bancă afectată, deci $\sum_j \theta_{ij} > 1$; liniile se normalizează la suma 1 **Diebold & Yilmaz (2014)**

- FEVD Cholesky:** aceeași formulă cu $P e_j$ în locul lui $\Sigma e_j / \sqrt{\sigma_{jj}}$

$$\theta_{ij}^c(H) = \sum_{h=0}^{H-1} (e_i^\top \Phi_h P e_j)^2 / \text{Var}_i(H)$$

- liniile au suma exact 1, dar ponderile depind de ordine (B2); cu Σ diagonală cele două coincid

Noțiuni necesare azi (16/23): Măsurile de conectivitate

- Din tabelul normalizat $\tilde{\theta}_{ij}$ (linii: receptorii i , coloane: sursele j) Diebold & Yilmaz (2014)


$$F_i = \sum_{j \neq i} \tilde{\theta}_{ij}, \quad T_j = \sum_{i \neq j} \tilde{\theta}_{ij}, \quad \text{Net}_i = T_i - F_i, \quad C = \frac{100}{N} \sum_{i \neq j} \tilde{\theta}_{ij}$$

- ▶ F_i : primit de la ceilalți (suma liniei fără diagonală); T_j : transmis celorlalți (suma coloanei)
- ▶ $\text{Net}_i > 0$: transmițător net; C : conectivitatea totală, proporția (%) din dispersia erorilor de prognoză care trece de la o bancă la alta
- Exemplu: două bănci, liniile (0,7; 0,3) și (0,2; 0,8)
 - ▶ $F_1 = 0,3$, $F_2 = 0,2$; $T_1 = 0,2$, $T_2 = 0,3$
 - ▶ Net: banca 1 $-0,1$ (receptor), banca 2 $+0,1$ (transmițător); $C = \frac{100}{2}(0,3 + 0,2) = 25\%$

Noțiuni necesare azi (17/23): Un tabel de conectivitate și rețeaua lui

100 $\tilde{\theta}_{ij}(10)$ (%)				
Variance of bank i	1	2	3	4
1 -	67	17	11	6
2 -	27	54	12	8
3 -	22	17	55	7
4 -	13	10	16	60
To -	62	44	39	21
	1	2	3	4
	Shock in bank j			
	From			
	C 41			

Net pairwise spillovers



■ Net transmitter ($T_i - F_i > 0$)
 ■ Net receiver
 ➔ Arrow $j \rightarrow i$: $\tilde{\theta}_{ij} > \tilde{\theta}_{ji}$

- Un VAR(1) simulat pentru patru bănci, în care banca 1 le influențează pe celelalte cu întârziere; $H = 10$
 - ▶ Stînga: tabelul în %; ultima coloană F_i , ultimul rînd T_j , colțul $C = 41\%$
 - ▶ Dreapta: banca 1 este singurul transmițător net (+29); săgețile arată fluxurile nete pe perechi $\tilde{\theta}_{ij} - \tilde{\theta}_{ji}$


Noțiuni necesare azi (18/23): Bootstrap-ul pe blocuri mobile

- Incertitudinea de eșantionare a unei estimări $\hat{\theta}$ (de ex. ΔCoVaR , C) fără o formulă
 - ▶ $\hat{\theta}_b^*$: estimarea recalculată pe eșantionul bootstrap $b = 1, \dots, B$ ($B = 999$)
- **Blocuri mobile Künsch (1989)**: lipim $\lceil n/\ell \rceil$ blocuri $(X_s, \dots, X_{s+\ell-1})$ cu începuturi s aleatoare
 - ▶ $\ell = 20$ de zile păstrează volatility clustering în fiecare bloc; bootstrap-ul i.i.d. ($\ell = 1$) îl distruge
 - ▶ se reeșantionează zile întregi (toate băncile împreună), deci dependența dintre bănci se păstrează
 - ▶ VAR (B3): blocuri de reziduuri $\hat{\varepsilon}_t$, apoi $y_t^* = \hat{c} + \sum_l \hat{A}_l y_{t-l}^* + \varepsilon_t^*$
- Ce raportăm

$$CI_{95\%} = [\hat{\theta}_{(2,5\%)}^*, \hat{\theta}_{(97,5\%)}^*], \quad se = sd(\hat{\theta}_1^*, \dots, \hat{\theta}_B^*), \quad z = \hat{\theta}/se$$

- ▶ intervalul percentil; eroarea standard bootstrap; pentru $H_0: \theta = 0$, $p = 2(1 - \Phi(|z|))$, respingem la 5% dacă $|z| > 1,96$

Noțiuni necesare azi (19/23): Blocuri față de reeșantionarea i.i.d.



□ O serie GARCH simulată ($T = 2000$ de zile) cu volatility clustering

- ▶ Stînga: reeșantionările pe blocuri păstrează autocorelația lui $|r_t|$ pînă la aproximativ $\ell = 20$ de laguri; cele i.i.d. nu o au deloc
- ▶ Dreapta: intervalul pe blocuri pentru abaterea standard este de aproximativ două ori mai larg ($[1,15; 1,33]$ față de $[1,19; 1,29]$): bootstrap-ul i.i.d. supraestimează precizia

Noțiuni necesare azi (20/23): Multe teste simultan: Holm, Wald și Spearman

- **Corecția step-down Holm (1979):** m teste, p-value-urile ordonate $p_{(1)} \leq \dots \leq p_{(m)}$

respingem $H_{(k)}$ cât timp $p_{(k)} \leq \frac{0,05}{m - k + 1}$, $k = 1, 2, \dots$; ne oprim la primul eșec

- ▶ rata erorii pe familie (FWER) $\leq 5\%$: probabilitatea a cel puțin unei respingeri false, validă sub orice dependență

- **Testul Wald** că cele m contribuții sînt egale (B1, B4)


$$W = \hat{d}^\top \hat{V}^{-1} \hat{d} \sim \chi_{m-1}^2 \text{ sub } H_0$$

- ▶ $\hat{d}$: cele $m - 1$ diferențe $\widehat{\Delta \text{CoVaR}}_i - \widehat{\Delta \text{CoVaR}}_m$; $\hat{V}$: covarianța lor pe extrageri bootstrap comune
- ▶ folosește corelația estimărilor, pe care intervalele separate o ignoră; respingem dacă W depășește cuantila de 95% a lui χ_{m-1}^2

- Corelația de rang **Spearman** a două clasamente ale celor n bănci (B4)

- ▶ $r_S = 1 - 6 \sum_i d_i^2 / (n(n^2 - 1))$, d_i : diferența celor două ranguri ale băncii i ; 1: aceeași ordine, -1: ordine inversă

Noțiuni necesare azi (21/23): Pragurile Holm și distribuția de referință χ^2



- Stînga: 15 p-value-uri simulate (4 din ipoteze nule false); 5 sînt sub 0,05, Holm păstrează 4
 - pragul crește de la $0,05/15 = 0,0033$ la 0,05; testarea se oprește la primul punct de deasupra pragului său
- Dreapta: χ^2_5 , referința testului Wald pentru șase bănci; valoarea critică de 5% este 11,07
 - p-value-ul = aria din dreapta lui W observat: $W = 8,0$ dă $p = 0,156$, nu respingem

Noțiuni necesare azi (22/23): Pachetele de extindere: variante de CoVaR și teste

- CoVaR condiționat de pierderi cel puțin egale cu VaR Girardi & Ergün (2013) (A4, B5)

$$P(X^{sys} \leq -\text{CoVaR}_\alpha^{\leq} \mid X_i \leq q_\alpha(X_i)) = \alpha$$

- condiționează pe întreaga coadă a băncii, nu pe un punct; mai mare decât CoVaR când $\rho > 0$

- Testul Kupiec al ratei depășirilor Banulescu-Radu, Hurlin, Leymarie & Scaillet (2021): x evenimente în n zile, rata nominală π_0 , $\hat{\pi} = x/n$

$$LR = -2[x \ln \pi_0 + (n - x) \ln(1 - \pi_0) - x \ln \hat{\pi} - (n - x) \ln(1 - \hat{\pi})] \sim \chi_1^2$$

- respingem la 5% dacă $LR > 3,84$; pentru evenimentul comun CoVaR $\pi_0 = \alpha^2$; puterea: probabilitatea de a respinge o rată greșită

- Erorile standard Newey–West Newey & West (1987) (B8): OLS cu erori autocorelate

$$\hat{\Omega} = \hat{\Gamma}_0 + \sum_{l=1}^L \left(1 - \frac{l}{L+1}\right) (\hat{\Gamma}_l + \hat{\Gamma}_l^\top), \quad \hat{\Gamma}_l = \frac{1}{T} \sum_t \hat{u}_t \hat{u}_{t-l} x_t x_{t-l}^\top$$

- $\hat{u}_t$: reziduul, x_t : regresorii, L : lagurile; $\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}) = (X^\top X)^{-1} T \hat{\Omega} (X^\top X)^{-1}$; necesare pentru ferestrele mobile suprapuse

Noțiuni necesare azi (23/23): Pachetele de extindere: GARCH–DCC și testele de stres

- GJR–GARCH(1,1) (B6, B7): veștile proaste măresc dispersia mai mult

$$\sigma_t^2 = \omega + (\alpha_G + \gamma 1\{r_{t-1} < 0\})r_{t-1}^2 + \beta_G \sigma_{t-1}^2$$

- ▶ $\omega > 0$; α_G : reacția la știri; $\gamma > 0$: reacția suplimentară la pierderi; β_G : memoria; persistența $\alpha_G + \gamma/2 + \beta_G < 1$

- DCC(1,1): o corelație variabilă în timp a reziduurilor standardizate ε_t

- ▶ $Q_t = (1 - a - b)\bar{Q} + a\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1}^\top + bQ_{t-1}$, $\rho_t = Q_{12,t}/\sqrt{Q_{11,t}Q_{22,t}}$; $\bar{Q}$: covarianța de selecție a lui ε_t

- Testul invers de stres (A7, A8): cea mai probabilă mișcare a factorilor f cu pierderea ℓ^* , $f \sim N(0, \Sigma)$

- ▶ maximizăm densitatea, adică minimizăm pătratul distanței Mahalanobis $d^2 = f^\top \Sigma^{-1} f$, cu restricția $-b^\top f = \ell^*$ (b : expunerile)
- ▶ d : distanța în abateri standard care ține cont de corelație; factori Student- t (A8): aceeași direcție, probabilitate mai mare în coadă


A1 [Rezolvat]: derivarea CoVaR sub distribuția Normală — enunț

- ▣ **Întrebarea:** Cît adaugă o bancă aflată în dificultate la pierderea din coadă a sistemului când randamentele au distribuția Normală?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ (X_i, X^{sys}) : randamentele zilnice (%) ale băncii i și ale sistemului, cu distribuție Normală bivariată, medii zero, abateri standard σ_i, σ_{sys} și corelație $\rho > 0$
 - ▶ Dificultatea băncii: $X_i = q_\alpha(X_i) = \sigma_i z_\alpha$, cu $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha) < 0$; starea mediană: $X_i = 0$; CoVaR este minus cuantila α a lui X^{sys} , o pierdere pozitivă [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#)
 - ▶ Cifrele pentru (c): $\sigma_i = 2\%$, $\sigma_{sys} = 1,5\%$, $\rho = 0,6$, $\alpha = 1\%$
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Proiectați X^{sys} pe X_i și determinați distribuția lui X^{sys} condiționată de $X_i = x$ (media și dispersia).
 - (b) Derivați CoVaR_α (condiționat de $X_i = \sigma_i z_\alpha$), CoVaR în starea mediană (condiționat de $X_i = 0$) și $\Delta\text{CoVaR}_\alpha$ ca diferența lor; arătați că $\Delta\text{CoVaR}_\alpha$ nu depinde de σ_i .
 - (c) Calculați VaR 1% al băncii, CoVaR 1%, CoVaR în starea mediană și ΔCoVaR 1% pentru cifrele de mai sus.
- ▣ **Raportați**
 - ▶ Media și abaterea standard condiționate, cele trei formule închise de la (b) și cele patru cifre de la (c), cu fiecare produs intermediar
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ O bancă de două ori mai volatilă, cu același ρ , are același ΔCoVaR : ce implică acest rezultat pentru ordonarea băncilor după propriul VaR?
- ▣ Notebook: secțiunea [A1](#)

A1 [Rezolvat]: rezolvare (1/3)

- (a) Proiecția: $X^{sys} = \beta X_i + U$ cu $\beta = \text{Cov}(X^{sys}, X_i) / \sigma_i^2 = \rho \sigma_{sys} / \sigma_i$, iar U are distribuția Normală și este independentă de X_i .
- Dispersia reziduului: $\text{Var}(U) = \sigma_{sys}^2 - \beta^2 \sigma_i^2 = \sigma_{sys}^2 (1 - \rho^2)$.
- Rezultat: $X^{sys} \mid X_i = x \sim N\left(\rho \frac{\sigma_{sys}}{\sigma_i} x, \sigma_{sys}^2 (1 - \rho^2)\right)$.
- (b) Cuantila de ordin α , condiționată de x , este $\rho \frac{\sigma_{sys}}{\sigma_i} x + \sigma_{sys} \sqrt{1 - \rho^2} z_\alpha$.
- La $x = \sigma_i z_\alpha$: $\text{CoVaR}_\alpha = -\sigma_{sys} z_\alpha (\rho + \sqrt{1 - \rho^2})$; la $x = 0$: $\text{CoVaR}_\alpha^{50\%} = -\sigma_{sys} \sqrt{1 - \rho^2} z_\alpha$.
- Diferența: $\Delta \text{CoVaR}_\alpha = -\rho \sigma_{sys} z_\alpha$; σ_i se simplifică, pentru că starea de dificultate x crește cu σ_i , iar panta scade cu $1/\sigma_i$.

A1 [Rezolvat]: rezolvare (2/3)



A1 [Rezolvat]: rezolvare (3/3)

- Albastru: sistemul cînd banca este la mediană; roșu: cînd banca este la VaR 1%; hașurat: cozile de 1%; distanța dintre liniile întrerupte este $\Delta\text{CoVaR } 1\%$
- (c) $z_{1\%} = -2,326$; VaR 1% al băncii:
 $-\sigma_i z_{1\%} = 2 \cdot 2,326 = 4,65\%$.
- Panta $\rho\sigma_{\text{sys}}/\sigma_i = 0,6 \cdot 1,5/2 = 0,45$; abaterea standard condiționată $1,5\sqrt{1 - 0,36} = 1,20\%$.
- CoVaR 1%:
 $0,45 \cdot 4,65 + 1,20 \cdot 2,326 = 2,094 + 2,792 = 4,885\%$.
- Starea mediană: $1,20 \cdot 2,326 = 2,792\%$; deci
 $\Delta\text{CoVaR}_{1\%} = 0,6 \cdot 1,5 \cdot 2,326 = 2,094\%$, primul termen de mai sus.
- Interpretare: cînd banca trece de la mediană la VaR, sistemul pierde în plus aproximativ 2,09 puncte; dublarea lui σ_i dublează VaR, dar lasă ΔCoVaR neschimbat.
- Riscul propriu și contribuția la riscul sistemic sînt mărimi diferite: un clasament după VaR nu este un clasament sistemic.

A2 [Rezolvat]: MES ca contribuție Euler — enunț (1/2)

- ▣ **Întrebarea:** De ce suma ponderată a valorilor MES ale activelor este exact ES al portofoliului?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Portofoliul $X_p = \sum_i w_i X_i$ de randamente zilnice, cu distribuție continuă; $q_\alpha(w)$ este cuantila lui de ordin α
 - ▶ $ES_\alpha(X_p) = -\frac{1}{\alpha} \mathbb{E}[X_p \mathbf{1}\{X_p \leq q_\alpha\}]$ și $MES_{i,\alpha} = -\mathbb{E}[X_i \mid X_p \leq q_\alpha]$ [Acharya et al. \(2017\)](#)
 - ▶ Datele pentru (c): randamente cu distribuția Normală multivariată, medii zero, $w = (0,5; 0,5)$, $\sigma = (2\%, 3\%)$, $\rho = 0,5$, $\alpha = 5\%$
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Derivați ES_α în raport cu w_i , inclusiv efectul lui w_i asupra cuantilei, pentru a arăta că $\partial ES_\alpha / \partial w_i = MES_{i,\alpha}$; apoi folosiți omogenitatea pentru a arăta că $ES_\alpha = \sum_i w_i MES_{i,\alpha}$.
 - (b) Pentru randamente cu distribuție Normală multivariată și medii zero, arătați că $MES_{i,\alpha} = \beta_{i,p} ES_\alpha(X_p)$ cu $\beta_{i,p} = \text{Cov}(X_i, X_p) / \sigma_p^2$ și $ES_\alpha(X_p) = \sigma_p \varphi(z_\alpha) / \alpha$.
 - (c) Calculați σ_p , $ES_{5\%}$, ambele beta și ambele MES pentru cifrele de mai sus și verificați suma Euler.

A2 [Rezolvat]: MES ca contribuție Euler — enunț (2/2)

□ Raportați

► σ_p , $\varphi(z_{5\%})/0,05$, $ES_{5\%}$, β , MES și verificarea $\sum_i w_i MES_i = ES_{5\%}$

□ Interpretare

► Activul 2 reprezintă jumătate din portofoliu: ce proporție din ES îi revine?

► De ce este MES, nu volatilitatea, cheia potrivită pentru alocarea riscului din coadă (tail risk)?

□ Notebook: secțiunea [A2](#)

A2 [Rezolvat]: rezolvare (1/2)

- (a) Scriem $\alpha \text{ES}_\alpha = -\mathbb{E}[X_p 1\{X_p \leq q(w)\}]$; derivând sub semnul speranței matematice obținem termenul direct $-\mathbb{E}[X_i 1\{X_p \leq q\}]$.
- Termenul de frontieră este $-q \frac{\partial}{\partial w_i} P(X_p \leq q(w))$: masa de probabilitate care traversează frontiera, unde $X_p = q$.
- $P(X_p \leq q(w)) = \alpha$ pentru orice w , deci această derivată este zero și $\partial \text{ES}_\alpha / \partial w_i = -\frac{1}{\alpha} \mathbb{E}[X_i 1\{X_p \leq q\}] = \text{MES}_{i,\alpha}$.
- Omogenitatea: $\text{ES}_\alpha(tX_p) = t \text{ES}_\alpha(X_p)$, deci teorema lui Euler dă $\text{ES}_\alpha = \sum_i w_i \partial \text{ES}_\alpha / \partial w_i = \sum_i w_i \text{MES}_{i,\alpha}$ [Gouriéroux, Laurent & Scaillet \(2000\)](#).
- (b) Regresia Normală: $\mathbb{E}[X_i | X_p] = \beta_{i,p} X_p$, deci $\text{MES}_{i,\alpha} = -\beta_{i,p} \mathbb{E}[X_p | X_p \leq q] = \beta_{i,p} \text{ES}_\alpha(X_p)$.
- Pentru $X_p \sim N(0, \sigma_p^2)$, $\text{ES}_\alpha = \sigma_p \varphi(z_\alpha) / \alpha$; iar $\sum_i w_i \beta_{i,p} = w^\top \Sigma w / \sigma_p^2 = 1$ confirmă suma Euler.

A2 [Rezolvat]: rezolvare (2/2)

- (c) Covarianța $\rho\sigma_1\sigma_2 = 0,5 \cdot 2 \cdot 3 = 3$; $\sigma_p^2 = 0,25 \cdot 4 + 2 \cdot 0,25 \cdot 3 + 0,25 \cdot 9 = 4,75$, deci $\sigma_p = 2,179\%$.
- $\varphi(z_{5\%})/0,05 = 2,063$, deci $ES_{5\%} = 2,179 \cdot 2,063 = 4,50\%$.
- $\text{Cov}(X_i, X_p) = (\Sigma w)_i = (3,5; 6,0)$; $\beta = (3,5; 6,0)/4,75 = (0,737; 1,263)$.
- $MES = \beta \cdot 4,50 = (3,31; 5,68)\%$; verificare: $0,5(3,31 + 5,68) = 4,50\% = ES_{5\%}$.
- Interpretare: cu o pondere de jumătate în portofoliu, activului 2 îi revine 63% din ES, pentru că este mai puternic corelat cu portofoliul în coada distribuției.
- MES împarte aditiv pierderea din coadă și folosește variația comună cu portofoliul, pe care volatilitatea singură o ignoră.

A3 [Rezolvat]: derivarea FEVD generalizate — enunț (1/2)

- ▣ **Întrebarea:** Cum se împarte dispersia erorii de prognoză a unei bănci între șocurile tuturor băncilor?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ VAR(1) stabil $y_t = Ay_{t-1} + \varepsilon_t$ (valorile proprii ale lui A în interiorul cercului unitate), ε_t necorelate serial, cu medie zero și distribuția Normală multivariată, cu $\text{Cov}(\varepsilon_t) = \Sigma = (\sigma_{ij})$ pozitiv definită; matricele reprezentării de tip medie mobilă $\Phi_h = A^h$; e_j este al j -lea vector unitar
 - ▶ Impulsul generalizat Pesaran & Shin (1998): un șoc de o abatere standard $\delta_j = \sqrt{\sigma_{jj}}$ asupra variabilei j , celelalte șocuri la media lor condiționată
 - ▶ Cifrele pentru (b): $A = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{pmatrix}$, $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0,5 \\ 0,5 & 1 \end{pmatrix}$
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Arătați că $\mathbb{E}[\varepsilon_t | \varepsilon_{jt} = \delta_j] = \Sigma e_j / \sqrt{\sigma_{jj}}$ și derivați ponderea $\theta_{ij}(H)$ din dispersia erorii de prognoză la H pași a lui i datorată șocurilor lui j .
 - (b) Calculați θ , sumele pe linii, tabelul normalizat pe linii $\tilde{\theta}$ și conectivitatea totală C la $H = 1$ și $H = 2$.
 - (c) Calculați descompunerea Cholesky la $H = 1$ cu variabila 1 prima și arătați că, pentru Σ diagonală, descompunerea generalizată și cea Cholesky coincid.

A3 [Rezolvat]: derivarea FEVD generalizate — enunț (2/2)

▣ Raportați

- ▶ θ și $\tilde{\theta}$ cu sumele pe linii și C la $H = 1, 2$, cu $A\Sigma$ și $\text{diag}(A\Sigma A^\top)$; tabelul Cholesky

▣ Interpretare

- ▶ De ce nu însumează unu liniile tabelului generalizat?
- ▶ Ce decide ordinea Cholesky?

▣ Notebook: secțiunea A3

A3 [Rezolvat]: rezolvare (1/3)

- (a) Pentru șocuri Normale $\mathbb{E}[\varepsilon_t \mid \varepsilon_{jt}] = \Sigma e_j \varepsilon_{jt} / \sigma_{jj}$; la $\varepsilon_{jt} = \sqrt{\sigma_{jj}}$ aceasta este $\Sigma e_j / \sqrt{\sigma_{jj}}$.
- Răspunsul variabilei i după h pași: $e_i^\top \Phi_h \Sigma e_j / \sqrt{\sigma_{jj}}$; dispersia erorii de prognoză la H pași a lui i este $\sum_{h < H} e_i^\top \Phi_h \Sigma \Phi_h^\top e_i$.
- Ponderea: $\theta_{ij}(H) = \frac{\sigma_{jj}^{-1} \sum_{h < H} (e_i^\top \Phi_h \Sigma e_j)^2}{\sum_{h < H} e_i^\top \Phi_h \Sigma \Phi_h^\top e_i}$.
- Normalizarea $\tilde{\theta}_{ij} = \theta_{ij} / \sum_j \theta_{ij}$ și conectivitatea totală $C = \frac{100}{N} \sum_{i \neq j} \tilde{\theta}_{ij}$ Diebold & Yilmaz (2014).

A3 [Rezolvat]: rezolvare (2/3)

- (b) $H = 1$ ($\Phi_0 = I$): $\theta_{ij} = \sigma_{ij}^2 / (\sigma_{ii} \sigma_{jj})$, deci $\theta = \begin{pmatrix} 1 & 0,25 \\ 0,25 & 1 \end{pmatrix}$, sumele pe linii 1,25.
- Normalizat: $\tilde{\theta} = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,2 & 0,8 \end{pmatrix}$, deci $C = 100(0,2 + 0,2)/2 = 20,0\%$.
- $H = 2$ adaugă $\Phi_1 = A$: $A\Sigma = \begin{pmatrix} 0,60 & 0,45 \\ 0,30 & 0,45 \end{pmatrix}$, $\text{diag}(A\Sigma A^\top) = (0,39; 0,21)$; numitorii 1,39 și 1,21.
- Numărătorii $\sigma_{ij}^2 + (A\Sigma)_{ij}^2$: linia 1 (1,3600; 0,4525), linia 2 (0,3400; 1,2025); deci $\theta = \begin{pmatrix} 0,978 & 0,326 \\ 0,281 & 0,994 \end{pmatrix}$, sumele pe linii 1,304 și 1,275.
- Ponderile normalizate din afara diagonalei 0,250 și 0,220, deci $C = 100(0,250 + 0,220)/2 = 23,5\%$.

A3 [Rezolvat]: rezolvare (3/3)

- ▣ (c) Cholesky cu variabila 1 prima: $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0,5 & \sqrt{0,75} \end{pmatrix}$, $PP^\top = \Sigma$; la $H = 1$ ponderile sînt pătratele elementelor de pe liniile lui P : (1, 0) și (0,25; 0,75).
- ▣ Întregul șoc comun este atribuit variabilei 1, prima în ordine.
- ▣ Σ diagonală: $\Sigma e_j / \sqrt{\sigma_{jj}} = \sqrt{\sigma_{jj}} e_j = P e_j$ cu $P = \Sigma^{1/2}$ factorul Cholesky diagonal: impulsurile coincid, iar liniile însumează deja unu.
- ▣ Interpretare: liniile lui θ depășesc unu pentru că un șoc corelat este numărat la ambele variabile; normalizarea corectează suma fără să impună o ordine.
- ▣ Cu Cholesky, ordinea, nu datele, decide cine primește șocul comun; legăturile întîrziate din A cresc C de la 20,0% la 23,5% între $H = 1$ și $H = 2$.

B1 [Rezolvat]: ΔCoVaR 5% pentru băncile americane, cu teste — enunț (1/2)

- **Întrebarea:** Diferă cele șase bănci americane prin contribuția lor la riscul sistemic?
- **Date și ipoteze**
 - ▶ Prețurile ajustate ale celor șase bănci americane (datele cursului): JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo
 - ▶ Eșantion: 5 ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026, 3 960 de zile de tranzacționare comune celor 13 bănci și celor patru indici (alinăm întâi prețurile pe zilele comune, apoi calculăm randamentele log zilnice în %)
 - ▶ Sistemul băncii i : portofoliul cu ponderi egale al celorlalte cinci bănci [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#); nivelul $\alpha = 5\%$, aproximativ 198 de zile în coadă
- **Cerințe**
 - (a) Pentru fiecare bancă, estimați regresia cuantilă $q_{5\%}(X_t^{\text{sys}} \mid X_{i,t}) = a_{5\%} + b_{5\%}X_{i,t}$ și calculați VaR 5%, CoVaR 5% și ΔCoVaR 5% cu formulele din [Noțiuni necesare \(3/23\)](#).
 - (b) Construiți intervale percentile de 95% pentru ΔCoVaR cu bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile) [Künsch \(1989\)](#) și cu bootstrap i.i.d., câte 999 de reeșantionări.
 - (c) Testați $H_0 : b_{5\%} = b_{50\%}$ pentru fiecare bancă cu $z = (\hat{b}_{5\%} - \hat{b}_{50\%})/\text{se}$ (se din bootstrap pe blocuri) la nivelul de 5%, cu și fără corecția Holm [Holm \(1979\)](#).
 - (d) Testați egalitatea ΔCoVaR pentru cele 15 perechi pe extrageri comune (aceleași zile reeșantionate pentru toate băncile), cu Holm, și pentru toate cele șase bănci împreună, cu un test Wald (χ_5^2).

B1 [Rezolvat]: ΔCoVaR 5% pentru băncile americane, cu teste — enunț (2/2)

□ Raportați

- ▶ Un tabel cu $\hat{b}_{5\%}$, ΔCoVaR , ambele intervale, $\hat{b}_{5\%} - \hat{b}_{50\%}$ și p-value-ul; un grafic cu cele două intervale pentru fiecare bancă
- ▶ Numărul respingerilor la (c) și (d), brut și după Holm; statistica Wald, p-value-ul și decizia

□ Interpretare

- ▶ De ce este intervalul pe blocuri mai larg decât cel i.i.d.?
- ▶ Pot intervalele marginale suprapuse să ascundă o diferență semnificativă?
- ▶ De ce este banca i exclusă din propriul sistem?

□ Notebook: secțiunea B1

B1 [Rezolvat]: rezolvare (1/4)


- Pasul 1: pentru fiecare bancă, randamentul sistemului este $X_t^{\text{sys}} = \frac{1}{5} \sum_{j \neq i} X_{j,t}$; estimăm regresiile cuantile la 5% și la 50%.
- Pasul 2: înlocuim cuantilele empirice: $\text{CoVaR}_{5\%} = -(\hat{a} + \hat{b}\hat{q}_{5\%})$ și $\Delta\text{CoVaR}_{5\%} = \hat{b}(\hat{q}_{50\%} - \hat{q}_{5\%})$.
- Exemplu, JPMorgan: $\text{VaR } 5\% = 2,66\%$, $\hat{q}_{50\%} - \hat{q}_{5\%} = 2,74$, $\hat{b}_{5\%} = 0,96$, deci $\Delta\text{CoVaR}_{5\%} = 0,96 \cdot 2,74 = 2,62\%$; $\text{CoVaR } 5\% = 3,81\%$.
- Pasul 3: extragem 999 de eșantioane din blocuri de 20 de zile (bootstrap pe blocuri) și 999 din zile individuale (i.i.d.), reestimăm pe fiecare și luăm percentilele 2,5% și 97,5%.
- Pasul 4: în fiecare extragere pe blocuri calculăm toate cele șase $\hat{b}_{5\%} - \hat{b}_{50\%}$ și toate cele șase ΔCoVaR pe aceleași zile; abaterile standard ale extragerilor sînt erorile standard, iar covarianța lor intră în testul Wald.

B1 [Rezolvat]: rezolvare (2/4)

	$\hat{b}_{5\%}$	ΔCoVaR	interval 95% blocuri	interval 95% i.i.d.	$\hat{b}_{5\%} - \hat{b}_{50\%}$	p
JPMorgan	0,96	2,62	[2,33; 2,98]	[2,43; 2,82]	-0,002	0,878
Bank of America	0,76	2,45	[2,08; 2,79]	[2,23; 2,63]	-0,017	0,425
Citigroup	0,72	2,38	[2,07; 2,64]	[2,20; 2,56]	-0,040	0,019
Goldman Sachs	0,89	2,54	[2,18; 2,91]	[2,30; 2,80]	0,044	0,048
Morgan Stanley	0,72	2,43	[2,05; 2,76]	[2,19; 2,66]	-0,009	0,746
Wells Fargo	0,81	2,34	[2,04; 2,77]	[2,15; 2,61]	0,032	0,221

- (a) Toate cele șase contribuții sînt între 2,34% și 2,62% pierdere suplimentară a sistemului; pantele sînt între 0,72 și 0,96.
- (b) Intervalele pe blocuri sînt mai largi (JPMorgan: lățime 0,65 față de 0,39 puncte): zilele din coadă se grupează în crize, iar bootstrap-ul i.i.d. desparte grupările.

B1 [Rezolvat]: rezolvare (3/4)



B1 [Rezolvat]: rezolvare (4/4)

- (c) Citigroup: $z = -0,040/0,017 = -2,34$, $p = 0,019$, ipoteza este respinsă la 5%; JPMorgan: $z = -0,15$, $p = 0,878$, ipoteza nu este respinsă; în total, ipoteza este respinsă pentru 2 din 6 bănci și pentru 0 după Holm.
- (d) 2 din 15 perechi diferă la 5%, 0 după Holm; Wald $\chi^2_5 = 14,2$, $p = 0,014 < 0,05$: respingem ipoteza că toate cele șase contribuții sînt egale.
- Interpretare: testul comun detectează diferențe pe care intervalele marginale suprapuse le ascund, pentru că folosește corelația pozitivă a estimărilor între bănci.
- Banca i este exclusă din sistem: altfel X_i ar apărea de ambele părți ale regresiei și ar adăuga o autocontribuție mecanică la $\hat{b}$ (cu w ponderea băncii în sistem și b panta față de restul, panta devine $w + (1 - w)b$).

B2 [Rezolvat]: robustețea indicelui de conectivitate — enunț

- ▣ **Întrebarea:** Cât de mult schimbă alegerile de modelare indicele de conectivitate?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Prețurile maxime și minime zilnice ale celor 13 bănci (datele cursului; șase americane, cinci europene, Banca Transilvania și BRD), 2010–2026, zile comune
 - ▶ Volatilitatea Parkinson $\hat{\sigma}_t$ din [Noțiuni necesare \(11/23\)](#), folosită în logaritm; ordinea variabilelor: băncile americane primele, cele românești ultimele
 - ▶ Conectivitatea generalizată [Diebold & Yilmaz \(2014\)](#) cu descompunerea din [Pesaran & Shin \(1998\)](#) (A3)
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Estimați $\text{VAR}(p)$ prin OLS pentru $p = 1, \dots, 4$ și calculați conectivitatea totală C la $H = 5, 10, 20$ (12 valori).
 - (b) Cu $p = 1$, $H = 10$, calculați C și poziția netă însumată a celor șase bănci americane cu descompunerea generalizată și cu Cholesky, cu băncile americane primele și cu cele românești primele.
- ▣ **Raportați**
 - ▶ Tabelul 4×3 și graficul de la (a); cele trei totaluri și cele trei poziții nete de la (b)
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ Ce alegere metodologică modifică cel mai mult indicele?
 - ▶ De ce schimbă ordinea Cholesky poziția netă a băncilor americane?
- ▣ Notebook: secțiunea [B2](#)


B2 [Rezolvat]: rezolvare (1/3)

- Pași: (1) logaritmul volatilităților Parkinson; (2) $\text{VAR}(p)$ cu termen liber prin OLS și covarianța reziduurilor $\hat{\Sigma}$; (3) Φ_h pentru $h < H$; (4) ponderile generalizate, liniile normalizate; (5) $C = \frac{100}{13} \sum_{i \neq j} \tilde{\theta}_{ij}$.

C (%)	$H = 5$	$H = 10$	$H = 20$
VAR(1)	63,9	64,9	64,9
VAR(2)	61,3	63,9	64,6
VAR(3)	59,8	62,9	64,2
VAR(4)	58,8	62,0	63,8

- (a) Indicele variază între 58,8% ($p = 4$, $H = 5$) și 64,9% ($p = 1$, $H = 20$): o amplitudine de 6,1 puncte pentru toate cele 12 alegeri.

B2 [Rezolvat]: rezolvare (2/3)




B2 [Rezolvat]: rezolvare (3/3)

- (b) Totaluri: Cholesky 44,1% (americane primele) și 43,5% (românești primele), față de generalizat 64,9%.
- Poziția netă a băncilor americane: +65,9 (americane primele), -96,0 (românești primele), +53,2 (generalizat).
- Interpretare: alegerea descompunerii schimbă cel mai mult indicele; Cholesky atribuie șocul comun variabilelor puse primele, deci ordinea, nu datele, decide cine transmite: folosiți descompunerea generalizată.

B3 [Rezolvat]: spillover-urile nete identificate de date — enunț

- ▣ **Întrebarea:** Ce etichete de transmițător și receptor din rețea rezistă erorii de estimare?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Logaritmul volatilităților Parkinson ale celor 13 bănci (B2), 2010–2026; ordinul VAR $p = 2$ ales prin BIC (până la 5 laguri), $H = 10$, descompunerea generalizată Diebold & Yilmaz (2014)
 - ▶ Fereastra vârfului din 2020 al indicelui pe ferestre mobile: cele 250 de zile până la 2020-08-27, VAR(2), ca la indicele pe ferestre mobile
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Construiți 999 de eșantioane bootstrap: reeșantionați reziduurile VAR în blocuri de 20 de zile, reconstruiți seriile cu VAR-ul estimat, reestimați VAR-ul și recalculați tabelul de conectivitate.
 - (b) Raportați intervalele percentile de 95% pentru C și pentru cele 13 poziții nete; numiți o bancă transmițător (receptor) doar dacă intervalul ei se află integral deasupra (sub) zero.
 - (c) Repetați (a)–(b) pentru C în fereastra vârfului și comparați media bootstrap cu estimarea.
- ▣ **Raportați**
 - ▶ C cu intervalul; un grafic cu cele 13 poziții nete și intervalele lor; băncile identificate; estimarea, intervalul și media bootstrap în fereastra vârfului
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ Ce etichete de „transmițător” și „receptor” rezistă?
 - ▶ De ce diferă, în fereastra scurtă, media bootstrap a lui C de estimarea punctuală?
- ▣ Notebook: secțiunea B3

B3 [Rezolvat]: rezolvare (1/3)



B3 [Rezolvat]: rezolvare (2/3)

- Pași: (1) VAR(2) prin OLS, reziduurile $\hat{\varepsilon}_t$; (2) reeșantionăm blocuri de 20 de zile din $\hat{\varepsilon}_t$; (3) reconstruim $y_t^* = \hat{c} + \sum_{l=1}^2 \hat{A}_l y_{t-l}^* + \varepsilon_t^*$ ($\hat{c}$, $\hat{A}_l$: constantele și coeficienții VAR estimați, ε_t^* : reziduurile reeșantionate), pornind de la primele 2 valori observate; (4) reestimăm, recalculăm tabelul; (5) percentilele pe 999 de extrageri.
- Pozițiile nete cu intervale de 95%; o etichetă este identificată doar dacă intervalul ei exclude zero.

B3 [Rezolvat]: rezolvare (3/3)

- (a)–(b) Întreaga perioadă: $C = 63,9\%$, interval $[59,9; 65,8]$.
- 8 din 13 poziții nete exclud zero: JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, Deutsche Bank, HSBC, Banca Transilvania, BRD-Groupe SG; celelalte cinci etichete nu sînt identificate.
- (c) Vîrfurile din 2020 (250 de zile pînă la 2020-08-27): $C = 79,3\%$, interval $[65,9; 83,0]$, media bootstrap $75,8\%$, adică $-3,5$ puncte față de estimare.
- Interpretare: diferența dintre media bootstrap și estimare este o estimare bootstrap a deplasării în eșantion finit: în ferestrele scurte indicele este deplasat, nu doar zgomotos; zgomotul de eșantionare din coeficienții OLS este o sursă plauzibilă [Demirer et al. \(2018\)](#).
- Raportați intervalul lîngă fiecare cifră netă și desenați pe graficul rețelei doar etichetele identificate.

 MFM_ch18_spillover_uncertainty

C1 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Cererea studentului:** „Banca i și sistemul au distribuție Normală bivariată cu medii zero: $\sigma_i = 2,5\%$, $\sigma_{sys} = 1,2\%$, $\rho = 0,5$. Calculează CoVaR 1%, Δ CoVaR 1%, MES 5% (sistemul este piața) și SRISK cu $W = 100$, $D = 1\,100$, $k = 8\%$, LRMES = 40%.”
 - ▶ W : valoarea de piață a capitalului propriu; D : valoarea contabilă a datoriilor; k : raportul prudentțial de capital
- **Răspunsul asistentului AI**
 - ▶ $VaR_i = 2,5 \cdot 2,326 = 5,82\%$; $X^{sys} \mid X_i = x \sim N(0,24x, 1,04^2)$
 - ▶ CoVaR condiționează pe banca aflată la VaR, $X_i = VaR_i = 5,82$: cuantila 1% este $0,24 \cdot 5,82 - 1,04 \cdot 2,326 = -1,02$, deci CoVaR = 1,02%
 - ▶ Starea mediană: $1,04 \cdot 2,326 = 2,42\%$; Δ CoVaR = $1,02 - 2,42 = -1,40\%$: banca **reduce** riscul sistemic
 - ▶ MES este pierderea așteptată a băncii în propria coadă de 5%: $MES = 2,5 \cdot \varphi(1,645)/0,05 = 5,16\%$
 - ▶ $SRISK = kD - (1 - LRMES)W = 88 - 60 = 28$

C1 [Propus]: critica unui răspuns AI — enunț

- ▣ Răspunsul de pe slide-ul anterior conține **trei** erori tipice pentru măsurile de risc sistemic; restul este corect
 - ▶ Model: **A1**, **A2** și formula SRISK din **Noțiuni necesare (10/23)**; secțiunea **C1** din notebook; convențiile acestui seminar: α este o probabilitate a cozii, VaR, CoVaR și MES sînt pierderi pozitive
- ▣ Cerințe
 - ▶ Găsiți fiecare eroare: ce pas și de ce este greșit
 - ▶ Precizați cum ați detecta-o fără să cunoașteți răspunsul: o verificare de semn, un caz-limită, o formulă închisă
 - ▶ Calculați cifrele corecte
 - ▶ Notați fiecare eroare ca în **AI_ERRORS.md**: ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

B4 [Propus]: ΔCoVaR pentru băncile europene și clasamentul după VaR — enunț (1/2)

▣ Întrebările

- ▶ Putem numi o bancă europeană „cea mai sistemică”?
- ▶ Ne spune VaR-ul ei care este?

▣ Date și ipoteze

- ▶ Prețurile ajustate ale celor cinci bănci europene (datele cursului): Deutsche Bank, BNP Paribas, Santander, ING, HSBC; același eșantion și aceleași randamente ca în B1
- ▶ Sistemul fiecărei bănci: portofoliul cu ponderi egale al celorlalte patru; nivelurile $\alpha = 1\%$ (aproximativ 40 de zile în coadă) și $\alpha = 5\%$ (aproximativ 198)
- ▶ Pentru (c): cele unsprezece bănci internaționale (cele șase bănci americane din B1 și aceste cinci), fiecare cu propriul sistem regional

▣ Cerințe

- Calculați VaR 1%, $\hat{b}_1\%$, ΔCoVaR 1% cu interval bootstrap pe blocuri (blocuri de 20 de zile, 999 de reeșantionări) și ΔCoVaR 5%; ordonați băncile la fiecare nivel și calculați corelația Spearman a celor două clasamente.
- La fiecare nivel, testați egalitatea ΔCoVaR pentru cele 10 perechi pe extrageri bootstrap comune pe blocuri, cu corecția Holm, și pentru toate cele cinci bănci împreună, cu un test Wald (χ_4^2), la 5%.
- Calculați corelația Spearman dintre VaR 1% și ΔCoVaR 1% pe cele unsprezece bănci, cu un interval bootstrap pe blocuri de 95% (blocuri de 20 de zile, 999 de reeșantionări).

B4 [Propus]: ΔCoVaR pentru băncile europene și clasamentul după VaR — enunț (2/2)

□ Raportați

- Un tabel pentru (a); ambele clasamente și corelația lor Spearman; numărul perechilor (brut, Holm), statisticile Wald, p-value-urile și deciziile; corelația Spearman de la (c) cu intervalul ei

□ Interpretare

- Cîte zile din coadă folosește fiecare nivel?
- Ce implicații are acest lucru pentru puterea testelor?
- Ați numi o bancă europeană „cea mai sistemică” pe baza acestor date?
- Este corelația $\text{VaR}-\Delta\text{CoVaR}$ diferită de zero?
- Este ea diferită de unu?

□ Model: B1 [Rezolvat]; secțiunea B4 din notebook

Proiectul de echipă

- ▣ Alegeți un sistem financiar nediscutat la seminar (de ex. bănci din Europa Centrală și de Est, asigurători, platforme crypto)
- ▣ Estimați MES, ΔCoVaR și un tabel de conectivitate, fiecare cu incertitudine din bootstrap pe blocuri; un test de stres istoric și unul invers
- ▣ Predați un folder Quantlet (cod, fișier de descriere Metainfo.txt, grafice) și trei slide-uri: cifre, interpretare, limite
- ▣ Consemnați folosirea AI în AI_USE.md și erorile găsite în [AI_ERRORS.md](#); pachetele de extindere sînt opționale

Pachetele de extindere: ce cere fiecare

Pachetul	Exercițiile	Cerințe prealabile
1. Variante de CoVaR și backtesting	A4, B5	A1, B1
2. SRISK	B6 [Rezolvat], A5, B7	A2; secțiunea SRISK din curs
3. Conectivitate	A6, B8, C2	A3, B2, B3
4. Rețele în coadă	B9 [Rezolvat]	Cursul 18, Financial Risk Meter
5. Testarea la stres	A7 [Rezolvat], A8, B10	Cursul 18, testul invers de stres
6. Băncile românești	C3	B1, B3

- Fiecare pachet are secțiunile lui în notebook; rezolvați exercițiile în ordinea din pachet
- Utile pentru proiectul de echipă: C2 și C3 pot fi puncte de plecare

A4 [Propus]: CoVaR Girardi–Ergün sub distribuția Normală — enunț

- ▣ **Întrebarea:** Cu cât crește CoVaR dacă condiționăm pe pierderi cel puțin egale cu VaR?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Același model Normal bivariat și aceleași cifre ca în **A1(c)**: $\sigma_{\text{sys}} = 1,5\%$, $\rho = 0,6$, $\alpha = 1\%$
 - ▶ Definiția din **Girardi & Ergün (2013)**: dificultatea înseamnă $X_i \leq q_\alpha(X_i)$ (la VaR sau dincolo de el), iar $\text{CoVaR}_\alpha^{\leq} = c$ rezolvă $P(X^{\text{sys}} \leq -c \mid X_i \leq q_\alpha(X_i)) = \alpha$
 - ▶ $\Phi_2(u, v; \rho)$: funcția de repartiție Normală bivariată standard, cu corelația ρ
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Scrieți probabilitatea condiționată ca probabilitate comună împărțită la α , standardizați ambele coordonate și arătați că c rezolvă $\Phi_2(z_\alpha, -c/\sigma_{\text{sys}}; \rho) = \alpha^2$.
 - (b) Demonstrați că $\text{CoVaR}_\alpha^{\leq} \geq \text{CoVaR}_\alpha$ pentru $\rho > 0$, folosind faptul că distribuția lui X^{sys} condiționată de $X_i \leq q_\alpha$ este un amestec al distribuțiilor din **A1(a)**, pentru valorile $x \leq q_\alpha$.
 - (c) Rezolvați numeric ecuația de la (a) prin bisecție după c și comparați rezultatul cu $\text{CoVaR}_{1\%}$ din **A1**.
- ▣ **Raportați**
 - ▶ c , pragul standardizat $-c/\sigma_{\text{sys}}$ și diferența față de **A1** în puncte și în procente
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ Diferența este mică sub distribuția Normală: de ce ar fi mult mai mare în datele bancare?
- ▣ **Model:** **A1** [Rezolvat]; secțiunea **A4** din notebook

B5 [Propus]: backtesting pentru CoVaR Girardi–Ergün — enunț (1/2)

- ▣ **Întrebarea:** Ar detecta backtesting-ul un CoVaR prost calibrat?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Cele unsprezece bănci internaționale din B1, B4, cu sistemele lor regionale; randamentele zilnice și eșantionul ca în B1
 - ▶ În fiecare zi $t \geq 1\,000$, folosind toate zilele anterioare: $\hat{q}_t$ este cuantila empirică 5% a lui X_i ; $\text{CoVaR}_t^{\leq}$ este minus cuantila empirică 5% a lui X_t^{sys} în zilele trecute cu $X_i \leq \hat{q}_t$ (versiunea istorică a A4) Girardi & Ergün (2013)
 - ▶ Eveniment comun $I_t = 1\{X_t^{\text{sys}} \leq -\text{CoVaR}_t^{\leq}, X_{i,t} \leq \hat{q}_t\}$; sub H_0 , $P(I_t = 1) = \alpha^2 = 0,25\%$
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Numărați evenimentele comune ale fiecărei bănci și testați $H_0 : P(I_t = 1) = 0,25\%$ la 5% cu testul Kupiec Banulescu-Radu, Hurlin, Leymarie & Scaillet (2021), statistica raportului de verosimilitate $LR = -2[\ln L(0,25\%) - \ln L(\hat{\pi})] \sim \chi_1^2$.
 - (b) Găsiți regiunea de respingere a testului în funcție de numărul de evenimente și calculați puterea lui, presupunînd evenimente Bernoulli independente: probabilitatea de a respinge cînd rata comună reală este 0,5%.

B5 [Propus]: backtesting pentru CoVaR Girardi–Ergün — enunț (2/2)

▣ Raportați

- ▶ Numărul zilelor de prognoză; evenimentele așteptate și observate; LR și p pentru JPMorgan; intervalul numărului de evenimente și cel mai mic p pe cele unsprezece bănci; regiunea de respingere și puterea

▣ Interpretare

- ▶ De ce α^2 este rata corectă sub ipoteza nulă?
- ▶ Ce vă spune aici o nerespingere?

- ▣ **Model:** B1 (teste), A4 ($\text{CoVaR}^{\leq}$); secțiunea B5 din notebook

B6 [Rezolvat]: SRISK: LRMES prin simulare — enunț (1/2)

- ▣ **Întrebarea:** Cât ar pierde JPMorgan într-o criză a pieței de o lună, azi și în martie 2020?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ JPMorgan (preț ajustat) și S&P 500 (închidere), randamente log zilnice în %, 5 ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026 [Brownlees & Engle \(2017\)](#)
 - ▶ Criza ca în [Brownlees & Engle \(2017\)](#): randamentul aritmetic al pieței sub $C = -10\%$ în $h = 22$ de zile; LRMES este pierderea așteptată a băncii în aceleași h zile, în criză
 - ▶ Pentru (c): scenariul pe șase luni ($h = 126$ de zile, $C = -40\%$), aproximarea $1 - \exp(-18 \text{ MES}^{2\%})$ din Cursul 18 și raportul prudențial $k = 8\%$
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Estimați un GJR–GARCH(1,1) cu medie zero pentru fiecare serie de randamente și un DCC(1,1) pentru corelația lor, prin QML în doi pași.
 - (b) Simulați 200 000 de traiectorii de 22 de zile din perechi reeșantionate de inovații standardizate, păstrați traiectoriile de criză și calculați LRMES cu intervalul de 90% (cuantilele 5% și 95% ale pierderii); repetați cu date pînă la 31 martie 2020.
 - (c) Repetați (b) cu $h = 126$, $C = -40\%$ (400 000 de traiectorii), comparați cu aproximarea și calculați levierul de echilibru L^* din [Noțiuni necesare \(10/23\)](#) pentru ambele.

B6 [Rezolvat]: SRISK: LRMES prin simulare — enunț (2/2)

▣ Raportați

- ▶ Estimările GJR și DCC; proporția traiectoriilor de criză; LRMES cu intervalul, azi și pe 31 martie 2020; LRMES pe șase luni față de aproximare; ambele L^*

▣ Interpretare


- ▶ La ce ipoteză a aproximării renunță simularea?
- ▶ De ce se schimbă LRMES între martie 2020 și azi?
- ▶ Ce date lipsesc pentru a exprima SRISK în unități monetare pe baza LRMES?

▣ Notebook: secțiunea B6

B6 [Rezolvat]: rezolvare (1/3)

- (a) Recursia GJR din **Noțiuni necesare (23/23)**; JPMorgan: $\hat{\alpha}_G = 0,017$, $\hat{\gamma} = 0,120$, $\hat{\beta}_G = 0,891$, persistența $\hat{\alpha}_G + \hat{\gamma}/2 + \hat{\beta}_G = 0,967$.
- Recursia DCC pe reziduurile standardizate (același slide): $\hat{a} = 0,052$, $\hat{b} = 0,928$; ultima corelație $\rho_T = 0,53$.
- (b) Pași: extragem 22 de zile de perechi $(\xi_{i\tau}, \epsilon_{m\tau})$, cu $\xi_{i\tau} = (\epsilon_{i\tau} - \rho_{\tau}\epsilon_{m\tau})/\sqrt{1 - \rho_{\tau}^2}$; reconstruim $\epsilon_i = \rho_{\tau}\epsilon_{m\tau} + \sqrt{1 - \rho_{\tau}^2}\xi_{i\tau}$ cu ρ simulat; rulăm recursiile GJR și DCC din starea de azi; păstrăm traiectoriile cu randamentul pieței sub -10% ; facem media pierderii aritmetice a băncii pe ele.
- Rezultat: $1,3\%$ din traiectorii sînt crize (aproximativ 2 687 din 200 000); LRMES = $10,6\%$, interval de 90% $[-2, 25]\%$.
- Cu date pînă la 31 martie 2020, aceeași procedură dă LRMES = $23,7\%$.

B6 [Rezolvat]: rezolvare (2/3)



B6 [Rezolvat]: rezolvare (3/3)

- Pierderea simulată a JPMorgan pe 22 de zile, pe traiectoriile în care S&P 500 scade sub -10% ; linia întreruptă: LRMES; hașurat: intervalul de 90%
- (c) Aproximarea: $MES^{2\%}$ al JPMorgan = $3,61\%$, $18 \cdot 0,0361 = 0,650$, deci $LRMES = 1 - e^{-0,650} = 48\%$.
- Simularea pentru $h = 126$, $C = -40\%$: $LRMES = 33\%$.
- $L^* = 1 + 0,92(1 - 0,335)/0,08 = 8,7$ din simulare, față de $1 + 0,92(1 - 0,478)/0,08 = 7,0$ din aproximare.
- Interpretare: simularea renunță la beta constant și la scalarea randamentelor log din spatele constantei 18 a aproximării (vezi A5); pornește de la volatilitatea și corelația de azi și păstrează coada comună a inovațiilor.
- Pe 31 martie 2020 volatilitatea și corelația erau la niveluri de criză, deci o nouă lună cu -10% ar fi produs o pierdere mai mare a băncii; azi starea de pornire este calmă.
- Exprimarea SRISK în unități monetare cere și valoarea contabilă a datoriilor D și de valoarea de piață a capitalului propriu W .

A5 [Propus]: originea constantei 18 din aproximarea LRMES — enunț (1/2)

▣ **Întrebarea:** De unde vine constanta 18 din aproximarea LRMES?

▣ **Date și ipoteze**

- ▶ Scenariul de criză [Acharya, Engle & Richardson \(2012\)](#): piața scade cu exact $d = 40\%$ în șase luni, un scenariu determinist la limită ($R_m = -d$) care motivează aproximarea; LRMES simulat din [B6](#) face în schimb media pe toate traiectoriile cu $R_m < C$
- ▶ Randamentul log pe șase luni al băncii este β înmulțit cu cel al pieței, cu β constant; $MES^{2\%} = \beta ES_m^{2\%}$, unde $ES_m^{2\%}$ este pierderea medie a pieței în zilele cu randament sub -2%
- ▶ Datele pentru (c): randamentele log zilnice S&P 500 (închidere), 5 ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026; și o piață ale cărei randamente urmează distribuția Normală, cu $\sigma_m = 1\%$

▣ **Cerințe**

- (a) Arătați că în acest scenariu banca pierde $LRMES = 1 - (1 - d)^\beta$.
- (b) Înlocuiți $\beta = MES^{2\%}/ES_m^{2\%}$ pentru a arăta că $LRMES = 1 - \exp(-\kappa MES^{2\%})$ cu $\kappa = -\ln(1 - d)/ES_m^{2\%}$.
- (c) Calculați $ES_m^{2\%}$ și κ pentru S&P 500 și pentru piața cu randamente care urmează distribuția Normală ($ES_m^{2\%} = \sigma_m \varphi(2)/\Phi(-2)$), precum și $ES_m^{2\%}$ care dă $\kappa = 18$.

A5 [Propus]: originea constantei 18 din aproximarea LRMES — enunț (2/2)

▣ Raportați

- ▶ Numărul zilelor S&P 500 sub -2% , ambele valori ale lui $ES_m^{2\%}$ și ale lui κ și $ES_m^{2\%}$ implicat de 18

▣ Interpretare

- ▶ Ce limitare are aproximarea dacă β crește în crize?

▣ Model: A2 [Rezolvat]; secțiunea A5 din notebook

B7 [Propus]: SRISK pentru o bancă europeană și una românească — enunț

- ▣ **Întrebarea:** Cît de expuse sînt Deutsche Bank și Banca Transilvania la o criză a propriei piețe?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Deutsche Bank cu Euro Stoxx 50 ca piață; Banca Transilvania cu BET; eșantionul din B6
 - ▶ Modelele și criza ca în B6: GJR–GARCH(1,1), DCC(1,1), 200 000 de traiectorii de 22 de zile, $C = -10\%$
 - ▶ Raportul prudențial $k = 5,5\%$ Engle, Jondeau & Rockinger (2015), deci $L^* = 1 + 0,945(1 - \text{LRMES})/0,055$
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Calculați LRMES cu intervalul de 90% pentru ambele bănci, cu date pînă la 18 septembrie 2026 și pînă la 31 martie 2020, precum și proporția traiectoriilor de criză pentru fiecare piață.
 - (b) Calculați L^* din LRMES și din ambele capete ale intervalului de 90%.
- ▣ **Raportați**
 - ▶ LRMES cu interval (ambele date), proporțiile crizelor, L^* cu intervalul, pentru ambele bănci
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ Care bancă este mai expusă la o criză a propriei piețe?
 - ▶ Cît de larg este intervalul pentru L^* ?
 - ▶ Ce înseamnă acest interval pentru un supraveghetor?
- ▣ **Model:** B6 [Rezolvat]; secțiunea B7 din notebook

A6 [Propus]: conectivitatea unui VAR bivariat — enunț

▣ **Întrebarea:** Cine transmite și cine primește într-un VAR cu două bănci?

▣ **Date și ipoteze**

► VAR(1) pentru două bănci cu $A = \begin{pmatrix} 0,5 & 0 \\ 0,4 & 0,5 \end{pmatrix}$ și $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0,3 \\ 0,3 & 1 \end{pmatrix}$

► $A_{21} = 0,4$, $A_{12} = 0$: banca 1 influențează banca 2 cu o întârziere de o zi, nu invers

► Descompunerea generalizată din A3, liniile normalizate la unu; $C = \frac{100}{2}(\tilde{\theta}_{12} + \tilde{\theta}_{21})$; poziția netă $T_i - F_i$ (către ceilalți minus de la ceilalți)

▣ **Cerințe**

(a) Calculați tabelul generalizat (brut și normalizat) și C la $H = 1$.

(b) Calculați $A\Sigma$, $\text{diag}(A\Sigma A^T)$, tabelele brut și normalizat și C la $H = 2$.

(c) Calculați poziția netă a fiecărei bănci la $H = 2$ și identificați transmitătorul net.

▣ **Raportați**

► Ambele tabele, C la ambele orizonturi și cele două poziții nete

▣ **Interpretare**

► De ce este tabelul simetric la $H = 1$, deși banca 1 influențează banca 2?

► De ce crește C cu H ?

▣ **Model:** A3 [Rezolvat]; secțiunea A6 din notebook

B8 [Propus]: modificarea conectivității după 2020 — enunț (1/2)

▣ **Întrebarea:** A crescut conectivitatea băncilor după 2020?

▣ **Date și ipoteze**

- ▶ Conectivitatea totală pe ferestre mobile din Cursul 18: logaritmul volatilităților Parkinson ale celor 13 bănci (B2), ferestre de 250 de zile mutate cu câte 5 zile, VAR(2), $H = 10$; 744 de ferestre
- ▶ Data rupturii: 1 ianuarie 2020; pentru (b), seriile zilnice din B2 în 2010–2019 (2 373 de zile) și în 2020–2026 (1 593 de zile)

▣ **Cerințe**

- (a) Regresați indicele pe ferestre mobile pe o constantă și pe $D_t = 1\{t \geq 2020\}$ prin OLS; testați H_0 : panta = 0 la 5% cu erori standard obișnuite și Newey–West (50 de laguri) Newey & West (1987).
- (b) Estimați un VAR(1) separat pe 2010–2019 și pe 2020–2026 și calculați C ($H = 10$) pentru fiecare, cu intervale de 95% dintr-un bootstrap pe blocuri de reziduuri (blocuri de 20 de zile, 999 de extrageri) în fiecare perioadă.
- (c) Construiți un interval de 95% pentru diferența $C_{2020-26} - C_{2010-19}$ din diferențele extragerilor independente din cele două perioade și decideți la 5%.

B8 [Propus]: modificarea conectivității după 2020 — enunț (2/2)

▣ Raportați

- ▶ Cele două medii, panta, ambele statistici t și deciziile; C pentru ambele perioade, cu intervale; diferența cu intervalul ei

▣ Interpretare

- ▶ De ce sînt valorile consecutive ale indicelui pe ferestre mobile aproape identice?
- ▶ De ce este testul de la (b)–(c) mai potrivit decît cel de la (a)?
- ▶ Ce ipoteză menține testul asupra datei rupturii?

▣ Model: B2, B3 [Rezolvat]; secțiunea B8 din notebook

C2 [Propus]: conectivitatea cuantilă a pierderilor bancare — enunț (1/2)

- ▣ **Întrebarea:** Se propagă pierderile bancare mari mai mult decât cele mici?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Studiul de caz din Cursul 18: [Ando, Greenwood-Nimmo & Shin \(2022\)](#), indicele de spillover al unui VAR cuantil cu factori (QFVAR) la cuantila τ și $RTD = S_{0,95}^{(5)} - S_{0,05}^{(5)}$ (Secțiunile 2 și 4.3)
 - ▶ Prețurile zilnice de închidere ajustate ale celor 13 bănci din [B2](#) (datele cursului), 2010–2026, aliniate pe zilele comune înainte de calcularea randamentelor; $y_{it} = -100 \ln(P_{it}/P_{i,t-1})$, pierderea zilnică în %, astfel încât coada dreaptă să fie cea adversă, ca la variațiile CDS din lucrare
 - ▶ FEVD generalizată din Ec. (17), cu liniile normalizate, $h = 5$ zile
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Construiți panelul de pierderi, alegeți ordinul VAR după BIC pe întregul eșantion și raportați-l împreună cu numărul de factori ales prin Ec. (8) la medie și la fiecare τ de la (b) (numărul depinde de cuantilă).
 - (b) Estimați VAR-ul cu factori la medie și la $\tau \in \{0,05; 0,10; 0,50; 0,90; 0,95\}$ pe întregul eșantion și calculați indicele de spillover $S_{\tau}^{(5)}$ din Ec. (20) pentru fiecare.
 - (c) Repetați (b) fără factori, ca VAR cuantil simplu, și comparați indicii; interpretați diferența ca sensibilitate la factorii comuni, nu ca o contribuție identificată a șocurilor comune.
 - (d) Pe ferestre mobile de 250 de zile, deplasate cu câte o zi, cu numărul factorilor fixat la valoarea din întregul eșantion, calculați $S^{(5)}$ la medie, la 0,05; 0,5 și 0,95, precum și RTD; exercițiul este descriptiv: alegerile pe întregul eșantion folosesc date viitoare.

C2 [Propus]: conectivitatea cuantilă a pierderilor bancare — enunț (2/2)

▣ Raportați

- ▶ Indicii de la (b)–(c) alături de Figura 4 din lucrare; corelațiile indicilor pe ferestre mobile de la (d) alături de Tabelul 3, cu intervale bootstrap pe blocuri; un grafic al RTD cu martie 2020 și martie 2023 marcate; limitarea datelor (pierderi din acțiuni, 13 bănci, ore de închidere diferite)

▣ Interpretare

- ▶ Se transmit pierderile bancare mai puternic în ambele cozi decât în centru, ca în rețeaua de risc de credit?
- ▶ Crește RTD înaintea stresului din 2020 și 2023 sau doar odată cu el?

▣ Model: B2, B3, Cursul 18 (studiul de caz); secțiunea C2 din notebook


B9 [Rezolvat]: penalizarea FRM într-o fereastră — enunț

- ▣ **Întrebarea:** Ce bănci explică pierderile extreme (coada stângă) ale JPMorgan, într-o fereastră calmă și într-una de criză?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Randamentele zilnice (fracții) ale celor 13 bănci și ale S&P 500, Euro Stoxx 50 și VIX întârziate cu o zi
 - ▶ Regresia FRM [Mihoci et al. \(2020\)](#): JPMorgan pe celelalte 12 bănci și pe cei trei indici întârziați (15 regresori), nivelul cuantilei $\tau = 5\%$, penalizare L_1 cu λ , ferestre de 63 de zile
 - ▶ Grilă de 20 de valori λ , echidistante logaritmice între 10^{-6} și $10^{-1,5}$; $GACV(\lambda) = \sum_t \rho_\tau(\hat{u}_t)/(n - df)$, df = numărul coeficienților nenuli
- ▣ **Cerințe**
 - (a) În fereastra calmă care se încheie pe 28 iunie 2019, estimați regresia cuantilă penalizată pentru fiecare λ din grilă, alegeți λ care minimizează GACV și numărați coeficienții activi.
 - (b) Repetați (a) în fereastra de criză care se încheie pe 31 martie 2020 și enumerați cei mai mari patru coeficienți în valoare absolută în fiecare fereastră.
- ▣ **Raportați**
 - ▶ $\hat{\lambda}$, numărul coeficienților activi și cei mai mari patru coeficienți în fiecare fereastră
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ Ce bănci explică pierderile extreme (coada stângă) ale JPMorgan în fiecare fereastră?
 - ▶ De ce este λ ales atât de mic?
- ▣ Notebook: secțiunea [B9](#)

B9 [Rezolvat]: rezolvare (1/3)

- Pași: (1) luăm cele 63 de zile ale ferestrei; (2) pentru fiecare λ rezolvăm regresia cuantilă penalizată; (3) calculăm reziduurile, df și GACV; (4) păstrăm λ cu cel mai mic GACV.
- (a) Fereastra calmă (2019-03-21 – 28 iunie 2019): $\hat{\lambda} = 4,5 \times 10^{-5}$, 11 din 15 coeficienți activi.
- Cei mai mari: Bank of America (0,52), Santander (0,25), Morgan Stanley (0,19), ING (−0,12).
- (b) Fereastra de criză (2019-12-23 – 31 martie 2020): $\hat{\lambda} = 7,8 \times 10^{-5}$, 12 din 15 activi.
- Cei mai mari: Bank of America (0,39), Euro Stoxx 50 (t-1) (0,38), BNP Paribas (0,34), HSBC (0,32).

B9 [Rezolvat]: rezolvare (2/3)



■ Calm window ending 28 Jun 2019: $\lambda = 4.5e-05$, 11 of 15 active

■ COVID-19 window ending 31 Mar 2020: $\lambda = 7.8e-05$, 12 of 15 active

B9 [Rezolvat]: rezolvare (3/3)

- Cei 15 coeficienți la penalizarea aleasă prin GACV, în cele două ferestre
- Interpretare: Bank of America are coeficientul cel mai mare în ambele ferestre; în criză, printre coeficienții cei mai mari se numără și cei ai indicelui Euro Stoxx 50 întârziat și ai două bănci europene: coada JPMorgan devine internațională.
- $\hat{\lambda}$ crește de la perioada calmă la criză, direcția pe care FRM o interpretează ca risc mai mare în coadă.
- λ este mic pentru că 15 regresori pentru 63 de zile fac posibilă estimarea fără penalizare: GACV preferă o penalizare mică.
- FRM este conceput pentru mult mai multe firme decât zile, unde penalizarea este indispensabilă [Toma et al. \(2026\)](#).


A7 [Rezolvat]: test invers de stres: lagrangianul — enunț

- ▣ **Întrebarea:** Care este cel mai plauzibil scenariu din spatele unei pierderi date a portofoliului?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Doi factori de risc $f = (f_1, f_2)^T \sim N(0, \Sigma)$ (randamente pe patru săptămîni, %); pierderea portofoliului $L = -b^T f$ cu expunerile b
 - ▶ Test invers de stres: cel mai plauzibil scenariu (densitate maximă) care produce o pierdere dată ℓ^*
 - ▶ Cifrele pentru (c): $b = (1, 2; 0, 8)$, $\Sigma = \begin{pmatrix} 16 & 6 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}$ ($\%^2$), $\ell^* = 20\%$
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Minimizați $\frac{1}{2} f^T \Sigma^{-1} f$ cu restricția $-b^T f = \ell^*$ printr-un lagrangian și derivați f^* .
 - (b) Arătați că distanța Mahalanobis a lui f^* este $d^* = \ell^* / \sqrt{b^T \Sigma b}$ și că $P(L \geq \ell^*) = \Phi(-d^*)$.
 - (c) Calculați Σb , $b^T \Sigma b$, f^* , d^* și $P(L \geq \ell^*)$ și verificați că f^* produce pierderea țintă.
- ▣ **Raportați**
 - ▶ Fiecare vector și scalar intermediar, f^* , d^* și probabilitatea
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ Care factor are scăderea mai mare în scenariu?
 - ▶ Cum ar trebui să interpreteze un comitet de risc o probabilitate de această mărime?
- ▣ Notebook: secțiunea [A7](#)

A7 [Rezolvat]: rezolvare (1/3)

- (a) Densitatea maximă înseamnă minimumul lui $\frac{1}{2}f^\top \Sigma^{-1}f$; lagrangianul $\mathcal{L} = \frac{1}{2}f^\top \Sigma^{-1}f + \lambda(b^\top f + \ell^*)$.
- Condiția de ordinul întâi: $\Sigma^{-1}f + \lambda b = 0$, deci $f = -\lambda \Sigma b$.
- Restricția: $-b^\top f = \lambda b^\top \Sigma b = \ell^*$, deci $\lambda = \ell^* / (b^\top \Sigma b)$ și $f^* = -\ell^* \Sigma b / (b^\top \Sigma b)$.
- (b) $f^{*\top} \Sigma^{-1} f^* = \lambda^2 b^\top \Sigma b = \ell^{*2} / (b^\top \Sigma b)$, deci $d^* = \ell^* / \sqrt{b^\top \Sigma b}$.
- $L = -b^\top f \sim N(0, b^\top \Sigma b)$, deci $P(L \geq \ell^*) = 1 - \Phi(\ell^* / \sqrt{b^\top \Sigma b}) = \Phi(-d^*)$.

A7 [Rezolvat]: rezolvare (2/3)



— Mahalanobis distance 1 — Mahalanobis distance 3.15 — Loss line $-b'f = 20\%$ ● $f^* = (-11.9, -7.1)$
— Mahalanobis distance 2

A7 [Rezolvat]: rezolvare (3/3)

- Elipsele: puncte de densitate egală ale lui f ; cel mai plauzibil scenariu este punctul în care dreapta pierderii atinge cea mai mică elipsă
- (c) $\Sigma b = (16 \cdot 1,2 + 6 \cdot 0,8; 6 \cdot 1,2 + 9 \cdot 0,8) = (24; 14,4)$.
- $b^T \Sigma b = 1,2 \cdot 24 + 0,8 \cdot 14,4 = 40,32$, $\sqrt{40,32} = 6,35$;
 $\lambda = 20/40,32 = 0,496$.
- $f^* = -0,496 \cdot (24; 14,4) = (-11,9\%; -7,1\%)$; verificare:
 $1,2 \cdot 11,90 + 0,8 \cdot 7,14 = 20\%$.
- $d^* = 20/6,35 = 3,15$ și
 $P(L \geq 20\%) = \Phi(-3,15) = 0,082\%$.
- Interpretare: factorul 1 scade cu 11,90% (2,98 abateri standard), factorul 2 cu 7,14% (2,38): scenariul se sprijină pe factorul cu expunerea și dispersia mai mari.
- Sub modelul Normal, o astfel de pierdere pe patru săptămîni apare aproximativ o dată la 94 de ani; A8 arată cît de fragilă este această cifră.

A8 [Propus]: test invers de stres sub o distribuție Student- t — enunț

- ▣ **Întrebarea:** Rămîne valabil scenariul invers de stres în prezența cozilor grele?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Aceleași b și Σ ca în A7; țintele $\ell^* = 20\%$ și $\ell^* = 30\%$
 - ▶ f are distribuție Student- t multivariată cu $\nu = 4$ grade de libertate și covarianța Σ , deci matricea de scală este $\Sigma(\nu - 2)/\nu$; T_ν este funcția de repartiție Student- t
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Arătați că cel mai plauzibil scenariu f^* este același ca în A7, folosind faptul că densitatea depinde de f doar prin $f^\top \Sigma^{-1} f$ și descrește în raport cu aceasta.
 - (b) Arătați că $L = -b^\top f$ este un t_ν univariat cu scala $\sqrt{b^\top \Sigma b (\nu - 2)/\nu}$, deci $P(L \geq \ell^*) = 1 - T_\nu(d^* \sqrt{\nu/(\nu - 2)})$.
 - (c) Calculați probabilitatea pentru ambele ținte sub modelul Normal și sub t_4 , precum și raportul lor.
- ▣ **Raportați**
 - ▶ d^* , argumentul t , cele două probabilități și raportul lor pentru fiecare țintă
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ Ce este robust într-un test invers de stres?
 - ▶ Ce nu este robust?
- ▣ **Model:** A7 [Rezolvat]; secțiunea A8 din notebook

B10 [Propus]: test de stres pentru un portofoliu de bănci românești — enunț (1/2)

- ▣ **Întrebarea:** Cât ar pierde un portofoliu de bănci românești într-un șoc sever, dar plauzibil?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Portofoliu de 1 000 000 RON, jumătate în Banca Transilvania și jumătate în BRD, reechilibrat zilnic; randamente log zilnice, zilele fără tranzacții sînt eliminate
 - ▶ Ferestrele istorice: șocul taxei bancare (10 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2019) și COVID-19 (15 februarie – 30 aprilie 2020)
 - ▶ Scenariul ipotetic: randamente log săptămîinale de -25% pentru Euro Stoxx 50 și -20% pentru BET; randamentele log săptămîinale (vineri) 2010–2026 ale celor două bănci, Euro Stoxx 50 și BET
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Randamentul log zilnic al portofoliului reechilibrat este $r_p = 100 \ln\left(\frac{1}{2}e^{r_{TLV}/100} + \frac{1}{2}e^{r_{BRD}/100}\right)$, nu media celor două randamente log; în fiecare fereastră găsiți cea mai mică sumă S a 10 valori r_p consecutive și transformați-o în pierderea $1 - e^{S/100}$, în % și în RON.
 - (b) Regresați randamentul săptămîinal al fiecărei bănci pe randamentele săptămîinale Euro Stoxx 50 (β_1) și BET (β_2) prin OLS cu termen liber; prognozați randamentul log indus de factori al fiecărei bănci $\hat{r}_k = \beta_{1k}(-25) + \beta_{2k}(-20)$ (termenul liber și reziduul egale cu zero), transformați-l în randament simplu $e^{\hat{r}_k/100} - 1$ și aplicați ponderile 50/50, păstrate neschimbate în săptămîina scenariului; raportați și media coeficienților beta și a valorilor R^2 .

B10 [Propus]: test de stres pentru un portofoliu de bănci românești — enunț (2/2)

▣ Raportați

- ▶ Ambele pierderi istorice, cu datele și sumele în RON; beta, R^2 și pierderea ipotetică în % și RON

▣ Interpretare

- ▶ Ce scenariu produce pierderi mai mari: un șoc politic intern sau o pandemie globală?
- ▶ De ce este beta față de Euro Stoxx 50 aproape zero când BET este în model?

▣ Model: A7 [Rezolvat]; secțiunea B10 din notebook

C3 [Propus]: expunerea băncilor românești la stresul bancar european — enunț (1/2)

- ▣ **Întrebarea:** Sînt băncile românești expuse mai ales stresului bancar european sau șocurilor interne?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Banca Transilvania și BRD; sistemul european: portofoliul cu ponderi egale format din Deutsche Bank, BNP Paribas, Santander, ING și HSBC; BET
 - ▶ Eșantion: 5 ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026, 3 960 de zile de tranzacționare comune celor 13 bănci și celor patru indici (aliniem întâi prețurile pe zilele comune, apoi calculăm randamentele log zilnice în %)
 - ▶ CoVaR de expunere: regresia cuantilă a băncii românești pe sistemul european, deci ΔCoVaR este pierderea suplimentară a băncii românești cînd sistemul european este în dificultate (direcția inversă față de B1)
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Estimați ΔCoVaR de expunere al fiecărei bănci românești la 5% și la 1%, cu intervale bootstrap pe blocuri (blocuri de 20 de zile, 999 de reeșantionări), și aceeași măsură cu BET în locul sistemului european.
 - (b) Împărțiți eșantionul în 2010–2017 și 2018–2026, estimați ΔCoVaR 5% în fiecare și testați schimbarea la 5% cu $z = (\hat{\Delta}_2 - \hat{\Delta}_1) / \sqrt{\text{se}_1^2 + \text{se}_2^2}$ din extrageri bootstrap independente pe blocuri (sau un test de dominanță [Castro & Ferrari \(2014\)](#)), nu prin suprapunerea intervalelor.
 - (c) Cu tabele Diebold–Yilmaz pe ferestre mobile (logaritmul volatilităților Parkinson ale celor 13 bănci, ferestre de 250 de zile mutate cu cîte 5 zile, $\text{VAR}(2)$, $H = 10$), calculați proporția din dispersia erorii de prognoză a băncilor românești care vine de la băncile europene și de la cele americane.

C3 [Propus]: expunerea băncilor românești la stresul bancar european — enunț (2/2)

▣ Raportați

- ▶ Livrabil: un folder Quantlet (cod, fișier de descriere Metainfo.txt, grafice) și trei slide-uri: cifrele de la (a)–(c) cu intervale și teste, interpretarea, limitele

▣ Interpretare

- ▶ Sînt băncile românești expuse mai ales stresului bancar european sau șocurilor interne?
- ▶ A crescut expunerea?

▣ Notebook: secțiunea C3

Bibliografie (1/2)

- Acharya, V.V., Engle, R., Richardson, M. (2012). [Capital shortfall: a new approach to ranking and regulating systemic risks](#). *American Economic Review*, 102(3), 59–64.
- Acharya, V.V., Pedersen, L.H., Philippon, T., Richardson, M. (2017). [Measuring systemic risk](#). *Review of Financial Studies*, 30(1), 2–47.
- Adrian, T., Brunnermeier, M.K. (2016). [CoVaR](#). *American Economic Review*, 106(7), 1705–1741.
- Ando, T., Greenwood-Nimmo, M., Shin, Y. (2022). [Quantile connectedness: modeling tail behavior in the topology of financial networks](#). *Management Science*, 68(4), 2401–2431.
- Banulescu-Radu, D., Hurlin, C., Leymarie, J., Scaillet, O. (2021). [Backtesting marginal expected shortfall and related systemic risk measures](#). *Management Science*, 67(9), 5730–5754.
- Brownlees, C., Engle, R.F. (2017). [SRISK: a conditional capital shortfall measure of systemic risk](#). *Review of Financial Studies*, 30(1), 48–79.
- Castro, C., Ferrari, S. (2014). [Measuring and testing for the systemically important financial institutions](#). *Journal of Empirical Finance*, 25, 1–14.
- Demirer, M., Diebold, F.X., Liu, L., Yilmaz, K. (2018). [Estimating global bank network connectedness](#). *Journal of Applied Econometrics*, 33(1), 1–15.
- Diebold, F.X., Yilmaz, K. (2014). [On the network topology of variance decompositions: measuring the connectedness of financial firms](#). *Journal of Econometrics*, 182(1), 119–134.
- Engle, R., Jondeau, E., Rockinger, M. (2015). [Systemic risk in Europe](#). *Review of Finance*, 19(1), 145–190.

Bibliografie (2/2)

- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- Giglio, S., Kelly, B., Pruitt, S. (2016). *Systemic risk and the macroeconomy: an empirical evaluation*. *Journal of Financial Economics*, 119(3), 457–471.
- Girardi, G., Ergün, A.T. (2013). *Systemic risk measurement: multivariate GARCH estimation of CoVaR*. *Journal of Banking & Finance*, 37(8), 3169–3180.
- Gouriéroux, C., Laurent, J.P., Scaillet, O. (2000). *Sensitivity analysis of values at risk*. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 225–245.
- Holm, S. (1979). *A simple sequentially rejective multiple test procedure*. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70.
- Künsch, H.R. (1989). *The jackknife and the bootstrap for general stationary observations*. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- Mihoci, A., Althof, M., Chen, C.Y.-H., Härdle, W.K. (2020). *FRM Financial Risk Meter*. In *The Econometrics of Networks*, Advances in Econometrics 42, Emerald, 335–368.
- Newey, W.K., West, K.D. (1987). *A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix*. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Pesaran, H.H., Shin, Y. (1998). *Generalized impulse response analysis in linear multivariate models*. *Economics Letters*, 58(1), 17–29.
- Toma, F.-M., Dima, D.M., Grecu, R., Pele, D.T., Lessmann, S. (2026). *Energy Financial Risk Meter: systemic risk in the EU energy sector*. SSRN working paper.