



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 4: Optimizarea portofoliului



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- BVB: Bursa de Valori București
- CAPM: Capital Asset Pricing Model (modelul de evaluare a activelor financiare)
- DSR: Deflated Sharpe Ratio (raportul Sharpe deflatat)
- ERC: Equal Risk Contribution portfolio (portofoliul cu contribuții egale la risc)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- FDR: False Discovery Rate (rata descoperirilor false)
- FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- GLS: Generalised Least Squares (metoda celor mai mici pătrate generalizate)
- GMV: Global Minimum-Variance portfolio (portofoliul de varianță minimă globală)
- GMV-LO: Global Minimum-Variance portfolio, Long-Only (portofoliul de varianță minimă globală, doar poziții long)
- GMV-LW: Global Minimum-Variance portfolio with Ledoit–Wolf covariance (portofoliul de varianță minimă globală cu covarianța Ledoit–Wolf)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HRP: Hierarchical Risk Parity (paritatea ierarhică a riscului)
- HYG: iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (ETF de obligațiuni corporative americane cu randament ridicat, sub rating investițional)
- IEF: iShares 7–10 Year Treasury Bond ETF (ETF de obligațiuni de stat americane cu scadența 7–10 ani)
- LO: Long-Only, no short sales (doar poziții long, fără vânzări în lipsă)
- LQD: iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF (ETF de obligațiuni corporative americane cu rating investițional)
- ML: Machine Learning (învățare automată)
- MV: Mean–Variance tangency portfolio estimated from sample moments (portofoliul tangent medie–varianță estimat din momentele de eșantion)
- MV-LO: Mean–Variance tangency portfolio, Long-Only (portofoliul tangent medie–varianță, doar poziții long)
- NYSE: New York Stock Exchange (Bursa din New York)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- OMV: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale (grupul OMV))

Acronime folosite în acest material (2/2)

- OOS: Out-Of-Sample (în afara eșantionului)
- POET: Principal Orthogonal complement Thresholding (estimatorul prin prag aplicat complementului ortogonal al componentelor principale)
- SUA: Statele Unite ale Americii

Traseul capitolului și ce veți ști

Întrebarea

- Un **portofoliu** este un vector de ponderi $w = (w_1, \dots, w_N)^\top$ cu $w^\top \mathbf{1} = 1$; optimizarea alege w care maximizează un criteriu, sub restricții
- Optimul se scrie ușor când mediile și covarianțele sunt cunoscute, dar se estimează greu: optimizatorul se încarcă pe cele mai mari erori de estimare
 - ▶ 16 active: $16 + 136 = 152$ de parametri, estimați din 60 de observații lunare ale unui vector de randamente de dimensiune 16
- Poate vreo regulă estimată să bată ponderile egale în afara eșantionului, după costuri?

Traseu

- Partea I: teoria medie–varianță, riscul de estimare, shrinkage al covarianței, Black–Litterman
- Partea a II-a: risk parity și HRP, teste în afara eșantionului, portofolii BVB, un studiu de caz, o trecere prin bucla de cercetare asistată de AI
- Detaliile tehnice sunt în [▶ Anexă](#); manual: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), Partea I

Date, active și reperul 1/N

Univers	Active	Randamente	Monedă
Sectoare	9 ETF-uri sectoriale din SUA: XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY	1999/01 – 2026/07	USD
Multi-active	SPY, EFA, EEM (acțiuni); TLT, IEF (titluri de stat); LQD, HYG (credit); GLD (aur)	2007/05 – 2026/07	USD
Combinat	9 sectoare + cele 7 ETF-uri multi-active, fără SPY (16 ETF-uri)	2007/05 – 2026/07	USD
România	8 blue chips BVB: TLV, SNP, BRD, TGN, SNG, SNN, EL, TEL; BET, BET-TR	2014/10 – 2026/08	RON

- Randamente lunare simple din prețurile de sfârșit de lună, în zilele comune de tranzacționare; ETF-uri și acțiuni cu dividendele reinvestite; BET este indice de preț, BET-TR reinvestește dividendele
- Randamente în exces față de titlul de stat la o lună ([Kenneth French Data Library](#)); BVB: $R_f = 0$
- Sectoare: XLB materiale, XLE energie, XLF financiar, XLI industrie, XLK tehnologie, XLP bunuri de consum de bază, XLU utilități, XLV sănătate, XLY consum discreționar
- Multi-active: SPY (S&P 500), EFA (acțiuni din țări dezvoltate, fără SUA și Canada), EEM (acțiuni din piețe emergente), TLT (titluri de stat SUA, peste 20 de ani), IEF (titluri de stat SUA, 7–10 ani), LQD (obligațiuni corporative investment grade), HYG (obligațiuni corporative high yield), GLD (aur)
- BVB: TLV Banca Transilvania, SNP OMV Petrom, BRD BRD–Groupe Société Générale, TGN Transgaz, SNG Romgaz, SNN Nuclearelectrica, EL Electrica, TEL Transelectrica
- 1/N: ponderi egale $w_i = 1/N$, reechilibrate lunar; nicio estimare, reperul oricărei comparații

Notație

- ▣ Randament simplu $R_{i,t} = P_{i,t}/P_{i,t-1} - 1$; randament în exces $R_{i,t}^e = R_{i,t} - R_{f,t}$; media portofoliului $w^\top \mu$, varianța $w^\top \Sigma w$
- ▣ **Raportul Sharpe** (Sharpe (1966)): $SR_p = \mathbb{E}[R_p^e]/\sigma(R_p^e)$; cifrele lunare se anualizează cu $\times 12$ (media) și $\times \sqrt{12}$ (volatilitatea, Sharpe)
- ▣ **Drawdown maxim**: $\min_t (W_t / \max_{s \leq t} W_s - 1)$, cea mai mare scădere a averii W_t față de un maxim anterior
- ▣ **În afara eșantionului** (OOS): ponderile deținute în luna t folosesc doar date până în luna $t - 1$
- ▣ Regulile capitolului: MV (tangent din momente de eșantion), GMV (varianță minimă globală), versiunile lor long-only MV-LO și GMV-LO, GMV-LW (GMV cu shrinkage), ERC, HRP și $1/N$


Problema lui Markowitz

- ▣ **Markowitz (1952)**: investitorii țin cont de media și de varianța randamentelor portofoliului
- ▣ **Frontiera de varianță minimă**: varianța minimă pentru fiecare medie-țintă m ; ramura ei superioară, $m \geq \mu_{\text{GMV}}$ (media portofoliului GMV), este **frontiera eficientă**

$$\min_w w^\top \Sigma w \quad \text{cu} \quad w^\top \mu = m, \quad w^\top \mathbf{1} = 1$$

- ▣ Forma cu utilitate, aversiunea la risc $\gamma > 0$: $\max_w w^\top \mu - \frac{\gamma}{2} w^\top \Sigma w$ cu $w^\top \mathbf{1} = 1$; când γ variază, descrie exact ramura eficientă
- ▣ Ponderile pot fi negative: o **vânzare în lipsă** (vânzarea unui activ împrumutat)

Două active: cum diversifică corelația



- Două active, corelația ρ :

$$\sigma_p^2 = w^2\sigma_1^2 + (1-w)^2\sigma_2^2 + 2w(1-w)\rho\sigma_1\sigma_2$$
- Minimul este la $w^* = \frac{\sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}$
- SPY și TLT, lunar 2002–2026: $\rho = -0,10$, $w^* = 46\%$ SPY, volatilitate 9,4% față de 14,7% și 13,5%
- Cu cât ρ e mai mic, cu atât curba se îndoaie mai mult spre stânga; la $\rho = 1$ nu există diversificare
- Corelația variabilă în timp: [Capitolul 6](#)

Portofoliile GMV și tangent pentru N active

- GMV: $\min_w w^\top \Sigma w$ cu $w^\top 1 = 1$; lagrangianul $\mathcal{L} = w^\top \Sigma w - \lambda(w^\top 1 - 1)$, Σ pozitiv definită
 - Condiția de ordinul întâi $2\Sigma w = \lambda 1$, deci $w = \frac{\lambda}{2} \Sigma^{-1} 1$; restricția dă $\frac{\lambda}{2} = 1/A$, $A = 1^\top \Sigma^{-1} 1$
- Tangent: se maximizează $w^\top \mu / \sqrt{w^\top \Sigma w}$, μ randamentele așteptate **în exces**; condiția $\mu \propto \Sigma w$ dă $w \propto \Sigma^{-1} \mu$

	GMV	Tangent (MV)
Ponderi	$w_{\text{GMV}} = \Sigma^{-1} 1 / A$	$w_{\text{MV}} = \Sigma^{-1} \mu / B$, $B = 1^\top \Sigma^{-1} \mu$
Rezultat	varianța $\sigma_{\text{GMV}}^2 = 1/A$	Sharpe la pătrat $\theta^2 = \mu^\top \Sigma^{-1} \mu$
Necesită	doar Σ	μ și Σ ; Sharpe $\text{sign}(B) \theta$

- $\Sigma^{-1} \mu / B$ normalizat este maximul doar dacă $B > 0$; $B < 0$ dă portofoliul cu Sharpe minim, $B = 0$ nicio soluție complet investită

Separarea și frontiera în formă închisă



James Tobin, Premiul Nobel pentru economie 1981


Foto: autor necunoscut (1962);

domeniu public; Wikimedia Commons

- **Tobin (1958)**: se adaugă un activ fără risc cu randamentul R_f ; fiecare investitor ține **același** portofoliu riscant, portofoliul tangent, combinat cu numerar sau cu împrumut
 - ▶ Aversiunea la risc schimbă doar combinația de-a lungul dreptei de alocare a capitalului: **separarea în două fonduri**, puntea spre CAPM ([Capitolul 3](#))
- **Merton (1972)**: cu vânzări în lipsă, frontiera este o hiperbolă; Σ pozitiv definită, μ neproportional cu 1
 - ▶ $A = 1^\top \Sigma^{-1} 1$, $B = 1^\top \Sigma^{-1} \mu$, $C = \mu^\top \Sigma^{-1} \mu$, $D = AC - B^2 > 0$

$$\sigma^2(m) = \frac{Am^2 - 2Bm + C}{D}$$
- GMV se află la $m = B/A$, $\sigma^2 = 1/A$; orice portofoliu de pe frontieră combină oricare două portofolii distincte de pe frontieră, de exemplu GMV și tangentul (dacă $B \neq 0$)

Frontiera sectoarelor din SUA



- Randamente lunare în exces, ianuarie 1999 – iulie 2026 ($T = 331$); toți parametrii estimați pe tot eșantionul: o imagine în eșantion
- Tangent: Sharpe 0,66; GMV: 0,57 (volatilitate 11,1%); 1/N: 0,54
- Ponderile tangente: $-0,37$ financiar, $-0,21$ materiale, $+0,37$ sănătate: poziții short
- Tangent long-only: Sharpe 0,61; materialele, financiarul și industria primesc exact zero, o soluție de colț
- Câștigul față de 1/N este mic chiar și cu informația completă din trecut

Restricții

- ▣ **Long-only (LO):** $w_i \geq 0$; fără formă închisă, se rezolvă prin programare pătratică
- ▣ Limite pe poziții: $w_i \leq 0,2$; limite pe sectoare sau clase de active: $\sum_{i \in G} w_i \leq c_G$
- ▣ Limită de levier: $\sum_i |w_i| \leq L$
- ▣ **Frost & Savarino (1988):** restricționarea ponderilor a îmbunătățit performanța în afara eșantionului; de ce funcționează este un rezultat de shrinkage (secțiunea următoare)
- ▣ MV-LO și GMV-LO sunt versiunile long-only ale MV și GMV

Mediile se estimează greu: argumentul lui Merton




Robert C. Merton, Premiul
Nobel pentru economie 1997

Foto: Digarnick (2006); domeniu
public; Wikimedia Commons

- **Merton (1980)**: Y ani observați de h ori pe an, randamente i.i.d. din distribuția Normală (o difuzie) cu media anuală μ și varianța σ^2
 - ▶ $\text{Var}(\hat{\mu}) = \sigma^2/Y$: nu depinde de h ; ajută doar **lungimea** eșantionului
 - ▶ $\text{Var}(\hat{\sigma}^2) \approx 2\sigma^4/(hY) \rightarrow 0$ când $h \rightarrow \infty$ (distribuția Normală; în general $(\kappa - 1)\sigma^4/(hY)$, κ kurtosisul): varianțele devin mai precise cu frecvența
- SPY, $Y = 24$, $\sigma = 14,7\%$: eroarea standard 3,0%, intervalul de 95% [5,8%; 17,6%] pentru o medie de 11,7%
- O eroare standard de 1% cere $(0,147/0,01)^2 \approx 217$ ani
- **Chopra & Ziemba (1993)**: erorile în medii costă de circa zece ori mai mult decât cele în varianțe; regulile fără medii (GMV, risk parity) sunt mai robuste

Maximizarea erorii: frontiere estimate versus realizate



- **Michaud (1989)**: optimizatorii sunt **maximizatori ai erorii de estimare**; **Best & Grauer (1991)**: o mică schimbare într-o medie mută multe ponderi
- Parametrii adevărați = momentele sectoarelor 1999–2026; se extrag 60 de luni din distribuția Normală, se optimizează, se evaluează cu parametrii adevărați
- Roșu: frontierele estimate, prea optimiste; verde: aceleași portofolii cu parametrii adevărați, toate sub frontiera adevărată
- 2000 de portofolii tangente simulate: Sharpe maxim estimat median 1,56, Sharpe adevărat median 0,30, optimul adevărat 0,66
- 96% au Sharpe adevărat sub $1/N$ (0,54), 7,5% sub zero; în 11% din eșantioane $1^T \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\mu} < 0$

 MFM_ch4_estimation_error

Raportul Sharpe estimat direct este deplasat

- Randamente i.i.d. $N(\mu, \Sigma)$, $\hat{\mu}$ și $\hat{\Sigma}$ de verosimilitate maximă, $\hat{\theta}^2 = \hat{\mu}^\top \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\mu}$ (Kan & Zhou (2007); momentele Wishart în [► Anexă](#))

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}^2] = \frac{T}{T - N - 2} \left(\theta^2 + \frac{N}{T} \right) = \frac{T\theta^2 + N}{T - N - 2}, \quad T > N + 2$$


- Sectoare: $N = 9$, $T = 60$, θ adevărat = 0,66 pe an: $\mathbb{E}[\hat{\theta}^2]$ corespunde unui Sharpe de 1,65 pe an, echivalentul analitic al mediei simulate 1,56
- Estimatorul nedeplasat al lui θ^2 : $\hat{\theta}_u^2 = [(T - N - 2)\hat{\theta}^2 - N]/T$
 - Poate fi negativ; trunchierea la zero dă un estimator nenegativ, dar deplasat în sus, iar $\sqrt{\hat{\theta}_u^2}$ nu este nedeplasat pentru θ
- Sectoare, tot eșantionul ($T = 331$): $\hat{\theta} = 0,66$ estimat direct, $\sqrt{\hat{\theta}_u^2} = 0,31$ pe an după corecție: peste jumătate din Sharpe-ul în eșantion este zgomot, chiar și cu 27 de ani
- Ponderile tangente sunt coeficienții OLS ai regresiei lui 1 pe randamente (Britten-Jones (1999); [► Anexă](#), Seminarul A2 și B9)

Ponderi instabile



- Nouă ETF-uri sectoriale; în fiecare lună ponderile folosesc doar ultimele 60 de luni; panoul de sus tăiat la ± 6
- MV: expunere brută mediană $\sum_i |w_i| = 4,9$, peste 3 în 90% din luni; cea mai mare pondere individuală 26 în valoare absolută
- Explozii în 2004–2006 și 2009: numitorul $1^\top \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\mu}$ este aproape de zero, deci ponderile tangente au cozi foarte groase
 - Negativ în 12 din 271 de ferestre: MV ține atunci portofoliul cu Sharpe minim
- GMV-LW (jos): expunere brută 1,5, cea mai mare pondere 0,94
- Ponderile instabile înseamnă turnover mare, deci costuri mari de tranzacționare

Cât de lungă trebuie să fie fereastra pentru a bate 1/N?



- DeMiguel, Garlappi & Uppal (2009): 14 modele pe 7 seturi de date; niciunul nu bate consecvent 1/N ca raport Sharpe, randament echivalent cert sau turnover; calibrarea lor cere circa 3000 de luni pentru 25 de active
- Aici: 300 de eșantioane simulate pentru fiecare fereastră, parametrii populației = momentele sectoarelor
- MV bate 1/N doar cu 480 de luni (40 de ani): Sharpe adevărat median 0,55 față de 0,54; cu 60 de luni 0,31
- MV-LO, GMV, GMV-LW sunt aproape de 1/N de la 60 de luni; ERC este aproape insensibil, 0,56
- În această calibrare 1/N este aproape eficient (tangenta adevărat 0,66): dovadă din simulare, nu un test empiric

 MFM_ch4_window_length

De ce eșuează matricea de covarianță de eșantion


- ▣ Valorile proprii de eșantion sunt prea dispersate: cele mari prea mari, cele mici prea mici
- ▣ **Numărul de condiționare**: cea mai mare valoare proprie împărțită la cea mai mică; o valoare mare înseamnă că Σ^{-1} amplifică zgomotul
- ▣ Optimizatorii inversează Σ , deci se încarcă pe direcțiile cu cea mai mică varianță estimată
- ▣ Matricea de eșantion centrată are rangul cel mult $T - 1$: singulară, neinvertibilă, ori de câte ori $T \leq N$
- ▣ Reperul **Marchenko–Pastur** ([Marčenko & Pastur \(1967\)](#)): randamente i.i.d. cu $\Sigma = \sigma^2 I$; când $N, T \rightarrow \infty$ cu $N/T \rightarrow c \in (0, 1)$, valorile proprii de eșantion umplu

$$[\lambda_-, \lambda_+] = [\sigma^2(1 - \sqrt{c})^2, \sigma^2(1 + \sqrt{c})^2]$$

- ▶ $c = 16/60 = 0,27$: banda $[0,23; 2,30]$ pentru o matrice de corelație ($\sigma^2 = 1$), o dispersie de zece ori doar din zgomot
- ▶ [Laloux et al. \(1999\)](#): valorile proprii din afara benzii sunt candidate la structură; cele din interior nu se pot deosebi de zgomot doar prin această comparație

Valorile proprii de eşantion și banda de zgomot

Last 60-month window, Aug 2021 - Jul 2026



- Matrice de corelație ale randamentelor lunare în exces, ultima fereastră de 60 de luni (august 2021 – iulie 2026); banda colorată: $[\lambda_-, \lambda_+]$ pentru $\sigma^2 = 1$
- Doar modul pieței este deasupra lui λ_+ : 9,0 (56% din urma matricei) la 16 ETF-uri, 5,2 la nouă sectoare ($\lambda_+ = 1,92$); cu varianța zgomotului rescalată la $\sigma^2 = 1 - \lambda_1/N$ (Laloux et al. (1999)), trei valori proprii depășesc banda în fiecare univers
- Șase din 16 valori proprii sunt sub bandă: combinații aproape fără risc, precum TLT contra IEF; GMV se încarcă exact pe ele, deci dacă sunt subestimate, la fel este și riscul său

Estimatorul de shrinkage


- Matricea de eșantion S este trasă spre o țintă structurată F

$$\hat{\Sigma}_{\text{LW}} = \delta F + (1 - \delta) S, \quad 0 \leq \delta \leq 1$$

- Ținte

- ▶ Modelul cu un singur indice (al pieței): [Ledoit & Wolf \(2003\)](#)
 - ▶ Identitatea scalată: [Ledoit & Wolf \(2004a\)](#)
 - ▶ Corelația constantă, $f_{ii} = s_{ii}$ și $f_{ij} = \bar{r} \sqrt{s_{ii} s_{jj}}$ pentru $i \neq j$, $\bar{r}$ corelația medie de eșantion: [Ledoit & Wolf \(2004b\)](#), folosită aici
- δ schimbă varianța lui S pe deplasarea lui F : date zgomotoase sau o țintă bună, δ mare; eșantioane lungi, $\delta \rightarrow 0$ (δ^* optim în [▶ Anexă](#))

Shrinkage pe sectoarele din SUA



- Nouă ETF-uri sectoriale, randamente lunare în exces; ultima fereastră august 2021 – iulie 2026: $\delta = 0,24$; cele mai mici valori proprii sunt ridicate, cele mai mari aproape neschimbate; numărul de condiționare $51,6 \rightarrow 32,5$
- δ rulant: media 0,43, între 0,19 și 1,00; $\delta = 1$ în primele ferestre, unde 60 de luni sunt prea puține pentru a bate ținta
- GMV-LW: portofoliul GMV calculat cu $\hat{\Sigma}_{LW}$

Și restricțiile sunt shrinkage

- ▣ Jagannathan & Ma (2003): GMV long-only este egal cu GMV fără restricții al unei matrice de covarianță modificate

$$\tilde{S} = S - (\lambda \mathbf{1}^\top + \mathbf{1} \lambda^\top), \quad \mathcal{L} = \frac{1}{2} \mathbf{w}^\top S \mathbf{w} - \lambda_0 (\mathbf{w}^\top \mathbf{1} - 1) - \lambda^\top \mathbf{w}$$

- ▶ $\lambda \geq 0$: multiplicatorii Lagrange ai restricțiilor $w_i \geq 0$ din $\mathcal{L}$; $\lambda_i > 0$ doar unde restricția este activă
- ▶ Condiția de ordinul întâi $S \mathbf{w} = \lambda_0 \mathbf{1} + \lambda$ și $\lambda^\top \mathbf{w} = 0$ dau $\tilde{S} \mathbf{w} = \lambda_0 \mathbf{1}$: condiția GMV pentru $\tilde{S}$
- ▣ $\tilde{s}_{ij} = s_{ij} - \lambda_i - \lambda_j$: o restricție activă pe activul i îi reduce covarianțele, ceea ce trage în jos estimările mari
- ▣ Restricția „greșită” (fără vânzări în lipsă) poate reduce riscul în afara eșantionului; efectul este cel mai mare când covarianțele vin din puține observații

Shrinkage neliniar

- ▣ Shrinkage-ul liniar amestecă două matrice cu un singur δ ; shrinkage-ul **neliniar** păstrează vectorii proprii de eşantion şi corectează separat fiecare valoare proprie
 - ▶ Ledoit & Wolf (2017): calibrat pentru alegerea portofoliului; Ledoit & Wolf (2020): o formulă analitică, fără optimizare
- ▣ În afara eşantionului, fereastră de 60 de luni, volatilitatea GMV
 - ▶ Sectoare: eşantion 11,90%, liniar (corelație constantă) 11,80%, neliniar 11,62%
 - ▶ 16 ETF-uri: eşantion 4,06%, liniar 4,38%, neliniar 4,31%: mai bun decât ținta liniară, nu și decât matricea brută
- ▣ O corelație constantă nu se potrivește nici perechilor acțiuni–acțiuni (pozitive), nici celor acțiuni–obligațiuni (negative): ținta contează (Seminarul 4, B4)
- ▣ Regulă: aplicați shrinkage, restricții sau ambele, dar nu inversați niciodată o matrice de eşantion brută pentru multe active

De la shrinkage-ul covarianței la shrinkage-ul mediilor



Fischer Black (1938–1995)

Foto: Dalmatine, Wikipedia în limba engleză; domeniu public; Wikimedia

[Commons](#)

- Shrinkage-ul corectează $\hat{\Sigma}$; Black & Litterman (1992), dezvoltat la Goldman Sachs, trage mediile spre cele implicate de un portofoliu de referință w_b
- Optimizarea inversă: un investitor medie–varianță cu aversiunea la risc δ_{RA} și acces la numerar ține $w^* = (\delta_{RA} \Sigma)^{-1} \mu$ în active riscante; randamentele care fac w_b optim sunt

$$\pi = \delta_{RA} \Sigma w_b$$

- π : randamente în exces **implicite** (de echilibru); cu ponderile pieței, randamentele CAPM
- Aici: nu avem capitalizări pentru sectoare, deci $w_b = 1/N$, $\delta_{RA} = 2,5$
- Apoi se adaugă **opiniile** investitorului, ponderate cu încrederea în ele: ponderile se îndepărtează de reper doar unde există opinii

Opiniile și distribuția a posteriori

▣ K opinii: $P\mu = q + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \Omega)$; a priori $\mu \sim N(\pi, \tau\Sigma)$

▣ Media a posteriori: o medie ponderată cu preciziile; ponderile $w_{BL} = (\delta_{RA}\Sigma)^{-1}\mu_{BL}$

$$\mu_{BL} = [(\tau\Sigma)^{-1} + P^\top \Omega^{-1}P]^{-1}[(\tau\Sigma)^{-1}\pi + P^\top \Omega^{-1}q]$$


▣ Limite: $\Omega \rightarrow 0$ dă exact $P\mu_{BL} = q$; $\Omega \rightarrow \infty$ dă π ; fără opinii, chiar reperul

▣ He & Litterman (2002): $\tau = 0,05$, $\Omega = \text{diag}(P \tau\Sigma P^\top)$; cu Σ în ponderi, se mută doar activele din opinii

▣ Un activ, $\pi = 5\%$, $\tau\sigma^2 = 0,00128$, opinia 8% cu varianța 0,0004: $\mu_{BL} = 7,29\%$, ponderea opiniei 0,76

▣ Același estimator este o regresie GLS (mixtă) (Theil & Goldberger (1961); [▶ Anexă](#), Seminarul A5)

Black-Litterman pe sectoarele din SUA



- Σ din randamentele lunare în exces, august 2016 – iulie 2026; o opinie: XLK minus XLU = 3% pe an; implicit 2,2%, a posteriori 2,6% (media, pentru că Ω este egală cu varianța a priori a opiniei)
- Ponderi: XLK de la 11,1% la 14,4%, XLU de la 11,1% la 7,8%, restul neschimbate; opinia este relativă ($P1 = 0$), deci înclinarea $\propto P^\top$ are suma zero și portofoliul rămâne complet investit
- Cu mediile de eșantion: XLK 21,3% pe an; ponderile MV +115% XLK, -68% XLY, -46% XLB

Contribuțiile la risc

- Volatilitatea este omogenă de gradul întâi în ponderi (Euler)

$$\sigma_p = \sum_{i=1}^N w_i \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \sum_{i=1}^N \frac{w_i (\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

- Contribuția la risc** a activului i : $RC_i = w_i (\Sigma w)_i / \sigma_p$; cota procentuală $RC_i / \sigma_p = w_i (\Sigma w)_i / \sigma_p^2$
- Exemplu numeric, 50/50 în SPY și IEF (lunar 2002–2026, anualizat): $\sigma_1^2 = 0,02166$, $\sigma_2^2 = 0,00441$, $\sigma_{12} = -0,00098$
 - $(\Sigma w)_1 = 0,5(0,02166) + 0,5(-0,00098) = 0,01034$, $(\Sigma w)_2 = 0,5(-0,00098) + 0,5(0,00441) = 0,00172$
 - $\sigma_p^2 = 0,5(0,01034) + 0,5(0,00172) = 0,00603$, $\sigma_p = 7,76\%$; cotele: SPY 85,8%, IEF 14,2%
- Ponderile egale nu înseamnă riscuri egale: domină activele volatile; bugetarea riscului alege w astfel încât cotele să fie egale cu bugetele fixate b_i

Contribuții egale la risc (ERC)


- ERC (Maillard, Roncalli & Teïletche (2010)): $RC_i = RC_j$ pentru orice i, j ; se calculează dintr-o problemă convexă, apoi se normalizează

$$\min_{y>0} \frac{1}{2} y^T \Sigma y - \frac{1}{N} \sum_i \ln y_i, \quad w = y / 1^T y$$

- Pentru Σ pozitiv definită soluția există și este unică (obiectiv strict convex, infinit la frontieră)
- Ordinea volatilităților: $\sigma_{\text{GMV}} \leq \sigma_{\text{ERC}} \leq \sigma_{1/N}$
- Două active: ERC înseamnă **inversul volatilității**, $w_1 = \sigma_1^{-1} / (\sigma_1^{-1} + \sigma_2^{-1})$, pentru orice $\rho \in (-1, 1)$
 - SPY (14,7%) și IEF (6,6%): ERC ține 31% SPY, volatilitate 6,1%, fiecare activ cu 50% din varianță
- Nu are nevoie de randamente așteptate, doar de Σ ; ERC este portofoliul tangent dacă toate activele au același raport Sharpe și corelații egale

Ponderi versus contribuții la risc

Eight multi-asset ETFs, monthly May 2007 - Jul 2026




- Opt ETF-uri multi-active, matricea de covarianță pe tot eșantionul, mai 2007 – iulie 2026 ($T = 231$)
- 1/N: acțiunile și high yield primesc jumătate din pondere, dar 69% din risc; ERC: 12,5% din risc de la fiecare activ, IEF primește cea mai mare pondere (25%); GMV long-only: 73% IEF, 22% HYG, 5% SPY, cinci active la zero
- Volatilitate: 1/N 9,4%, ERC 7,9%, HRP 7,1%, GMV long-only 5,8%: ERC se află între 1/N și GMV, cum prezice teoria

Hierarchical Risk Parity: de la arbore la ponderi

- HRP (López de Prado (2016)), trei pași, fără inversarea matricei (merge chiar dacă Σ este singulară), toate ponderile pozitive
 1. **Arbore**: distanța de corelație $d_{ij} = \sqrt{(1 - \rho_{ij})/2} \in [0, 1]$; apoi distanța euclidiană dintre **coloanele** lui $D = (d_{ij})$, $\tilde{d}_{ij} = \sqrt{\sum_k (d_{ki} - d_{kj})^2}$; legătura simplă pe $\tilde{d}_{ij}$ (se unesc repetat cele mai apropiate două grupuri) dă o **dendrogramă**
 2. **Cvasi-diagonalizare**: activele se ordonează ca frunzele arborelui, astfel încât cele asemănătoare sunt vecine
 3. **Bisecție recursivă**: **lista ordonată** se împarte în două jumătăți; fiecare jumătate primește pondere invers proporțională cu varianța ei $\tilde{w}^\top \Sigma \tilde{w}$, cu $\tilde{w}$ ponderile invers proporționale cu varianța în interiorul jumătății; se repetă în fiecare jumătate
- Mantegna (1999): aceeași distanță și **arborele de acoperire minim** arată ierarhia unei piețe de acțiuni; manual: Härdle & Simar (2019), analiza cluster
- Un exemplu rezolvat cu patru active: Seminarul 4, B3

HRP pe 16 ETF-uri



- Nouă sectoare și șapte ETF-uri multi-active, lunar, mai 2007 – iulie 2026; cea mai apropiată pereche TLT și IEF ($\tilde{d} = 0,29$), aurul se alătură ultimul (0,96)
- Grupul de acțiuni: sectoarele ciclice, EFA, EEM și creditul high yield; sectoarele defensive (utilități, bunuri de consum de bază, sănătate) și energia i se alătură târziu
- HRP: toate cele 16 ponderi pozitive, cele mai mari IEF 26,7%, LQD 17,6%, HYG 12,6%; GMV long-only: 75,6% în IEF și doar cinci active peste zero


Designul backtest-ului

- ▣ Fereastră rulantă de 60 de luni, reechilibrare lunară; ponderile lunii t folosesc doar lunile $t - 60, \dots, t - 1$
- ▣ Opt reguli: 1/N, MV, MV-LO, GMV, GMV-LO, GMV-LW, ERC, HRP
- ▣ Trei universuri
 - ▶ Sectoare: în afara eșantionului ianuarie 2004 – iulie 2026, 271 de luni (prima fereastră ianuarie 1999 – decembrie 2003)
 - ▶ Multi-active și combinat: mai 2012 – iulie 2026, 171 de luni
- ▣ Media, volatilitatea și raportul Sharpe anualizate ale randamentelor în exces; drawdown-ul maxim al averii din randamente totale
- ▣ Fiecare diferență de Sharpe se raportează cu un test (slide-urile următoare), iar toate testele efectuate întră în corecția pentru testare multiplă

Turnover și costuri: un exemplu numeric pe o lună

- ▣ Între reechilibrări ponderile se modifică odată cu randamentele (drift): $w_{i,t}^+ = w_{i,t}(1 + R_{i,t}) / \sum_j w_{j,t}(1 + R_{j,t})$
- ▣ **Turnover**: fracțiunea din avere tranzacționată, $TO_{t+1} = \sum_i |w_{i,t+1} - w_{i,t}^+|$
- ▣ Exemplu numeric, sectoare, 1/N: în ianuarie 2004 XLB a avut $-4,4\%$ și XLK $+4,3\%$, deci ponderile de $11,11\%$ s-au modificat (drift) la $10,50\%$ și $11,45\%$
 - ▶ Revenirea la 1/N în februarie 2004 tranzacționează $TO = 0,019$: și 1/N tranzacționează, vinde câștigătorii și cumpără perdantii
 - ▶ MV-LO, reestimat pe noua fereastră, tranzacționează $0,748$ în aceeași lună
- ▣ Randamentul net cu costul c pe unitate tranzacționată: $R_{p,t}^{\text{net}} = R_{p,t} - c TO_t$; 1 punct de bază (bp) = $0,01\%$, deci 20 bp înseamnă $c = 0,002$
 - ▶ La 20 bp, tranzacția din februarie costă MV-LO $0,002 \times 0,748 = 0,15\%$ din avere, iar 1/N $0,004\%$


Creşterea în afara eşantionului: multi-active



- Opt ETF-uri multi-active; averea relativă la un cont în titluri de stat, înainte de costuri
- MV se prăbuşeşte: volatilitate 518% pe an, turnover de 44 de ori averea pe lună; o pierdere lunară de peste 100% îi încheie traiectoria averii
- MV-LO are cel mai mare Sharpe (0,80); 1/N 0,52; ERC 0,49
- Regulile GMV: cea mai mică volatilitate (3,8%–5,4%), Sharpe scăzut (0,27–0,37); se încarcă pe titlurile de stat, ale căror randamente în exces au fost ușor negative după mai 2012 (TLT -0,5%, IEF -0,2% pe an)
- Este MV-LO chiar mai bun sau doar norocos? E nevoie de un test

 MFM_ch4_oos_backtest


Rapoartele Sharpe în cele trei universuri



- Fereastră rulată de 60 de luni, reechilibrare lunară, anualizat, înainte de costuri; tablele complete în [▶ Anexă](#)
- Sectoare: toate regulile în afară de MV ajung la cel mult 0,07 de 1/N (0,66); MV 0,26 cu drawdown –100%
- Combinat: 1/N 0,76, MV-LO 0,81, ERC 0,71; regulile GMV 0,20–0,36
- MV: o pierdere lunară de peste 100% șterge capitalul; media și Sharpe-ul lui descriu o serie ipotetică de randamente, nu o avere investibilă
- Turnover lunar, sectoare: 1/N 0,02, ERC 0,03, GMV-LW 0,14, MV-LO 0,23, MV 3,86

 MFM_ch4_oos_backtest

Rapoartele Sharpe după costuri



- Universul combinat (16 ETF-uri); costul c între 0 și 100 bp pe unitate de turnover; turnover de la 0,02 (1/N) la 22 (MV) pe lună
- Sharpe-ul net devine negativ la circa 11 bp pentru MV, 29 bp pentru GMV, 58 bp pentru GMV-LW; MV-LO depășește 1/N doar la costuri sub circa 22 bp (Seminarul 4, B8)
- 1/N și ERC abia se mișcă: turnover-ul mic e un avantaj ascuns; raportați și performanța netă la costuri realiste

Inferența pentru un raport Sharpe: Lo (2002)

- ▣ Lo (2002), randamente i.i.d. din distribuția Normală: $\sqrt{T}(\widehat{SR} - SR) \rightarrow N(0, 1 + SR^2/2)$, cu SR lunar
- ▣ $1/N$ pe sectoare, $T = 271$: $\widehat{SR}$ lunar = 0,191, eroarea standard 0,061
 - ▶ Anualizat $0,66 \pm 1,96 \times 0,21$: intervalul de 95% [0,25; 1,08]
- ▣ Anualizarea cu $\sqrt{q}$ ($q = 12$) este exactă doar fără autocorelație; în general $SR(q) = \eta(q) SR$

$$\eta(q) = \frac{q}{\sqrt{q + 2 \sum_{k=1}^{q-1} (q-k) \rho_k}}$$

- ▣ Aici $\rho_1 = -0,03$, $\sum_{k=1}^{11} \rho_k = -0,11$: $\eta = 3,62$ în loc de $\sqrt{12} = 3,46$, Sharpe anual 0,69

Testarea unei diferențe de rapoarte Sharpe

- ▣ H_0 : $SR_1 = SR_2$ pentru două strategii evaluate pe aceleași luni; [Jobson & Korkie \(1981\)](#): un test pentru randamente i.i.d. din distribuția Normală
- ▣ [Ledoit & Wolf \(2008\)](#): o variantă robustă
 - ▶ $\hat{\Delta} = f(\hat{v})$, $v = (\mu_1, \mu_2, \mathbb{E}[r_1^2], \mathbb{E}[r_2^2])$, $f = \frac{\mu_1}{\sqrt{\mathbb{E}r_1^2 - \mu_1^2}} - \frac{\mu_2}{\sqrt{\mathbb{E}r_2^2 - \mu_2^2}}$
 - ▶ Eroarea standard prin metoda delta: $\sqrt{\nabla f^\top \hat{\Psi} \nabla f / T}$, $\hat{\Psi}$ o covarianță HAC
- ▣ Strategiile pe aceleași active sunt puternic corelate: diferențe mici pot fi semnificative


Bootstrap-ul pe blocuri



Bradley Efron, inventatorul
bootstrap-ului (1979)

Foto: Ryan K. Morris (2007); domeniu
public; [Wikimedia Commons](#)

- Bootstrap: datele se reeșantionează pentru a aproxima distribuția de eșantionare a lui $\hat{\Delta}$
- Randamentele sunt dependente (grupări de volatilitate): se reeșantionează **blocuri** de luni consecutive ([Künsch \(1989\)](#))
- [Ledoit & Wolf \(2008\)](#), Secțiunea 3.2.2: blocuri circulare de **perechi** (r_{1t}, r_{2t}) , care trec peste sfârșitul eșantionului, astfel încât corelația celor două strategii se păstrează
- Centrare și studentizare: bootstrap pentru $|\hat{\Delta}^* - \hat{\Delta}|/s(\hat{\Delta}^*)$; asimptotic pivotal, mai precis decât aproximarea Normală a testului HAC
- $p = [\#\{\tilde{d}^{*m} \geq |\hat{\Delta}|/s(\hat{\Delta})\} + 1]/(M + 1)$, $M = 4999$ de extrageri
- Lungimea blocului se alege prin calibrarea din [Ledoit & Wolf \(2008\)](#), Algoritmul 3.1 ([▶ Anexă](#)): de regulă 1 pentru sectoare, 8–10 pentru regulile multi-active și combinate

Este ceva mai bun decât $1/N$?

- Distribuțiile bootstrap ale diferenței studentizate față de $1/N$; roșu: statistica observată; întrerupt: valorile critice bootstrap
- Sectoare, GMV-LW minus $1/N$: $-0,02$, intervalul de 95% $[-0,36; 0,33]$, p HAC = 0,93, p bootstrap = 0,94 (bloc 1); multi-active, ERC minus $1/N$: $-0,03$, $[-0,15; 0,08]$, p HAC = 0,61, p bootstrap = 0,58 (bloc 10): atât de corelat cu $1/N$ încât intervalul e îngust, dar tot conține zero
- Sectoare: nicio regulă nu diferă de $1/N$ la 5% (cea mai apropiată ERC, $+0,04$, p HAC = 0,09); multi-active: MV-LO $+0,29$ nu este semnificativ (p HAC = 0,12, bootstrap 0,16)

Multe reguli, multe teste


Univers	Regula minus 1/N	$\hat{\Delta}$	p HAC	p bootstrap
Multi-active	MV	-0,74	0,01	0,06
Multi-active	HRP	-0,16	0,07	0,05
Combinat	GMV	-0,57	0,03	0,05
Combinat	GMV-LO	-0,40	0,05	0,08
Combinat	GMV-LW	-0,56	0,02	0,03
Combinat	MV-LO	+0,05	0,82	0,82

- Nicio regulă nu bate semnificativ 1/N în niciun univers; neajustat, regulile GMV pierd în fața lui 1/N pe universul combinat: risc mic, randament prea mic
- Familia: $H_0: \Delta_k = SR_k - SR_{1/N} \leq 0$ pentru orice k ; 21 de teste (7 reguli $\times$ 3 universuri); valorile p ajustate Holm sunt cel puțin 0,29 (HAC) și 0,68 (bootstrap): nimic nu rezistă ([Capitolul 3](#), testarea multiplă)
- O altă întrebare, cea mai bună din 24 de configurații: raportul Sharpe deflatat din [Bailey & López de Prado \(2014\)](#) dă $0,84 < 0,95$ pentru MV-LO pe 16 ETF-uri, dar verdictul depinde de numărul efectiv de încercări ([► Anexă](#))

Cadrul: un investitor român

- ▣ Opt blue chips listate din 2014: TLV, SNP, BRD, TGN, SNG, SNN, EL, TEL
- ▣ Randamente lunare în lei, octombrie 2014 – august 2026; fereastră de 36 de luni, primul portofoliu în octombrie 2017
- ▣ Reguli: 1/N, MV-LO, GMV-LO, GMV-LW, ERC, HRP; repere BET-TR și BET
- ▣ Rapoarte Sharpe cu $R_f = 0$ (nu avem în date o serie a pieței monetare în lei): randament pe unitate de risc, mai mare decât Sharpe-ul din randamente în exces
- ▣ Dovezi anterioare despre diversificare în România: Dragotă, Șerbănescu & Pele (2008)

Portofoliile BVB față de BET-TR



- În afara eșantionului, octombrie 2017 – august 2026 (107 luni), înainte de costuri, $R_f = 0$
- BET-TR: media 24,7% pe an, volatilitatea 17,0%, Sharpe 1,45; BET: media 17,8%, Sharpe 1,07; diferența de circa 7% pe an sunt dividendele: comparați cu BET-TR, niciodată cu BET
- 1/N 1,41, ERC 1,38, HRP 1,31: aproape de BET-TR
- MV-LO 1,66 (diferența +0,21, $p = 0,44$); GMV-LW 0,83 ($-0,63$, $p = 0,05$)
- Corelația medie a celor opt acțiuni 0,44: puțin loc pentru diversificare în interiorul BVB; ultimul GMV-LO pune 70% în TLV
- Întrebare deschisă: merită diversificarea dincolo de BET? (Seminarul 4, C1)


Studiu de caz: ce frontieră poate atinge un investitor mare?

- [Jensen, Kelly, Malamud & Pedersen \(2026\)](#), *Review of Financial Studies*: cum se construiesc portofolii din prognoze de randament prin machine learning, când fiecare tranzacție mută prețurile?
- **Frontiera eficientă implementabilă** (ec. 12): pentru fiecare volatilitate σ , cel mai mare randament așteptat **net de costurile de tranzacționare**, $k(\sigma) = \max_{\pi} E[r_{t+1}^{\text{net}}]$ cu $E[\pi_t^\top \Sigma \pi_t] = \sigma^2$
 - Propoziția 1: raportul Sharpe net $k(\sigma)/\sigma$ scade de-a lungul frontierei, iar un investitor mai mare are o frontieră mai joasă
- Costul ca fracțiune din averea W_t (ec. 4, 7): $c_t = \frac{W_t}{2} (\pi_t - g_t \pi_{t-1})^\top \Lambda (\pi_t - g_t \pi_{t-1})$, pătratic în tranzacție; g_t aplică drift-ul ponderilor lunii trecute, $\Lambda = \text{diag}(0, 2/V_i)$, V_i volumul în dolari
- Regula optimă: se tranzacționează doar o parte din drumul spre un **portofoliu-țintă**, $\pi_t = m g_t \pi_{t-1} + (1 - m) A_t$ ([Gârleanu & Pedersen \(2013\)](#)); Portfolio-ML învață A_t din semnale printr-o regresie ridge care maximizează utilitatea netă de costuri

	Articol	Replicarea din curs
Active	acțiuni NYSE peste mărimea mediană (184–805)	14 acțiuni din SUA + 9 ETF-uri sectoriale
Semnale	115 caracteristici (Jensen, Kelly & Pedersen (2023))	5 semnale de preț și volum
În afara eșantionului	1981–2020, lunar	februarie 2014 – august 2026 (151 de luni)
Investitor	$\gamma = 10$, avere de 10 miliarde \$ la sfârșitul lui 2020	la fel

Studiu de caz: Tabelul 2 dintr-o privire


Out of sample 1981-2020, US stocks, wealth \$10 billion (Markowitz-ML off scale)



- Jensen, Kelly, Malamud & Pedersen (2026), Tabelul 2: net de costuri, 1981–2020, $\gamma = 10$; utilitatea (ec. 11) = randamentul net anual $-\frac{\gamma}{2} \times \text{varianța anuală}$
- Markowitz-ML (medie–varianță pe prognozele ML de randament, fără costuri): Sharpe brut 2,06, turnover 79,36, levier 74,61: randament net extrem de negativ
- Portfolio-ML: Sharpe net 1,33, utilitate 0,086 (randament net 15%, volatilitate 11%, cost 0,6% pe an)
- Static-ML* (costuri pe o singură perioadă; * = nivel suplimentar de calibrare) 0,81, 0,030; 1/N 0,54, -0,051; piața 0,51, -0,033: doar regulile care țin cont de costuri au utilitate pozitivă

 MFM_ch4_implementable_frontier

Studiu de caz: brut și net de costuri pe datele cursului



- Marcaj gol: înainte de costuri; plin: după costurile din ec. (35); curba întreruptă: perechile cu utilitatea Portfolio-ML (0,016), punctată: utilitatea 0
- Portfolio-ML abia se mișcă: 3,8% brut, 3,3% net, volatilitate 5,7%; Sharpe net 0,57
- 1/N păstrează 18,1% net (Sharpe 0,61), dar la volatilitatea de 29,8% utilitatea lui este -0,26
- Variația minimă: +6,6% brut, -36,1% net; reechilibrarea unui levier de 2,6 costă 43% pe an
- Limite: 23 de active, 5 semnale, fără model factorial pentru Σ ; frontiera care contează este cea după costuri (Seminarul 4, C3)

 MFM_ch4_implementable_frontier

O întrebare deschisă

- ▣ Bate vreo regulă de alocare **estimată** ponderile $1/N$ în afara eșantionului, net de costuri, odată ce se numără toate regulile, ferestrele și universurile încercate?
- ▣ Dovezile actuale merg în ambele direcții
 - ▶ Shrinkage-ul neliniar al lui Σ îmbunătățește GMV în afara eșantionului pe secțiuni transversale mari: [Ledoit & Wolf \(2017\)](#)
 - ▶ Combinarea portofoliului tangent, a GMV și a lui $1/N$ sub riscul de estimare: [Kan, Wang & Zhou \(2022\)](#)
 - ▶ Backtest-urile cer o reducere a rezultatelor pentru numărul de specificații încercate: [Harvey & Liu \(2015\)](#)
- ▣ Formularea pentru K reguli pe un univers: $H_0: \Delta_k = SR_k - SR_{1/N} \leq 0$ pentru orice k ; $H_1: \Delta_k > 0$ pentru un k ; rata de eroare fixată pentru toată familia
- ▣ O trecere prin buclă cu un asistent AI: literatură cu DOI, ipoteze concurente, cod pe datele lunare ale cursului, o familie de teste preînregistrată, o critică în stilul unui referent (prompturile în [▶ Anexă](#))
- ▣ Infirmată de: un $\hat{\Delta}_k$ pozitiv care rezistă unei corecții pentru toată familia, costurilor și unui al doilea eșantion

Ce trebuie să verifice cercetătorul

- ▣ **Look-ahead:** ponderi din luna t construite cu randamentele lunii t ; verificați că ultima dată de estimare este înainte de t
- ▣ **Survivorship bias și selecție:** o listă de ETF-uri aleasă azi; folosiți universul disponibil la fiecare dată, inclusiv ETF-urile delistate ulterior, sau declarați limita
- ▣ **Testare multiplă:** 7 reguli $\times$ 3 universuri dau deja 21 de teste; valori p ajustate Holm (FWER) sau Benjamini–Hochberg (FDR, [Benjamini & Hochberg \(1995\)](#))
- ▣ **Putere:** $\hat{\Delta}$ are o eroare standard de circa 0,18 pe 171 de luni; calculați efectul detectabil înainte de rulare
- ▣ **Tipul randamentului:** portofoliile agregă randamente **simple**, rapoartele Sharpe folosesc randamente **în exces**; recalculați o lună pas cu pas
- ▣ **Referințe inventate:** un DOI care nu se rezolvă sau un titlu diferit elimină afirmația și intră în `AI_ERRORS.md`

Mini studiu de caz: data snooping în backtest-ul acestui capitol

- ▣ O propunere tipică a asistentului: „MV-LO bate 1/N pe universul multi-active”; superioritatea este unilaterală:
 $H_0: \Delta \leq 0, p = 1 - \Phi(\hat{\Delta}/se)$
- ▣ Replicare: $\hat{\Delta} = +0,29$, eroarea standard HAC 0,18, p unilateral = 0,06 (HAC bilateral 0,12, bootstrap 0,16)
- ▣ Testați familia, nu câștigătorul: 21 de teste (7 reguli $\times$ 3 universuri)
 - ▶ Doar 7 din 21 de diferențe sunt pozitive; cele 4 valori p HAC bilaterale sub 0,05 sunt toate **pierderi**, care nu resping niciodată o ipoteză nulă de superioritate
 - ▶ Unilateral: cel mai mic $p = 0,046$ (sectoare, ERC); ajustat Holm 0,96, Benjamini–Hochberg 0,62; 0 descoperiri la un FDR de 10%
- ▣ Puterea 0,8 pentru $\Delta = 0,29$, unilateral: circa 435 de luni (36 de ani) la 5%, 944 de luni (79 de ani) la nivelul Holm 5%/21
- ▣ Interpretare: datele nu pot ordona aceste reguli; intervalul bootstrap pentru MV-LO, $[-0,13; 0,70]$, admite pierderi și câștiguri mari; nerespingerea nu dovedește egalitatea

Rândul vostru: o idee de proiect de cercetare

- ▣ **Întrebare:** bat shrinkage-ul neliniar (Ledoit & Wolf (2017)) sau o combinație de trei fonduri (Kan, Wang & Zhou (2022)) ponderile $1/N$ pe cele 16 ETF-uri ale capitolului, după costuri de 10–50 bp?
- ▣ **Replicați întâi:** rezultatele pe universul combinat (Sharpe $1/N$ 0,76, MV-LO 0,81) și valorile p ajustate din mini studiu de caz
- ▣ **Preînregistrați:** ipotezele, familia de teste, rata de eroare, puterea și un placebo (ponderi long-only aleatoare cu același turnover), fixate înainte de orice rezultat
- ▣ **Raportați:** cod pe datele lunare ale cursului, un tabel cu toate specificațiile, o autocritică în stilul unui referent
- ▣ **Jurnal:** prompturile în AI_USE.md; fiecare eroare prinsă și testul care a prins-o în AI_ERRORS.md

Concluzii: ce regulă și când?

Regula	Obiectiv	Date necesare	Principalul mod de eșec	Dovezi din acest capitol
MV	Sharpe maxim	$\hat{\mu}, \hat{\Sigma}^{-1}$	maximizarea erorii, ponderi explozive	cea mai slabă în toate universurile; averea se anulează
MV-LO	Sharpe maxim, $w_i \geq 0$	$\hat{\mu}, \hat{\Sigma}$	soluții de colț, turnover	cele mai bune estimări punctuale, niciodată semnificative
GMV, GMV-LW	varianță minimă	$\hat{\Sigma}$ (cu shrinkage)	se încarcă pe active cu randament mic	cel mai mic risc, pierde în fața lui 1/N pe 16 ETF-uri (neajustat)
ERC, HRP	risc echilibrat	$\hat{\Sigma}$	o înclinare a lui 1/N; HRP tranzacționează mai mult	niciodată semnificativ mai bune decât 1/N
Black–Litterman	reper plus opinii	w_b , opinii, Ω	încredere setată prea mare	mută doar activele din opinii
1/N	niciunul	niciuna	ignoră diferențele de risc	greu de bătut după costuri

- Evaluați orice regulă în afara eșantionului, net de costuri, cu un test al diferenței de Sharpe și cu numărarea tuturor testelor; aceste verdicts sunt specifice acestor eșantioane

Verificați-vă și ce urmează

Întrebări de recapitulare

- ▣ De ce supraestimează Sharpe-ul tangent în eșantion pe cel realizabil și cu cât pentru $N = 9$, $T = 60$?
- ▣ De ce acționează o restricție long-only ca un shrinkage?
- ▣ De ce poate o diferență mică de Sharpe între ERC și $1/N$ să fie aproape semnificativă, iar una mai mare între GMV și $1/N$ nu?

Legături cu alte capitole

- ▣ **Capitolul 3:** portofoliul tangent și CAPM; modele factoriale de covarianță
- ▣ **Capitolele 5–6:** volatilitate și corelație variabile în timp pentru ponderi dinamice
- ▣ **Capitolul 7:** Value-at-Risk și Expected Shortfall de portofoliu
- ▣ **Capitolul 8:** backtesting fără overfitting
- ▣ **Capitolul 13:** machine learning pentru randamente și portofolii

Anexă: momentele Wishart și distribuția ponderilor

- ▣ Randamente i.i.d. $N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, estimatori de verosimilitate maximă: $\hat{\boldsymbol{\mu}} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}/T)$, $T\hat{\boldsymbol{\Sigma}} \sim W_N(T-1, \boldsymbol{\Sigma})$ (Wishart), independenți
- ▣ Momentul Wishart invers, finit pentru $T > N + 2$: $\mathbb{E}[\hat{\boldsymbol{\Sigma}}^{-1}] = \frac{T}{T-N-2}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$, o deplasare **în sus** care crește cu N/T
- ▣ Condiționând pe $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ și folosind $\mathbb{E}[\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}] = \text{tr}(\mathbf{A} \text{Var}(\mathbf{x})) + \mathbb{E}[\mathbf{x}]^\top \mathbf{A} \mathbb{E}[\mathbf{x}]$ se obține $\mathbb{E}[\hat{\theta}^2]$ din curs (Seminarul A9)
- ▣ Ponderile GMV cu $\hat{\boldsymbol{\Sigma}}$ Wishart și T suficient de mare față de N : $\hat{\mathbf{w}}_{\text{GMV}}$ este nedeplasat, iar distribuția și covarianța lui exacte sunt cunoscute (Okhrin & Schmid (2006))
- ▣ Ponderile tangente împart la $\mathbf{1}^\top \hat{\boldsymbol{\Sigma}}^{-1} \hat{\boldsymbol{\mu}}$, care poate fi aproape de zero: cozi foarte groase
- ▣ Combinații optime sub riscul de estimare ale portofoliului tangent, GMV și $1/N$: Kan & Zhou (2007), Kan, Wang & Zhou (2022)

Anexă: ponderile tangente prin regresie, Britten-Jones (1999)

- Britten-Jones (1999): regresia constantei 1 pe randamentele în exces, **fără** termen liber

$$1 = \mathbf{b}^\top \mathbf{r}_t + u_t, \quad \hat{\mathbf{b}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{1}_T \propto \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\boldsymbol{\mu}}$$

- Sherman-Morrison aplicat lui $\mathbf{X}^\top \mathbf{X} / T = \hat{\Sigma} + \hat{\boldsymbol{\mu}} \hat{\boldsymbol{\mu}}^\top$ dă proporționalitatea (Seminarul A2); $\hat{\mathbf{b}} / \mathbf{1}^\top \hat{\mathbf{b}} =$ ponderile tangente de eşantion dacă $\mathbf{1}^\top \hat{\mathbf{b}} > 0$
- Testul t OLS al lui $b_i = 0$: activul i are pondere zero în portofoliul tangent; testul F al lui $\mathbf{Rb} = 0$ cu $\mathbf{R} = [\mathbf{I}_{N-1}, -\mathbf{1}_{N-1}]$: „portofoliul tangent este $1/N$ ”
- Distribuții t și F exacte în eşantion finit pentru randamente i.i.d. din distribuția Normală; altfel erori standard HAC
- Nouă sectoare, ianuarie 1999 – iulie 2026 ($T = 331$): $\hat{\mathbf{b}}$ normalizat reproduce ponderile tangente; cel mai mare $|t| = 1,12$ (financiar), HAC 1,19
- H_0 : tangent = $1/N$, opt restricții: $F(8, 322) = 0,48$, $p = 0,87$; Wald HAC $\chi^2_8 = 4,50$, $p = 0,81$; nerespingerea nu dovedește ponderi egale

Anexă: intensitatea optimă de shrinkage

- Ledoit și Wolf aleg δ care minimizează distanța pătratică așteptată (Frobenius) față de Σ adevărată

$$\delta^* = \max \left\{ 0, \min \left\{ 1, \frac{\hat{\kappa}}{T} \right\} \right\}, \quad \hat{\kappa} = \frac{\hat{\pi} - \hat{\rho}}{\hat{\gamma}}$$

- $\hat{\pi}$: suma varianțelor asimptotice ale elementelor lui S (zgomotul)
- $\hat{\rho}$: covarianțele lor asimptotice cu elementele țintei
- $\hat{\gamma} = \|F - S\|^2$: eroarea de specificare a țintei
- Formulele complete pentru ținta de corelație constantă: [Ledoit & Wolf \(2004b\)](#), Anexă; codul: [Quantlet-ul de shrinkage](#)

Anexă: shrinkage-ul mediilor și alți estimatori de covarianță

- ▣ Bayes–Stein ([Jorion \(1986\)](#)): $\hat{\mu}_{BS} = (1 - \hat{\phi}) \hat{\mu} + \hat{\phi} \hat{\mu}_{GMV}$
 - Shrinkage Bayes empiric al fiecărei medii spre media portofoliului GMV; $\hat{\phi}$ dintr-un argument Stein, mai mare când N/T este mare
- ▣ [Tu & Zhou \(2011\)](#): combinația convexă dintre o regulă sofisticată și $1/N$ care minimizează pierderea așteptată în afara eșantionului
- ▣ [DeMiguel, Garlappi, Nogales & Uppal \(2009\)](#): restricțiile de normă $\|w\|_1 \leq \delta$ sau $\|w\|_2 \leq \delta$ includ GMV long-only, GMV cu shrinkage și $1/N$; puntea spre portofoliile lasso din [Capitolul 13](#)
- ▣ Structură factorială plus o covarianță reziduală rară: POET ([Fan, Liao & Mincheva \(2013\)](#)), legătura cu [Capitolul 3](#)
- ▣ GMV în dimensiune mare, cu shrinkage spre un portofoliu-țintă: [Bodnar, Parolya & Schmid \(2018\)](#)

Anexă: Black–Litterman ca estimare mixtă (GLS)

- ▣ Theil & Goldberger (1961): distribuția a priori și opiniile se scriu ca o singură regresie pentru μ

$$\begin{pmatrix} \pi \\ q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I \\ P \end{pmatrix} \mu + \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}, \quad \text{Var} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tau \Sigma & 0 \\ 0 & \Omega \end{pmatrix}$$

- ▣ GLS dă exact μ_{BL} , cu covarianța $M = [(\tau \Sigma)^{-1} + P^T \Omega^{-1} P]^{-1}$
- ▣ Formă echivalentă: $\mu_{BL} = \pi + \tau \Sigma P^T (P \tau \Sigma P^T + \Omega)^{-1} (q - P \pi)$
- ▣ $\Omega \rightarrow 0$: cele mai mici pătrate cu restricții, $P \mu_{BL} = q$
- ▣ Covarianța predictivă $\Sigma + M$ în ponderi ar schimba toate ponderile; fără opinii le scalează cu $1/(1 + \tau)$

Anexă: alte reguli bazate pe risc

- ▣ **Inversul volatilității:** $w_i \propto 1/\sigma_i$; coincide cu ERC când toate corelațiile sunt egale
- ▣ **Diversificare maximă** (Choueifaty & Coignard (2008)): se maximizează $w^\top \sigma / \sqrt{w^\top \Sigma w}$, raportul dintre volatilitatea medie a activelor și volatilitatea portofoliului
- ▣ **Varianță minimă:** GMV, regula extremă bazată pe risc
- ▣ Toate ignoră randamentele așteptate: robuste la eroarea de estimare, dar optime doar în ipoteze speciale

Anexă: rezultate, universul sectoarelor

Regula	Media	Volatilitate	Sharpe	Turnover	Drawdown maxim
1/N	9,4%	14,3%	0,66	0,02	−49%
MV	17,8%	69,0%	0,26	3,86	−100%
MV-LO	10,7%	14,7%	0,72	0,23	−42%
GMV	8,5%	11,9%	0,71	0,23	−33%
GMV-LO	8,1%	11,5%	0,70	0,09	−34%
GMV-LW	7,6%	11,8%	0,65	0,14	−31%
ERC	9,3%	13,2%	0,70	0,03	−47%
HRP	8,9%	12,8%	0,70	0,08	−45%

- Ianuarie 2004 – iulie 2026; turnover: fracțiunea medie lunară din avere tranzacționată; drawdown-ul averii din randamente totale
- MV: o pierdere lunară de peste 100% șterge capitalul (drawdown −100%); media și Sharpe-ul lui descriu o serie ipotetică de randamente

Anexă: rezultate, universul combinat (16 ETF-uri)

Regula	Media	Volatilitate	Sharpe	Turnover	Sharpe, 50 bp
1/N	7,9%	10,3%	0,76	0,02	0,75
MV	28,7%	261,8%	0,11	22,10	-0,51
MV-LO	8,0%	9,8%	0,81	0,20	0,69
GMV	0,8%	4,1%	0,20	0,24	-0,15
GMV-LO	2,0%	5,4%	0,36	0,06	0,30
GMV-LW	0,9%	4,4%	0,20	0,13	0,03
ERC	5,5%	7,8%	0,71	0,03	0,68
HRP	4,0%	7,0%	0,56	0,11	0,47

□ Mai 2012 – iulie 2026; ultima coloană: net de 50 de puncte de bază pe unitate de turnover

Anexă: detaliile bootstrap-ului și lungimea blocului

- Studentizare: $s(\hat{\Delta}^*)$ din sumele pe blocuri ale fiecărei reeșantionări; $s(\hat{\Delta})$ pe date, cu un nucleu pătratic-spectral cu prealbire (Andrews & Monahan (1992)) și lățime de bandă automată (Andrews (1991))
- Ledoit & Wolf (2008), Algoritm 3.1: se alege blocul b al cărui interval bootstrap are acoperirea efectivă cea mai apropiată de 95%
 - ▶ Se estimează o autoregresie vectorială de ordinul întâi pentru perechea de randamente; reziduurile se reeșantionează printr-un bootstrap staționar (Politis & Romano (1994)), bloc mediu 5
 - ▶ Se generează $K = 5000$ de pseudo-eșantioane de lungime T ; în fiecare se construiește intervalul de 95% pentru $b \in \{1, 2, 4, 6, 8, 10\}$
 - ▶ $\hat{g}(b)$: proporția intervalelor care conțin $\hat{\Delta}$ pseudo-adevărat; se alege $\tilde{b} = \arg \min_b |\hat{g}(b) - 0,95|$
- Grila și K sunt cele din articol (Secțiunile 4–5); aplicate fiecăreia dintre cele 21 de perechi din capitol
- Un bootstrap nestudentizat cu bloc fix de 6 luni nu este acest test: blocul lui nu este calibrat pentru acoperire

Anexă: raportul Sharpe deflatat

- Bailey & López de Prado (2014): cel mai bun dintre N rapoarte Sharpe este deplasat în sus chiar dacă toate rapoartele Sharpe adevărate sunt zero
- Maximul așteptat sub H_0 : toate Sharpe-urile adevărate zero, N încercări independente, T în unități lunare; cu $\gamma_E = 0,5772$ (constanta lui Euler) și $\hat{V}$ varianța celor N estimări

$$SR_0 = \sqrt{\hat{V}} \left[(1 - \gamma_E) \Phi^{-1} \left(1 - \frac{1}{N} \right) + \gamma_E \Phi^{-1} \left(1 - \frac{1}{Ne} \right) \right]$$

- Raportul Sharpe deflatat, cu asimetria $\hat{\gamma}_3$ și kurtosisul $\hat{\gamma}_4$ ale câștigătorului

$$DSR = \Phi \left(\frac{(\widehat{SR} - SR_0) \sqrt{T-1}}{\sqrt{1 - \hat{\gamma}_3 \widehat{SR} + \frac{\hat{\gamma}_4 - 1}{4} \widehat{SR}^2}} \right)$$

- Acest capitol: 24 de configurații (8 reguli $\times$ 3 universuri); câștigător MV-LO pe 16 ETF-uri, 0,81 pe an
 - Ca 24 de încercări independente: $SR_0 = 0,52$ pe an, $DSR = 0,84 < 0,95$
 - Configurațiile sunt puternic corelate (până la 0,99), deci mai puține sunt independente: $N = 8$ dă DSR 0,93, $N = 3$ dă 0,98
- Holm ajustează întreaga familie de teste pe perechi față de $1/N$; DSR întreabă dacă cea mai bună configurație este mai bună decât norocul

Anexă: dincolo de acțiuni, activele digitale

- ▣ [Petukhina, Trimborn, Härdle & Elendner \(2021\)](#): criptomonede în regulile de alocare a portofoliului; câștigurile depind de regulă și de lichiditate
- ▣ [Pele et al. \(2023\)](#): devin criptomonede active alternative?
- ▣ Bitcoin: volatilitatea anualizată 172% (lunar, 2010–2026, o monedă supraviețuitoare aleasă ex post), IEF 6,6%
- ▣ Contribuțiile la risc cresc cu volatilitatea: regulile bazate pe risc dau automat lui Bitcoin o pondere mică (Seminarul 4, B5)
- ▣ Markowitz robust pentru crypto-active: [Pele \(2023\)](#)

Anexă: studiul de caz, metoda în detaliu (1/2)

- Costul (ec. 4, 7): π_t ponderile activelor riscante, $1 - 1^\top \pi_t$ în activul fără risc; $g_t = \text{diag}((1 + r_t^f + r_t)/(1 + g_t^w))$ (ec. 6), g_t^w creșterea averii; $\Lambda = \text{diag}(0, 2/V_i)$, V_i volumul zilnic mediu în dolari pe 6 luni: tranzacționarea a 1% din V_i mută prețul cu 0,1% (ec. 35, [Frazzini, Israel & Moskowitz \(2018\)](#))
- Regula optimă (Propoziția 3): $\pi_t = m g_t \pi_{t-1} + (1 - m) A_t$, A_t o sumă ponderată a portofoliilor Markowitz de azi și a celor viitoare așteptate; m rezolvă ec. (14); generalizează [Gârleanu & Pedersen \(2013\)](#)
- Portfolio-ML (Propoziția 4, ec. 40): $A_t = \text{diag}(1/\sigma_{i,t}) f(s_t) \beta$, $f = p$ caracteristici Fourier aleatoare ale semnalelor s_t ; $\hat{\beta} = (E_T[\tilde{\Sigma}_t] + \lambda I)^{-1} E_T[\tilde{r}_{t+1}]$, o regresie ridge care maximizează în formă închisă utilitatea netă de costuri (ec. 24–26), învățând direct ponderile, cum fac [Brandt, Santa-Clara & Valkanov \(2009\)](#) fără costuri

Anexă: studiul de caz, metoda în detaliu (2/2)

- Date (Secțiunea 5.1): acțiuni ordinare NYSE peste capitalizarea mediană (184–805 acțiuni), 115 caracteristici din [Jensen, Kelly & Pedersen \(2023\)](#) ordonate în $[0, 1]$; decembrie 1952 – decembrie 2020, în afara eșantionului 1981–2020, lunar
- Σ : 13 teme de caracteristici și 12 industrii ca factori, ponderi exponențiale cu timpi de înjumătățire de 378 de zile (corelații) și 126 de zile (varianțe); investorul $\gamma = 10$, avere de 10 miliarde \$ la sfârșitul lui 2020, care crește odată cu piața (Secțiunea 5.1.3)
- Calibrare (Tabelul 1): $\lambda \in \{0, e^{-10}, e^{-9.8}, \dots, e^{10}\}$, $p \in \{2^6, \dots, 2^9\}$, $\eta \in \{e^{-3}, e^{-2}\}$ (abaterea standard a ponderilor aleatoare), alese anual după utilitatea backtest-urilor de validare din 1971
- Rivali: Markowitz-ML (ec. 32), Static-ML (cost pe o perioadă, ec. 34), Multiperiod-ML (prognoze pentru 12 orizonturi, ec. 22), sortări pe factori, $1/N$, varianță minimă, piața; „*” marchează un nivel suplimentar de calibrare (Secțiunea 5.3)

Anexă: studiul de caz, rezultatele complete

- Tabelul 2, Portfolio-ML: raport Sharpe net 1,33, utilitate 0,086 (randament net 15%, volatilitate 11%, cost 0,6% pe an, turnover 0,25)
- Tabelul 2, Multiperiod-ML*: Sharpe net 0,83, utilitate 0,020; Portfolio-ML nu are nevoie de un al doilea nivel de calibrare
- Tabelul 3: probabilitatea a posteriori ca Portfolio-ML să aibă utilitatea mai mare: 99,9% față de Static-ML* și Multiperiod-ML*, 100% față de Markowitz-ML
- Figura 1(B) (Secțiunea 6.2): cu 10 miliarde \$ și $\gamma = 10$, randament net în exces 14,6% la volatilitatea de 11%; cu 1 miliard \$, 16,3% la aceeași volatilitate: mărimea este un cost
- Figura 5: net de costuri, calitatea este tema cea mai importantă, iar reversal-ul pe termen scurt aproape irelevant; autocorelația lunară $-0,04$ pentru reversal-ul de o lună, $0,94$ pentru book-to-market (Secțiunea 6.3): semnalele persistente sunt ieftin de tranzacționat
- Limite declarate de autori: comisioane și alte fricțiuni, putere de calcul și metode ML indisponibile în timp real la începutul eșantionului (Secțiunea 6.1); costurile și riscul considerate constante pe orizontul fiecărei optimizări (Secțiunea 5.1.3); printre cele mai mici 20% dintre acțiuni, Portfolio-ML este în urma Multiperiod-ML* și Static-ML* (Figura 8)

Anexă: studiul de caz, replicarea din curs

- Datele cursului: 14 acțiuni din SUA și 9 ETF-uri sectoriale; cinci semnale (randamentul pe o lună, momentum de la $t - 6$ și de la $t - 12$ la $t - 1$, volatilitatea pe un an, volumul în dolari pe 6 luni); aceeași regulă de cost, γ , avere și grilă; Σ cu aceleași ponderi pe cele 23 de active; validare din 2011; randamente în afara eșantionului februarie 2014 – august 2026 (151 de luni)
- Portfolio-ML: Sharpe net 0,57, utilitate 0,016, cost 0,6% pe an, levier 0,32; 1/N: Sharpe net 0,61, utilitate $-0,26$ (volatilitate netă 30%)
- Utilitate: Static-ML $-0,13$; varianța minimă $-0,72$ (cost 43% pe an); Markowitz-ML extrem de negativă (levier 18)
- Probabilitatea a posteriori a unei utilități mai mari pentru Portfolio-ML: 99,5% față de Static-ML, 99,9% față de varianța minimă, 93,3% față de 1/N
- Aceeași ierarhie a regulilor care țin cont de costuri față de cele care le ignoră ca în Tabelul 2; Portfolio-ML câștigă prin poziții mici, tranzacționate lent, nu printr-un Sharpe brut mai mare (0,68 față de 0,87 pentru 1/N)
- Limite: 23 de active în loc de 184–805, cinci semnale în loc de 115, fără model factorial pentru Σ , a cărui fereastră ajunge la 10 ani abia în august 2014 (prețuri comune din august 2004); prognoze de randament cu $p \geq 2^6$ și trei ani de validare (articolul: 2^1-2^9 , zece ani), fără rivalii marcați cu stea
- Extensie deschisă: frontiere implementabile pentru averi de 1, 10 și 100 de miliarde \$ și $\gamma \in \{1, 5, 10, 20, 100\}$, cu costurile lui 1/N calculate la fiecare nivel de avere (Seminarul 4, C3)

Anexă: bucla de descoperire, prompturi reutilizabile (1/2)

- Instrumentele sunt interschimbabile: un asistent AI (Claude, ChatGPT, Gemini, GitHub Copilot) și motoare de căutare a literaturii (Semantic Scholar, Elicit, Google Scholar)
- **Literatură:** „Enumeră studiile evaluate colegial din 2015 încoace care compară regulile cu shrinkage sau bazate pe risc cu $1/N$ în afara eșantionului; pentru fiecare dă DOI, N , T , ipoteza de cost și testul.” Rezolvați fiecare DOI pe Crossref și deschideți tabelul citat
- **Ipoteze:** „Dă trei explicații concurente pentru un câștig de Sharpe față de $1/N$ (o Σ mai bună, o primă de volatilitate redusă, noroc) și implicația testabilă a fiecăreia pentru turnover, subperioade și expunerile la factori.”
- **Date și cod:** „Scrie cod Python care citește prețurile zilnice din datele cursului, aliniază prețurile pe zilele comune și rulează GMV-LW și $1/N$ cu o fereastră rulantă de 60 de luni; ponderile de la t pot folosi date doar până la $t - 1$.” Replicați întâi: $1/N$ 0,76, GMV-LW 0,20 pe universul combinat

Anexă: bucla de descoperire, prompturi reutilizabile (2/2)

- ▣ **Robustețe:** „Scrie o preînregistrare: familia de teste ($\text{reguli} \times \text{universuri} \times \text{ferestre} \times \text{costuri}$), rata de eroare (FWER sau FDR), subperioadele și un placebo, fixate înainte de a vedea vreun rezultat.”
- ▣ **Critică:** „Joacă rolul unui referent: dă cele mai puternice trei motive pentru care câștigul meu de Sharpe este fals și testul care l-ar demasca pe fiecare.”
- ▣ **Raport:** fiecare specificație încercată, valori p ajustate, puterea designului, codul și seed-urile; orice specificație aleasă după ce ai văzut rezultatele este exploratorie
- ▣ Portofoliile agregă randamente **simple**, iar rapoartele Sharpe folosesc randamente **în exces**: recalculați o lună pas cu pas

Anexă: studiu suplimentar, cod și date

Cursuri avansate pe quantinar.com

-  Hierarchical Clustering
-  Minimum Spanning Tree
-  Multivariate Statistical Analysis

Cod și date

- Toate graficele și tabelele: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_04
- Rata fără risc: [Kenneth French Data Library](#)

Bibliografie (1/10)

- ▣ Andrews, D.W.K. (1991). [Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation](#). *Econometrica*, 59(3), 817–858.
- ▣ Andrews, D.W.K., Monahan, J.C. (1992). [An improved heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimator](#). *Econometrica*, 60(4), 953–966.
- ▣ Bailey, D.H., López de Prado, M. (2014). [The deflated Sharpe ratio: correcting for selection bias, backtest overfitting, and non-normality](#). *Journal of Portfolio Management*, 40(5), 94–107.
- ▣ Benjamini, Y., Hochberg, Y. (1995). [Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing](#). *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 57(1), 289–300.
- ▣ Best, M.J., Grauer, R.R. (1991). [On the sensitivity of mean-variance-efficient portfolios to changes in asset means: some analytical and computational results](#). *Review of Financial Studies*, 4(2), 315–342.
- ▣ Black, F., Litterman, R. (1992). [Global portfolio optimization](#). *Financial Analysts Journal*, 48(5), 28–43.

Bibliografie (2/10)

- ▣ Bodnar, T., Parolya, N., Schmid, W. (2018). Estimation of the global minimum variance portfolio in high dimensions. *European Journal of Operational Research*, 266(1), 371–390.
- ▣ Brandt, M.W., Santa-Clara, P., Valkanov, R. (2009). Parametric portfolio policies: exploiting characteristics in the cross-section of equity returns. *Review of Financial Studies*, 22(9), 3411–3447.
- ▣ Britten-Jones, M. (1999). The sampling error in estimates of mean-variance efficient portfolio weights. *Journal of Finance*, 54(2), 655–671.
- ▣ Chopra, V.K., Ziemba, W.T. (1993). The effect of errors in means, variances, and covariances on optimal portfolio choice. *Journal of Portfolio Management*, 19(2), 6–11.
- ▣ Choueifaty, Y., Coignard, Y. (2008). Toward maximum diversification. *Journal of Portfolio Management*, 35(1), 40–51.
- ▣ DeMiguel, V., Garlappi, L., Nogales, F.J., Uppal, R. (2009). A generalized approach to portfolio optimization: improving performance by constraining portfolio norms. *Management Science*, 55(5), 798–812.

Bibliografie (3/10)

- ▣ DeMiguel, V., Garlappi, L., Uppal, R. (2009). Optimal versus naive diversification: how inefficient is the 1/N portfolio strategy?. *Review of Financial Studies*, 22(5), 1915–1953.
- ▣ Dragotă, M., Șerbănescu, C.I., Pele, D.T. (2008). Portfolio diversification and market share analysis for Romanian insurance companies. În *Risk Management and Value*, World Scientific, 277–298.
- ▣ Fan, J., Liao, Y., Mincheva, M. (2013). Large covariance estimation by thresholding principal orthogonal complements. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 75(4), 603–680.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, ed. a 5-a. Springer.
- ▣ Frazzini, A., Israel, R., Moskowitz, T.J. (2018). *Trading costs*. SSRN Working Paper 3229719.
- ▣ Frost, P.A., Savarino, J.E. (1988). For better performance: constrain portfolio weights. *Journal of Portfolio Management*, 15(1), 29–34.

Bibliografie (4/10)

- ▣ Gârleanu, N., Pedersen, L.H. (2013). [Dynamic trading with predictable returns and transaction costs](#). *Journal of Finance*, 68(6), 2309–2340.
- ▣ Härdle, W.K., Simar, L. (2019). [Applied Multivariate Statistical Analysis](#), ed. a 5-a. Springer.
- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y. (2015). [Backtesting](#). *Journal of Portfolio Management*, 42(1), 13–28.
- ▣ He, G., Litterman, R. (2002). [The intuition behind Black-Litterman model portfolios](#). SSRN Working Paper 334304.
- ▣ Jagannathan, R., Ma, T. (2003). [Risk reduction in large portfolios: why imposing the wrong constraints helps](#). *Journal of Finance*, 58(4), 1651–1683.
- ▣ Jensen, T.I., Kelly, B., Malamud, S., Pedersen, L.H. (2026). [Machine learning and the implementable efficient frontier](#). *Review of Financial Studies*, 39(10), 3035–3078.

Bibliografie (5/10)

- ▣ Jensen, T.I., Kelly, B., Pedersen, L.H. (2023). *Is there a replication crisis in finance?*. *Journal of Finance*, 78(5), 2465–2518.
- ▣ Jobson, J.D., Korkie, B.M. (1981). *Performance hypothesis testing with the Sharpe and Treynor measures*. *Journal of Finance*, 36(4), 889–908.
- ▣ Jorion, P. (1986). *Bayes-Stein estimation for portfolio analysis*. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 21(3), 279–292.
- ▣ Kan, R., Wang, X., Zhou, G. (2022). *Optimal portfolio choice with estimation risk: no risk-free asset case*. *Management Science*, 68(3), 2047–2068.
- ▣ Kan, R., Zhou, G. (2007). *Optimal portfolio choice with parameter uncertainty*. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 42(3), 621–656.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). *The jackknife and the bootstrap for general stationary observations*. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.

Bibliografie (6/10)

- ▣ Laloux, L., Cizeau, P., Bouchaud, J.-P., Potters, M. (1999). Noise dressing of financial correlation matrices. *Physical Review Letters*, 83(7), 1467–1470.
- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2003). Improved estimation of the covariance matrix of stock returns with an application to portfolio selection. *Journal of Empirical Finance*, 10(5), 603–621.
- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2004a). A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2), 365–411.
- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2004b). Honey, I shrunk the sample covariance matrix. *Journal of Portfolio Management*, 30(4), 110–119.
- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2008). Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Journal of Empirical Finance*, 15(5), 850–859.
- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2017). Nonlinear shrinkage of the covariance matrix for portfolio selection: Markowitz meets Goldilocks. *Review of Financial Studies*, 30(12), 4349–4388.

Bibliografie (7/10)

- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2020). Analytical nonlinear shrinkage of large-dimensional covariance matrices. *Annals of Statistics*, 48(5), 3043–3065.
- ▣ Lo, A.W. (2002). The statistics of Sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- ▣ López de Prado, M. (2016). Building diversified portfolios that outperform out of sample. *Journal of Portfolio Management*, 42(4), 59–69.
- ▣ Maillard, S., Roncalli, T., Teïletche, J. (2010). The properties of equally weighted risk contribution portfolios. *Journal of Portfolio Management*, 36(4), 60–70.
- ▣ Mantegna, R.N. (1999). Hierarchical structure in financial markets. *European Physical Journal B*, 11(1), 193–197.
- ▣ Marčenko, V.A., Pastur, L.A. (1967). Distribution of eigenvalues for some sets of random matrices. *Mathematics of the USSR-Sbornik*, 1(4), 457–483.

Bibliografie (8/10)

- ▣ Markowitz, H. (1952). *Portfolio selection*. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- ▣ Merton, R.C. (1972). *An analytic derivation of the efficient portfolio frontier*. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 7(4), 1851–1872.
- ▣ Merton, R.C. (1980). *On estimating the expected return on the market: an exploratory investigation*. *Journal of Financial Economics*, 8(4), 323–361.
- ▣ Michaud, R.O. (1989). *The Markowitz optimization enigma: is 'optimized' optimal?*. *Financial Analysts Journal*, 45(1), 31–42.
- ▣ Okhrin, Y., Schmid, W. (2006). *Distributional properties of portfolio weights*. *Journal of Econometrics*, 134(1), 235–256.
- ▣ Pele, D.T. (2023). *Robust Markowitz for crypto-assets*. Curs Quantinar, Academia de Studii Economice din București.

Bibliografie (9/10)

- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). *Are cryptos becoming alternative assets?*. *The European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Petukhina, A., Trimborn, S., Härdle, W.K., Elendner, H. (2021). *Investing with cryptocurrencies – evaluating their potential for portfolio allocation strategies*. *Quantitative Finance*, 21(11), 1825–1853.
- ▣ Politis, D.N., Romano, J.P. (1994). *The stationary bootstrap*. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.
- ▣ Sharpe, W.F. (1966). *Mutual fund performance*. *Journal of Business*, 39(S1), 119–138.
- ▣ Theil, H., Goldberger, A.S. (1961). *On pure and mixed statistical estimation in economics*. *International Economic Review*, 2(1), 65–78.
- ▣ Tobin, J. (1958). *Liquidity preference as behavior towards risk*. *Review of Economic Studies*, 25(2), 65–86.

Bibliografie (10/10)

- Tu, J., Zhou, G. (2011). Markowitz meets Talmud: a combination of sophisticated and naive diversification strategies. *Journal of Financial Economics*, 99(1), 204–215.
- Date: Kenneth R. French Data Library, mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html.