



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 1: Fapte stilizate și randamente — aplicații



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ ARCH-LM: ARCH Lagrange Multiplier (test) (testul multiplicatorului Lagrange pentru efecte ARCH)
- ▣ BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ COVID-19: COroNaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- ▣ CUSUM: CUmulative SUM (of squares) (suma cumulată (a pătratelor))
- ▣ EGARCH: Exponential GARCH (GARCH exponențial)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ FIGARCH: Fractionally Integrated GARCH (GARCH integrat fracționar)
- ▣ FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GJR-GARCH: Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH (GARCH asimetric Glosten-Jagannathan-Runkle)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ HAR: Heterogeneous AutoRegressive (model) (model autoregresiv heterogen)
- ▣ JB: Jarque-Bera (test) (testul de normalitate Jarque-Bera)
- ▣ MDD: Maximum DrawDown (scăderea maximă de la vârf)
- ▣ OHLC: Open, High, Low, Close (deschidere, maxim, minim, închidere)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ QQ: Quantile-Quantile (plot) (graficul cuantilă-cuantilă)
- ▣ RMSE: Root Mean Squared Error (rădăcina erorii pătratice medii)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ **SUA: Statele Unite ale Americii**
- ▣ **UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné)**
(timpul universal coordonat)
- ▣ **VIX: CBOE Volatility Index (indicele de volatilitate CBOE)**

Întrebarea de azi și ce trebuie predat

- ▣ Întrebarea seminarului: **ce fapte stilizate din Cursul 1 rezistă unei inferențe care ține cont de cozile groase și de gruparea volatilității?**
- ▣ Parcursul la seminar (circa 2×50 de minute de lucru, restul discuție)
 - ▶ randamente și momente: A1, B1, A3, B2
 - ▶ cozi și dependență: A6, B3, A10, B9, A7, B11, B4
 - ▶ drawdown și un răspuns AI de corectat: A4(a), C2
- ▣ De predat (lista de pe ultimul slide al părții obligatorii): răspunsurile A, câte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B, codul corectat din C2, o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminar: drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiu	Întrebare	Tip	Model
A1	cum se adună randamentele în timp?	Rezolvat	–
B1	cât de groase sunt cozile și cât de fragil este kurtosisul?	Rezolvat	–
A3	de la statistică la p-value: JB și Ljung–Box	Rezolvat	–
B2	cât de mare este VaR 1% pentru BET-TR?	Propus	B1
A6	de ce creează volatilitatea aleatoare cozi groase?	Rezolvat	–
B3	sunt randamentele Bitcoin independente?	Rezolvat	–
A10	de ce lărgeste gruparea banda autocorelației?	Propus	A6
B9	ce autocorelații rezistă inferenței robuste?	Rezolvat	–
A7	estimatorul Hill, pas cu pas	Rezolvat	–
B11	sunt pierderile mai groase decât câștigurile?	Rezolvat	–
B4	se apropie randamentele de distribuția Normală odată cu orizontul?	Propus	B1, B3
A4(a)	cât de adânc este un drawdown?	Propus	A1
C2	ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	A3, B3, B9
Pachete de extindere	A1(c), A2, A4(b–e), A5, A8, A9, A11, B1(d), B5–B8, B10, B12–B15, C1, C3 (opționale)	ambele	indicat la fiecare cerință

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați voi, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hârtie; Partea B: verificare și inferență pe date reale, fiecare cu o întrebare de interpretare la final; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Serie	Simbol, câmp	Prețuri folosite	Calendar	Randamente
BET-TR	BETTR.INDX, close	23 sept. 2014 – 18 sept. 2026	zilele de tranzacționare BVB	2.992
Bitcoin	BTC-USD.CC, close	17 sept. 2014 – 18 sept. 2026	în fiecare zi, 24:00 UTC	4.384
EUR/RON	cursul de referință BNR	4 iul. 2005 – 18 sept. 2026	zilele lucrătoare din România	5.352
S&P 500	GSPC.INDX, OHLC	2 ian. 1990 – 18 sept. 2026	zilele de tranzacționare din SUA	9.245
ETF-ul SPY	SPY.US, OHLC, adjusted close	2 ian. 2008 – 18 sept. 2026 (B8)	zilele de tranzacționare din SUA	–
VIX, VIX pe 9 zile	VIX.INDX, VIX9D.INDX, close	doar C3	zilele de tranzacționare din SUA	–

- Fișierele de piață: `data/market/<SIMBOL>.csv`, coloanele date, open, high, low, close, adjusted_close, volume
- EUR/RON este cursul oficial de referință BNR (funcția `load_data('eurron')` din notebook), nu fișierul de piață `EURRON.FOREX`
- Unități: randamentele sunt în zecimale în cod și în % pe slide-uri; fiecare serie pe propriul calendar; analizele comune unesc întâi *prețurile* pe zilele comune

Pregătire: rulați și verificați

```
# secțiunea "Date" din notebook definește load_data(name)
closes = {a: load_data(a)['Close'] for a in
           ['sp500', 'bettr', 'btc', 'eurron']}
rets = {a: np.log(c).diff().dropna()
        for a, c in closes.items()}
r_bet, r_btc = rets['bettr'], rets['btc']
r_eur, r_sp = rets['eurron'], rets['sp500']
for a, r in rets.items():
    print(a, r.index[0].date(), len(r))
```

- Rezultat așteptat: data primului randament și numărul de randamente


Serie	primul randament	T
S&P 500	1990-01-03	9.245
BET-TR	2014-09-24	2.992
Bitcoin	2014-09-18	4.384
EUR/RON	2005-07-05	5.352

- Momente: `scipy.stats.skew` și `kurtosis` (exces de kurtosis, fără corecție de eșantion mic); abateri standard cu `ddof=1`; cuantile cu `numpy.quantile` (liniar)
- Dacă un număr diferă, opriți-vă și verificați simbolul, câmpul și data de început

Notății folosite în toate exercițiile

- ▣ P_t : preț; randament simplu $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$; randament logaritmic $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$; T : numărul de randamente
- ▣ $\bar{r}$, $\hat{\sigma}$: media și abaterea standard de selecție; $z_t = (r_t - \bar{r})/\hat{\sigma}$; $x_t = r_t - \bar{r}$
- ▣ **Asimetria** $\hat{S} = \frac{1}{T} \sum_t z_t^3$; **kurtosisul** $\hat{K} = \frac{1}{T} \sum_t z_t^4$; **excesul de kurtosis** $\hat{K} - 3$ (0 pentru distribuția Normală)
- ▣ **Autocorelația** la lagul k : $\hat{\rho}_k = \sum_{t=k+1}^T x_t x_{t-k} / \sum_{t=1}^T x_t^2$
- ▣ **Anualizarea** cu P intervale de randament pe an: 252 (BET-TR, S&P 500, EUR/RON), 365 (Bitcoin); volatilitatea $\sqrt{P} \hat{\sigma}$
- ▣ **p-value**: probabilitatea, sub H_0 , a unei statistici cel puțin la fel de extreme ca cea observată; nu este probabilitatea ca H_0 să fie adevărată
- ▣ Un exemplu: $P_0 = 100$, $P_1 = 102$: $R_1 = 2,00\%$, $r_1 = \ln 1,02 = 1,98\%$

Prima privire: prețuri, randamente și extreme datate



- Fiecare zi extremă este un eveniment datat: taxa pe activele bancare (19 dec. 2018), prăbușirea din pandemia COVID-19 (martie 2020), deprecierea leului din 2008
- Perioadele calme alternează cu cele agitate în toate cele trei serii
- EUR/RON este aproape plat după 2013
- Întâi privim datele, apoi testăm


A1 [Rezolvat]: randamente și anualizare — cerința

- ▣ **Întrebare:** ce randament se adună în timp și cum devin cifrele zilnice cifre anuale?
- ▣ **Date de intrare:** o acțiune închide la 100, 110, 99, 104,5 în zilele 0–3 și nu plătește dividend; un indice are un randament logaritmic mediu zilnic de 0,04% și o volatilitate zilnică de 1,2%; Bitcoin are o volatilitate zilnică de 3,5%; randamentele sunt necorelate serial, cu varianță constantă
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați cele trei randamente simple R_t și cele trei randamente logaritmice r_t , toate în %.
 2. Calculați randamentele pe 3 zile $P_3/P_0 - 1$ și $\ln(P_3/P_0)$ și comparați-le cu $\sum_t R_t$ și $\sum_t r_t$.
 3. Anualizați randamentul logaritmic mediu și volatilitatea indicelui cu $P = 252$.
 4. Anualizați volatilitatea Bitcoin și justificați alegerea lui P .
- ▣ **De raportat:** un tabel zi, preț, R_t , r_t și cele trei cifre anuale
- ▣ Notebook: secțiunea A1

A1 [Rezolvat]: rezolvare

t	P_t	R_t	r_t
0	100	—	—
1	110	+10,00%	+9,53%
2	99	-10,00%	-10,54%
3	104,5	+5,56%	+5,41%
sumă		5,56%	4,40%
$0 \rightarrow 3$		4,50%	4,40%

- Randamentele logaritmice se reduc telescopic la $\ln(104,5/100)$; randamentele simple se compun: $1,1 \times 0,9 \times 1,0556 - 1 = 4,5\%$



- Indice: randamentul logaritmic mediu anualizat
 $252 \times 0,04\% = 10,08\%$; volatilitatea
 $\sqrt{252} \times 1,2\% = 15,87 \times 1,2\% = 19,05\%$
- Bitcoin se tranzacționează zilnic: $\sqrt{365} \times 3,5\% = 66,9\%$; cu
 $\sqrt{252}$ s-ar raporta 55,6%, cu 17% prea puțin

B1 [Rezolvat]: statistici descriptive — cerința


- ▣ **Întrebare:** cât de groase sunt cozile BET-TR, Bitcoin și EUR/RON și cât depinde kurtosisul de câteva zile?
- ▣ **Date:** r_{bet} , r_{btc} , r_{eur} din pregătire ($T = 2.992, 4.384, 5.352$); $P = 252, 365, 252$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați media, abaterea standard, volatilitatea anualizată, asimetria, excesul de kurtosis, minimul și maximul fiecărei serii.
 2. Calculați $JB = T[\hat{S}^2/6 + (\hat{K} - 3)^2/24]$ și cei doi termeni ai săi; comparați JB cu 5,99, valoarea critică la 5% a lui χ^2_2 .
 3. Recalculați fiecare exces de kurtosis după eliminarea zilei cu cel mai mare $|r_t|$ și după eliminarea celor mai mari cinci.
 4. Recalculați kurtosisul Crow–Siddiqui pe cuantile, $\frac{q_{0,975} - q_{0,025}}{q_{0,75} - q_{0,25}} - 2,91$, pe aceleași eșantioane reduse (0 pentru distribuția Normală).
- ▣ **De raportat:** un tabel pentru pașii 1–2 și un grafic al kurtosisului în funcție de numărul de zile eliminate
- ▣ **Interpretare:** ce măsură a grosimii cozilor puteți raporta cu încredere?

B1 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — BET-TR pas cu pas

- Pasul 1: $\bar{r} = 0,077\%$, $\hat{\sigma} = 0,978\%$; volatilitatea $\sqrt{252} \times 0,978\% = 15,5\%$; $\hat{S} = -1,40$, $\hat{K} - 3 = 17,79$
 - ▶ cea mai slabă zi $-11,86\%$ pe 19 dec. 2018 (taxa pe activele bancare), cea mai bună $+6,71\%$ pe 24 dec. 2018
- Pasul 2: termenul de asimetrie $2.992 \times 1,40^2/6 = 977$; termenul de kurtosis $2.992 \times 17,79^2/24 = 39.455$
 - ▶ $JB = 40.433$: 98% din statistică vine din termenul de kurtosis; $p < 10^{-10}$
- Pasul 3: exces de kurtosis 17,8 cu toate zilele, 11,8 fără 19 dec. 2018, 5,95 fără cele mai mari cinci zile (19 dec. 2018, 16 mar. 2020, 9 mar. 2020, 24 dec. 2018, 9 mar. 2022)
- Pasul 4: Crow-Siddiqui 1,06 cu toate zilele, 1,01 fără cele mai mari cinci zile
- O singură zi aduce o treime din kurtosisul pe momente; măsura pe cuantile nu se mișcă

	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON
Medie (% pe zi)	0,077	0,118	0,007
Abatere std. (% pe zi)	0,978	3,485	0,279
Volatilitate (% pe an)	15,5	66,6	4,4
Asimetrie	-1,40	-0,70	0,73
Exces de kurtosis	17,8	12,0	15,1
Min (%)	-11,9	-46,5	-2,5
Max (%)	6,7	22,5	2,9
JB	40.433	26.482	51.575
Fără primele 5 zile	5,95	4,24	11,17

B1 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — sensibilitate



- Toate statisticile JB depășesc 5,99 cu patru ordine de mărime; Bitcoin fără ziua de 12 mar. 2020: kurtosis 12,0 → 5,3
- Interpretare: cozile sunt groase după ambele măsuri; raportați kurtosisul pe cuantile, a cărei valoare nu depinde de câteva zile


A3 [Rezolvat]: Jarque–Bera și Ljung–Box, pas cu pas — cerința

- ▣ **Întrebare:** cum devine o statistică o decizie și de ce ipoteze are nevoie decizia?
- ▣ **Date de intrare:** două eșantioane ipotetice de randamente zilnice; teste la pragul de 5%
 - ▶ eșantionul 1: $T = 2.500$, asimetria $\hat{S} = -0,5$, kurtosisul $\hat{K} = 8$ (nu excesul)
 - ▶ eșantionul 2: $T = 1.000$, $\hat{\rho}_1 = 0,10$, $\hat{\rho}_2 = -0,05$, $\hat{\rho}_3 = 0,03$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați cei doi termeni ai $JB = T[\hat{S}^2/6 + (\hat{K} - 3)^2/24]$ Jarque & Bera (1980), statistica și $p = P(\chi^2_2 \geq JB)$.
 2. Calculați cei trei termeni ai $Q(3) = T(T+2) \sum_{k=1}^3 \hat{\rho}_k^2 / (T-k)$ Ljung & Box (1978), statistica și $p = P(\chi^2_3 \geq Q)$.
 3. Formulați H_0 pentru fiecare test și ipoteza distribuției de referință χ^2 care eșuează în prezența grupării volatilității.
- ▣ **De raportat:** termenii, cele două statistici, p-value-urile și deciziile
- ▣ **Notebook:** secțiunea A3

A3 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — pas cu pas

1. $\hat{S}^2/6 = 0,25/6 = 0,042$; $(\hat{K} - 3)^2/24 = 25/24 = 1,042$
▶ $JB = 2.500 \times 1,084 = 2.708,3$, $p < 10^{-10}$: respingem; 96% din JB este termenul de kurtosis
2. $0,01/999 = 1,001 \times 10^{-5}$, $0,0025/998 = 0,251 \times 10^{-5}$, $0,0009/997 = 0,090 \times 10^{-5}$
▶ $Q(3) = 1.000 \times 1.002 \times 1,342 \times 10^{-5} = 13,44$, $p = 0,004$: respingem
3. JB: H_0 = i.i.d. și distribuție Normală; Ljung–Box: H_0 = fără autocorelație, dar referința χ^2_3 cere și randamente i.i.d.
▶ în prezența grupării $\text{Var}(\hat{\rho}_k) > 1/T$, iar Q respinge prea des (A10, B9)

A3 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — distribuțiile de referință



- p-value-ul este aria de sub densitatea χ^2 dincolo de statistica observată
- Interpretare: pentru un eșantion i.i.d. ambele respingeri sunt corecte; pentru randamente cu grupare doar respingerea prin JB a ipotezei "i.i.d. și distribuție Normală" este corectă, p-value-ul lui $Q(3)$ este prea mic

B2 [Propus]: cozi groase și VaR 1% pe BET-TR — cerința

- ▣ **Model:** B1 [Rezolvat]; secțiunea B2 din notebook
- ▣ **Întrebare:** cât de mare este pierderea pe o zi depășită în 1% din zile, sub trei distribuții?
- ▣ **Date:** r_{bet} , $T = 2.992$; modelele sunt estimate și verificate pe **același** eșantion: o comparație descriptivă, nu un backtesting
- ▣ **Cerințe**
 1. Standardizați $z_t = (r_t - \bar{r})/\hat{\sigma}$ și numărați zilele cu $|z_t| > 3$; comparați ponderea lor cu 0,27% sub distribuția Normală.
 2. Estimați o distribuție Student- t pentru z_t prin verosimilitate maximă (`scipy.stats.t.fit`: grade de libertate ν , locație m , scală s).
 3. Calculați cuantila de 1% a lui z_t ca $q_z = m + s t_{\nu}^{-1}(0,01)$, apoi $q_r = \bar{r} + \hat{\sigma} q_z$ și $\text{VaR}_{1\%} = -q_r$; repetați cu $q_z = \Phi^{-1}(0,01) = -2,326$ și cu cuantila empirică de 1% a lui r_t .
 4. Numărați depășirile ($r_t < q_r$) pentru fiecare VaR și comparați-le cu 0,01 $T = 29,9$.
- ▣ **De raportat:** un tabel metodă / VaR / depășiri și un grafic al cozii stângi cu cele trei cuantile
- ▣ **Interpretare:** de ce are VaR-ul empiric, prin construcție, circa 30 de depășiri?

A6 [Rezolvat]: kurtosisul unei mixturi de volatilitate — cerința


- ▣ **Întrebare:** poate volatilitatea aleatoare să creeze singură cozi groase?
- ▣ **Ipoteze:** $r_t = \sigma_t \varepsilon_t$, ε_t i.i.d. $N(0, 1)$ și independent de σ_t ; $\sigma_t = 1\%$ cu probabilitatea 0,8 și 2% cu probabilitatea 0,2, extras **independent în fiecare zi**
- ▣ **Cerințe**
 1. Folosind independența și $\mathbb{E}\varepsilon^4 = 3$, arătați că $K = \mathbb{E}r^4 / (\mathbb{E}r^2)^2 = 3 \mathbb{E}\sigma^4 / (\mathbb{E}\sigma^2)^2$.
 2. Completați un tabel cu cele două stări: probabilitatea, σ^2 (în $\%^2$) și σ^4 (în $\%^4$); calculați $\mathbb{E}\sigma^2$, $\mathbb{E}\sigma^4$ și K .
 3. Folosiți inegalitatea lui Jensen, $\mathbb{E}[X^2] \geq (\mathbb{E}X)^2$ cu $X = \sigma^2$, ca să arătați că $K \geq 3$.
 4. Spuneți dacă acest model produce grupare a volatilității.
- ▣ **De raportat:** tabelul, K și excesul de kurtosis
- ▣ **Interpretare:** legați rezultatul de ipoteza mixturii de distribuții a lui [Clark \(1973\)](#)
- ▣ Notebook: secțiunea A6

A6 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — momente

Stare	Prob.	σ^2	σ^4
calmă	0,8	1	1
agitată	0,2	4	16
medie		1,6	4,0

1. $\mathbb{E}r^4 = \mathbb{E}\sigma^4 \mathbb{E}\varepsilon^4 = 3 \mathbb{E}\sigma^4$ și $\mathbb{E}r^2 = \mathbb{E}\sigma^2$
2. $K = 3 \times 4,0 / 1,6^2 = 12 / 2,56 = 4,69$; excesul de kurtosis 1,69
3. $\mathbb{E}[(\sigma^2)^2] \geq (\mathbb{E}\sigma^2)^2$, cu egalitate doar pentru σ constant: $K \geq 3$
4. Fără grupare: stările sunt independente de la o zi la alta, deci $|r_t|$ este necorelat; A8 le face persistente

A6 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — densități




- $P(|r_t| > 4\%)$: 0,92% în mixtură, 0,16% pentru distribuția Normală cu aceeași varianță
- Interpretare: "timpul de afaceri" aleator al lui [Clark \(1973\)](#) este o astfel de mixtură: variația volatilității creează cozi groase

B3 [Rezolvat]: necorelate, dar nu independente (Bitcoin) — cerința

- ▣ **Întrebare:** prezic randamentele trecute ale lui Bitcoin direcția sau doar mărimea randamentului de azi?
- ▣ **Date:** r_{btc} , 18 sept. 2014 – 18 sept. 2026, $T = 4.384$
- ▣ **Cerințe**
 1. Reprezentați randamentele, apoi ACF pentru r_t , $|r_t|$ și r_t^2 la lagurile 1–100, cu banda de referință i.i.d. $\pm 1,96/\sqrt{T} = \pm 0,030$.
 2. Calculați Ljung–Box $Q(10)$ pe r_t și pe r_t^2 (acorr_ljungbox), cu p-value-uri din χ^2_{10} .
 3. Rulați testul ARCH-LM cu 5 laguri Engle (1982): regresați x_t^2 pe o constantă și pe $x_{t-1}^2, \dots, x_{t-5}^2$ și comparați $(T-5)R^2$ cu χ^2_5 .
- ▣ **De raportat:** graficul, autocorelațiile de lag 1 și cele trei statistici, fiecare cu seria și ipoteza H_0
- ▣ **Interpretare:** $Q(10)$ pe r_t are $p \approx 3\%$; ținând cont de pasul 3, este validă distribuția lui de referință i.i.d.?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B3

B3 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — randamente și ACF



□ Direcția: nicio structură în ACF a lui r_t ; mărimea: $|r_t|$ și r_t^2 sunt autocorelate pe zeci de laguri

B3 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — teste

1. $\hat{\rho}_1$: $-0,022$ pentru r_t (în interiorul benzii), $0,213$ pentru $|r_t|$ și $0,137$ pentru r_t^2
 2. $Q(10)$ pe r_t : $20,2$, $p = 0,028$; pe r_t^2 : $212,7$, $p \approx 4 \times 10^{-40}$
 3. ARCH-LM(5) = $114,7$, $p \approx 4 \times 10^{-23}$; referința sa χ^2 cere $\mathbb{E}r^4 < \infty$, deci p-value-ul este orientativ
- ☐ Mărimile randamentelor sunt dependente: randamentele nu sunt i.i.d., deci p-value-ul de 2,8% al lui $Q(10)$ pe r_t se sprijină pe o ipoteză falsă
 - ☐ Banda i.i.d. este o referință, nu un test valid pentru $|r_t|$ și r_t^2 ; A10 și B9 corectează inferența pentru r_t

A10 [Propus]: de ce se lărgeste banda autocorelației în prezența grupării — cerința

- ▣ **Model:** A6 [Rezolvat]; secțiunea A10 din notebook
- ▣ **Cadru:** $x_t = \sigma_t \varepsilon_t$, cu ε_t i.i.d. $N(0, 1)$, independent de procesul staționar al volatilității; atunci x_t este necorelat și $\text{Var}(\hat{\rho}_1) \approx v_1/T$, cu $v_1 = \mathbb{E}[x_t^2 x_{t-1}^2] / (\mathbb{E}x_t^2)^2$ [Lobato, Nankervis & Savin \(2001\)](#)
- ▣ **Date de intrare:** A6: $\mathbb{E}\sigma^2 = 1,6$, $\text{Var}(\sigma^2) = 4,0 - 1,6^2 = 1,44$ (în %⁴); regimuri persistente (A8): $\text{Cov}(\sigma_t^2, \sigma_{t-1}^2) = \lambda \text{Var}(\sigma^2)$ cu $\lambda = 0,875$; S&P 500: $T = 9.245$, $\hat{\rho}_1 = -0,079$, $T\hat{\rho}_1 = 5,00$
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați că $v_1 = 1$ pentru mixtura din A6, ale cărei stări sunt independente de la o zi la alta.
 2. Arătați că $v_1 = 1 + \lambda \text{Var}(\sigma^2) / (\mathbb{E}\sigma^2)^2$ pentru regimuri persistente; calculați-l, împreună cu factorul de lărgire a benzii $\sqrt{v_1}$.
 3. Calculați statistica t pentru lagul 1 al S&P 500 cu SE i.i.d. $1/\sqrt{T}$ și cu SE robustă $\sqrt{\hat{\tau}_1}$, plus cele două semilățimi ale benzii de 95%.
- ▣ **Interpretare:** ce lărgeste banda: cozile groase sau volatilitatea persistentă?

B9 [Rezolvat]: Ljung–Box robust la heteroscedasticitate — cerința

▣ **Întrebare:** ce autocorelații ale randamentelor rezistă când varianța lui $\hat{\rho}_k$ ține cont de grupare?

▣ **Date:** $r_{\text{sp}}, r_{\text{bet}}, r_{\text{eur}}, r_{\text{btc}}$; $x_t = r_t - \bar{r}$

▣ **Cerințe**


1. Pentru $k = 1, \dots, 20$ calculați $\hat{\rho}_k$ și $\hat{\tau}_k = \sum_{t=k+1}^T x_t^2 x_{t-k}^2 / (\sum_{t=1}^T x_t^2)^2$; reprezentați $\hat{\rho}_k$ cu banda clasică $\pm 1,96/\sqrt{T}$ și banda robustă $\pm 1,96\sqrt{\hat{\tau}_k}$ [Lobato, Nankervis & Savin \(2001\)](#).
2. Calculați $Q(10)$ clasic și $\tilde{Q}(10) = \sum_{k=1}^{10} \hat{\rho}_k^2 / \hat{\tau}_k$ robust; comparați-le cu χ_{10}^2 (valoarea critică la 5%: 18,3).
3. Numărați lagurile dintre 1 și 20 aflate în afara fiecărei benzi: sunt verificări punctuale, diferite de testul comun pe 10 laguri de la pasul 2.

▣ **Ipotezele lui $\tilde{Q}$:** $\mathbb{E}r^4 < \infty$ și termeni încrucișați nuli, $\mathbb{E}[x_t^2 x_{t-k} x_{t-l}] = 0$ pentru $k \neq l$

▣ **Interpretare:** pentru ce serii rezistă autocorelația și este credibilă ipoteza momentului de ordinul patru?

▣ **Notebook:** secțiunea B9

B9 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — ACF cu ambele benzi



- S&P 500, lagul 1: $\hat{\rho}_1 = -0,079$, $T\hat{\tau}_1 = 5,00$; banda robustă este $1,96\sqrt{5,00/9.245} = 0,046$, nu 0,020
- La lagul 1 banda robustă este de $\sqrt{T\hat{\tau}_1} = 1,7$ (Bitcoin) până la 2,6 (EUR/RON) ori mai largă decât cea clasică

B9 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — teste comune și interpretare


	S&P 500	BET-TR	EUR/RON	Bitcoin
$Q(10)$ (p)	91,6 ($< 10^{-10}$)	70,0 ($< 10^{-10}$)	221,7 ($< 10^{-10}$)	20,2 (0,028)
$\tilde{Q}(10)$ (p)	19,0 (0,041)	16,9 (0,076)	37,4 ($< 0,001$)	11,9 (0,29)
Laguri în afară, clasic / robust	8 / 3	5 / 2	6 / 2	3 / 0
Laguri în afara benzii robuste	1, 15, 16	2, 10	1, 3	niciunul

- La 5%, testul clasic respinge pentru toate cele patru serii; testul robust respinge doar pentru S&P 500 (la limită) și EUR/RON
- Bitcoin (B3): p-value-ul de 2,8% devine 29%: nicio dovadă de autocorelație liniară la lagurile 1–10
- EUR/RON păstrează $\hat{\rho}_1 = 0,17$: fixing-ul administrat netezește ajustările pe mai multe zile
- Ipoteze rămase: testul cu prag al lui [Dalla, Giraitis & Phillips \(2022\)](#) nu găsește termeni încrucișați semnificativi pentru S&P 500, BET-TR și Bitcoin; dar cu Hill $\hat{\alpha} \approx 3$ momentul de ordinul patru este îndoielnic, deci p-value-urile robuste sunt condiționate de el

A7 [Rezolvat]: estimatorul Hill, pas cu pas — cerința

- ▣ **Întrebare:** cum se estimează un indice de coadă din cele mai mari observații și cât de precis este?
- ▣ **Date de intrare:** cele mai mari 11 randamente zilnice absolute (%) ale unui eșantion ipotetic: 12,0; 9,5; 8,2; 7,4; 6,9; 6,1; 5,8; 5,5; 5,2; 5,0; 4,8
- ▣ **Ipoteză:** deasupra pragului $X_{(k+1)}$ coada este Pareto, $P(X > x) \propto x^{-\alpha}$, iar observațiile sunt independente
- ▣ **Cerințe**
 1. Pentru $k = 10$ calculați log-rapoartele $\ln(X_{(i)}/X_{(11)})$, media lor și $\hat{\alpha} = 1/\text{medie}$ Hill (1975).
 2. Calculați $SE = \hat{\alpha}/\sqrt{k}$ și intervalul $\hat{\alpha} \pm 1,96 SE$.
 3. Spuneți ce momente $\mathbb{E}|X|^p$ ($p < \alpha$) există la estimarea punctuală și ce afirmații rămân valabile la 95%.
 4. Repetați pașii 1–2 pe cele mai mari 11 valori $|r_t|$ ale BET-TR, folosind tabelul afișat de notebook.
- ▣ **De raportat:** $\hat{\alpha}$, SE și intervalul pentru ambele eșantioane
- ▣ Notebook: secțiunea A7

A7 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — eșantionul ipotetic



1. Etichetele sunt log-rapoartele față de 4,8; suma 3,616, media 0,3616, $\hat{\alpha} = 1/0,3616 = 2,77$
2. $SE = 2,77/\sqrt{10} = 0,87$; intervalul $[1,05; 4,48]$, o aproximare normală grosieră pentru cozi Pareto i.i.d.
3. La 2,77 varianța există, iar momentul de ordinul patru nu, dar intervalul conține valori sub 2 și peste 4: nicio afirmație nu rezistă la 95%

A7 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — tabelul BET-TR


i	Data	r_t (%)	$X_{(i)}$ (%)	$\ln(X_{(i)}/X_{(11)})$
1	19 dec. 2018	-11,857	11,857	0,824
2	16 mar. 2020	-10,075	10,075	0,661
3	9 mar. 2020	-7,827	7,827	0,409
4	24 dec. 2018	+6,707	6,707	0,254
5	9 mar. 2022	+6,662	6,662	0,247
6	24 aug. 2015	-6,512	6,512	0,225
7	24 mar. 2020	+5,972	5,972	0,138
8	17 mar. 2020	+5,928	5,928	0,131
9	4 mar. 2022	-5,490	5,490	0,054
10	12 mar. 2020	-5,285	5,285	0,016
11	18 ian. 2016	-5,202	5,202	prag

- Primul rând, calculat:
 $\ln(11,857/5,202) = \ln 2,279 = 0,824$
- Suma celor zece log-raapoarte 2,958;
 $\hat{\alpha}_{10} = 10/2,958 = 3,38$
- $SE = 3,38/\sqrt{10} = 1,07$; intervalul [1,28; 5,48]
- Șase dintre cele zece zile sunt în decembrie 2018 sau martie 2020: extremele se grupează, deci SE i.i.d. subestimează incertitudinea
- Interpretare: zece observații nu pot decide dacă momentul de ordinul patru există; B11 folosește $k = 2\%$ din n

B11 [Rezolvat]: Hill pe ambele cozi, BET-TR și Bitcoin — cerința

- ▣ **Întrebare:** sunt pierderile mari mai frecvente decât câștigurile mari de aceeași mărime?
- ▣ **Date:** r_{bet} ($n = 2.992$), r_{btc} ($n = 4.384$); pierderi $\text{loss} = -r[r < 0]$, câștiguri $\text{gain} = r[r > 0]$, fiecare ordonat descrescător
- ▣ **Cerințe**
 1. Reprezentați estimarea Hill $\hat{\alpha}(k)$ pentru fiecare coadă, cu k de la 1% la 10% din n al întregului eșantion, cu banda $\hat{\alpha}(1 \pm 1,96/\sqrt{k})$.
 2. Calculați $\hat{\alpha}_-$ (pierderi) și $\hat{\alpha}_+$ (câștiguri) la $k = \lfloor 0,02 n \rfloor$ (BET-TR 59, Bitcoin 87), cu intervale de 95%; cursul folosește $k = 2,5\%$ din n pentru $|r_t|$, care combină ambele cozi.
 3. Calculați statistica aproximativă pentru cozi independente $z = (\hat{\alpha}_- - \hat{\alpha}_+)/\sqrt{\hat{\alpha}_-^2/k + \hat{\alpha}_+^2/k}$ și p-value-ul ei bilateral.
 4. Comparați cu $\hat{v}$ al distribuției Student- t estimate pe randamentele standardizate: 3,10 pentru BET-TR (B2), 2,23 pentru Bitcoin.
- ▣ **Interpretare:** este asimetria câștig/pierdere stabilită statistic, iar gruparea face SE adevărată mai mare sau mai mică?
- ▣ Notebook: secțiunea B11

B11 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — graficele Hill și estimările



□ BET-TR: $\hat{\alpha}_- = 2,19$ [1,63; 2,75], $\hat{\alpha}_+ = 3,08$ [2,30; 3,87]; Bitcoin: $\hat{\alpha}_- = 2,89$ [2,28; 3,50], $\hat{\alpha}_+ = 3,62$ [2,86; 4,38]

□ De exemplu, pierderile BET-TR: $2,19 \times (1 \pm 1,96/\sqrt{59}) = 2,19 \times (1 \pm 0,255)$

B11 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — testul și interpretarea

- ▣ BET-TR: $\sqrt{2,19^2/59 + 3,08^2/59} = \sqrt{0,0812 + 0,1612} = 0,492$; $z = (2,19 - 3,08)/0,492 = -1,82$, $p = 0,069$
- ▣ Bitcoin: $\sqrt{2,89^2/87 + 3,62^2/87} = 0,497$; $z = (2,89 - 3,62)/0,497 = -1,47$, $p = 0,14$
- ▣ Decizie: pierderile au cozi mai groase pe ambele piețe, dar $H_0: \alpha_- = \alpha_+$ nu este respinsă la 5%
 - ▶ statistica tratează cele două cozi ca eșantioane independente; extremele se grupează în timp, deci SE adevărată este mai mare, iar dovada mai slabă
 - ▶ un bootstrap comun pe blocuri al randamentelor originale păstrează ambele trăsături (extindere)
- ▣ $\hat{\nu}$ este estimat pe toată distribuția; valoarea 2,23 pentru Bitcoin este sub ambii indici de coadă: Student- t nu potrivește simultan centrul și cozile, pe când $\hat{\alpha}$ folosește doar coada

B4 [Propus]: gaussianitate prin agregare (Bitcoin) — cerința

- ▣ **Model:** B1 și B3 [Rezolvat]; secțiunea B4 din notebook
- ▣ **Întrebare:** se apropie randamentele Bitcoin pe h zile de distribuția Normală când h crește?
- ▣ **Date:** r_btc , $T = 4.384$; blocuri care nu se suprapun, începând cu prima zi: primul bloc de 5 zile este 18–22 sept. 2014, al doilea 23–27 sept. 2014; ultimul bloc incomplet (4 zile pentru $h = 5$ și $h = 20$) se elimină
- ▣ **Cerințe**
 1. Construiți randamentele logaritmice pe h zile (sume de h randamente zilnice consecutive) pentru $h = 1, 5, 20$.
 2. Desenați un QQ-plot al fiecărei serii standardizate față de distribuția Normală, cu N , numărul de blocuri, în titlu.
 3. Calculați excesul de kurtosis și SE de referință pentru date i.i.d. cu distribuție Normală, $\sqrt{24/N}$.
- ▣ **De raportat:** cele trei QQ-plot-uri și un tabel h , N , exces de kurtosis, $\sqrt{24/N}$
- ▣ **Interpretare:** de ce este $\sqrt{24/N}$ prea optimistă aici și de ce blocurile care nu se suprapun elimină zilele comune, dar nu și dependența volatilității?

A4(a) [Propus]: cât de adânc este un drawdown? — cerința

- ▣ **Model:** A1 [Rezolvat]; secțiunea A4 din notebook
- ▣ **Întrebare:** care este cea mai mare pierdere față de un vârf anterior și cum se compară cu rata de creștere?
- ▣ **Date de intrare:** valorile portofoliului la sfârșit de an $V_0, \dots, V_5 = 100, 120, 90, 110, 130, 117$; CAGR pe 5 ani 3,19%
- ▣ **Cerințe:** completați tabelul
 1. Vârful curent $M_t = \max_{s \leq t} V_s$.
 2. Drawdown-ul $DD_t = V_t / M_t - 1$, ca număr negativ.
 3. Drawdown-ul maxim $MDD = \min_t DD_t$, anul în care apare și raportul Calmar $CAGR / |MDD|$.

Anul	0	1	2	3	4	5
V_t	100	120	90	110	130	117
M_t	100	120	...	...	...	...
DD_t	0%	0%	...	...	...	...

- ▣ **Interpretare:** de ce scăderea la 117 din anul 5 nu este drawdown-ul maxim?

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Promptul** trimis unui asistent AI: “Sunt randamentele logaritmice zilnice ale BET-TR distribuite Normal? Sunt autocorelate? Dă cod Python și o concluzie”
- **Răspunsul:** codul de mai jos și concluzia

```
from scipy import stats
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
r = np.log(bet["close"]).diff().dropna()      # daily log returns
k = stats.kurtosis(r)                          # sample kurtosis
print("excess_kurtosis:", k - 3)              # the Normal has kurtosis 3
jb, p = stats.jarque_bera(r)
lb = acorr_ljungbox(r**2, lags=[10])          # Ljung-Box, 10 lags
```

- **Concluzia asistentului**
 - ▶ “Exces de kurtosis 14,8: cozi groase”
 - ▶ “p-value JB 0,000: probabilitatea ca randamentele BET-TR să urmeze distribuția Normală este 0%”
 - ▶ “Ljung-Box $Q(10) = 713,5$, $p < 0,001$: randamentele sunt puternic autocorelate, deci BET-TR este predictibil și nu este un mers aleator”

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — cerința

- ▣ **Model:** A3, B3 și B9 [Rezolvat]; secțiunea C2 din notebook
- ▣ **Date:** `r_bet`, cele 2.992 de randamente din pregătire
- ▣ **Cerințe**
 1. Găsiți toate erorile de fond din cod și din cele trei concluzii.
 2. Pentru fiecare eroare spuneți cum ați detecta-o: un test pe date simulate, o cifră din Cursul 1, un exercițiu rezolvat sau documentația bibliotecii.
 3. Scrieți cod corectat, executabil, și raportați excesul de kurtosis, JB cu p-value-ul său, $Q(10)$ pe r_t și pe r_t^2 și $\tilde{Q}(10)$ robust din B9.
 4. Formulați ipotezele din spatele p-value-ului robust.
 5. Scrieți concluzia corectată în trei fraze.
- ▣ **De raportat:** codul corectat, un tabel valoare AI / valoare corectă, un grafic al ACF pentru r_t și r_t^2
- ▣ Codul generat de AI rulează de obicei fără mesaj de eroare: greșelile sunt de statistică, nu de sintaxă; notați ce găsiți în `AI_ERRORS.md`

Ce predați și repository-ul echipei

De predat înaintea seminarului următor

- ▣ A1, A3, A6, A7, A10, A4(a): tabele și răspunsuri
- ▣ B1, B2, B3, B9, B11, B4: câte o figură și un tabel, ca în rezolvări
- ▣ C2: cod corectat, tabel, grafic, concluzia corectată
- ▣ O frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Temă la alegere: un pachet de extindere

Repository-ul echipei

- ▣ Un folder Quantlet: B9 sau B11 pe un activ ales de voi, listat la BVB
- ▣ Notați folosirea AI în AI_USE.md și erorile prinse în AI_ERRORS.md
- ▣ Propuneri de proiect: C1 (BET-TR după reclasificarea din 2020), C3 (replicarea [Guyon & Lekeufack \(2023\)](#))

Pachete de extindere: ce cere fiecare

Pachet	Exerciții	Cunoștințe necesare
1. Aritmetica randamentelor și drawdown	A1(c) [Rezolvat], A2, A4(b–e)	A1, A4(a)
2. Mixturi, regimuri și cozi	A5 [Rezolvat], A8, A9, A11	A6, A7, A10
3. Momente robuste și verificarea modelelor	B1(d) [Rezolvat], B10, B14	B1, B9, B11
4. Dependență și asimetrie	B5, B12, B6, B15	B3, B9
5. Performanță și estimatori de range volatility	B7, B13, B8	A1, A5, B1
6. Proiecte	C1, C3	B9, studiul de caz din curs

- Fiecare cerință are pe un singur slide datele, pașii numerotați și ce se predă; secțiunile din notebook poartă aceleași etichete
- Rezolvările exercițiilor [Propus] se discută la seminarul următor

A1(c) [Rezolvat]: randamentul unui portofoliu — cerința și rezolvarea

- ▣ **Întrebare:** ce randament se adună între active?
- ▣ **Date de intrare:** 60% în activul A și 40% în activul B, pentru o zi; $R_A = +5\%$, $R_B = -2\%$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați randamentul simplu al portofoliului $R_p = 0,6R_A + 0,4R_B$.
 2. Calculați randamentul logaritmic ponderat $0,6r_A + 0,4r_B$ și randamentul logaritmic adevărat al portofoliului $\ln(1 + R_p)$.
- ▣ **Rezolvare**
 1. $R_p = 0,6 \times 5\% + 0,4 \times (-2\%) = 2,20\%$
 2. $0,6 \times \ln 1,05 + 0,4 \times \ln 0,98 = 0,6 \times 4,879\% - 0,4 \times 2,020\% = 2,119\%$, în timp ce $\ln 1,022 = 2,176\%$
- ▣ **Interpretare:** randamentele simple se adună între active, cele logaritmice în timp (A1); pentru mișcări zilnice diferența dintre cele două reguli este mică, pentru mișcări mari nu

A2 [Propus]: regula $\sqrt{h}$ în prezența autocorelației — cerința

- ▣ **Model:** A1 [Rezolvat]; secțiunea A2 din notebook
- ▣ **Ipoteză:** AR(1) staționar, $r_t = \rho r_{t-1} + e_t$, $|\rho| < 1$, $\text{Var}(r_t) = \sigma^2$, deci $\gamma_j = \text{Cov}(r_t, r_{t-j}) = \sigma^2 \rho^j$
- ▣ **Punct de plecare**, $h = 3$: $\text{Var}(r_1 + r_2 + r_3) = 3\gamma_0 + 2(2\gamma_1 + \gamma_2)$: două perechi la lagul 1, o pereche la lagul 2
- ▣ **Cerințe**
 1. Generalizați numărarea perechilor: arătați că $\text{Var}(\sum_{j=1}^h r_{t+j}) = h\sigma^2[1 + 2\sum_{j=1}^{h-1}(1-j/h)\rho^j]$.
 2. Folosind $\sum_{j=1}^{h-1} \rho^j = \rho(1 - \rho^{h-1})/(1 - \rho)$ și $\sum_{j \geq 1} j|\rho|^j = |\rho|/(1 - |\rho|)^2$, arătați că $VR(h) = \text{Var}(\cdot)/(h\sigma^2) \rightarrow (1 + \rho)/(1 - \rho)$.
 3. Calcul ilustrativ: tratați autocorelațiile de lag 1 de selecție ca parametri AR(1), EUR/RON $\rho = 0,170$ (volatilitate 4,44%), S&P 500 $\rho = -0,079$ (17,99%); calculați $\sqrt{VR(252)}$ și volatilitățile anuale corectate.
 4. Explicați de ce gruparea volatilității, singură, nu schimbă rezultatul de la pasul 1.
- ▣ **Interpretare:** ce verificare a ACF trebuie făcută înaintea pasului 3?

A4(b–e) [Propus]: un reper pentru drawdown — cerința

- ▣ **Model:** A4(a); secțiunea A4 din notebook
- ▣ **Ipoteză:** logaritmul prețului este $X_t = \mu t + \sigma W_t$, cu W_t o mișcare browniană standard, σ volatilitatea anuală, T orizontul în ani; drawdown-ul maxim logaritm $D = \max_{s \leq t \leq T} (X_s - X_t) = -\ln(1 + MDD)$; pentru $\mu = 0$: $\mathbb{E}[D] = \sqrt{\pi/2} \sigma \sqrt{T}$ Magdon-Ismail et al. (2004)
- ▣ **Date de intrare:** aur spot, 1990–2026: $\sigma = 16,3\%$, $T = 36,7$ ani, $MDD = -44,7\%$ observat ($D = 0,592$), randament logaritm mediu $6,5\%$ pe an
- ▣ **Cerințe**
 1. Folosiți $W(cT) \stackrel{d}{=} \sqrt{c} W(T)$ ca să explicați de ce $\mathbb{E}[D]$ este proporțional cu $\sqrt{T}$ când $\mu = 0$.
 2. Calculați raportul valorilor $\mathbb{E}[D]$ pentru 40 și 10 ani ai aceluiași proces.
 3. Calculați reperul fără drift pentru aur și comparați-l cu D observat.
 4. Simulați 2.000 de traiectorii zilnice (seed 42) cu $\mu = 0$ și cu $\mu = 6,5\%$ și reprezentați media lui D în funcție de T .
- ▣ **Interpretare:** ce implică pașii 1–4 pentru rapoartele Calmar calculate pe eșantioane de lungimi diferite?


A5 [Rezolvat]: volatilitatea Parkinson și eficiența ei — cerința

- ▣ **Întrebare:** câtă informație despre volatilitate conține amplitudinea zilnică?
- ▣ **Notații:** o_t, h_t, l_t, c_t = logaritmi deschiderii, maximului, minimului și închiderii; $h_t - l_t = \ln(H_t/L_t)$
- ▣ **Date de intrare:** H/L pentru cinci zile: 1,020, 1,015, 1,030, 1,010, 1,025; $P = 252$
- ▣ **Ipoteză:** în timpul zilei logaritmul prețului este o mișcare browniană fără drift, cu volatilitatea σ ; fără salturi peste noapte
- ▣ **Cerințe**
 1. Completați un tabel cu cinci rânduri: $\ln(H/L)$, pătratul său și media pătratelor.
 2. Calculați $\hat{\sigma}_P^2 = \overline{(h-l)^2}/(4 \ln 2)$ Parkinson (1980), volatilitatea zilnică și cea anuală.
 3. Spuneți ce informație ignoră estimatorul și ce efect are un drift puternic.
 4. Folosind $\mathbb{E}[(h-l)^2] = 4 \ln 2 \sigma^2$ și $\mathbb{E}[(h-l)^4] = 9\zeta(3) \sigma^4$ ($\zeta(3) = 1,202$), comparați varianța zilnică a lui $(h-l)^2/(4 \ln 2)$ cu $\text{Var}(r_t^2) = 2\sigma^4$.
- ▣ Notebook: secțiunea A5

A5 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — estimarea

H/L	$\ln(H/L)$	pătrat ($\times 10^{-4}$)
1,020	0,0198	3,92
1,015	0,0149	2,22
1,030	0,0296	8,74
1,010	0,0100	0,99
1,025	0,0247	6,10
medie		4,39

- $\hat{\sigma}_P^2 = 0,000439/2,7726 = 0,000158$; $\hat{\sigma}_P = 1,26\%$ pe zi, $1,26\% \times 15,87 = 20,0\%$ pe an
- Ignore: deschiderea și saltul de peste noapte Yang & Zhang (2000); un drift mărește amplitudinea și deplasează $\hat{\sigma}_P$ în sus Rogers & Satchell (1991)



- O zi simulată: amplitudinea $h_t - l_t$ folosește toată traiectoria, randamentul close-to-close doar capetele ei

A5 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — eficiența

4. $\text{Var}((h - l)^2) = (9\zeta(3) - 16(\ln 2)^2)\sigma^4 = (10,819 - 7,687)\sigma^4 = 3,131\sigma^4$

- ▶ împărțit la $(4 \ln 2)^2 = 7,687$: $0,407\sigma^4$ pe zi pentru termenul Parkinson
- ▶ close-to-close: $\text{Var}(r_t^2) = 3\sigma^4 - \sigma^4 = 2\sigma^4$ pe zi

- Pentru o medie pe n zile independente, ambele varianțe se împart la n : raportul rămâne $2/0,407 = 4,9$
- O zi de amplitudini conține cam informația a cinci zile close-to-close: “circa 5” din Cursul 1
- Interpretare: câștigul presupune tranzacționare continuă, fără drift și fără salturi peste noapte; o deschidere învechită afectează estimatorii care folosesc deschiderea (Garman–Klass, Rogers–Satchell, Yang–Zhang), nu Parkinson (B8)

A8 [Propus]: de unde vine autocorelația lui r_t^2 — cerința

- ▣ **Model:** A6 [Rezolvat] și A10; secțiunea A8 din notebook
- ▣ **Ipoteză:** ca în A6, $\sigma_t^2 \in \{1, 4\}$ (în %²), cu probabilitățile staționare (0,8; 0,2), dar starea urmează un lanț Markov cu două stări [Hamilton \(1989\)](#) cu matricea de tranziție $\begin{pmatrix} 0,975 & 0,025 \\ 0,1 & 0,9 \end{pmatrix}$ (rânduri: azi calm, agitat)
- ▣ **Cerințe**
 1. Verificați condiția de echilibru $0,8 \times 0,025 = 0,2 \times 0,1$ și calculați $\lambda = p_{LL} + p_{HH} - 1$.
 2. Cu indicatorul $I_t = 1$ în starea agitată, $\sigma_t^2 = 1 + 3I_t$; arătați că $\text{Cov}(I_t, I_{t-k}) = \pi_H(1 - \pi_H)\lambda^k$, deci $\text{Cov}(r_t^2, r_{t-k}^2) = \text{Var}(\sigma^2)\lambda^k$ pentru $k \geq 1$.
 3. Folosind A6, calculați $\text{Var}(\sigma^2)$, $\text{Var}(r^2) = 3\mathbb{E}\sigma^4 - (\mathbb{E}\sigma^2)^2$ și $\text{corr}(r_t^2, r_{t-k}^2)$ la lagurile 1 și 10.
 4. Reprezentați ACF implicată față de ACF a lui r_t^2 pentru S&P 500 (0,31 la lagul 1, 0,04 la lagul 100).
- ▣ **Interpretare:** ce două trăsături ale datelor nu poate reproduce acest model?

A9 [Propus]: poate un GARCH gaussian să producă cozile S&P 500? — cerința

- ▣ **Model:** A6 [Rezolvat]; o anticipare a Capitolului 5; secțiunea A9 din notebook
- ▣ **Ecuațiile modelului Bollerslev (1986):** $r_t = \mu + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t = \sigma_t z_t$, z_t i.i.d. $N(0, 1)$, $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$, $\omega > 0$, $\alpha, \beta \geq 0$, $\alpha + \beta < 1$; aici α este un coeficient GARCH, nu indicele de coadă
- ▣ **Rezultat:** dacă $1 - (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha^2 > 0$, atunci $K = 3[1 - (\alpha + \beta)^2]/[1 - (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha^2]$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați K pentru $(\alpha, \beta) = (0,10; 0,85)$ și $(0,10; 0,88)$.
 2. Formulați condiția pentru un moment de ordinul patru finit și comparați-o cu $\alpha + \beta < 1$.
 3. Cu $\alpha + \beta = 0,99$, găsiți α care dă kurtosisul S&P 500, $K = 13,9$.
 4. Estimați modelul pe `r_sp` în % (`arch_model(100*r_sp, mean='Constant', vol='GARCH', p=1, q=1, dist='normal')`); calculați K implicat și desenați QQ-plot-ul lui $\hat{z}_t = \hat{\varepsilon}_t / \hat{\sigma}_t$.
- ▣ **Interpretare:** ce spune QQ-plot-ul despre distribuția Normală a lui z_t ?

A11 [Propus]: estimatorul Hill ca estimator de verosimilitate maximă — cerința

- ▣ **Model:** A7 [Rezolvat]; secțiunea A11 din notebook
- ▣ **Ipoteză:** dat pragul $u = X_{(k+1)}$, cele k depășiri sunt statisticile de ordine ale unui eșantion Pareto i.i.d. cu densitatea $f(x) = \alpha u^\alpha x^{-\alpha-1}$, $x > u$
- ▣ **Cerințe**
 1. Scrieți log-verosimilitatea $\ell(\alpha)$ a celor k depășiri (ordonarea adaugă doar constanta $\ln k!$).
 2. Rezolvați $\ell'(\alpha) = 0$ și arătați că maximul este estimatorul Hill $\hat{\alpha} = k / \sum_{i=1}^k \ln(X_{(i)}/u)$ Hill (1975).
 3. Calculați $\ell''(\alpha)$, informația k/α^2 și $\text{SE}(\hat{\alpha}) \approx \hat{\alpha}/\sqrt{k}$; verificați pe datele din A7.
 4. Simulați $n = 2.000.000$ de valori $|X|$, X Student- t cu $\nu = 3$ (`numpy.random.default_rng(1)`); reprezentați $\hat{\alpha}_k$ în funcție de k/n și raportați $k = 200, 2.000, 20.000, 200.000$.
- ▣ **Interpretare:** de ce se îndepărtează $\hat{\alpha}_k$ de 3 când k este mare?

B1(d) [Rezolvat]: momente pe cuantile, cu intervale bootstrap

- ▣ **Întrebare:** rezistă asimetria negativă și excesul de kurtosis unor măsuri care nu cer momente?
- ▣ **Măsuri Kim & White (2004):** asimetria Hinkley $\frac{q_{0,95} + q_{0,05} - 2q_{0,5}}{q_{0,95} - q_{0,05}}$ și kurtosisul Crow–Siddiqui $\frac{q_{0,975} - q_{0,025}}{q_{0,75} - q_{0,25}} - 2,91$; ambele 0 pentru distribuția Normală
- ▣ **Bootstrap:** extrageți uniform $\lceil T/20 \rceil$ zile de start, luați câte 20 de randamente consecutive de la fiecare, tăiați la T ; recalculați ambele măsuri; 1.000 de reeșantionări (`default_rng(42)`); interval de percentile de 95%

	Asimetrie (momente)	Hinkley [CI 95%]	Exces kurt.	Crow–Siddiqui [CI 95%]
BET-TR	−1,40	−0,036 [−0,085; 0,025]	17,8	1,06 [0,73; 1,43]
Bitcoin	−0,70	−0,018 [−0,069; 0,032]	12,0	2,25 [1,88; 2,64]
EUR/RON	0,73	0,041 [−0,022; 0,093]	15,1	4,87 [3,74; 6,13]

- ▣ Toate intervalele pentru kurtosis sunt peste 0: cozile groase sunt stabilite fără momente
- ▣ Asimetria pe momente și asimetria Hinkley măsoară lucruri diferite; toate intervalele Hinkley conțin 0, ceea ce nu dovedește simetria

B10 [Propus]: un kurtosis care nu converge — cerința

- ▣ **Model:** B1 [Rezolvat]; secțiunea B10 din notebook
- ▣ **Date:** `r_sp`; fereastra n = randamentele date înainte de 3 ianuarie al anului $1990 + n$, $n = 1, \dots, 36$ (253 de randamente pentru $n = 1$, 2.527 pentru $n = 10$, 9.067 pentru $n = 36$)
- ▣ **Simulare:** 500 de traiectorii Student- t de lungime 9.245 pentru $\nu = 3$ și pentru $\nu = 6$ (`default_rng(42)`), tăiate la aceleași lungimi de fereastră
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați excesul de kurtosis al S&P 500 pe fiecare fereastră și listați cele mai mari trei salturi, cu zilele care le produc.
 2. Pentru fiecare ν calculați cuantilele de 5%, 50% și 95% ale kurtosisului simulat pentru fiecare n .
 3. Reprezentați curba datelor peste ambele benzi, pe o scală logaritmică simetrică.
- ▣ **Interpretare:** de ce se stabilizează încet banda pentru $\nu = 6$, deși kurtosisul lui t_6 este finit? Ce înseamnă atunci “exces de kurtosis = 10,9”?

B14 [Propus]: ce fapte stilizate reproduce GARCH- t ? — cerința

- ▣ **Model:** B3 și B11 [Rezolvat], A9; secțiunea B14 din notebook
- ▣ **Date:** `r_sp` transformat în % ($T = 9.245$); medie constantă; ω în %² pe zi

```
from arch import arch_model
from arch.univariate import StudentsT
am = arch_model(100 * r_sp, mean='Constant', vol='GARCH', p=1, q=1, dist='t')
res = am.fit(displ='off')
am.distribution = StudentsT(seed=np.random.default_rng(42)) # reproducible paths
sim = am.simulate(res.params, nobs=len(r_sp), burn=1000)['data']
```

- ▣ **Cerințe**

1. Estimați modelul și listați toți cei cinci parametri, cu unitățile lor.
2. Probă: simulați o traiectorie și calculați-i excesul de kurtosis; apoi rulați 200 de traiectorii.
3. Pentru fiecare traiectorie calculați excesul de kurtosis, ACF a lui $|r_t|$ la lagurile 1, 20, 100, 250, $\hat{\alpha}$ Hill pentru $|r_t|$ la $k = 2\%$ din T și $L(1) = \text{corr}(r_t, |r_{t+1}|)$.
4. Construiți intervalele punctuale de 5–95% și marcați fiecare valoare observată ca fiind în interior sau în afară.

- ▣ **Interpretare:** ce fapte nu sunt reproduse și ce componentă a modelului ați schimba pentru fiecare?

B5 [Propus]: efectul de levier, România vs crypto — cerința

- ▣ **Model:** B3 [Rezolvat]; secțiunea B5 din notebook
- ▣ **Convenția lagului:** $L(k) = \text{corr}(r_t, |r_{t+k}|)$ Christie (1982); k numără zilele de observație ale fiecărei serii; $k > 0$: randamentul de azi și o mărime ulterioară
 - ▶ exemplu, $k = 1$: randamentul BET-TR de luni, 16 mar. 2020, este asociat cu $|r|$ de marți, 17 mar. 2020
- ▣ **Date:** `r_bet` și `r_btc`, fiecare pe propriul calendar
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $L(k)$ pentru $k = -20, \dots, 20$ și reprezentați ambele serii cu benzile de referință i.i.d. $\pm 1,96/\sqrt{T}$ (0,036 și 0,030).
 2. Raportați $L(1)$ și $L(5)$ pentru ambele piețe și spuneți dacă sunt în afara benzilor de referință.
 3. Dați două explicații concurente pentru un efect mai slab la Bitcoin.
- ▣ **Interpretare:** de ce o bandă de referință nu este un interval de încredere în prezența grupării și ce aduce B12?

B12 [Propus]: efectul de levier ca regresie — cerința

- ▣ **Model:** B5, B9 [Rezolvat]; secțiunea B12 din notebook
- ▣ **Regresia:** $|r_{t+1}| = c + \beta^+ r_t^+ + \beta^- r_t^- + \sum_{j=1}^5 \delta_j |r_{t-j}| + u_{t+1}$, $r_t^+ = \max(r_t, 0) \geq 0$, $r_t^- = \min(r_t, 0) \leq 0$
 - ▶ un câștig $+a$ adaugă $\beta^+ a$, o pierdere $-a$ adaugă $-\beta^- a$: un răspuns simetric înseamnă $\beta^+ = -\beta^-$
 - ▶ rândul din matricea de regresori pentru ziua t : $(1, r_t^+, r_t^-, |r_{t-1}|, \dots, |r_{t-5}|)$, variabila dependentă $|r_{t+1}|$
- ▣ **Date:** r_sp, r_bet, r_btc, r_eur
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați prin OLS cu erori standard Newey–West [Newey & West \(1987\)](#), trunchierea lagurilor $\lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$.
 2. Testați $H_0: \beta^+ + \beta^- = 0$ cu $W = (\hat{\beta}^+ + \hat{\beta}^-)^2 / [\text{Var}(\hat{\beta}^+) + \text{Var}(\hat{\beta}^-) + 2 \text{Cov}(\hat{\beta}^+, \hat{\beta}^-)]$, χ_1^2 la 5%.
 3. Reprezentați $|r_{t+1}|$ prezis după un câștig $+a$ și după o pierdere $-a$, cu controalele de lag la mediile lor.
 4. Arătați de ce $|r_t|$ nu poate fi adăugat printre controale.

B6 [Propus]: EUR/RON pe regimuri — cerința

- ▣ **Model:** B1, B9 [Rezolvat]; secțiunea B6 din notebook
- ▣ **Date:** r_{eur} (cursul de referință BNR), împărțit în iul. 2005 – 2011, 2012–2019, 2020–2026 (1.656, 2.013, 1.683 de randamente); lagurile se construiesc în interiorul fiecărei perioade
- ▣ **Cerințe**
 1. În fiecare perioadă regresați $r_t = a + \rho r_{t-1} + e_t$ prin OLS, cu SE HAC (trunchierea lagurilor $\lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$); raportați $\hat{\rho}$, SE, volatilitatea și excesul de kurtosis.
 2. Testați egalitatea lui ρ între perioade: ponderi $w_j = 1/\text{SE}_j^2$, $\bar{\rho} = \sum_j w_j \hat{\rho}_j / \sum_j w_j$, $W = \sum_j w_j (\hat{\rho}_j - \bar{\rho})^2 \sim \chi_2^2$.
 3. Separat, localizați o ruptură de varianță cu suma cumulată a pătratelor [Inclán & Tiao \(1994\)](#):
 $D_k = C_k / C_T - k / T$, $C_k = \sum_{t \leq k} x_t^2$, ruptura la $\arg \max_k |D_k|$.
- ▣ **Interpretare:** de ce este atât de mare SE pentru 2020–2026 și de ce data CUSUM este descriptivă, nu un test?

B15 [Propus]: memorie lungă sau rupturi? — cerința

- ▣ **Model:** B9, B11 [Rezolvat]; secțiunea B15 din notebook (funcția `local_whittle(x, m)`)
- ▣ **Metoda Robinson (1995):** centrați $x_t = |r_t|$, periodograma $I(\lambda_j)$ la $\lambda_j = 2\pi j/T$; $\hat{d}$ minimizează $\ln\left(\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \lambda_j^{2d} I(\lambda_j)\right) - \frac{2d}{m} \sum_{j=1}^m \ln \lambda_j$ pe $d \in [-0,49; 0,99]$; $m = \lfloor T^p \rfloor$; $SE = 1/(2\sqrt{m})$
- ▣ **Date:** $|r_t|$ pentru S&P 500, BET-TR și Bitcoin
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați d cu $p = 0,65$ și dați intervalul de 95%.
 2. Reprezentați $\hat{d}$ în funcție de p de la 0,45 la 0,80, cu dreptele $d = 0$ și $d = 0,5$.
 3. Localizați o ruptură de varianță a lui r_t (B6); reestimați $\hat{d}$ de fiecare parte și reprezentați ACF a lui $|r_t|$ înainte și după.
- ▣ **Interpretare:** este $\hat{d} > 0$ robust la p și la ruptură sau compatibil cu regimuri Diebold & Inoue (2001)? Ce implică $\hat{d} \geq 0,5$?

B7 [Propus]: BET-TR vs S&P 500 pe aceeași perioadă — cerința

- ▣ **Model:** A1, B1 [Rezolvat]; secțiunea B7 din notebook
- ▣ **Date:** BET-TR (randament total, lei) și S&P 500 (indice de preț, USD); uniți *prețurile* pe datele comune (23 sept. 2014 – 18 sept. 2026), apoi calculați 2.903 randamente
 - ▶ lungimea intervalelor: 2.231 de o zi, 538 de două sau trei zile, 134 mai lungi (cel mult 6 zile)
- ▣ **Cerințe**
 1. Reprezentați averea rebazată (scală logaritmică) și cele două curbe de drawdown (underwater).
 2. Calculați CAGR, volatilitatea randamentelor simple ($P = 252$), raportul Sharpe $252\bar{R}/(\sqrt{252}\hat{\sigma}_R)$ cu $r_f = 0$, raportul Sortino (abaterea negativă pe toate zilele) [Sortino & van der Meer \(1991\)](#), MDD și raportul Calmar.
- ▣ **De raportat:** graficul și un tabel cu două coloane
- ▣ **Interpretare:** dați trei motive pentru care comparația este doar descriptivă (dividende, monedă, dobânda fără risc în lei)

B13 [Propus]: este reală diferența de Sharpe? — cerința

- ▣ **Model:** B7, B1(d); secțiunea B13 din notebook
- ▣ **Date:** cele 2.903 perechi de randamente din B7; randamente simple pentru rapoartele Sharpe (1,36 și 0,75), logaritmice pentru corelații
- ▣ **Cerințe**
 1. Treceți la rapoarte Sharpe zilnice ($\widehat{SR}/\sqrt{252}$) și calculați testul Jobson–Korkie [Jobson & Korkie \(1981\)](#) cu corecția lui [Memmel \(2003\)](#): $z = (\widehat{SR}_1 - \widehat{SR}_2)/\sqrt{\widehat{V}}$, $\widehat{V} = \frac{1}{T} [2(1 - \hat{\rho}) + \frac{1}{2}(\widehat{SR}_1^2 + \widehat{SR}_2^2 - 2\widehat{SR}_1\widehat{SR}_2\hat{\rho}^2)]$.
 2. Bootstrap circular pe blocuri, pe perechi: extrageți $\lceil T/21 \rceil$ zile de start, luați câte 21 de zile consecutive (reluând de la început la final), tăiați la T , aplicați **aceiași** indici ambelor serii; 2.000 de reeșantionări (`default_rng(42)`); interval de percentile de 95% pentru diferența anualizată.
 3. Calculați patru corelații: în aceeași zi, BET-TR cu S&P 500 din ziua precedentă și din ziua următoare, și pe randamente săptămânale (vineri).
- ▣ **Interpretare:** este diferența semnificativă, ce presupun cele două metode și ce corelație se folosește într-un portofoliu?

B8 [Propus]: estimatori de range volatility pentru S&P 500 — cerința

- ▣ **Model:** A5 [Rezolvat]; secțiunea B8 din notebook (funcții testate pentru toți cei cinci estimatori; formulele în Cursul 1)
- ▣ **Date:** OHLC pentru GSPC.INDX, 2 ian. 2008 – 18 sept. 2026; SPY.US pe aceeași bază ajustată: $C^* = \text{adjusted_close}$, $O^*, H^*, L^* = (\text{adjusted_close/close}) \times O, H, L$
 - ▶ exemplu, 16 mar. 2020: factorul $218,08/239,85 = 0,9092$; $O^* = 241,18 \times 0,9092 = 219,29$, $H^* = 233,58$, $L^* = 215,82$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați volatilitățile mobile pe 21 de zile close-to-close, Parkinson, Garman–Klass [Garman & Klass \(1980\)](#), Rogers–Satchell [Rogers & Satchell \(1991\)](#) și Yang–Zhang [Yang & Zhang \(2000\)](#) ($P = 252$) și mediile lor în timp.
 2. Pentru indice și pentru SPY comparați mediile pe 21 de zile ale close-to-close și Yang–Zhang cu volatilitatea de peste noapte pe tot eșantionul, $\text{sd}(o_t - c_{t-1})\sqrt{252}$, și cu volatilitatea de la deschidere la închidere.
- ▣ **Interpretare:** de ce rămâne Yang–Zhang sub close-to-close pe indice, dar nu și pe SPY?

C1 [Propus]: a scăzut autocorelația BET-TR după reclasificarea FTSE?

- ▣ **Model:** B6, B9 [Rezolvat]; o propunere de proiect
- ▣ **Context:** BET-TR are o autocorelație pozitivă de lag 1, tipică piețelor mai puțin lichide; România a devenit piață emergentă secundară FTSE Russell pe 21 sept. 2020
- ▣ **Date:** r_{bet} ; lichiditatea: valoarea zilnică tranzacționată ($\text{volum} \times \text{preț de închidere brut, în lei}$) a 11 blue chips de la BVB (TLV, SNP, BRD, TGN, FP, SNG, H2O, SNN, EL, DIGI, TEL), însumată pe acțiunile listate în ziua respectivă; raportați câte sunt listate în fiecare an
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $\hat{\rho}_1$ pe ferestre mobile de 250 de zile (pas de 5 zile), cu benzile din B9, etichetate ca benzi de referință sub $\rho_1 = 0$.
 2. Estimați ρ_1 înainte și după 21 sept. 2020 ca pantă AR(1), cu SE HAC (B6); raportați $z = (\hat{\rho}_{\text{după}} - \hat{\rho}_{\text{înainte}}) / \sqrt{SE_1^2 + SE_2^2}$ și interacțiunea e din $r_t = a + b r_{t-1} + c \text{post}_t + e r_{t-1} \text{post}_t$ (HAC, 10 laguri).
 3. Corelați $\hat{\rho}_1$ mobil cu logaritmul valorii tranzacționate medii pe 250 de zile.
- ▣ **De predat:** un folder Quantlet și un slide cu o concluzie descriptivă și principala ei limită, nu o afirmație cauzală

C3 [Propus]: depinde VIX în mare parte de traiectorie? — cerința (1/2)

- ▣ **Model:** studiul de caz din curs; un proiect de replicare, nu o sarcină de seminar
- ▣ **Întrebare:** pot randamentele trecute ale S&P 500 să explice singure VIX, cum găesc [Guyon & Lekeufack \(2023\)](#) (94,6% din varianța sa în 2000–2018, 85,5% în 2019 – mai 2022)?
- ▣ **Date:** închiderile GSPC.INDX, VIX.INDX, VIX9D.INDX; randamente simple $r_{t_i} = S_{t_i}/S_{t_{i-1}} - 1$; indicii de volatilitate împărțiți la 100
- ▣ **Modelul**, ec. (3.7): $\sigma_t = \beta_0 + \beta_1 R_{1,t} + \beta_2 \Sigma_t$, $R_{1,t} = \sum_{i=0}^{999} K_1(i\Delta t) r_{t-i}$, $\Sigma_t = (\sum_{i=0}^{999} K_2(i\Delta t) r_{t-i}^2)^{1/2}$, $\Delta t = 1/252$
- ▣ **Nuclee**, ec. (3.9): $K_j(\tau) = (\tau + \delta_j)^{-\alpha_j} / Z_j$, cu Z_j astfel încât $\sum_{i=0}^{999} K_j(i\Delta t) \Delta t = 1$
- ▣ **Parametri și unități:** β_0 în unități de volatilitate (0,03 = 3 puncte VIX), β_1, β_2 fără unitate, $\alpha_j > 1$, $\delta_j > 0$ în ani
- ▣ **Start** (Tabelul 3, rândul VIX): $\beta_0 = 0,057$, $\beta_1 = -0,095$, $\beta_2 = 0,82$, $\alpha_1 = 1,06$, $\delta_1 = 0,020$, $\alpha_2 = 1,60$, $\delta_2 = 0,052$; limite $\alpha_j \in [1,0001; 20]$, $\delta_j \in [10^{-4}; 5]$

C3 [Propus]: depinde VIX în mare parte de traiectorie? — cerința (2/2)

▣ **Cerințe**, pe etape

1. Nuclee fixe: calculați $R_{1,t}$ și Σ_t cu nucleeele din Tabelul 3 și estimați $\beta_0, \beta_1, \beta_2$ prin OLS pe 2000–2018.
2. Modelul complet: estimați toți cei șapte parametri prin cele mai mici pătrate neliniare (`scipy.optimize.least_squares`) pe 1 ian. 2000 – 31 dec. 2018, recalculând variabilele la fiecare valoare încercată.
3. Raportați r^2 și RMSE pe eșantionul de antrenare și pe 1 ian. 2019 – 15 mai 2022, pentru modelul complet și pentru restricțiile $\beta_1 = 0$ și $\beta_2 = 0$; repetați modelul complet pentru VIX pe 9 zile (antrenare din 2011).
4. Păstrați parametrii fixați și evaluați perioada 16 mai 2022 – 18 sept. 2026.

▣ **De raportat**: tabelul parametrilor, scorurile alături de Tabelul 2 din lucrare, VIX observat și estimat, raportul dintre VIX observat și estimat, nucleeele estimate

▣ **Interpretare**: modelul explică VIX din aceeași zi; nu este o prognoză pentru ziua următoare; ce variabilă explică mai mult, $R_{1,t}$ sau Σ_t ?

Bibliografie (1/3)

- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
- Bollerslev, T., Hood, B., Huss, J., Pedersen, L.H. (2018). Risk everywhere: modeling and managing volatility. *Review of Financial Studies*, 31(7), 2729–2773.
- Christie, A.A. (1982). The stochastic behavior of common stock variances: value, leverage and interest rate effects. *Journal of Financial Economics*, 10(4), 407–432.
- Clark, P.K. (1973). A subordinated stochastic process model with finite variance for speculative prices. *Econometrica*, 41(1), 135–155.
- Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- Dalla, V., Giraitis, L., Phillips, P.C.B. (2022). Robust tests for white noise and cross-correlation. *Econometric Theory*, 38(5), 913–941.
- Diebold, F.X., Inoue, A. (2001). Long memory and regime switching. *Journal of Econometrics*, 105(1), 131–159.
- Dimson, E. (1979). Risk measurement when shares are subject to infrequent trading. *Journal of Financial Economics*, 7(2), 197–226.
- Engle, R.F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction* (ed. a 5-a). Springer.
- Garman, M.B., Klass, M.J. (1980). On the estimation of security price volatilities from historical data. *Journal of Business*, 53(1), 67–78.
- Guyon, J., Lekeufack, J. (2023). Volatility is (mostly) path-dependent. *Quantitative Finance*, 23(9), 1221–1258.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Hamilton, J.D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384.
- ▣ Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). Understanding cryptocurrencies. *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- ▣ Hill, B.M. (1975). A simple general approach to inference about the tail of a distribution. *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- ▣ Inclán, C., Tiao, G.C. (1994). Use of cumulative sums of squares for retrospective detection of changes of variance. *Journal of the American Statistical Association*, 89(427), 913–923.
- ▣ Jarque, C.M., Bera, A.K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. *Economics Letters*, 6(3), 255–259.
- ▣ Jobson, J.D., Korkie, B.M. (1981). Performance hypothesis testing with the Sharpe and Treynor measures. *Journal of Finance*, 36(4), 889–908.
- ▣ Kim, T.-H., White, H. (2004). On more robust estimation of skewness and kurtosis. *Finance Research Letters*, 1(1), 56–73.
- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2008). Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Journal of Empirical Finance*, 15(5), 850–859.
- ▣ Ljung, G.M., Box, G.E.P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- ▣ Lo, A.W. (2002). The statistics of Sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- ▣ Lobato, I., Nankervis, J.C., Savin, N.E. (2001). Testing for autocorrelation using a modified Box–Pierce Q test. *International Economic Review*, 42(1), 187–205.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Magdon-Ismail, M., Atiya, A.F., Pratap, A., Abu-Mostafa, Y.S. (2004). On the maximum drawdown of a Brownian motion. *Journal of Applied Probability*, 41(1), 147–161.
- ▣ Memmel, C. (2003). Performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Finance Letters*, 1(1), 21–23.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Parkinson, M. (1980). The extreme value method for estimating the variance of the rate of return. *Journal of Business*, 53(1), 61–65.
- ▣ Robinson, P.M. (1995). Gaussian semiparametric estimation of long range dependence. *Annals of Statistics*, 23(5), 1630–1661.
- ▣ Rogers, L.C.G., Satchell, S.E. (1991). Estimating variance from high, low and closing prices. *Annals of Applied Probability*, 1(4), 504–512.
- ▣ Scholes, M., Williams, J. (1977). Estimating betas from nonsynchronous data. *Journal of Financial Economics*, 5(3), 309–327.
- ▣ Sortino, F.A., van der Meer, R. (1991). Downside risk. *Journal of Portfolio Management*, 17(4), 27–31.
- ▣ Yang, D., Zhang, Q. (2000). Drift-independent volatility estimation based on high, low, open, and close prices. *Journal of Business*, 73(3), 477–492.