



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 17: Bule și crahuri



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ ADF: Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-FI: BET Financial Investment companies index (indicele BVB al societăților de investiții financiare)
- ▣ BSADF: Backward Sup Augmented Dickey–Fuller (statistic) (statistica Dickey–Fuller augmentată supremă, calculată înapoi de la fiecare dată)
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ EM: Expectation-Maximisation (algorithm) (algoritmul de maximizare a așteptării)
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- ▣ FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GSADF: Generalised Sup Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat suprem generalizat)
- ▣ JLS: Johansen–Ledoit–Sornette (model) (modelul Johansen–Ledoit–Sornette)
- ▣ LPPL: Log-Periodic Power Law (legea de putere log-periodică)
- ▣ LPPLS: Log-Periodic Power Law Singularity (model) (modelul singularității de tip lege de putere log-periodică)
- ▣ LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- ▣ MC: Monte Carlo (simulation) (simulare Monte Carlo)
- ▣ NVIDIA: NVIDIA Corporation (company name, US chip designer) (NVIDIA Corporation (nume de companie, proiectant american de cipuri))
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ PSY: Phillips–Shi–Yu (bubble test and date-stamping procedure) (procedura Phillips–Shi–Yu de testare și datare a bulelor)
- ▣ PWY: Phillips–Wu–Yu (bubble test and date-stamping procedure) (procedura Phillips–Wu–Yu de testare și datare a bulelor)
- ▣ SADF: Sup Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat suprem)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SRISK: Systemic RISK (capital shortfall measure) (deficitul de capital al unei bănci într-o criză sistemică)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii

Parcursul capitolului și rezultatele învățării

Parcursul capitolului

- ▣ Întrebarea: prețurile cresc uneori mult mai repede decât orice schimbare plauzibilă a fundamentelor, apoi își pierd cea mai mare parte din valoare; poate statistica detecta astfel de episoade **în timp real** și poate spune **când** se termină?
- ▣ Partea I: ce este o bulă, creșteri și prăbușiri în date, testele pentru prețuri explozive și datarea episoadelor
- ▣ Partea a II-a: modelul LPPLS, schimbarea de regim, crypto și acțiunile AI, un studiu de caz, o trecere prin bucla de cercetare asistată de AI
- ▣ Detaliile tehnice sunt în Anexa de la final

După acest capitol puteți

- ▣ separa valoarea fundamentală de o bulă rațională și spune ce se poate testa
- ▣ testa prețurile explozive cu GSADF și data episoadele cu BSADF, cu valori critice valide
- ▣ estima LPPLS, judeca stabilitatea momentului critic și evalua corect alarmele lui
- ▣ descrie creșterile și prăbușirile cu un model Markov-switching și testa numărul de regimuri

Trei lecții istorice



Hendrik Gerritsz Pot, *Carul nebunilor al Florei* (c. 1637), o satiră a comerțului cu lălele

Imagine: Hendrik Gerritsz Pot (c. 1637); domeniu public; [Wikimedia Commons](#)

- **Lălelele, 1636–1637:** contractele pe bulbi rari s-au tranzacționat la prețuri foarte mari până când piața s-a oprit în februarie 1637; o parte din traiectorie se potrivește cu fundamentele unui bun de lux nou [Garber \(1990\)](#)
 - Lecția 1: ca să numim ceva bulă, avem nevoie de un model al valorii fundamentale
- **Marea Sudului și Mississippi, 1720:** acțiunile au crescut de câteva ori în câteva luni, apoi s-au prăbușit; o inovație financiară, credit ușor și o poveste despre profiturile viitoare [Kindleberger & Aliber \(2005\)](#)
 - Lecția 2: bulele vin împreună cu creditul și cu volume mari de tranzacționare [Scheinkman & Xiong \(2003\)](#)
- **1929:** un avânt finanțat parțial cu bani împrumutați s-a încheiat cu crahul din octombrie; secvența lui Kindleberger (după Minsky): șoc inițial, avânt, euforie, tensiune, panică [Kindleberger & Aliber \(2005\)](#)
 - Lecția 3: avem nevoie de teste care funcționează pe o singură serie de timp, în timp real, înainte de panică

Datele folosite în acest capitol

Seria	Frecvența	Perioada	Utilizare
S&P Composite, preț și dividend reale	lunar	1871–2026	raportul preț/dividend
48 de portofolii sectoriale din SUA	lunar	1926–2026	creșteri și prăbușiri
Nasdaq 100, S&P 500	zilnic, lunar	1990–2026	dot-com, AI
BET, BET-FI	zilnic, lunar	1997–2026	Bursa de Valori București
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin	zilnic, săptămânal	2014–2026	creșteri crypto
NVIDIA, Cisco, Tesla, GameStop, Strategy	zilnic, lunar	1990–2026	acțiuni individuale

- Valori de închidere până la 18 septembrie 2026; acțiunile ajustate pentru dividende și divizări; seriile săptămânale și lunare folosesc ultimul preț din perioadă
- Surse: shillerdata.com pentru S&P Composite; [Kenneth French Data Library](https://kennethfrench.com) pentru industrii

Valoarea fundamentală

- Absența oportunităților de arbitraj implică $P_t = \mathbb{E}_t[M_{t+1}(P_{t+1} + D_{t+1})]$, cu M factorul stochastic de actualizare și D dividendul
 - **Ipoteza modelului:** un randament cerut (așteptat) constant r , deci $P_t = \frac{\mathbb{E}_t[P_{t+1} + D_{t+1}]}{1 + r}$; $\mathbb{E}_t$: speranța sub probabilitatea fizică, condiționată de informația de la t
- Prin substituții succesive ale valorilor viitoare obținem **valoarea fundamentală:** $F_t = \sum_{i \geq 1} \frac{\mathbb{E}_t[D_{t+i}]}{(1 + r)^i}$
 - Cazul Gordon, dividende care cresc cu $g < r$: $F_t = D_{t+1}/(r - g)$
- Dar și $P_t = F_t + B_t$ rezolvă ecuația, ori de câte ori $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1 + r) B_t$
- B_t este **bula rațională**: investitorii plătesc pentru ea pentru că se așteaptă să o revândă la un preț mai mare
Blanchard & Watson (1982)


De ce o bulă rațională trebuie să explodeze

- Din $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1+r)B_t$: $\mathbb{E}_t[B_{t+h}] = (1+r)^h B_t$, o traiectorie **explozivă**
 - Bula crește mai repede decât dividendele ($r > g$), deci ponderea ei în preț crește în timp
- O bulă negativă ar împinge în cele din urmă prețul așteptat sub zero, iar o bulă care azi este zero trebuie să rămână zero: bulele raționale sunt pozitive și există de la prima tranzacție [Diba & Grossman \(1988\)](#)
- O bulă este încălcarea **condiției de transversalitate** $\lim_{h \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t[P_{t+h}]/(1+r)^h = 0$: prețul conține o valoare care nu este plătită niciodată ca dividend (derivarea în Anexă)
- **Implicația testabilă**: dacă dividendele sunt cel mult $I(1)$, atunci fără bulă prețul și raportul preț/dividend **nu sunt explozive**
 - $I(1)$: integrat de ordinul unu; prima diferență este $I(0)$ (staționară), iar nivelul nu este

Bule care se sparg: Blanchard și Watson

- În fiecare perioadă bula supraviețuiește cu probabilitatea π și se prăbușește cu probabilitatea $1 - \pi$ [Blanchard & Watson \(1982\)](#)
 - ▶ $B_{t+1} = \frac{1+r}{\pi} B_t + \varepsilon_{t+1}$ cu probabilitatea π , $B_{t+1} = \varepsilon_{t+1}$ altfel
- Creșterea așteptată rămâne r ; cât timp supraviețuiește, bula crește mai repede, cu $(1+r)/\pi - 1$, pentru a compensa riscul de prăbușire
- Durata de viață așteptată: $1/(1-\pi)$ perioade, un timp de așteptare geometric
- După o prăbușire $B = \varepsilon$ poate fi negativă, ceea ce Diba–Grossman exclude: simularea de pe slide-ul următor repornește de la o valoare pozitivă (forma Evans) [Evans \(1991\)](#)

O bulă rațională simulată



- ▣ Valoarea fundamentală D_t/r , dividende de tip mers aleator; $r = 1\%$, $\pi = 0,97$: creștere de aproape 4,1% pe perioadă cât timp bula persistă și are o valoare mare, durată de viață așteptată 33,3 perioade
- ▣ Forma Evans: prăbușire la $b_0 = 5$, supraviețuire $B_{t+1} = b_0 + \frac{1+r}{\pi}(B_t - \frac{b_0}{1+r})$ înmulțit cu un zgomot de medie 1, deci $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1+r)B_t$ exact
- ▣ În 400 de perioade bula a crescut mult și s-a spart de 4 ori; la maximum, prețul a fost de 1,43 ori valoarea fundamentală
- ▣ Între episoade prețul urmează fundamentele, deci un test pe toată selecția vede mai ales date „normale”: testele din acest capitol folosesc **ferestre**

Bule dincolo de așteptările raționale



Robert J. Shiller, Premiul Nobel 2013

Foto: Presidential Office Building, Taiwan (2017); CC

BY 2.0; Wikimedia Commons


- **Feedback și narațiuni:** prețurile în creștere atrag cumpărători noi, poveștile despre o „eră nouă” se răspândesc din gură în gură [Shiller \(2015\)](#)
- **Dezacord și limite la vânzarea în lipsă:** prețul include opțiunea de a revinde unui cumpărător mai optimist [Scheinkman & Xiong \(2003\)](#)
- **Riding the bubble** (rămânerea în bulă): investitorii informați rămân cât timp rămân și ceilalți, fiindcă nimeni nu o poate sparge singur [Abreu & Brunnermeier \(2003\)](#), [Brunnermeier & Nagel \(2004\)](#)
- Toate trei dau prețuri care cresc un timp mai repede decât fundamentele: semnătura explozivă pe care o vom testa

Nouă episoade: creștere și prăbușire

Episod	Vârf	Creștere în 2 ani	Scădere max.	Minim	Înapoi la vârf
Nasdaq 100, 2000	27 mar. 2000	+288%	−83%	oct. 2002	nov. 2015
Cisco, 2000	27 mar. 2000	+592%	−89%	oct. 2002	aug. 2021
BET, 2007	24 iul. 2007	+97%	−83%	feb. 2009	mar. 2021
Bitcoin, 2017	16 dec. 2017	+4186%	−83%	dec. 2018	nov. 2020
Ethereum, 2018	13 ian. 2018	+124004%	−94%	dec. 2018	feb. 2021
Bitcoin, 2021	8 nov. 2021	+667%	−77%	nov. 2022	mar. 2024
Dogecoin, 2021	7 mai 2021	+26897%	−92%	iun. 2022	încă nu
GameStop, 2021	27 ian. 2021	+2218%	−88%	apr. 2024	încă nu
Tesla, 2021	4 nov. 2021	+1837%	−74%	ian. 2023	dec. 2024

- Vârful: cea mai mare închidere zilnică din episod; creșterea: variația prețului în cei doi ani dinaintea vârfului; scăderea maximă: până la cea mai mică închidere din următorii patru ani
- BET 2007: singurul episod fără o creștere spectaculoasă în ultimii doi ani, dar cu una dintre cele mai adânci scăderi

Creșteri și prăbușiri aliniate la vârf



- Prețuri zilnice cu doi ani înainte și după fiecare vârf, vârful = 100, scară logaritmică
- Creșterile pe doi ani diferă enorm, de la +97% (BET) la +124004% (Ethereum); scăderile sunt mult mai asemănătoare, 74–94%
- Forma comună: o creștere care accelerează (convexă pe scara logaritmică, însăși rata de creștere crește), un vârf ascuțit, o scădere adâncă: comportamentul **exploziv** pe care îl caută testele
- Distorsiune de selecție: am ales aceste episoade pentru că s-au încheiat cu prăbușiri; multe creșteri nu au fost urmate de prăbușiri

Bula dot-com



Păpușa-șosetă Pets.com, mascota unui magazin online de produse pentru animale listat și închis în 2000

Foto: [Atomic Taco \(2013\)](#); CC BY-SA 2.0; [Wikimedia Commons](#)


- După vârful din 27 mar. 2000: Nasdaq 100 –83%, Cisco –89% (tabelul); Cisco și-a recuperat vârful abia în aug. 2021
- Fondurile de tip hedge fund au rămas în bulă (*riding the bubble*) și și-au redus pozițiile înainte de scădere [Brunnermeier & Nagel \(2004\)](#)
- Totuși, internetul a schimbat economia: o revoluție tehnologică poate crea în același timp valoare și o bulă [Pástor & Veronesi \(2009\)](#)

Bubbles for Fama: designul

- Obiecția lui Fama: o „bulă” este bulă doar dacă sfârșitul ei este previzibil; altfel poate fi o reacție rațională la știri [Fama \(2014\)](#)
- Greenwood, Shleifer și You răspund cu **toate** industriile americane din 1926, nu doar cu episoadele celebre: prezic creșterile bruște prăbușiri sau randamente mici? [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#)
- **Creștere:** randamentul industriei (ponderat cu capitalizarea bursieră) pe ultimii 2 ani peste un prag (de exemplu 100%), atât brut, cât și în exces față de randamentul pieței
 - ▶ Și un randament brut de cel puțin 50% pe ultimii 5 ani (din 1931), ca revenirile după scăderi să nu fie numărate (Secțiunea 2)
 - ▶ Prima lună a creșterii; un episod nou în aceeași industrie abia după doi ani
- **Prăbușire:** o scădere de cel puțin 40% față de un maxim anterior în următorii 2 ani
- Replicarea noastră, cu aceleași reguli de selecție: primele 48 dintre cele 49 de industrii din [Kenneth French Data Library](#) (fără „Other”), luni cu cel puțin zece firme: 41 679 de luni-industrie, 1926–2026

Ce prezic creșterile bruște?

Bubbles for Fama, 48 US industries 1926-2026: two-year run-ups above the threshold, raw and net of the market




- După o creștere de peste 100% (52 de episoade în 27 de industrii), a urmat o prăbușire de 40% în 46% din cazuri, CI de 95% [27%, 63%], față de 11% pentru o lună-industrie oarecare; peste 150%: 71% ($n = 21$)
 - CI: bootstrap pe ani calendaristici, fiindcă episoadele se grupează în timp (de exemplu 1928–1929, 1967–1968, 1980); mărimea efectivă a eșantionului în Anexă
- Randamentul mediu din următorii 2 ani nu diferă semnificativ de zero: 2% după o creștere de 100%, CI [–14%, 20%]: nicio pierdere medie stabilită statistic
- Creșterile măresc **riscul** unei prăbușiri, nu pierderea previzibilă: creșterile de preț singure nu oferă un semnal profitabil pentru alegerea momentului tranzacționării [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#)

ADF la dreapta și bulele care se prăbușesc


- Regresia pe logaritmul prețului y_t : $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + \varepsilon_t$; $ADF = \hat{b}/SE(\hat{b})$; aici cu termen liber și fără valori întârziate ale lui Δy
- Testul de bulă: $H_0 : b = 0$ (rădăcină unitară) vs $H_1 : b > 0$ (rădăcină explozivă), **coada dreaptă**; tabelul Dickey–Fuller pentru coada stângă nu se aplică [Phillips, Wu & Yu \(2011\)](#)
- Evans: o bulă care se prăbușește periodic face ca seria **pe toată selecția** să pară staționară sau un mers aleator: putere mică; prăbușirile dau pantei pe toată selecția un semn negativ (Anexă) [Evans \(1991\)](#)
- Soluția: rulăm regresia ADF pe multe **ferestre** și luăm cea mai mare statistică
 - ▶ SADF (Phillips, Wu și Yu): ferestrele încep la prima observație și cresc [Phillips, Wu & Yu \(2011\)](#)
 - ▶ GSADF (Phillips, Shi și Yu): ferestrele pot începe și se pot termina oriunde [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)

Bula Evans: selecția completă vs ferestre



- 400 de perioade simulate; BSADF (definit mai jos) față de valoarea critică de 95% din 2 000 de traiectorii de tip mers aleator
- ADF la dreapta pe toată selecția: $-5,49$ vs valoarea critică de 95% $-0,09$: nu respingem, bula este invizibilă
- SADF 0,98 (valoarea critică 1,46) și GSADF 5,88 (valoarea critică 2,21)
- BSADF depășește valoarea critică în mai multe explozii, dar doar una durează suficient ca să fie datată: regula duratei minime renunță la exploziile scurte în schimbul unor alarme false mai puține

Trei moduri de a alege ferestrele: SADF, GSADF, BSADF




- $ADF_{r_1}^2$: statistica ADF pe fereastra de la fracția r_1 la fracția r_2 a selecției; fiecare bară din grafic este o regresie ADF
- $SADF(r_0) = \sup_{r_2 \in [r_0, 1]} ADF_0^2$ Phillips, Wu & Yu (2011)
- $GSADF(r_0) = \sup_{r_2 \in [r_0, 1]} \sup_{r_1 \in [0, r_2 - r_0]} ADF_{r_1}^2$ Phillips, Shi & Yu (2015a)
- SADF retrospectiv, cu capătul ferestrei la r_2 : $BSADF_{r_2} = \sup_{r_1 \in [0, r_2 - r_0]} ADF_{r_1}^2$; $GSADF = \sup_{r_2} BSADF_{r_2}$
 - $BSADF_{r_2}$ folosește doar datele până la r_2 : poate fi calculat în timp real
- Regula ferestrei minime: $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$, de exemplu $T = 440$ de luni: $r_0 = 0,096$, 42 de luni Phillips, Shi & Yu (2015a)

Datarea: când a început și când s-a încheiat?

- **Începutul:** prima dată la care BSADF depășește valoarea critică Phillips, Shi & Yu (2015a)
 - ▶ Șirul valorilor critice cv_{r_2} : cuantila de 95% a $BSADF_{r_2}$ sub ipoteza nulă, dată cu dată
- **Sfârșitul** (PSY, ec. 8): prima dată după $\hat{r}_e + \delta \ln(T)/T$ la care BSADF coboară sub valoarea critică, cu δ dependent de frecvență Phillips, Shi & Yu (2015a)
- **Regula folosită în acest capitol:** filtrul de durată minimă din exuber (datestamp, min_duration), care elimină seriile de depășiri mai scurte de L Vasilopoulos, Pavlidis & Martínez-García (2022)
 - ▶ $L = \lceil \ln T \rceil$ ($\delta = 1$); $T = 440$: 7 luni. Începutul: prima depășire; sfârșitul: ultima depășire (exuber raportează data următoare). Ec. 8 ar prelungi în schimb o depășire izolată la L date
 - ▶ Timp real: începutul este datat retrospectiv; episodul este **confirmat** abia după L depășiri consecutive, cu $L - 1$ perioade mai târziu
- Datarea PWY folosește în schimb $ADF_0'^2$ recursiv: poate rata o a doua bulă după o prăbușire Phillips, Shi & Yu (2015b)

Distribuțiile sub ipoteza nulă și valorile critice



- Mers aleator cu un drift mic, $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + \varepsilon_t$, 2000 de traiectorii cu $T = 440$; valori critice de 95%: un singur ADF $-0,06$ (negativă!), SADF 1,41, GSADF 2,19 Phillips, Shi & Yu (2015a)
- Supremul pe mai multe ferestre mută distribuția spre dreapta: pragul GSADF este prețul căutării în aproximativ 80 000 de ferestre; îl simulăm pentru fiecare T , r_0 și număr de întârzieri
- Teoria asimptotică (Anexă): limita sub ipoteza nulă este pivotală; împotriva rădăcinilor ușor explozive testele sunt consistente; datarea păstrează o șansă de 5% de alarmă falsă la fiecare dată Phillips, Shi & Yu (2015b)

Volatilitate variabilă: wild bootstrap


- ▣ Valorile critice Monte Carlo presupun șocuri cu dispersie constantă; prețurile reale au grupări și schimbări ale volatilității
- ▣ O explozie a volatilității poate imita explozivitatea și poate crește rata de respingere [Harvey et al. \(2016\)](#)
- ▣ **Wild bootstrap**: înmulțim variațiile observate și centrate Δy_t cu semne aleatoare $w_t = \pm 1$, reconstruim traiectoria, recalculăm BSADF [Phillips & Shi \(2020\)](#)
 - ▶ Ipoteza nulă din bootstrap păstrează tiparul de volatilitate al datelor, dar nu are rădăcină explozivă
 - ▶ Centrarea cu media întregului eșantion și reeșantionarea întregii traiectorii produc valori critice **retrospective**; în timp real le recalculăm cu datele până la fiecare dată
- ▣ Validitatea: datele bootstrap au prin construcție o rădăcină unitară și moștenesc tiparul în timp al $\text{Var}(\Delta y_t)$; centrarea elimină drift-ul, ca în modelul nul [Harvey et al. \(2016\)](#)

Nivelul GSADF când volatilitatea se schimbă: Monte Carlo

Model nul, fără bulă	GSADF, cv MC	GSADF, cv wild	Episod fals, MC	Episod fals, wild
Volatilitate constantă	4,1%	3,9%	49,1%	51,9%
Volatilitate $\times 3$ la $T/2$	32,0%	4,1%	63,8%	49,6%
Volatilitate $\times 1/3$ la $T/2$	4,3%	6,1%	48,0%	54,8%
GARCH(1,1), $\alpha = 0,10$, $\beta = 0,88$	16,6%	6,8%	58,1%	52,8%


- Rate de respingere la 5%; $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + e_t$, $T = 400$, $w_0 = 40$, 1 000 de traiectorii pe rând, fiecare cu propriul wild bootstrap (199 de replici); eroarea Monte Carlo $\pm 1,4$ puncte în jur de 5%; episod fals: BSADF peste valoarea punctuală de 95% timp de 6 perioade
- O creștere târzie a volatilității este confundată cu explozivitatea (32,0% cu valori critice Monte Carlo, 4,1% cu wild bootstrap); sub GARCH, wild bootstrap elimină cea mai mare parte a distorsiunii, nu toată; o scădere a volatilității nu face rău [Harvey et al. \(2016\)](#)
- Chiar cu volatilitate constantă, 49,1% dintre traiectorii conțin un episod datat fals: nivelul este controlat dată cu dată, nu pe toată selecția

Raportul preț/dividend S&P 500, 1871–2026




- Prețul real împărțit la dividendul real, lunar, ian. 1871–iun. 2026, $T = 1865$, fereastra minimă 96 de luni
- GSADF = 3,41 vs valoarea critică de 95% 2,39 (99%: 2,88); ADF pe toată selecția (−1,11) nu vede nimic
- Episoade: aug. 1917–iun. 1918; nov. 1928–sept. 1929; mai 1997–aug. 2001
 - 1917–1918 este o **scădere** accelerată a raportului (prețurile reale au scăzut mai repede decât dividendele reale): explozivă, dar nu o bulă
- Dot-com: vârful 90,2 în aug. 2000, față de o medie pe termen lung de 29,8; maximum din selecție, 91,2 în mai 2026, nu cade în niciun episod: un raport mare nu este neapărat unul exploziv
- Un raport poate exploda prin numitor: verificăm mereu atât prețul, cât și dividendul

Nasdaq 100: datarea GSADF vs PWY




- Logaritmul închiderilor lunare 1990–2026, $T = 440$, fereastra minimă 42 de luni; 2 000 de traiectorii Monte Carlo
- GSADF = 2,57 (valoarea critică de 95% 2,19); SADF = 2,14 (valoarea critică 1,41)
- Episoade BSADF: iun. 1995–iun. 1996; aug. 1996–iul. 1998; sept. 1998–oct. 2000; apr. 2020–mai 2022; mai 2023–în curs
 - ▶ Episoade PWY (început fix): apr. 1997–nov. 1997; ian. 1998–iul. 1998; sept. 1998–oct. 2000
- ADF recursiv pornește din 1990 și este tras în jos de lunga perioadă plată de după 2000: ratează episoadele de după 2020 pe care BSADF le găsește
- Episodul dot-com datat din iun. 1995, cu 57 de luni înainte de vârful din mar. 2000; confirmat în timp real în dec. 1995

Bitcoin: episoade explozive




- Logaritmul închiderilor săptămânale 2014–2026, $T = 626$, fereastra minimă 51 de săptămâni; valori critice Monte Carlo
- $GSADF = 3,85$: valoarea critică de 95% Monte Carlo 2,27, wild bootstrap 2,82: respingem în ambele cazuri
- Episoade Monte Carlo: apr. 2017–iun. 2018; dec. 2020–mai 2021
 - ▶ Episoade wild bootstrap: mai 2017–ian. 2018; dec. 2020–feb. 2021
- 2017: episod datat din apr. 2017, cu 8 luni înainte de vârful din 16 dec. 2017, confirmat în timp real în iun. 2017; s-a încheiat la 6 luni după vârf
- Creșterea din 2024–2025 la noi maxime **nu** este semnalată: o creștere constantă nu este același lucru cu o accelerare explozivă

Datarea este un test multiplu: Bitcoin




- BSADF este comparat cu valoarea critică de 95% la fiecare dintre cele 626 de săptămâni: sute de teste dependente
- Rata erorii pe familie (FWER): probabilitatea apariției a cel puțin unei alarme false pe toată fereastra de monitorizare; în 2 000 de mersuri aleatoare cu T și w_0 ale Bitcoin: o depășire în 95%, un „episod” în 59% din traiectorii
- Phillips și Shi: bootstrap pentru **maximul** BSADF pe τ_b date; valoarea critică pe familie 1,75, față de valori punctuale de cel mult 0,71 [Phillips & Shi \(2020\)](#)
- Episoade peste pragul mai înalt: oct. 2017–ian. 2018; episodul din 2020–2021 găsit cu valorile punctuale nu rezistă
- O verificare de sensibilitate, nu un control FWER demonstrat (designul în Anexă)

BET: avântul din 2007 și anul 2025



- Logaritmul închiderilor lunare ale indicelui BET oficial, 1997–2026, $T = 348$, fereastra minimă 37 de luni
- $GSADF = 2,90$ vs valoarea critică de 95% 2,21; episoade: aug. 2002–iun. 2003; nov. 2003–oct. 2007; oct. 2008–mar. 2009; oct. 2025–în curs
- 2003–2007: creșterea dinaintea și din jurul aderării României la Uniunea Europeană (ianuarie 2007); BET a scăzut apoi cu 83% de la vârful din 24 iul. 2007
- Oct. 2008–mar. 2009 este o **scădere** accelerată: exploziv poate însemna în jos, nu doar în sus
- Episodul actual (din oct. 2025) este încă deschis: exploziv nu înseamnă că se va prăbuși; înseamnă că urcarea accelerează

GameStop, ianuarie 2021



Un magazin GameStop, 3 februarie 2021, la o săptămână după vârf

Foto: Will Buckner (2021); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- Logaritmul închiderilor zilnice 2020–2021, $T = 504$, fereastra 45 de zile; GSADF = 7,34, valoarea critică 2,21
- Episodul din ianuarie datat din 13 ian. 2021, cu 14 zile înainte de maximum de închidere din 27 ian. 2021; confirmat pe 22 ian. 2021
- O creștere de câteva săptămâni: cere date zilnice; testul nu identifică mecanismul (*short covering*)

 MFM_ch17_bet_gamestop

Timp real vs retrospectivă

Episod	Început / Vârf	Confirmat	Avans (luni)	Avans, conf.	Creștere	Scădere
Nasdaq 100, lunar	iun. 1995 / mar. 2000	dec. 1995	57	51	+716%	-76%
BET, lunar	nov. 2003 / iul. 2007	apr. 2004	44	39	+299%	-83%
Bitcoin 2017, săptămânal	apr. 2017 / dec. 2017	iun. 2017	8	6	+590%	-83%
Bitcoin 2021, săptămânal	dec. 2020 / apr. 2021	feb. 2021	4	2	+66%	-75%
GameStop, zilnic	13 ian. 2021 / 27 ian. 2021	22 ian. 2021	0,5	0,2	+435%	-88%

- Început: prima depășire a șirului de episoade BSADF care duce la vârf (retrospectiv); confirmat: după L depășiri consecutive, prima dată cunoscută în timp real; avansurile în luni; creșterea: de la confirmare la vârf; scăderea: până la cea mai mică închidere în 2 ani (definițiile în Anexă)
- Chiar la confirmare testele **avertizează devreme**, dar avansul variază între 5 zile și aproximativ 4,2 ani, iar vânzarea la confirmare ar fi ratat cea mai mare parte a creșterii: ele nu anticipează momentul prăbușirii [Phillips, Shi & Yu \(2015b\)](#)

Prăbușirile ca puncte critice



Didier Sornette, ETH Zürich

Foto: Didier Sornette (2012); CC BY-SA 3.0
(Germany); Wikimedia Commons

- Johansen, Ledoit și Sornette (JLS): imitația dintre investitori face ca **rata de hazard** a unei prăbușiri să crească pe măsură ce se apropie un moment critic t_c [Johansen, Ledoit & Sornette \(2000\)](#)
- Investitorii raționali rămân doar dacă prețul crește suficient de repede pentru a compensa riscul tot mai mare de prăbușire
- Rezultatul: o creștere **mai rapidă decât exponențială**, însoțită de oscilații care se accelerează lângă t_c
- t_c este sfârșitul cel mai probabil al bulei, nu o dată sigură a prăbușirii [Sornette \(2017\)](#)

Ecuția LPPLS

- ▣ $\ln p(t) = A + B(t_c - t)^m + C(t_c - t)^m \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi), \quad t < t_c$
- ▣ A : logaritmul prețului la t_c ; $B < 0$: tendința super-exponențială pentru o bulă în creștere; $0 < m < 1$: exponentul legii de putere
 - ▶ Rata de creștere a tendinței de tip lege de putere, $-Bm(t_c - t)^{m-1}$, crește nelimitat când $t \rightarrow t_c$
- ▣ C, ω, ϕ : amplitudinea, frecvența unghiulară logaritmică și faza oscilațiilor log-periodice
- ▣ Șapte parametri: A, B, C, ϕ și cei neliniari t_c, m, ω
- ▣ LPPL: tiparul legii de putere log-periodice; LPPLS: modelul cu singularitatea în timp finit la t_c


Calibrarea: Filimonov și Sornette

- ▣ Rescriem cosinusul: $C \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi) = C_1 \cos(\omega \ln(t_c - t)) + C_2 \sin(\omega \ln(t_c - t))$ [Filimonov & Sornette \(2013\)](#)
 - ▶ A, B, C_1, C_2 devin **liniari**: pentru (t_c, m, ω) dați se obțin prin OLS
- ▣ Optimizăm doar în raport cu (t_c, m, ω) : o grilă, apoi o rafinare Nelder–Mead a sumei pătratelor reziduurilor
- ▣ Spațiul de căutare al lui Shu și Zhu (Secțiunea 2.3, ec. 11): $m \in [0, 1]$, $\omega \in [1, 50]$, $t_c \in [t_2, t_2 + (t_2 - t_1)/3]$, amortizarea $\frac{m|B|}{\omega|C|} \geq 1$, o condiție aproximativă ca rata de hazard a prăbușirii (probabilitatea prăbușirii pe unitatea de timp, dat fiind că nu a avut loc încă) să fie nenegativă (exact: $m|B| \geq |C|\sqrt{m^2 + \omega^2}$, Seminarul 17, A8) [Shu & Zhu \(2020\)](#)
- ▣ Rămân multe minime locale: ferestre și puncte de pornire diferite dau t_c diferite [Geraskin & Fantazzini \(2013\)](#)

Ajustări calificate: filtrul


- O ajustare pe $[t_1, t_2]$ este **calificată** dacă trece toate condițiile lui Shu și Zhu (Secțiunea 2.3, ec. 12), iar $B < 0$ pentru o bulă în creștere [Shu & Zhu \(2020\)](#)
 - ▶ $m \in [0,01, 0,99]$, $\omega \in [2, 25]$, $t_c \in [t_2, t_2 + (t_2 - t_1)/5]$
 - ▶ Numărul de oscilații (semiperioade) $O = \frac{\omega}{\pi} \ln \frac{t_c - t_1}{t_c - t_2} \geq 2,5$, ca oscilațiile să nu fie zgomot
 - ▶ Cea mai mare eroare relativă a prețului ajustat $\max_t |\hat{p}_t - p_t|/p_t \leq 0,15$
 - ▶ Periodograma Lomb a reziduului fără tendință $(t_c - t)^{-m}(\ln p_t - A - B(t_c - t)^m)$: log-periodicitate semnificativă la 10%
 - ▶ Verificarea rădăcinii unitare a reziduului $\ln \hat{p}_t - \ln p_t$: testele Dickey–Fuller și Phillips–Perron resping rădăcina unitară la 10% (un reziduu staționar, cu revenire la medie; asta singur nu îl face AR(1))
- $[t_1, t_2]$: fereastra de estimare; filtrul se aplică fiecărei ferestre separat

LPPLS pe Bitcoin, 2017



- Ajustare pe logaritmul prețurilor zilnice din 1 ianuarie până la 15 noiembrie 2017; traiectoria după 15 noiembrie este în afara eșantionului
- Ajustarea urmează îndeaproape creșterea din 2017 și oscilațiile ei: $m = 0,95$, $\omega = 10,54$, $B = -2,62$
- t_c estimat: 21 dec. 2017; vârful real: 16 dec. 2017, adică cu 5 zile mai devreme
- Ajustarea nu îndeplinește condiția privind eroarea relativă $\leq 0,15$: **nu** trece filtrul, deși pare convingătoare

Cât de stabil este momentul critic?




- O ajustare bună în eșantion nu este o prognoză: fiecare punct este o ajustare pe o fereastră cu început fix, care se termină la data de pe axa orizontală (la fiecare 7 zile)
- Bitcoin: înainte de vârf (20 de ajustări) t_c a variat între oct. 2017 și feb. 2018; eroarea absolută medie 48 de zile; la mai puțin de 30 de zile de vârf: 20% dintre ajustări
- Nasdaq 100: înainte de vârf (30 de ajustări) t_c a variat între dec. 1999 și sept. 2000; eroarea absolută medie 70 de zile; $t_c \geq t_2$ este o constrângere a căutării, nu o prognoză
- Ajustări calificate înainte de vârf: 0% (Bitcoin) și 0% (Nasdaq 100); nașterea unei bule este mai ușor de diagnosticat decât spargerea ei [Demos & Sornette \(2017\)](#)

Indicatorul de încredere LPPLS

- ▣ La fiecare dată t_2 , ajustăm multe ferestre $[t_2 - L, t_2]$ și raportăm **ponderea ajustărilor calificate** [Demirer et al. \(2019\)](#)
 - ▶ Grila lui Shu și Zhu (Secțiunea 2.3): 141 de ferestre, L de la 750 la 50 de observații, cu pasul 5; t_2 la fiecare 5 observații; doar date până la t_2 [Shu & Zhu \(2020\)](#)
 - ▶ Închideri zilnice; Bitcoin se tranzacționează în fiecare zi, deci o observație este o zi calendaristică
- ▣ O pondere mare înseamnă că semnătura de bulă este robustă la alegerea ferestrei
- ▣ Evaluarea onestă: este un semnal urmat mai des decât lipsa semnalului de o scădere de cel puțin 20% în 90 de zile?
 - ▶ Scăderea se măsoară de la prețul din ziua semnalului; doar datele ale căror 90 de zile calendaristice sunt complet observate (ultimele trei luni de date sunt excluse)

Bitcoin: indicatorul de încredere în timp real



- Sus: ponderea celor 141 de ferestre cu ajustare calificată, la fiecare 5 zile, 2016–2026; jos: ponderea ferestrelor care trec fiecare condiție (testele Lomb și al reziduului, cumulativ)
- Bitcoin: indicatorul a fost pozitiv în 14% din datele din 2017, 3% în 2021 și 12% în ceilalți ani; maximum 0,18 în dec. 2020
- După un semnal, a urmat o scădere de 20% în 90 de zile în 22% din cazuri, față de 37% fără semnal (709 date)
 - Nasdaq 100, 1997–2026: 4% după un semnal, față de 11% fără semnal (1482 de date)
- Diferența brută nu este încă o dovadă: semnalele vin în serii, iar ferestrele de 90 de zile ale rezultatului se suprapun (testul pe slide-ul următor)


Este indicatorul mai bun decât întâmplarea? Un test

- $H_0: P(\text{scădere} \geq 20\% \text{ în } 90 \text{ de zile} \mid \text{semnal}) = P(\cdot \mid \text{fără semnal})$; statistica $\Delta = \hat{\rho}_{\text{on}} - \hat{\rho}_{\text{off}}$
- Datele aflate la 5 zile distanță au în comun până la 85 din cele 90 de zile ale rezultatului: testul z pentru două eșantioane, care presupune date independente, subestimează eroarea standard
- Bootstrap pe blocuri circulare al perechilor (semnal, rezultat), blocuri de 90 de zile, 9 999 de replici; regresie liniară de probabilitate cu erori standard Newey–West
 - ▶ Bitcoin: $\Delta = -15,5$ puncte, CI de 95% $[-30,0, 1,8]$; SE pe blocuri 8,1 vs SE pentru date independente 5,0; regresia $p = 0,049$
 - ▶ Același test pentru Nasdaq 100, cu un calcul de putere: Seminarul 17, Exercițiul B6
- Intervalul nu este peste zero: în datele noastre un semnal **nu** este urmat de o scădere mare mai des decât lipsa semnalului; estimarea punctuală este negativă (regresia $p = 0,049$): semnalele apar în creșteri constante, nu chiar înaintea prăbușirilor

Modelul Markov-switching

- ▣ Randamentul log săptămânal $r_t = \mu_{s_t} + \sigma_{s_t} \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$, regimul $s_t \in \{1, 2\}$ neobservat [Hamilton \(1989\)](#)
 - ▶ Fiecare regim are propria medie μ și propria volatilitate σ : un regim calm și unul turbulent
- ▣ Regimurile urmează un lanț Markov: $p_{ij} = P(s_t = j \mid s_{t-1} = i)$; durata așteptată a regimului i : $1/(1 - p_{ii})$
- ▣ Estimare prin verosimilitate maximă cu filtrul Hamilton, care actualizează $P(s_t = j \mid r_1, \dots, r_t)$ săptămână de săptămână
- ▣ Probabilitatea **filtrată**: randamentele până la t , pentru parametri dați; **netezită**: toată selecția (retrospectiv)
 - ▶ Parametrii noștri sunt estimați pe toată selecția, deci probabilitățile filtrate descriu doar o analiză în **pseudo-timp real**; analiza în timp real necesită reestimarea parametrilor cu datele până la t
 - ▶ Un pas al filtrului este lucrat în Seminarul 17, Exercițiul A5

Nasdaq 100: două regimuri




Regim	$\hat{\mu}$ (SE)	$\hat{\sigma}$	$\hat{\rho}_{ii}$	Durata
Calm	0,43 (0,06)	2,30	0,987	75,4
Turbulent	-0,32 (0,27)	5,40	0,957	23,5

- Randamente log săptămânale în %, 1990–2026, 1 915 săptămâni; durata în săptămâni; regimul calm 76% din săptămâni
- Turbulent: volatilitate de peste două ori mai mare, medie negativă (neseemnificativă)
- Episodul turbulent din jurul vârfului din 2000 a început în iun. 1998 (probabilitatea netezită peste 0,5); probabilitatea filtrată 0,99 la sfârșitul lui martie 2000: prețurile continuau să crească, iar volatilitatea a sărit


 MFM_ch17_markov_switching

Bitcoin: două regimuri



- Randamente log săptămânale 2014–2026, 626 de săptămâni
- Calm: $\hat{\mu} = 0,26\%$ pe săptămână, $\hat{\sigma} = 2,93\%$, durata 3,8 săptămâni
 - ▶ Turbulent: $\hat{\mu} = 1,20\%$ (SE 0,58), $\hat{\sigma} = 11,22\%$, durata 6,3 săptămâni, 62% din săptămâni
- Spre deosebire de acțiuni, regimul turbulent are media **mai mare**; regimurile sunt scurte: stări de volatilitate, nu faze ale bulei
- Regimurile ignoră nivelul prețului (o bulă lentă și calmă rămâne în regimul calm): BSADF spune „prețul accelerează”, regimul spune „riscul s-a schimbat”

Câte regimuri? Un test LR cu bootstrap




- H_0 : un regim (randamente iid din distribuția Normală) vs H_1 : două regimuri Markov, $LR = 2(\hat{\ell}_2 - \hat{\ell}_1)$; nu χ^2 : p_{11}, p_{22} nu sunt identificate sub H_0 (Anexă) Hansen (1992)
- **Bootstrap parametric**: simulăm din modelul H_0 estimat, reestimăm ambele modele, recalculăm LR; 199 de replici;
 $p = (1 + \#\{LR^* \geq LR\}) / (B + 1)$
- Unul vs două: Bitcoin LR = 123,2 (valoarea de 95% 11,8, $p = 0,005$); Nasdaq 100 LR = 475,7 (11,1, $p = 0,005$)
- Două vs trei, Bitcoin: LR = 29,6, valoarea bootstrap de 95% 15,0 vs valoarea χ^2_6 naivă 12,6; $p = 0,005$ (Seminarul 17, B8)
- Un singur regim este respins pentru ambele serii; un al treilea regim Bitcoin este și el susținut. Atenție: ipoteza nulă cu un regim folosește distribuția Normală, deci și cozile groase singure pot favoriza două regimuri

Sunt cripto-actele bule?


- ▣ Nu au dividende: valoarea fundamentală a Bitcoin este greu de definit; o estimare o plasează la zero [Cheah & Fry \(2015\)](#)
- ▣ Alternativa: valoarea din adoptarea rețelei (legea lui Metcalfe), cu bule LPPL suprapuse [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2019\)](#)
- ▣ Cripto-actele se comportă tot mai mult ca o clasă de active alternative, nu ca o bulă pură [Pele et al. \(2023\)](#)
- ▣ Fără valoare fundamentală putem totuși testa prețul: este exploziv și când?

Episoade explozive, 2014–2026



- Logaritmul închiderilor săptămânale; fiecare serie testată pe propria istorie, cu propriile valori critice Monte Carlo; doar episoadele de creștere
- Cripto: Bitcoin apr. 2017–iun. 2018; dec. 2020–mai 2021; Ethereum apr. 2017–oct. 2017; nov. 2017–feb. 2018; ian. 2021–mai 2021; Dogecoin ian. 2021–iul. 2021: creșterile se grupează în 2017 și la sfârșitul lui 2020–2021
- Strategy (o companie care deține Bitcoin): dec. 2020–mai 2021; apr. 2025–iul. 2025; Tesla: nov. 2013–mai 2014; mai 2014–oct. 2014; iul. 2020–mar. 2022; NVIDIA: mai 2016–nov. 2018; mai 2020–iun. 2022; ian. 2023–în curs
- GameStop, săptămânal: creșterea de 3 săptămâni din ianuarie 2021 e mai scurtă decât durată minimă; o scădere care accelerează dacă și ea $b > 0$: raportăm mereu direcția

Dot-com vs AI



- Închideri lunare, rebazate la 100 la primul semnal exploziv al fiecărui episod (BSADF, date lunare)
- Cisco: primul semnal în nov. 1998, vârf după 16 luni, la un preț de 4,1 ori mai mare decât la semnal; NVIDIA: primul semnal în feb. 2023, după 43 de luni prețul este de 9,6 ori mai mare, episod încă deschis
- Nasdaq 100 din iun. 1995: vârf după 57 de luni, la un nivel de 8,2 ori mai mare; din mai 2023: de 2,1 ori mai mare după 40 de luni, o creștere mai lentă decât în anii 1990

Există o bulă AI? Ce pot spune testele

- ▣ BSADF lunar semnalează NVIDIA (mar. 2016–nov. 2018; feb. 2020–mai 2022; feb. 2023—în curs) și Nasdaq 100 (episodul curent din mai 2023)
- ▣ Testele nu pot separa o bulă de fundamente explozive: și profiturile așteptate în creștere rapidă ale unei tehnologii noi pot face prețurile explozive [Pástor & Veronesi \(2009\)](#)
- ▣ Istoria: prețul acțiunii Cisco, ajustat pentru dividende, a revenit la nivelul din martie 2000 abia în aug. 2021
- ▣ Ce putem spune: testele detectează o dinamică explozivă a prețurilor; dovezile Bubbles for Fama despre creșterile industriilor justifică urmărirea riscului de prăbușire, dar nu îl cuantifică pentru aceste acțiuni, iar momentul este necunoscut


Studiu de caz (1/5): întrebarea de cercetare

- ▣ Articolul: [DeFusco, Nathanson & Zwick \(2022\)](#), *Journal of Financial Economics*, 146(1), 205–229
 - Context: expansiunea și prăbușirea pieței imobiliare din SUA în 2000–2011, asociate crizei din 2008
- ▣ Întrebarea: cine cumpără în perioada de expansiune și cum poate speculația explica evoluția prețurilor, a volumului tranzacțiilor și a stocului de locuințe oferite spre vânzare (Introducerea)?
 - Speculația, în definiția Harrison–Kreps adoptată de autori (nota 1): a plăti mai mult pentru un activ pentru că îl poți revinde
- ▣ Trei faze (Secțiunea 2): expansiunea (cresc prețurile și volumul), „acalmia” (*quiet*: volumul scade, prețurile continuă să crească, iar stocul locuințelor nevândute se mărește), prăbușirea
- ▣ De ce contează: testele de explozivitate din acest capitol folosesc doar prețuri; Bubbles for Fama [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#) analizează și volumul tranzacționat, emisiunile de acțiuni și volatilitatea, iar bulele vin cu volume mari de tranzacționare [Scheinkman & Xiong \(2003\)](#)
 - Datele despre tranzacții ajută la identificarea participanților care alimentează expansiunea, inclusiv în cazul Bitcoin din 2017 [Griffin & Shams \(2020\)](#)

Studiu de caz (2/5): date, metodă și rezultatele principale

- Datele (Secțiunea 1.1): 51 580 408 de vânzări de locuințe din registrele de proprietate, 1995–2014, 115 zone metropolitane; **speculatorii**: cumpărătorii pe termen scurt care revând în cel mult trei ani și cumpărătorii care nu locuiesc în proprietate (Secțiunea 1.2)
- Decalajul (ec. 1): $p_{i,t} = \beta_k v_{i,t-k} + \eta_{i,t}$, $k = -12, \dots, 48$ de luni, p logaritmul centrat al prețului, v rata centrată a vânzărilor; corelația implicită $\beta_k \text{sd}(v_{i,t-k}) / \text{sd}(p_{i,t})$
- Figura 2: corelația este maximă la un decalaj de 24 de luni; Figura 4: revânzările după o deținere scurtă explică 39% din creșterea vânzărilor din 2000–2005
- Tabelul 2: o abatere standard în plus a volumului speculativ este asociată cu o creștere a prețurilor mai mare cu 24,9 puncte și o scădere mai adâncă cu 7,4 puncte: orașele cu mai multă speculație au avut expansiuni și prăbușiri mai mari
- Modelul (Secțiunile 5–6, Tabelul 6): cumpărătorii care extrapolează și au orizont scurt amplifică ciclul; o taxă de 5% la cumpărare reduce scăderea de la 8,2% la 1,1%


Studiu de caz (3/5): prețuri și volum, 2000–2011



- FRED: indicele Case-Shiller U.S. National Home Price Index și vânzările de case unifamiliale noi, media din 2000 = 100; volumul ajustat cu mediile lunilor calendaristice, ca în Figura 1 din [DeFusco, Nathanson & Zwick \(2022\)](#)
- Boomul: vânzările ating vârful de 157 în iul. 2005 (articolul: 150% din nivelul din 2000); prețurile urcă până la 176 în iul. 2006
- Acalmia: 12 luni de la vârful volumului la vârful prețurilor, când vânzările au coborât deja la 110 (vânzări neajustate: 16 luni)
- Prăbușirea: mediile din 2011 sunt 35 pentru vânzări și 133 pentru prețuri; vânzările de case noi nu includ revânzările, deci nu arată cine tranzacționează

 MFM_ch17_case_study

Studiu de caz (4/5): volumul precede prețurile



- Ec. (1) pe seriile naționale, fără termen liber; banda punctuală de 95%: bootstrap circular pe blocuri de 24 de luni, 2000 de replici
- 2000–2011: maximul la $k = 33$ (0,80, CI $[0,32; 1,11]$); la $k = 24$ din articol valoarea noastră este 0,70, CI $[0,06; 1,26]$
- Banda exclude zero pentru $k = 22, \dots, 48$, dar un singur ciclu național conține puține blocuri independente: intervale largi
- Direcția este cea din articol (volumul primul, cu doi-trei ani înainte); lungimea nu este precisă (1990–2011: $k = 48$)

Studiu de caz (5/5): limite și o întrebare deschisă

- Limita datelor din ilustrarea noastră: seriile publice sunt naționale și acoperă doar locuințele noi, deci volumul pe termen scurt și cel al neocupanților nu pot fi construite; Figurile 1–2 pot fi ilustrate, Tabelul 2 nu (Seminarul 17, C3)
- Limitele declarate de autori
 - ▶ Perioadele de deținere sunt cele realizate, nu cele intenționate (nota 4; verificare cu variabile instrumentale în anexa online)
 - ▶ Clasificarea după adresa de corespondență poate identifica greșit drept rezidenți proprietarii care folosesc adresa locuinței pentru corespondența fiscală (Secțiunea 1.2)
 - ▶ Scenariile contrafactice pot supraestima rolul cumpărătorilor pe termen scurt, pentru că orizontul de vânzare este exogen în model; creditul și construcțiile noi sunt omise (Secțiunile 4.3, 6.5.3, 7)
- Întrebare deschisă: în episoadele de expansiune cripto, volumul tranzacțiilor atinge maximul înaintea prețurilor? Există o acalmie (volum în scădere, prețuri în creștere) înainte de încheierea episoadelor Bitcoin datate de BSADF?

O întrebare deschisă

Pot fi date alarme de bulă în timp real cu o rată controlată a alarmelor false și conțin ele informație despre prăbușiri?

- Datarea BSADF face câte un test la dreapta pentru fiecare dată: nivelul de semnificație este controlat pe fiecare dată, nu pe întreaga perioadă de monitorizare
 - ▶ Cercetare în curs: reguli de monitorizare pentru bule și prăbușiri, cu alarme false controlate [Whitehouse, Harvey & Leybourne \(2023\)](#); „termometre econometrice” în timp real pentru piața imobiliară [Shi & Phillips \(2023\)](#)
- Formularea formală, pentru o alarmă A_t și o prăbușire $C_{t,h}$ (o scădere de cel puțin 20% în $h = 90$ de zile):
 $H_0: P(C_{t,h} | A_t = 1) = P(C_{t,h} | A_t = 0)$, H_1 : mai mare după o alarmă
 - ▶ Infirmată dacă rata de succes (*hit rate*) după alarme nu o depășește pe cea fără alarme, cu o inferență care ține cont de ferestrele suprapuse
- Identificarea: prețurile explozive nu înseamnă neapărat o bulă
 - ▶ Fluxurile de numerar așteptate explozive ale unei tehnologii noi lasă aceeași amprentă [Pástor & Veronesi \(2009\)](#); creșterile bruște măresc riscul de prăbușire fără pierderi medii previzibile [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#)

Bucula descoperirii și verificările ei

- **Literatura:** cerem articole despre rata alarmelor false în monitorizarea secvențială a bulelor; verificăm fiecare DOI pe [Crossref](#) și găsim tabelul citat în răspuns
- **Ipotezele:** bulă rațională, fluxuri așteptate explozive, rată de actualizare în scădere, fiecare cu propriul observabil (de exemplu un raport preț/profit exploziv vs profituri explozive)
- **Codul:** replicăm întâi o cifră cunoscută ($GSADF = 3,85$ pentru Bitcoin săptămânal), apoi extindem
- **Robustețea:** preînregistrăm grila de orizonturi și praguri de prăbușire, cu corecția Holm; **critica:** cerem asistentului să atace rezultatul ca un recenzent
- **Verificările** pe care le face cercetătorul (detalii și prompturi în Anexă)
 - ▶ Nicio informație din toată selecția într-o datare; valori critice pentru coada dreaptă; wild bootstrap la volatilitate variabilă; multiplicitatea pe date și active; inferență robustă la ferestrele de rezultat suprapuse

Mini-caz: prezice alarma LPPLS prăbușirile?

- O propunere tipică a asistentului: „un indicator de încredere LPPLS pozitiv anunță o prăbușire; comparați ratele cu testul exact al lui Fisher”; alarmele vin în serii și rezultatele se suprapun, deci testăm prin rotații circulare
- Bitcoin (709 date, la fiecare 5 zile): o scădere de 20% în 90 de zile după 22% din alarme, față de 37% fără alarmă
 - ▶ Diferența $-15,5$ puncte procentuale; $p = 0,96$ unilateral pentru H_1 din 658 de rotații ale seriei alarmelor
 - ▶ Nasdaq 100: 4% față de 11%, diferența $-7,1$ puncte, $p = 0,98$
- Grila preînregistrată de 4 orizonturi $\times$ 3 praguri: cea mai mică valoare p brută este 0,76 (Bitcoin) și 0,69 (Nasdaq 100)
 - ▶ Nicio celulă nu respinge H_0 la 5%, nici înainte, nici după corecția Holm
- Interpretare: indicatorul datează creșterile care accelerează, dar aceste teste nu susțin o probabilitate mai mare a scăderilor mari după un semnal (ipotezele în Anexă)

Rândul vostru: o idee de proiect

- **Întrebarea:** poate o regulă de monitorizare pentru Bitcoin, Nasdaq 100 și NVIDIA să țină la 5% probabilitatea oricărei alarme false pe toată perioada și totuși să avertizeze înaintea scăderilor mari?
- **Replicați întâi:** GSADF = 3,85 pentru Bitcoin săptămânal, apoi probabilitatea de prăbușire după creșteri de peste 100% din [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#) (a noastră: 46%)
 - ▶ Extindeți: calibrați pragul alarmei prin simulare pe întreaga perioadă de monitorizare [Whitehouse, Harvey & Leybourne \(2023\)](#); evaluați alarmele cu rotații sau bootstrap pe blocuri
- **Livrabile:** o grilă preînregistrată, salvată înaintea evaluării, un notebook care regenerează fiecare cifră, rate de alarme false și rate de reușită cu valori p valide
- **Jurnalul AI:** prompturile care au modelat designul în AI_USE.md; fiecare afirmație greșită (valori critice la stânga, un semnal din toată selecția) și testul care a prins-o în AI_ERRORS.md ([șabloane](#))

Idei principale

- O bulă este prețul minus valoarea fundamentală; bulele raționale trebuie să fie explozive, iar bulele care se sparg se ascund de testele pe toată selecția
- GSADF testează existența episoadelor explozive, BSADF le datează în timp real; la o creștere târzie a volatilității, valorile critice Monte Carlo resping 32,0% dintre ipotezele nule adevărate, wild bootstrap 4,1%; datarea cere control pe familie
- În episoadele noastre testele au avertizat cu luni înainte de vârf, dar nu au anticipat momentul prăbușirii
- LPPLS descrie accelerarea; momentul său critic se mută odată cu fereastra, iar indicatorul de încredere este judecat printr-un test al ratelor de reușită robust la dependență
- Creșterile bruște măresc riscul de prăbușire fără o pierdere medie stabilită statistic: un semnal pentru gestiunea riscului, nu o regulă de tranzacționare

Ce instrument și când?

Întrebarea	Instrumentul
A existat vreun episod exploziv?	GSADF cu valori critice simulate
Când a început și când s-a încheiat?	Datarea BSADF, durata minimă $\lceil \ln T \rceil$; valori critice pe familie pentru monitorizarea lungă
Volatilitatea se schimbă mult (cripto, crize)	Valori critice prin wild bootstrap
Accelerează creșterea super-exponențial?	Indicatorul de încredere LPPLS pe multe ferestre
S-a schimbat starea de risc?	Probabilitățile filtrate Markov-switching
Cât de probabilă este o prăbușire după o creștere?	Condiționarea pe creșteri în multe active (Bubbles for Fama)

Verificați-vă, și urmează: Capitolul 18

Întrebări de verificare

- De ce ratează un ADF la dreapta pe toată selecția o bulă care se prăbușește periodic?
- De ce este valoarea critică de 95% a GSADF mult peste cea a unui singur ADF?
- De ce un singur moment critic LPPLS nu este o prognoză a prăbușirii?
- De ce ratele de succes după alarme trebuie testate cu bootstrap pe blocuri sau cu rotații?

Capitolul 18: riscul sistemic

- Când o bulă se sparge, pierderile se propagă prin bănci și piețe: contagiune și risc sistemic
- CoVaR și SRISK măsoară cât adaugă o instituție la riscul sistemului
- Lecturi suplimentare: Franke, Härdle & Hafner (2019), Kindleberger & Aliber (2005), Shiller (2015), Sornette (2017)

Anexă: Transversalitatea: de unde vine termenul de bulă

- ▣ Substituim ecuația de preț în ea însăși de h ori: $P_t = \sum_{i=1}^h \frac{\mathbb{E}_t[D_{t+i}]}{(1+r)^i} + \frac{\mathbb{E}_t[P_{t+h}]}{(1+r)^h}$ (legea speranțelor condiționate iterate)
- ▣ Pentru $h \rightarrow \infty$: $P_t = F_t + B_t$, cu $B_t = \lim_{h \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t[P_{t+h}]/(1+r)^h$
- ▣ **Condiția de transversalitate:** $\lim_{h \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t[P_{t+h}]/(1+r)^h = 0$; este îndeplinită $\Leftrightarrow B_t = 0 \Leftrightarrow P_t = F_t$
- ▣ Decalăm limita cu o perioadă: $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = \lim_h \mathbb{E}_t[P_{t+1+h}]/(1+r)^h = (1+r) B_t$, condiția de martingală a bulei raționale
- ▣ Seminarul 17, Exercițiul A1 derivă soluția generală și de ce $B_t \geq 0$ exclude o bulă care pornește de la zero [Diba & Grossman \(1988\)](#)

Anexă: Bubbles for Fama: mărimea efectivă a eșantionului

- Episoadele de creștere sunt distribuite în 31 de ani calendaristici și se suprapun: ferestrele consecutive de 2 ani din același avânt au luni comune
- SE bootstrap pe ani (9,1 puncte procentuale) vs SE binomială (6,9): un efect de design de 1,7, adică aproximativ 30 de observații independente
- Blocuri de 2, 3 și 5 ani consecutivi (ferestrele de 2 ani din ani vecini se suprapun): $SE = 8,9, 8,7, 8,3$
- Media necondiționată: 28%, peste CI al randamentului mediu după o creștere de 100% (−14% până la 20%): randamentele după creșteri par mai mici decât de obicei, dar aceasta este o comparație descriptivă, nu un test formal al diferenței dintre două estimări dependente

Anexă: De ce eșuează ADF pe toată selecția: influența prăbușirilor

- Panta OLS: $\hat{b} = \sum_t \tilde{y}_{t-1} \Delta y_t / \sum_t \tilde{y}_{t-1}^2$, cu $\tilde{y}_{t-1}$ logaritmul prețului întârziat și centrat
- Expansiunea: $\Delta y_t > 0$ în timp ce $\tilde{y}_{t-1}$ urcă peste medie: termeni pozitivi
- Prăbușirea: cel mai negativ Δy_t apare la cel mai mare $\tilde{y}_{t-1}$: câțiva termeni cu valori absolute foarte mari și semn opus
- Forma Evans în logaritmi, $y = \ln B$, prăbușire la $\delta = e^c$ cu probabilitatea $1 - \pi$; pentru $B \gg \delta$ creșterea logaritmică la supraviețuire este $\approx \ln \frac{1+r}{\pi}$: $\mathbb{E}[\Delta y_t | y_{t-1}] \approx \pi \ln \frac{1+r}{\pi} + (1 - \pi)(c - y_{t-1})$, panta $-(1 - \pi) < 0$: revenire aparentă la medie, deși $\mathbb{E}_t B_{t+1} = (1 + r)B_t$ [Evans \(1991\)](#)
- Ferestrele care conțin expansiunea, dar nu și prăbușirea, au $\hat{b} > 0$ când logaritmul prețului accelerează acolo (slide-ul următor): supremul pe ferestre readuce puterea [Phillips, Shi & Yu \(2015b\)](#)

Anexă: Exploziv în niveluri, accelerat în logaritmi

- O bulă rațională este explozivă în **nivel**: $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1 + r)B_t$, o rădăcină autoregresivă $1 + r > 1$
 - ▶ În logaritmi, o traiectorie pură de bulă $B_t = B_0(1 + r)^t$ are creștere constantă: $\ln B_t = \ln B_0 + t \ln(1 + r)$, o tendință liniară deterministă în logaritmi, $b = 0$ în $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + \varepsilon_t$
- Logaritmul prețului $\ln(F_t + B_t)$ **acelerează** cât timp ponderea bulei crește: rata lui de creștere urcă de la cea a lui F spre r (o traiectorie logaritmică convexă)
 - ▶ Când bula domină, creșterea logaritmică devine din nou aproximativ constantă: regresia pe logaritmul prețului are atunci putere mică
- Deci testul pe logaritmul prețului vizează o altă alternativă, logaritmi ai prețului care **acelerează**, nu condiția din niveluri; contează specificarea ipotezei nule și a termenilor determiniști [Phillips, Shi & Yu \(2014\)](#)
- În acest capitol testăm logaritmul prețurilor și al rapoartelor (ca PWY pentru Nasdaq); PSY testează raportul preț/dividend [Phillips, Wu & Yu \(2011\)](#), [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)

Anexă: Teoria asimptotică (1): distribuția sub ipoteza nulă

- Modelul nul: $y_t = d T^{-\eta} + y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\eta > 1/2$, ε_t iid $(0, \sigma^2)$: un mers aleator cu drift asimptotic neglijabil [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)
- Din teorema limită centrală funcțională și teorema aplicației continue (PSY, Teorema 1, ec. 5), cu $r_w = r_2 - r_1$ și W o mișcare browniană standard:
 - ▶ $\text{ADF}_{r_1}^2 \Rightarrow \frac{\frac{1}{2} r_w [W(r_2)^2 - W(r_1)^2 - r_w] - \int_{r_1}^{r_2} W dr [W(r_2) - W(r_1)]}{r_w^{1/2} \left\{ r_w \int_{r_1}^{r_2} W^2 dr - \left(\int_{r_1}^{r_2} W dr \right)^2 \right\}^{1/2}}$
- σ și d dispar: limita este pivotală. SADF și GSADF sunt supremuri ale aceleiași funcționale, deci valorile lor critice depind doar de r_0 și de termenii determinați
- $r_1 = 0$, $r_2 = 1$ dă limita Dickey–Fuller cu termen liber: cuantila ei de 95% este negativă (simulată: $-0,06$), departe de 1,645
- Specificarea derivatei și a termenului liber schimbă limita și nivelul testului [Phillips, Shi & Yu \(2014\)](#)

Anexă: Teoria asimptotică (2): alternative ușor explozive

- Alternativa: $y_t = \rho_T y_{t-1} + \varepsilon_t$ cu $\rho_T = 1 + c/k_T$, $c > 0$, $k_T \rightarrow \infty$, $k_T = o(T)$; PSY folosesc $k_T = T^\alpha$, $\alpha \in (0, 1)$
 - Mai aproape de 1 decât orice rădăcină explozivă fixă, mai departe decât o rădăcină local-unitară $1 + c/T$: viteza „moderată” a bulelor reale
- Phillips și Magdalinos: $\frac{\rho_T^T}{\rho_T^2 - 1} (\hat{\rho}_T - \rho_T) \Rightarrow \mathcal{C}$, o lege Cauchy standard, fără erori gaussiene Phillips & Magdalinos (2007)
 - Rata $k_T \rho_T^T$: exponențial de rapidă; statistica ADF diverge la $+\infty$
- Deci și SADF și GSADF diverg (pentru GSADF ajunge orice fereastră de cel puțin $r_0 T$ observații din interiorul bulei): testele sunt consistente, puterea $\rightarrow 1$ Phillips, Shi & Yu (2015b)
- În eșantioane finite: puterea depinde de c , α și de durată; exploziile scurte pot rămâne sub prag, ca în simularea Evans

Anexă: Teoria asimptotică (3): datarea consistentă

- Momentele de traversare (PSY, ec. 7–8): $\hat{r}_e = \inf\{r_2 \geq r_0 : \text{BSADF}_{r_2} > \text{scv}_{r_2}^{\beta_T}\}$,
 $\hat{r}_f = \inf\{r_2 \geq \hat{r}_e + \delta \ln(T)/T : \text{BSADF}_{r_2} < \text{scv}_{r_2}^{\beta_T}\}$
- $\text{scv}_{r_2}^{\beta_T}$: cuantila de $100(1 - \beta_T)\%$ a BSADF pe $\lfloor Tr_2 \rfloor$ observații
 - Consistența, $(\hat{r}_e, \hat{r}_f) \rightarrow_p (r_e, r_f)$, cere $\frac{1}{\text{scv}^{\beta_T}} + \frac{\text{scv}^{\beta_T}}{T^{1-\alpha/2}} \rightarrow 0$ (PSY, ec. 11)
- Valoarea critică trebuie să crească nelimitat, ca probabilitatea alarmei false să dispară ($\beta_T \rightarrow 0$), dar mai încet decât $T^{1-\alpha/2}$, ca bulele reale să fie găsite; de exemplu, de ordinul $\ln T$ Phillips, Shi & Yu (2015a)
- În practică β_T este fixat la 5% la fiecare dată: fiecare dată păstrează o șansă de 5% de alarmă falsă, iar pe sute de date o alarmă falsă devine probabilă (studiul de nivel de mai jos)

Anexă: Raportul preț/dividend: comparația cu PSY

- ▣ Selecția noastră: 1 866 de niveluri lunare, ian. 1871–iun. 2026; valorile critice din 1 000 de traiectorii Monte Carlo
- ▣ PSY, pe date până în 2010 și fără filtrul nostru de 8 luni consecutive, datează și 1879–1880, 1955–1956 și 1986–1987 [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)
- ▣ Cu o fereastră minimă mai scurtă apar și în datele noastre 1879–1880, 1954–1956 și 2008–2009 (Seminarul 17, B1)

Anexă: Valori critice pe familie: designul bootstrap

- ▣ Phillips și Shi: cuantila de 95% a maximului BSADF pe τ_b date consecutive fixează FWER la 5% pentru designul bootstrap: τ_b date de monitorizare după o perioadă inițială de w_0 observații Phillips & Shi (2020)
- ▣ Reziduurile din $\Delta y_t = a + e_t$, extrase cu revenire și înmulțite cu ponderi $N(0, 1)$; traiectorii de $w_0 + \tau_b - 1$ variații; 999 de replici
- ▣ Aici $\tau_b = 104$ săptămâni (doi ani); aplicat BSADF pe toată istoria, ale cărei date târzii caută mai multe începuturi, controlul de 5% este aproximativ, nu demonstrat
- ▣ Regula punctuală dă o depășire în ultimele 104 săptămâni în 42% din traiectoriile nule

Anexă: Timp real vs retrospectivă: definiții

- Început: prima depășire a șirului de episoade BSADF care duce la vârf, datată retrospectiv
- Confirmat: după L depășiri consecutive, prima dată la care episodul este cunoscut în timp real, dar cu w_0 și L stabilite din T al întregului eșantion (un design cu adevărat în timp real le fixează ex ante)
- Avansurile în luni (GameStop: luni de zile calendaristice); creșterea: de la confirmare până la vârf; scăderea: până la cea mai mică închidere în următorii 2 ani (GameStop: 1 an)
- Bitcoin 2021: șirul exploziv a atins maximul local din 13 apr. 2021 și s-a încheiat în mai 2021; maximul istoric din 8 nov. 2021 (tabelul episoadelor) a venit după o scădere adâncă și o revenire mai lentă, nesemnaltă de BSADF

Anexă: Monitorizarea în timp real: proceduri mai noi

- Repetarea unui test gândit pentru o singură aplicare umflă rata alarmelor false; Astill et al. compară statisticile din monitorizare cu maximul dintr-o perioadă de antrenare, deci rata alarmelor false este fixată pentru un orizont de monitorizare ales, robust la volatilitate variabilă [Astill et al. \(2018\)](#)
- Bule și prăbușiri: după detectarea bulei, monitorizăm prăbușirea prin semnul mediei lui Δy_t (regim exploziv vs staționar); nu semnaleză niciodată o prăbușire înainte de începutul ei [Whitehouse, Harvey & Leybourne \(2023\)](#)
- Detectare mai timpurie: standardizări alternative ale dispersiei păstrează probabilitatea de detectare falsă a procedurilor existente, dar găsesc bulele mai devreme (aplicate la Bitcoin și la piața imobiliară) [Whitehouse, Harvey & Leybourne \(2025\)](#)
- Faza de prăbușire: PSY aplicat pe selecția inversată datează criza și revenirea [Phillips & Shi \(2018\)](#)
- Alternative la sup-ADF: un test Chow de schimbare de la mers aleator la exploziv are cea mai mare putere la Homm și Breitung [Homm & Breitung \(2012\)](#); teste recursive cu căutarea punctului de start [Harvey, Leybourne & Sollis \(2015\)](#)

Anexă: LPPL pe piața crypto și pe piața românească

- Bursa de Valori București: comportament de turmă și tipare log-periodice înaintea prăbușirii din 2007–2008 [Pele, Mazurencu & Nijkamp \(2013\)](#); modelarea prăbușirilor pentru BVB [Pele & Mazurencu-Marinescu \(2012\)](#)
- Criptomonede: o valoare fundamentală din legea lui Metcalfe (mărimea rețelei) combinată cu bule LPPL [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2019\)](#), [Conda et al. \(2026\)](#)
- Dogecoin 2021: LPPL împreună cu sentimentul din rețelele sociale [Pele \(2025\)](#)
- Lecția comună: LPPL descrie bine accelerarea; data prăbușirii rămâne punctul slab

Anexă: Estimarea: filtrul Hamilton, netezirea Kim, EM

- Log-verosimilitatea prin predicție și actualizare: $\ell(\theta) = \sum_t \ln \sum_j P(s_t = j \mid \mathcal{F}_{t-1}) \varphi(r_t; \mu_j, \sigma_j^2)$, $\mathcal{F}_t$ = randamentele până la t , $\varphi(x; \mu, \sigma^2)$ densitatea distribuției Normale cu media μ și dispersia σ^2 [Hamilton \(1989\)](#)
- Netezirea Kim, înapoi: $P(s_t = j \mid \mathcal{F}_T) = P(s_t = j \mid \mathcal{F}_t) \sum_k p_{jk} \frac{P(s_{t+1} = k \mid \mathcal{F}_T)}{P(s_{t+1} = k \mid \mathcal{F}_t)}$ [Kim \(1994\)](#)
- Algoritmul EM: cu probabilitățile netezite $\xi_{tj} = P(s_t = j \mid \mathcal{F}_T)$ și $\xi_{t,ij} = P(s_{t-1} = i, s_t = j \mid \mathcal{F}_T)$, pasul M este o medie ponderată [Hamilton \(1990\)](#)
 - ▶ $\hat{\mu}_j = \frac{\sum_t \xi_{tj} r_t}{\sum_t \xi_{tj}}$, $\hat{\sigma}_j^2 = \frac{\sum_t \xi_{tj} (r_t - \hat{\mu}_j)^2}{\sum_t \xi_{tj}}$, $\hat{p}_{ij} = \frac{\sum_{t \geq 2} \xi_{t,ij}}{\sum_{t \geq 2} \xi_{t-1,i}}$
- Verosimilitatea este nemărginită (un regim pe un singur randament, cu $\sigma_j \rightarrow 0$) și are mai multe maxime locale (etichetele regimurilor se pot schimba): luăm cel mai bun maxim interior din 20 de porniri aleatoare și verificăm că niciun $\hat{\sigma}_j$ nu se apropie de 0, inclusiv în reestimările bootstrap
- Erori standard din inversa hessianei numerice; ele presupun că numărul de regimuri este cunoscut

Anexă: De ce testul LR pentru regimuri este nestandard

- Sub H_0 mediile și dispersiile regimurilor coincid, deci p_{11}, p_{22} nu sunt identificate (parametri de perturbare prezenți doar sub H_1); matricea informațională este singulară, iar unele scoruri sunt identic nule [Hansen \(1992\)](#)
- Hansen: margini pentru LR standardizat, prin teoria proceselor empirice [Hansen \(1992\)](#)
- Carrasco, Hu și Ploberger: un test optim care cere doar estimarea sub H_0 , cu valori critice bootstrap [Carrasco, Hu & Ploberger \(2014\)](#)
- Aceeași logică pentru două vs trei regimuri: modelul nul este atunci lanțul cu două regimuri estimat

Anexă: Studiu de caz, date și metodă

- Datele (Secțiunea 1.1): 51 580 408 de vânzări de locuințe între părți independente, din registrele de proprietate, 1995–2014, în 115 zone metropolitane (48% din fondul de locuințe al SUA); analiza ciclului acoperă 2000–2011, pentru că perioadele de deținere realizate cer vânzări consecutive
 - Anunțuri de vânzare asociate tranzacțiilor pentru aceeași proprietate în 57 dintre aceste zone
- Speculatorii (Secțiunea 1.2): cumpărătorii pe termen scurt revând în cel mult trei ani (perioada de deținere realizată); cumpărătorii care nu locuiesc în proprietate declară o altă adresă de corespondență (102 zone)
- Decalajul (ec. 1, Figura 2): $p_{i,t} = \beta_k v_{i,t-k} + \eta_{i,t}$ pentru $k = -12, \dots, 48$ de luni
 - p : logaritmul prețului, centrat pe fiecare oraș; v : vânzările împărțite la fondul de locuințe din 2000, centrate pe oraș și lună calendaristică; corelația implicită $\beta_k \text{sd}(v_{i,t-k}) / \text{sd}(p_{i,t})$, erori standard grupate pe lună
- Analiza între orașe (Tabelul 2): regresii OLS ale creșterii prețurilor (2000–2006), scăderii lor (2006–2011), stocului de locuințe oferite spre vânzare, volumului și executărilor silite în funcție de creșterea volumului speculativ (2000–2005)
- Modelul (Secțiunile 5–6): cumpărătorii extrapolează creșterea recentă a prețurilor și au orizonturi diferite; vânzătorii stabilesc prețurile cerute, iar unele locuințe rămân nevândute (piață non-walrasiană)
 - Scenarii contrafactice: așteptări raționale, fără speculatori, taxe pe tranzacții

Anexă: Studiu de caz, rezultatele complete

- Figura 2: corelația dintre prețuri și volumul întârziat este maximă la un decalaj de 24 de luni; Figura 4: vânzările cresc de la 2,73 la 3,82 milioane (2000 la 2005), revânzările după o deținere scurtă de la 510 la 940 de mii, adică 39% din creștere (cumpărările neocupanților: 53%)
 - ▶ Interpretare: volumul precede prețurile cu aproximativ doi ani, iar speculatorii explică o mare parte din boomul volumului
- Tabelul 2, Panelul A: coeficientul creșterii volumului revânzărilor după o deținere scurtă în regresia creșterii prețurilor 1,930 (eroare standard 0,297, $R^2 = 0,272$); o abatere standard în plus (12,9%, Tabelul 1) înseamnă o creștere a prețului mai mare cu 24,9 puncte; scăderea $-0,571$ (0,083), mai adâncă cu 7,4 puncte
 - ▶ Interpretare: orașele cu mai multă speculație au avut atât boomuri mai mari, cât și prăbușiri mai mari
- Tabelul 2, Panelurile B–C (cantități în % din volumul total din 2003): stocul locuințelor nevândute în perioada de acalmie 5,961 (1,353), cu 76,9 puncte mai multe pe abatere standard; executările silite 0,895 (0,398), 11,5 puncte, circa 370 de mii în plus în cele 115 zone (Secțiunea 3.2)
 - ▶ Interpretare: compatibil cu speculatori care au cumpărat în boom, își pun locuințele în vânzare în acalmie și nu le vând; faptul că acest mecanism întoarce ciclul este un rezultat al modelului (Secțiunile 5–6), nu este identificat de regresii
- Figura 7, Panelul C: o creștere a prețului de 10% în ultimul an este asociată cu o pondere mai mare a cumpărătorilor pe termen scurt cu 8,2 puncte; Tabelul 6: în model, o taxă de 5% la cumpărare pentru toți cumpărătorii reduce scăderea prețului de la 8,2% la 1,1%, doar pentru neocupanți la 5,8%
 - ▶ Interpretare: extrapolarea atrage cumpărători cu orizont scurt; orizontul scurt, nu faptul că nu locuiesc în proprietate, amplifică ciclul

Anexă: Studiu de caz, inferența pentru decalaje

- ▣ p și v centrate pe întregul eșantion; corelația implicită $\hat{\beta}_k \text{sd}(v_{t-k})/\text{sd}(p_t)$, $k = -12, \dots, 48$ de luni
- ▣ La $k = 0$ corelația este 0,03, la $k = -12$ este $-0,34$: corelații între niveluri, nu un test al direcției (dacă prețurile preced volumul)
- ▣ Ec. (1) nu are termen liber, iar seriile decalate nu au neapărat media zero: „corelația implicită” este o pantă standardizată, nu o corelație Pearson, deci limitele bootstrap pot depăși 1
- ▣ Bootstrap-ul pe blocuri presupune serii stabile, cu dependență slabă, ipoteză discutabilă pentru un singur ciclu de expansiune și prăbușire în niveluri: banda este punctuală și exploratorie
- ▣ 1990–2011: maximul se mută la capătul grilei, $k = 48$ (0,82)

Anexă: Bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (1/2)

- **Literatura:** cartografiem ce se știe, apoi verificăm fiecare referință
 - ▶ „Ce articole controlează rata alarmelor false în monitorizarea secvențială a bulelor și ce nivel și putere raportează? Dă DOI-ul și designul simulării.”
 - ▶ Accesăm fiecare referință prin DOI pe [Crossref](#) și găsim tabelul de simulare citat în răspuns; căutăm cu Semantic Scholar, Elicit sau Google Scholar
- **Ipoteze:** explicații concurente, fiecare cu o implicație observabilă distinctă
 - ▶ „Pentru episodul NVIDIA actual, listează explicațiile concurente (bulă rațională, fluxuri de numerar așteptate explozive, rată de actualizare în scădere) și observabilul prezis de fiecare.”
 - ▶ De exemplu, o bulă prezice un raport preț/profit exploziv; fluxurile explozive prezic profituri explozive, cu un raport stabil
- **Date și cod:** pe datele cursului, replicând întâi o cifră cunoscută
 - ▶ „Implementează GSADF cu $r_0 = 0.01 + 1.8/\sqrt{T}$ pe închiderile săptămânale Bitcoin din data/market și simulează valoarea critică de 95%.”
 - ▶ Replicăm întâi: $GSADF = 3,85$ și valoarea critică 2,27 pe 626 de săptămâni, ca în acest capitol

Anexă: Bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (2/2)

- **Robustețea**, fixată înainte de evaluarea alarmelor
 - ▶ „Preînregistrează evaluarea alarmei: orizonturi de 30/60/90/180 de zile, praguri de prăbușire de 10/20/30%, inferență robustă la ferestre suprapuse, corecție Holm pe cele 12 celule.”
 - ▶ Douăsprezece celule încercate și una raportată înseamnă căutare oportunistă în date (data snooping); douăsprezece celule preînregistrate și corectate înseamnă un test
- **Critica**: îi cerem asistentului să atace rezultatul
 - ▶ „Joacă rolul unui recenzent: de ce ar putea fi o asociere alarmă-prăbușire un artefact al ferestrelor suprapuse, al look-ahead bias-ului sau al alegerii activelor?”
 - ▶ Ne așteptăm la: observațiile dependente umflă semnificația; valori critice din toată selecția; doar episoade celebre, selecția pe care Greenwood, Shleifer & You (2019) o evită
- **Raportul**: ratele de succes cu valori p valide, toate cele 12 celule, alarmele care au eșuat
 - ▶ Prompturile folosite la stabilirea metodologiei se consemnează în AI_USE.md

Anexă: Ce verifică cercetătorul

- **Informație din toată selecția în date:** valori critice, număr de întârzieri sau eliminarea tendinței estimate pe toată selecția
 - ▶ Test: tăiem selecția la t și recalculăm; semnalul de la t nu trebuie să se schimbe
- **Coadă greșită:** valorile critice ADF la stânga (aproximativ $-2,86$) folosite împotriva unei alternative explozive
 - ▶ Test: pe mersuri aleatoare simulate, testul la dreapta trebuie să respingă în aproximativ 5% din traiectorii
- **Volatilitate variabilă:** valorile critice Monte Carlo cu dispersie constantă distorsionează nivelul testului
 - ▶ Test: valori critice wild bootstrap; pentru Bitcoin 2,82 în loc de 2,27
- **Multiplicitatea:** multe date, active și ferestre; apariția cel puțin unei alarme devine foarte probabilă
 - ▶ Test: rulăm regula de monitorizare pe mersuri aleatoare simulate și numărăm traiectoriile cu cel puțin o alarmă
- **Rezultate suprapuse:** ferestrele de 90 de zile se suprapun, deci testul exact al lui Fisher sau un test χ^2 exagerează semnificația; ferestrele tăiate de sfârșitul datelor se exclud
 - ▶ Test: bootstrap pe blocuri sau rotații circulare ale seriei alarmelor, care păstrează dependența fiecărei serii; rotațiile cer și staționaritate (mini-caz)

Anexă: Mini-caz: ce spune și ce nu spune rezultatul

- O valoare p unilaterală mare nu dovedește **lipsa** informației: doar nu susține o probabilitate de prăbușire **mai mare** după alarme
 - ▶ Ambele estimări punctuale sunt **negative**: valoarea p din rotații pentru o rată de prăbușire mai mică după alarme 0,07 (Bitcoin), 0,03 (Nasdaq 100); CI bootstrap pe blocuri și testul Newey–West în Seminarul 17, B6
 - ▶ O lectură post-hoc, bilaterală: alarmele apar în creșteri constante care nu s-au încheiat cu o prăbușire în 90 de zile, nu anunță un crah
- Ipotezele necesare pentru valorile p din rotații: sub H_0 orice deplasare circulară a seriei alarmelor (cel puțin 26 de pași, capetele unite) este la fel de probabilă ca alinierea observată
 - ▶ Aceasta este mai mult decât rate egale: cere serii staționare și alarme independente de procesul prăbușirilor; regimurile comune sau o rată a prăbușirilor variabilă în timp o pot invalida
 - ▶ Deci valorile p sunt exploratorii; nivelul lor trebuie verificat prin simulare sub procese nule plauzibile
- Rezultatele: doar datele al căror orizont este observat complet (fără ferestre cenzurate la sfârșitul datelor)

Anexă: Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

-  Cryptocurrency: Speculative Asset and Medium of Exchange
-  Are Cryptos becoming alternative Assets?
-  Statistics of Financial Markets

Cod și date

- Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_17

Bibliografie (1/5)

- ▣ Abreu, D., Brunnermeier, M.K. (2003). [Bubbles and crashes](#). *Econometrica*, 71(1), 173–204.
- ▣ Astill, S., Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Sollis, R., Taylor, A.M.R. (2018). [Real-time monitoring for explosive financial bubbles](#). *Journal of Time Series Analysis*, 39(6), 863–891.
- ▣ Blanchard, O.J., Watson, M.W. (1982). [Bubbles, rational expectations and financial markets](#). NBER Working Paper 945.
- ▣ Brunnermeier, M.K., Nagel, S. (2004). [Hedge funds and the technology bubble](#). *Journal of Finance*, 59(5), 2013–2040.
- ▣ Carrasco, M., Hu, L., Ploberger, W. (2014). [Optimal test for Markov switching parameters](#). *Econometrica*, 82(2), 765–784.
- ▣ Cheah, E.-T., Fry, J. (2015). [Speculative bubbles in Bitcoin markets? An empirical investigation into the fundamental value of Bitcoin](#). *Economics Letters*, 130, 32–36.
- ▣ Conda, A., Ginavar, A., Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2026). [Cryptocurrency market analysis: insights from Metcalfe's law and log-periodic power laws](#). In *Handbook of Blockchain Analytics*, Springer, 63–79.
- ▣ DeFusco, A.A., Nathanson, C.G., Zwick, E. (2022). [Speculative dynamics of prices and volume](#). *Journal of Financial Economics*, 146(1), 205–229.
- ▣ Demirer, R., Demos, G., Gupta, R., Sornette, D. (2019). [On the predictability of stock market bubbles: evidence from LPPLS confidence multi-scale indicators](#). *Quantitative Finance*, 19(5), 843–858.
- ▣ Demos, G., Sornette, D. (2017). [Birth or burst of financial bubbles: which one is easier to diagnose?](#). *Quantitative Finance*, 17(5), 657–675.
- ▣ Diba, B.T., Grossman, H.I. (1988). [Explosive rational bubbles in stock prices?](#). *American Economic Review*, 78(3), 520–530.
- ▣ Evans, G.W. (1991). [Pitfalls in testing for explosive bubbles in asset prices](#). *American Economic Review*, 81(4), 922–930.

Bibliografie (2/5)

- ▣ Fama, E.F. (2014). [Two pillars of asset pricing](#). *American Economic Review*, 104(6), 1467–1485.
- ▣ Filimonov, V., Sornette, D. (2013). [A stable and robust calibration scheme of the log-periodic power law model](#). *Physica A*, 392(17), 3698–3707.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). [Statistics of Financial Markets: An Introduction](#), 5th ed. Springer.
- ▣ Garber, P.M. (1990). [Famous first bubbles](#). *Journal of Economic Perspectives*, 4(2), 35–54.
- ▣ Geraskin, P., Fantazzini, D. (2013). [Everything you always wanted to know about log-periodic power laws for bubble modeling but were afraid to ask](#). *European Journal of Finance*, 19(5), 366–391.
- ▣ Greenwood, R., Shleifer, A., You, Y. (2019). [Bubbles for Fama](#). *Journal of Financial Economics*, 131(1), 20–43.
- ▣ Griffin, J.M., Shams, A. (2020). [Is Bitcoin really untethered?](#). *Journal of Finance*, 75(4), 1913–1964.
- ▣ Hamilton, J.D. (1989). [A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle](#). *Econometrica*, 57(2), 357–384.
- ▣ Hamilton, J.D. (1990). [Analysis of time series subject to changes in regime](#). *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 39–70.
- ▣ Hansen, B.E. (1992). [The likelihood ratio test under nonstandard conditions: testing the Markov switching model of GNP](#). *Journal of Applied Econometrics*, 7(S1), S61–S82.
- ▣ Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Sollis, R. (2015). [Recursive right-tailed unit root tests for an explosive asset price bubble](#). *Journal of Financial Econometrics*, 13(1), 166–187.
- ▣ Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Sollis, R., Taylor, A.M.R. (2016). [Tests for explosive financial bubbles in the presence of non-stationary volatility](#). *Journal of Empirical Finance*, 38, 548–574.

Bibliografie (3/5)

- ▣ Homm, U., Breitung, J. (2012). [Testing for speculative bubbles in stock markets: a comparison of alternative methods](#). *Journal of Financial Econometrics*, 10(1), 198–231.
- ▣ Johansen, A., Ledoit, O., Sornette, D. (2000). [Crashes as critical points](#). *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 3(2), 219–255.
- ▣ Kim, C.-J. (1994). [Dynamic linear models with Markov-switching](#). *Journal of Econometrics*, 60(1–2), 1–22.
- ▣ Kindleberger, C.P., Aliber, R.Z. (2005). [Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises](#), 5th ed. Palgrave Macmillan.
- ▣ Pástor, L., Veronesi, P. (2009). [Technological revolutions and stock prices](#). *American Economic Review*, 99(4), 1451–1483.
- ▣ Pele, D.T. (2025). [Dogecoin and speculative bubbles: a study using LPPL and sentiment analysis](#). Quantinar course.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu, M., Nijkamp, P. (2013). [Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange](#). SSRN Working Paper.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2012). [Modelling stock market crashes: the case of Bucharest Stock Exchange](#). *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). [Metcalf's law and log-period power laws in the cryptocurrencies market](#). *Economics*, 13(1), 2019–29.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). [Are cryptos becoming alternative assets?](#). *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Phillips, P.C.B., Magdalinos, T. (2007). [Limit theory for moderate deviations from a unit root](#). *Journal of Econometrics*, 136(1), 115–130.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S. (2018). [Financial bubble implosion and reverse regression](#). *Econometric Theory*, 34(4), 705–753.

Bibliografie (4/5)

- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S. (2020). *Real time monitoring of asset markets: bubbles and crises*. In *Handbook of Statistics: Financial, Macro and Micro Econometrics Using R*, Elsevier, 61–80.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S., Yu, J. (2014). *Specification sensitivity in right-tailed unit root testing for explosive behaviour*. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 76(3), 315–333.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S., Yu, J. (2015a). *Testing for multiple bubbles: historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500*. *International Economic Review*, 56(4), 1043–1078.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S., Yu, J. (2015b). *Testing for multiple bubbles: limit theory of real-time detectors*. *International Economic Review*, 56(4), 1079–1134.
- ▣ Phillips, P.C.B., Wu, Y., Yu, J. (2011). *Explosive behavior in the 1990s Nasdaq: when did exuberance escalate asset values?*. *International Economic Review*, 52(1), 201–226.
- ▣ Scheinkman, J.A., Xiong, W. (2003). *Overconfidence and speculative bubbles*. *Journal of Political Economy*, 111(6), 1183–1220.
- ▣ Shi, S., Phillips, P.C.B. (2023). *Diagnosing housing fever with an econometric thermometer*. *Journal of Economic Surveys*, 37(1), 159–186.
- ▣ Shiller, R.J. (2015). *Irrational Exuberance*, revised and expanded 3rd ed. Princeton University Press.
- ▣ Shu, M., Zhu, W. (2020). *Detection of Chinese stock market bubbles with LPPLS confidence indicator*. *Physica A*, 557, 124892.
- ▣ Sornette, D. (2017). *Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems*. Princeton University Press.
- ▣ Vasilopoulos, K., Pavlidis, E., Martínez-García, E. (2022). *exuber: recursive right-tailed unit root testing with R*. *Journal of Statistical Software*, 103(10).
- ▣ Whitehouse, E.J., Harvey, D.I., Leybourne, S.J. (2023). *Real-time monitoring of bubbles and crashes*. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 85(3), 482–513.

Bibliografie (5/5)

- Whitehouse, E.J., Harvey, D.I., Leybourne, S.J. (2025). Real-time monitoring procedures for early detection of bubbles. *International Journal of Forecasting*, 41(3), 1260–1277.