



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 0: Piețele financiare în 2026 — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- ▣ CAR: Cumulative Abnormal Return (randamentul anormal cumulat)
- ▣ EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) (furnizor de date de piață)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- ▣ FX: Foreign eXchange (piața valutară)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ MAD: Median Absolute Deviation (abaterea absolută mediană)
- ▣ MDD: Maximum DrawDown (scăderea maximă de la vîrf)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SR: Sharpe Ratio (raportul Sharpe)
- ▣ SSR: Sum of Squared Residuals (suma pătratelor reziduurilor)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)
- ▣ VR: Variance Ratio (raportul varianțelor)

Întrebările de azi și traseul

- ▣ Primul seminar, înaintea cursului de la [Capitolul 0](#)
- ▣ Întrebările seminarului
 - ▶ cum transformăm o serie de prețuri în randamente, creștere și risc?
 - ▶ cum măsurăm cea mai mare pierdere față de un maxim (drawdown)?
 - ▶ cum verificăm că prețurile sînt corecte?
- ▣ **La seminar**, patru pași
 1. **Pregătire**: deschideți notebook-ul în Colab, salvați o copie, încărcați datele
 2. **A1**: prețuri și randamente; **A3–A4**: CAGR și volatilitatea anualizată; **A2**: drawdown
 3. **B6**: o verificare a datelor, o cotație EUR/RON suspectă; **B1**: trei active pe un singur grafic
 4. Rîndul vostru: **A11**, **A12**, exerciții scurte de același tip
- ▣ **Temă**: **B9**, **B10**, **B2**, **C2**
- ▣ **După curs** (opțional): [pachetele](#) de la finalul acestui PDF
- ▣ Notebook-ul seminarului (în engleză): [deschideți-l în Colab](#)
- ▣ Seminar: Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiu	Întrebare	Tip	Model
Bază (la seminar)			
A1, A3–A4, A2	randamente, CAGR, volatilitate anualizată, drawdown, pe hîrtie	Rezolvat	–
B6	este o cotație EUR/RON un preț real?	Rezolvat	–
B1	cum au evoluat SPY, aurul și Bitcoin din 2015?	Rezolvat	–
A11, A12	rîndul vostru: aceleași calcule pe alte cifre	Propus	A1, A3–A4, A2
Temă			
B9, B10	încă două cotații; alte trei active	Propus	B6, B1
B2	cît de adînci și de lungi sînt drawdown-urile?	Propus	A2, B1
C2	ce e greșit într-un răspuns A1?	Propus	A3–A4, B1
După curs (opțional, la finalul acestui PDF)			
Pachetele 1–8	auditul complet al datelor, calendare și corelații, precizia mediilor și a rapoartelor Sharpe, extinderi	Rezolvat sau Propus (indicat la fiecare cerință)	indicat la fiecare enunț

- **[Rezolvat]:** rezolvare completă în slide-uri (traseul de bază) sau în notebook (după curs), un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați voi, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: calcule pe hîrtie; Partea B: aceleași idei pe date reale, fiecare cu o întrebare de interpretare la final; Partea C: critica unui răspuns A1

Datele de azi și ale temei

Serie	Preț folosit	Monedă	Calendar	Exercițiu
S&P 500 cu dividende	SPY (ETF), închidere ajustată	USD	zile de tranzacționare SUA	B1, B10
Aur	aur spot, închidere	USD	doar zile lucrătoare	B1
Bitcoin	BTC/USD, închidere	USD	în fiecare zi, 24:00 UTC	B1
RSP, TLT	ETF-uri, închidere ajustată	USD	zile de tranzacționare SUA	B10
EUR/RON, oficial	cursul de referință BNR	lei pentru un euro	zile lucrătoare în România, ora 13:00	B6, B9
EUR/RON, piață	seria de la EODHD, închidere	lei pentru un euro	orice zi cu o cotație	B6, B9

- Prețurile zilnice din datele cursului; eșantionul 2 ian. 2015 – 18 sep. 2026
- ETF (exchange-traded fund, fond tranzacționat la bursă): un fond ale cărui unități se tranzacționează la bursă ca o acțiune; SPY deține acțiunile din S&P 500, RSP aceleași acțiuni cu ponderi egale, TLT titluri de stat americane cu scadența peste 20 de ani
- Prețul de închidere ajustat: prețul de închidere corectat pentru dividende și divizări, astfel încât variațiile lui să fie randamente totale

Pregătire (1/2): deschideți notebook-ul și salvați o copie

- ▣ Colab: serviciul gratuit de notebook-uri al Google; Python rulează pe serverele Google, nu instalați nimic, ajunge un cont Google
- ▣ **Cerințe**
 1. Deschideți [notebook-ul seminarului în Colab](#).
 2. Alegeți *File* → *Save a copy in Drive* sau rulați celula de salvare în Drive de sub banner: fără o copie, modificările se pierd când închideți fila.
 3. Rulați în ordine celulele din secțiunea *Setup* (Shift + Enter); ele importă bibliotecile și definesc funcția de încărcare a datelor.
 4. Dacă o celulă dă eroare, alegeți *Runtime* → *Restart session* și rulați din nou de la început.
- ▣ **De raportat:** nimic; sînteți gata când verificarea de pe slide-ul următor afișează cifrele așteptate

Pregătire (2/2): încărcăți datele

```
# secțiunea "Setup" definește load(name, start):  
# o serie zilnică după numele ei,  
# cu câmpul de preț potrivit  
spy = load('SPY', start='2015-01-02')  
bnr = load('EUR/RON', start='2015-01-01')  
mkt = load('EUR/RON_(market)',  
          start='2015-01-01')  
print(len(spy), spy.index[0].date(),  
      spy.index[-1].date())  
print(len(bnr), len(mkt))
```

- load apelează fetch_daily(symbol, source, field); dicționarul SERIES din notebook listează toate numele

- Rezultat așteptat: 2 945 de prețuri SPY, 2 ian. 2015 – 18 sep. 2026; 2 939 de cursuri BNR; 3 115 cotații de piață

data	închidere	ajustată
2015-01-02	205,43	169,26
2015-01-05	201,76	166,24
2015-01-06	199,82	164,64

- Cele două coloane SPY diferă: dividendele apar doar în prețul de închidere ajustat
- Dacă numărul de prețuri sau prima valoare diferă, opriți-vă și verificați numele și data de început

Prețuri și randamente: definiții

- ▣ P_t : prețul din ziua t (aici prețul de închidere sau, la ETF-uri, prețul de închidere ajustat)
- ▣ **Randamentul simplu** $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$: câștigul procentual dintr-o zi
- ▣ **Randamentul logaritmic** $r_t = \ln(P_t/P_{t-1}) = \ln(1 + R_t)$: aproape egal cu R_t la variații mici, mai mic la variații mari
- ▣ Exemplu lucrat, două zile
 - ▶ $P_0 = 100, P_1 = 102$: $R_1 = 102/100 - 1 = 2,00\%$, $r_1 = \ln 1,02 = 1,98\%$
 - ▶ $P_2 = 96,9$: $R_2 = 96,9/102 - 1 = -5,00\%$, $r_2 = \ln 0,95 = -5,13\%$
- ▣ De ce două definiții: randamentul simplu este ce câștigă investitorul într-o perioadă; randamentul logaritmic este comod pe mai multe perioade (A1 arată de ce)



A1 [Rezolvat]: adunarea randamentelor — enunț

- ▣ **Întrebare:** se pot aduna pur și simplu două randamente zilnice pentru a obține randamentul pe două zile?
- ▣ **Date:** prețurile $P_0 = 100$, $P_1 = 110$, $P_2 = 99$; fără fișier de date
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați randamentele simple R_1, R_2 și randamentele logaritmice r_1, r_2 .
 2. Adunați cele două randamente simple și cele două randamente logaritmice.
 3. Calculați randamentele pe două perioade $P_2/P_0 - 1$ și $\ln(P_2/P_0)$ și comparați-le cu sumele de la pasul 2.
- ▣ **De raportat:** un tabel cu coloanele dată, preț, randament simplu, randament logaritmice și o frază despre randamentele care se adună
- ▣ Notebook: secțiunea A1–A4

A1 [Rezolvat]: rezolvare

t	P_t	R_t	r_t
0	100	–	–
1	110	+10,00%	+9,53%
2	99	–10,00%	–10,54%
sumă		0,00%	–1,005%
$0 \rightarrow 2$		–1,00%	–1,005%

- La randamentele logaritmice termenii intermediari se reduc: $\ln P_2 - \ln P_1 + \ln P_1 - \ln P_0 = \ln(P_2/P_0)$
- Randamentele simple se compun:
 $(1 + R_1)(1 + R_2) - 1 = 1,1 \times 0,9 - 1 = -1\%$



- Interpretare: suma randamentelor simple arată 0% pentru o traiectorie care a pierdut 1%; randamentele logaritmice se adună, cele simple se compun

CAGR și volatilitatea anualizată: definiții

- ▣ Y : zilele calendaristice dintre primul și ultimul preț /365,25, lungimea eșantionului în ani
- ▣ **Multiplul de creștere** $P_{\text{final}}/P_{\text{inițial}}$; **CAGR** (rata anuală compusă de creștere) $= (P_{\text{final}}/P_{\text{inițial}})^{1/Y} - 1$: creșterea anuală constantă care duce $P_{\text{inițial}}$ în P_{final}
 - ▶ exemplu: 100 devine 200 în 10 ani: $\text{CAGR} = 2^{1/10} - 1 = 7,18\%$, nu $100\%/10 = 10\%$
- ▣ **Volatilitatea zilnică** $\hat{\sigma}_d$: abaterea standard de selecție (împărțire la $n - 1$) a celor n randamente logaritmice zilnice
- ▣ $q = n/Y$: numărul observat de randamente pe an, aproximativ 252 pentru acțiunile americane, 260 pentru aur (zile lucrătoare), 365 pentru Bitcoin (în fiecare zi)
- ▣ **Volatilitatea anualizată** $\hat{\sigma}_d\sqrt{q}$
 - ▶ exemplu: $\hat{\sigma}_d = 1,2\%$, $q = 252$: $1,2\% \times \sqrt{252} = 1,2\% \times 15,87 = 19,05\%$
 - ▶ $\sqrt{q}$, nu q : varianțele randamentelor necorelate se adună, deci abaterea standard crește cu rădăcina pătrată a timpului

A3–A4 [Rezolvat]: anualizare și CAGR — enunț

- ▣ **Întrebare:** cum transformăm cifrele zilnice în cifre anuale?
- ▣ **Date A3:** volatilitatea zilnică $\sigma_d = 1\%$; $q = 252$ intervale de randament pe an pentru un indice de acțiuni, $q = 365$ pentru Bitcoin
 1. Calculați volatilitatea anualizată $\sigma_d\sqrt{q}$ pentru ambele valori ale lui q .
 2. Enunțați cele două ipoteze în care scalarea cu $\sqrt{q}$ este exactă.
- ▣ **Date A4:** indicele de preț S&P 500 s-a multiplicat de 3,72 ori între 2 ian. 2015 și 18 sep. 2026 (4 277 de zile calendaristice)
 3. Calculați $Y = 4\,277/365,25$ și $\text{CAGR} = 3,72^{1/Y} - 1$.
 4. Explicați de ce acest CAGR este mai mic decât cei 13,7% ai SPY din B1.
- ▣ **De raportat:** două volatilități, un CAGR, două fraze

A3–A4 [Rezolvat]: rezolvare

- ▣ A3
 1. $\sqrt{252} = 15,87$, deci $1\% \times 15,87 = 15,87\%$; $\sqrt{365} = 19,10$, deci $19,10\%$.
 2. Exactă când randamentele zilnice sînt necorelate și au varianță constantă; A6 (Pachetul 3, după curs) arată ce se întîmplă altfel.
- ▣ A4
 3. $Y = 4\,277/365,25 = 11,71$;
 $\text{CAGR} = \exp(\ln 3,72/11,71) - 1 = \exp(1,3137/11,71) - 1 = e^{0,1122} - 1 = 11,87\%$.
 4. Indicele S&P 500 este un indice de preț: nu include dividendele; prețul ajustat al SPY le reinvestește (13,7% pe an).
- ▣ Interpretare: CAGR este creșterea geometrică pe an, nu randamentul anual mediu; pe aceleași date, media aritmetică este mai mare (A5, Pachetul 3)

Drawdown: definiții

- ▣ **Maximul curent** $M_t = \max_{s \leq t} P_s$: cel mai mare preț de pînă atunci
- ▣ **Drawdown** $DD_t = P_t/M_t - 1 \leq 0$: pierderea unui investitor care a cumpărat la cel mai mare preț de pînă atunci
- ▣ **Drawdown-ul maxim** (MDD) $= \min_t DD_t$: cea mai mare astfel de pierdere din eșantion; are o dată a vîrfului și o dată a minimului
- ▣ Exemplu: vîrf 120, preț ulterior 90: $DD = 90/120 - 1 = -25\%$
 - ▶ revenirea la vîrf cere $120/90 - 1 = +33,3\%$: o pierdere L cere un câștig de $L/(1 - L)$
- ▣ Graficul underwater: DD_t în timp; este 0 la fiecare vîrf nou și negativ între vîrfuri

A2 [Rezolvat]: drawdown — enunț


- ▣ **Întrebare:** care este cea mai mare pierdere față de un maxim anterior și când a avut loc?
- ▣ **Date:** prețurile din zilele 0–5: 100, 120, 90, 110, 130, 100
- ▣ **Cerințe:** completați tabelul
 1. Maximul cumulat $M_t = \max_{s \leq t} P_s$.
 2. Drawdown-ul $DD_t = P_t / M_t - 1$, raportat ca număr negativ.
 3. Drawdown-ul maxim $\min_t DD_t$ și ziua în care apare.

Ziua	0	1	2	3	4	5
P_t	100	120	90	110	130	100
M_t	100	120	...	...	...	...
DD_t	0%	0%	...	...	...	...

- ▣ **De raportat:** tabelul completat și drawdown-ul maxim

A2 [Rezolvat]: rezolvare

Ziua	0	1	2	3	4	5
P_t	100	120	90	110	130	100
M_t	100	120	120	120	130	130
DD_t	0%	0%	-25,00%	-8,33%	0%	-23,08%




- Drawdown-ul maxim este -25%, în ziua 2; scăderea ulterioară la 100 este mai mică, -23,08%, pentru că se măsoară față de noul maxim de 130

Cotații eronate și cursul de referință BNR

- ▣ **Cotație eronată** (bad tick): un preț înregistrat la care nu a tranzacționat nimeni, de exemplu o greșeală de tastare, o virgulă pusă greșit sau cotația altui instrument
- ▣ **Cursul de referință BNR**: cursul oficial EUR/RON, publicat de BNR în fiecare zi lucrătoare din România în jurul orei 13:00; o sursă independentă cu care verificăm o serie de piață
- ▣ **Seria EUR/RON de la EODHD** agregă cotațiile dealerilor: nu este un curs oficial și este înregistrată la altă oră din zi
- ▣ Trei semne ale unei cotații eronate
 1. o variație într-o zi mult mai mare decât de obicei pentru acea serie;
 2. variația se inversează a doua zi;
 3. cotația este departe de sursa independentă din aceeași zi.
- ▣ Doar diferența față de BNR nu ajunge: într-o zi cu mișcări reale, cele două serii diferă pentru că sînt înregistrate la ore diferite
- ▣ O singură cotație eronată creează două randamente uriașe, saltul și inversarea lui, și umflă volatilitatea

B6 [Rezolvat]: o cotație suspectă — enunț

- ▣ **Întrebare:** este cotația EUR/RON de piață din 13 aug. 2025 un preț real?
- ▣ **Date:** seria EUR/RON de la EODHD (prețul de închidere), 1 ian. 2015 – 18 sep. 2026, 3 115 rînduri; cursul de referință BNR
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați variațiile logaritmice zilnice ale seriei de piață și găsiți-o pe cea mai mare în valoare absolută.
 2. Pentru 13 aug. 2025, raportați cotația anterioară, cotația și cotația următoare, precum și cele două variații logaritmice.
 3. Comparați cotația cu cursul BNR din 13 aug. 2025, în lei și în procente.
 4. Calculați volatilitatea anualizată a seriei de piață, a aceleiași serii fără această cotație și a cursului BNR, fiecare cu q -ul propriu.
- ▣ **De raportat:** cele trei cotații, diferența față de BNR și cele trei volatilități
- ▣ **Interpretare:** care dintre cele trei semne sînt prezente?




- ▣ Priviți întâi graficul: salturile care se inversează a doua zi sînt suspectele
- ▣ Notebook: secțiunea B6

B6 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — pas cu pas

- Pasul 1: cea mai mare variație logaritmică zilnică este $-15,41\%$, pe 14 aug. 2025; a doua, $+15,40\%$, este pe 13 aug. 2025
- Pasul 2: 12 aug. 5,0636 $\rightarrow$ 13 aug. 5,9065 $\rightarrow$ 14 aug. 5,0629
 - ▶ $\ln(5,9065/5,0636) = +15,40\%$, apoi $\ln(5,0629/5,9065) = -15,41\%$: variația se inversează a doua zi
- Pasul 3: BNR pe 13 aug. 2025: 5,0633; diferența $5,9065 - 5,0633 = 0,843$ lei, cu $16,7\%$ peste cursul oficial
- Pasul 4: volatilitatea anualizată
 - ▶ seria de piață $12,4\%$ ($q = 265,9$, are și câteva cotații de weekend); fără cotația din 13 aug. 2025: $10,6\%$
 - ▶ cursul BNR $2,1\%$ ($q = 251,1$)


B6 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — grafic și interpretare



- Toate cele trei semne sînt prezente: o variație de 15% acolo unde cursul BNR variază cu circa 0,13% pe zi ($2,1\%/\sqrt{251}$), inversată a doua zi, la 0,84 lei de BNR: o cotație eronată
- O singură cotație adaugă 1,8 pp la volatilitatea anualizată; seria de piață rămîne de cinci ori mai volatilă decît cursul BNR: au rămas și alte cotații eronate, auditul complet este în [Pachetul 1](#)
- Interpretare: verificați o serie de piață cu o sursă oficială înainte de orice calcul; pentru EUR/RON folosiți cursul BNR

Creșterea a 1 USD și scala logaritmică

- **Creșterea a 1 USD:** $G_t = P_t/P_0$, valoarea în ziua t a unui dolar investit în ziua 0; pune pe același grafic active cu prețuri foarte diferite
- **Scala logaritmică:** axa verticală arată $\ln G_t$, cu etichetele lui G_t
 - ▶ distanțe egale înseamnă rapoarte egale: $1 \rightarrow 2$ și $100 \rightarrow 200$ au aceeași înălțime
 - ▶ o rată de creștere constantă este o linie dreaptă
- Pe scala liniară (stînga), creșterea de 257 de ori a Bitcoin turtește SPY într-o linie la bază




B1 [Rezolvat]: trei active pe un singur grafic — enunț

- ▣ **Întrebare:** cât a crescut 1 USD în SPY, aur și Bitcoin din 2015, cât de volatil a fost fiecare activ și cât de adâncă a fost cea mai mare cădere?
- ▣ **Date:** SPY (închidere ajustată), aur (închidere, zile lucrătoare), Bitcoin (închidere, în fiecare zi), 2 ian. 2015 – 18 sep. 2026, toate în USD; fiecare activ pe calendarul lui
- ▣ **Cerințe**
 1. Reprezentați creșterea a 1 USD, P_t/P_0 , pe scală logaritmică.
 2. Pentru fiecare activ calculați multiplul, Y și CAGR.
 3. Calculați n , $q = n/Y$, volatilitatea zilnică $\hat{\sigma}_d$ și volatilitatea anualizată $\hat{\sigma}_d\sqrt{q}$.
 4. Reprezentați curbele de drawdown și raportați fiecare drawdown maxim cu datele vârfului și minimului.
- ▣ **De raportat:** cele două grafice și un tabel (multiplu, CAGR, q , volatilitate, MDD)
- ▣ **Interpretare:** activul cu cel mai mare CAGR are și cea mai mare volatilitate și cel mai adânc drawdown?
- ▣ Notebook: secțiunea B1

B1 [Rezolvat]: rezolvare (1/4) — SPY pas cu pas


- ▣ Prețuri: 169,26 pe 2 ian. 2015, 761,69 pe 18 sep. 2026; $Y = 4\,277/365,25 = 11,71$
- ▣ Pasul 2: multiplul $761,69/169,26 = 4,50$; $CAGR = 4,50^{1/11,71} - 1 = e^{1,504/11,71} - 1 = 13,7\%$
- ▣ Pasul 3: $n = 2\,944$ randamente, $q = 2\,944/11,71 = 251,4$; $\hat{\sigma}_d = 1,108\%$; volatilitatea $1,108\% \times \sqrt{251,4} = 17,6\%$
- ▣ Pasul 4: maximul curent 307,63 pe 19 feb. 2020, minimul 203,91 pe 23 mar. 2020: $MDD = 203,91/307,63 - 1 = -33,7\%$
- ▣ Același cod rulează pentru aur și Bitcoin: se schimbă doar numele; q urmează calendarul fiecăruia (260,5 pentru aur, 365,25 pentru Bitcoin)

B1 [Rezolvat]: rezolvare (2/4) — creșterea a 1 USD



- Scala logaritmică: căderile Bitcoin din 2018 și 2022 se văd la fel de bine ca creșterile; etichetele de la capăt sînt multiplii de creștere

B1 [Rezolvat]: rezolvare (3/4) — drawdown-uri



- Cercurile marchează fiecare drawdown maxim; pe 18 sep. 2026, SPY este cu 1,8% sub vîrf, aurul cu 20,6%, Bitcoin cu 35,2%

B1 [Rezolvat]: rezolvare (4/4) — tabel și interpretare

	Multiplu	CAGR	q	Volatilitate	MDD (vîrf → minim)
SPY	4,50	13,7%	251,4	17,6%	−33,7% (19 feb. 2020 → 23 mar. 2020)
Aur	3,68	11,8%	260,5	16,3%	−27,7% (28 ian. 2026 → 16 iul. 2026)
Bitcoin	256,8	60,6%	365,25	66,7%	−83,4% (16 dec. 2017 → 15 dec. 2018)

- Da, în acest eșantion: Bitcoin are cel mai mare CAGR, o volatilitate de circa patru ori mai mare decît SPY și aurul și a pierdut 83% față de vîrfurile din 2017
- SPY și aurul au volatilități apropiate; cea mai mare cădere a aurului este recentă și încă nerecuperată
- Un singur eșantion de 11,7 ani: dacă astfel de diferențe sînt sigure este o întrebare pentru curs și pentru [Pachetul 2](#)

A11 [Propus]: randamente, CAGR și volatilitate — enunț

- ▣ **Model:** A1 și A3–A4 [Rezolvat]
- ▣ **Întrebare:** se verifică regulile din A1 și A3–A4 pe alte cifre?
- ▣ **Date:** o acțiune cu $P_0 = 50$, $P_1 = 55$, $P_2 = 44$; un fond care a crescut de la 100 la 250 în 2 922 de zile calendaristice; o volatilitate zilnică de 1,5%
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați R_1 , R_2 , r_1 , r_2 , cele două sume și randamentele pe două zile $P_2/P_0 - 1$ și $\ln(P_2/P_0)$.
 2. Calculați Y și CAGR pentru fond.
 3. Anualizați volatilitatea zilnică cu $q = 252$ și cu $q = 365$.
- ▣ **De raportat:** un tabel mic și o frază despre suma care este egală cu randamentul pe două zile

A12 [Propus]: un drawdown pe hîrtie — enunț

- ▣ **Model:** A2 [Rezolvat]
- ▣ **Întrebare:** cînd a fost investorul cel mai departe sub vîrfurile anterioare și cînd și-a revenit prețurile?
- ▣ **Date:** prețurile din zilele 0–5: 200, 180, 220, 165, 198, 230
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați maximul curent M_t și drawdown-ul DD_t pentru fiecare zi.
 2. Raportați drawdown-ul maxim și ziua lui.
 3. În ce zi revine prețul la sau peste vîrfurile dinaintea minimumului și ce câștig față de minim a fost necesar?
- ▣ **De raportat:** tabelul completat, MDD și ziua revenirii, cu câștigul necesar

B9 [Propus]: încă două cotații suspecte — enunț

- ▣ **Model:** B6 [Rezolvat]
- ▣ **Întrebare:** cotațiile EUR/RON de piață din 22 apr. 2022 și din 6 mai 2025 sînt amîndouă la peste 0,05 lei de cursul BNR; care dintre ele este eronată?
- ▣ **Date:** seria EUR/RON de la EODHD și cursul de referință BNR, ca în B6
- ▣ **Cerințe**
 1. Pentru fiecare dată, raportați cotația anterioară, cotația și cotația următoare, precum și cele două variații logaritmice zilnice.
 2. Comparați fiecare cotație cu cursul BNR din acea zi; dacă BNR nu a publicat curs în ziua respectivă (o sărbătoare legală), folosiți ultimul curs anterior.
 3. Verificați cele trei semne ale unei cotații eronate pentru fiecare dată și decideți: eliminăm sau păstrăm.
 4. Reprezentați ambele episoade, seria de piață față de BNR, pe circa trei săptămîni.
- ▣ **De raportat:** cîte un rînd de tabel pentru fiecare dată (cotații, variații, BNR, diferență, semne prezente, decizie) și graficul
- ▣ **Interpretare:** de ce nu ajunge doar diferența față de BNR ca să eliminăm o cotație?

B10 [Propus]: alte trei active — enunț

- ▣ **Model:** B1 [Rezolvat]
- ▣ **Întrebare:** cum au evoluat față de SPY, din 2015, S&P 500 cu ponderi egale (RSP) și titlurile de stat americane pe termen lung (TLT)?
- ▣ **Date:** SPY, RSP și TLT (închidere ajustată), 2 ian. 2015 – 18 sep. 2026, USD, zile de tranzacționare SUA
- ▣ **Cerințe**
 1. Reprezentați creșterea a 1 USD pentru cele trei ETF-uri, pe scală logaritmică.
 2. Calculați multiplul, CAGR, q și volatilitatea anualizată pentru fiecare.
 3. Reprezentați curbele de drawdown și raportați fiecare MDD cu datele vârfului și minimului, precum și drawdown-ul din 18 sep. 2026.
- ▣ **De raportat:** cele două grafice și tabelul din B1 pentru cele trei ETF-uri
- ▣ **Interpretare:** sînt titlurile de stat pe termen lung un activ sigur în acest eșantion?

B2 [Propus]: drawdown-uri și durata revenirii — enunț

- ▣ **Model:** A2 și B1 [Rezolvat]
- ▣ **Întrebare:** cât de adânci și cât de lungi sînt drawdown-urile S&P 500 și ale Bitcoin?
- ▣ **Date:** S&P 500 (închidere) din 3 ian. 2000 și Bitcoin (închidere) din 17 sep. 2014, ambele pînă la 18 sep. 2026
- ▣ **Convenții:** o perioadă sub maxim începe în ultima zi în care s-a stabilit maximul cumulat (la maxime egale, ultima dintre ele) și se termină la prima închidere cel puțin egală cu acel maxim; o perioadă încă deschisă pe 18 sep. 2026 este cenzurată la dreapta
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați DD_t pentru ambele active și reprezentați grafic cele două curbe de drawdown (underwater).
 2. Raportați drawdown-ul maxim cu datele și prețurile de maxim, de minim și de revenire.
 3. Raportați cea mai lungă perioadă sub maxim (început, sfîrșit, zilele calendaristice și de tranzacționare) și drawdown-ul curent.
 4. Repetați 2–3 pentru S&P 500 din 17 sep. 2014, orizontul Bitcoin.
- ▣ **Interpretare:** de ce trebuie comparate cele două MDD-uri pe același orizont?

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Promptul** trimis unui asistent AI: „Folosind prețurile zilnice din datele cursului, calculează media anualizată, volatilitatea anualizată și raportul Sharpe ($r_f = 0$) pentru SPY și Bitcoin, din randamentele simple zilnice”
- **Răspunsul:** codul de mai jos și concluzia

```
import numpy as np, pandas as pd
URL = 'https://raw.githubusercontent.com/danpele/MFM/main/data/market/'
def load(sym, field='close'):
    return pd.read_csv(URL + sym + '.csv', index_col='date',
                       parse_dates=True)[field].dropna()
spy, btc = load('SPY.US'), load('BTC-USD.CC')
A = 252 # zile de tranzactionare pe an
for name, p in [('SPY', spy), ('BTC', btc)]:
    r = p.pct_change().dropna() # randamente simple zilnice
    mu = r.mean() * A # media anualizata
    vol = r.std() * A # volatilitatea anualizata
    print(name, mu, vol, mu / vol) # raportul Sharpe, rf = 0
```

- **Concluzia AI:** „Rapoarte Sharpe: SPY 0,03, Bitcoin 0,07. Ambele active își răsplătesc foarte slab riscul.”

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — proiectul înaintea codului

- ▣ **Model:** A3–A4 și B1 [Rezolvat]
- ▣ **Raportul Sharpe** (rata fără risc 0): media anualizată a randamentelor simple zilnice împărțită la volatilitatea lor anualizată, randamentul pe unitatea de risc
- ▣ **Date:** istoricul complet, SPY din 29 ian. 1993 și Bitcoin din 13 iul. 2010, ambele pînă la 18 sep. 2026
- ▣ **Pasul 1, proiectul cercetării** (scris înainte de a rula orice cod)
 1. Formulați ipoteza din spatele concluziei AI ca o propoziție testabilă despre cele două rapoarte Sharpe.
 2. Fixați eșantionul (datele, cîmpul de preț, calendarul fiecărui activ) și comparația pe care o veți face.
 3. Numiți o explicație alternativă pentru orice diferență veți găsi (de exemplu, perioadele diferite ale eșantioanelor).
 4. Spuneți ce nu poate stabili rezultatul, oricare ar fi cifrele.
- ▣ **De raportat:** patru fraze, scrise înainte de cod

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — enunț

▣ Pasul 2, codul

5. Găsiți cele trei erori de implementare strecurate în cod.
6. Pentru fiecare, spuneți cum ați depista-o: o verificare a rezultatului, o cifră publicată, cursul sau documentația.
7. Scrieți codul corectat și raportați media anualizată, volatilitatea și raportul Sharpe pentru SPY și Bitcoin.
8. Comparați rezultatul corectat cu Pasul 1: este exclusă explicația alternativă și ce limită rămîne chiar și cu codul reparat?
9. Consemnați fiecare eroare găsită efectiv, în formatul din `AI_ERRORS.md`: cererea, răspunsul, eroarea, cum ați găsit-o, corecția.

▣ **Interpretare:** rezistă concluzia „ambele active își răsplătesc foarte slab riscul”?

▣ Codul generat de AI rulează de obicei fără mesaj de eroare: greșelile sînt de finanțe, nu de sintaxă

După curs: pachete, date și notații

Pachet	Exerciții	Ce trebuie făcut înainte
1. Date și calendare	B6 audit complet, B1 șase active, B3 [toate rezolvate]	B6 și B1 din traseul de bază
2. Precizie	A10, B1 extins [Rezolvat]	Pachetul 1, cursul de la Capitolul 0
3. Aritmetica randamentelor	A5 [Rezolvat], A6, A8	Pachetul 2
4. Inferență pentru corelații	B3 extins, A7, A9, C1	Pachetele 1–2
5. Drawdown-uri extreme	B2 extins	B2, Pachetul 2
6. Piața românească	B7 [Rezolvat], B8, B5, B5 extins, B6 extins	Pachetul 1, regresia OLS
7. Stablecoins	B4, B4 extins	A3–A4, B7
8. Laborator: investiții pasive	C3	studiul de caz din curs, Pachetul 2

- Pentru după cursul de la [Capitolul 0](#), care introduce erorile standard, bootstrap-ul și testele folosite aici; notebook-ul are câte o secțiune pentru fiecare pachet, în această ordine; C1 și C3 pot fi începutul unui proiect
- Date (datele cursului, zilnice, 2 ian. 2015 – 18 sep. 2026, dacă nu se precizează altfel): SPY și TLT (închidere ajustată, randament total); indicele S&P 500, aurul (zile lucrătoare), Bitcoin (în fiecare zi, 24:00 UTC), Euro Stoxx 50 și Nikkei 225 (închidere, preț; în USD cu FRED DEXUSEU, DEXJPUS); EUR/RON de la BNR și seria EUR/RON de la EODHD; BET, BET-TR, Banca Transilvania, BRD; oferta de stablecoins de la DefiLlama
- Notații: P_t , R_t , r_t , n (și T), Y , $q = n/Y$, CAGR și $\hat{\sigma}_d\sqrt{q}$ ca în traseul de bază; raportul Sharpe (rata fără risc 0) $SR = \sqrt{q} \bar{R}/s_R$, cu $\bar{R}$ media de selecție și s_R abaterea standard de selecție (împărțire la $n - 1$) a randamentelor simple zilnice; iid: independente și identic distribuite
- [Rezolvat]: rezolvarea completă este în notebook; [Propus]: rezolvarea se discută la seminar

Pachetul 1: B6 audit complet și B1 șase active

B6 audit complet [Rezolvat]: toate cotațiile eronate

- **Enunț:** care cotații din seria EUR/RON de la EODHD (închidere, 1 ian. 2015 – 18 sep. 2026, 3 115 rînduri) sînt erori și cît distorsionează ele volatilitatea? Verificarea externă: cursul de referință BNR
 1. Eliminați rîndurile din weekend.
 2. Marcați cotațiile din zilele lucrătoare aflate la peste 0,05 lei de mediana mobilă centrată pe 11 zile.
 3. Comparați fiecare cotație marcată cu cursul BNR din aceeași zi (într-o zi de sărbătoare, cu ultimul curs anterior); eliminați doar cotațiile aflate la peste 0,05 lei de BNR.
 4. Calculați volatilitatea anualizată a seriei brute de piață, a seriei curățate și a cursului BNR, fiecare cu q -ul propriu.
- **De raportat:** un tabel de verificare (dată, cotație, mediană, BNR, diferență, decizie) și cele trei volatilități
- **Rezolvare completă:** notebook-ul, secțiunea *B6 full audit*

B1 șase active [Rezolvat]: comparație între clase de active

- **Enunț:** cît a crescut 1 USD din 2015 în SPY, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, aur, TLT și Bitcoin și cît de volatil a fost fiecare? 2 ian. 2015 – 18 sep. 2026, toate în USD
 1. Converteți Euro Stoxx 50 și Nikkei 225 în USD:

$$p^{USD} = p^{EUR} \times (\text{USD pentru un euro}),$$

$$p^{USD} = p^{JPY} / (\text{JPY pentru un dolar}),$$
 cu cursul FRED din aceeași zi sau, dacă lipsește, cu ultimul curs din cel mult 5 zile calendaristice anterioare.
 2. Reprezentați creșterea a 1 USD, P_t/P_0 , pe scară logaritmică.
 3. Pentru fiecare activ calculați n , Y , $q = n/Y$, multiplul, CAGR și volatilitatea $\hat{\sigma}_d \sqrt{q}$.
 4. Recalculați fiecare volatilitate cu $q = 252$.
- **De raportat:** graficul și un tabel (q , multiplu, CAGR, volatilitate, volatilitate cu 252); la ce active contează alegerea lui q și de ce?
- **Rezolvare completă:** notebook-ul, secțiunea *B1 six assets*

Pachetul 1: B3, corelații și calendare

B3 [Rezolvat]: corelații și calendare

- **Enunț:** cât schimbă calendarul și estimatorul o corelație și este schimbarea corelației acțiunii-obligațiunii mai mare decât eroarea de eșantionare? S&P 500 și Bitcoin (închidere), TLT (închidere ajustată), randamente log zilnice; Bitcoin – S&P 500 în 1 ian. 2022 – 18 sep. 2026; S&P 500 – TLT în 2010–2020 (n_1 zile) și 2022–2026 (n_2 zile)
- **Calendare:** întâi aliniem *prețurile* pe zilele comune, apoi calculăm randamentele (vineri → luni pentru ambele); dacă se calculează întâi randamentele, randamentul S&P 500 vineri → luni ajunge lângă randamentul Bitcoin duminică → luni, iar mișcarea Bitcoin din weekend se pierde; completarea S&P 500 în weekend creează randamente nule, puse lângă mișcările Bitcoin din weekend
 1. Corelația Bitcoin – S&P 500 pe toată perioada, pe zilele comune (prețurile aliniate întâi).
 2. Aceeași corelație cu S&P 500 completat în weekend și cu randamente săptămânale: ultimul preț din zilele comune al fiecărei săptămîni încheiate vinerea (joia, dacă vinerea e zi liberă); ultima săptămînă incompletă se elimină.
 3. Media corelației mobile pe 252 de zile în 2022–2026 (ferestrele pot începe în 2021).
 4. S&P 500 – TLT în ambele perioade, cu ambii estimatori.

5. Calculați $\hat{\rho}_1$, $\hat{\rho}_2$ nerotunjite, $z_i = \text{atanh } \hat{\rho}_i$, $SE_z = \sqrt{1/(n_1 - 3) + 1/(n_2 - 3)}$ și $z = (z_2 - z_1)/SE_z$ (Fisher (1915); perechi iid dintr-o distribuție Normală bivariată).
6. Calculați intervalul iid de 95% pentru $\rho_2 - \rho_1$:

$$(\hat{\rho}_2 - \hat{\rho}_1) \pm 1,96 \sqrt{(1 - \hat{\rho}_1^2)^2/(n_1 - 3) + (1 - \hat{\rho}_2^2)^2/(n_2 - 3)}.$$
- **De raportat:** graficul corelațiilor mobile; un tabel metodă / număr de observații / corelație; z , valoarea p , schimbarea și intervalul ei; ce estimator răspunde la întrebarea „care a fost corelația în 2022–2026”? Ce nu poate stabili intervalul?
- **Rezolvare completă:** notebook-ul, secțiunea B3

Pachetul 2: A10 și B1 extins

A10 [Rezolvat]: cât de precis este un randament mediu?

- Enunț: SPY a avut în 2015–2026 un randament mediu de circa 14% pe an; cât de precis fixează acest eșantion randamentul anual așteptat? SPY (închidere ajustată), randamente simple zilnice R_t , 2 ian. 2015 – 18 sep. 2026; q și Y ca în B1 șase active
 1. Calculați media anualizată $\hat{\mu}_a = q \bar{R}$ și volatilitatea anualizată $\hat{\sigma}_a = s_R \sqrt{q}$.
 2. Cu randamente iid, $SE(\hat{\mu}_a) = q s_R / \sqrt{n} = \hat{\sigma}_a / \sqrt{Y}$ (deoarece $n = qY$): calculați-o, împreună cu intervalul de 95% $\hat{\mu}_a \pm 1,96 SE$.
 3. Câți ani de date ar da un interval de 95% de ± 2 pp, la aceeași volatilitate?
- De raportat: $\hat{\mu}_a$, $\hat{\sigma}_a$, SE, intervalul și numărul de ani; de ce eșantionarea zilnică în loc de lunară nu face media mai precisă?
- Rezolvare completă: notebook-ul, secțiunea A10

B1 extins [Rezolvat]: cât de precis este un raport Sharpe?

- Enunț: este raportul Sharpe al SPY suficient de precis ca să îl plaseze deasupra aurului? Cele șase serii din B1 șase active, randamente simple zilnice R_t , rata fără risc 0
- Bootstrap staționar (Politis & Romano (1994)): blocuri din zile de start aleatoare, continuate cu probabilitatea $1 - 1/b$ (bloc mediu $b = 20$), circular, pînă se strîng T zile; fiecare zi extrasă își păstrează randamentele tuturor activelor; q , Y fixate; `default_rng(42)`
 1. Calculați $SR_a = \sqrt{q} \bar{R} / s_R$ pentru SPY și $SR_d = \bar{R} / s_R$ zilnic.
 2. Calculați SE iid asimptotică pentru randamente cu distribuția Normală (Lo (2002)), $SE = \sqrt{q(1 + SR_d^2/2)/T}$, și intervalul de 95% $SR_a \pm 1,96 SE$.
 3. Bootstrap (bloc 20, 2 000 de reeșantionări): intervalul percentil de 95% pentru SR al SPY și al celorlalte cinci active.
 4. Pe zilele comune ale SPY și aurului, estimați prin bootstrap diferența dintre rapoartele Sharpe (ambele cu $q = 252$) și raportați intervalul ei de 95%.
- De raportat: calculul pentru SPY, un grafic al intervalelor, diferența cu intervalul ei; plasează B1 șase active SPY deasupra aurului?
- Rezolvare completă: notebook-ul, secțiunea B1 extended

Pachetul 3: A5 și A6

A5 [Rezolvat]: volatility drag

- **Enunț:** poate un randament mediu pozitiv să meargă împreună cu o avere în scădere? Zilnic: $m = E[r]$, $a = E[R]$, $v_R = \text{Var}(R)$, $v_r = \text{Var}(r)$, $r = \ln(1 + R)$; Bitcoin, închiderea în USD, de la 17 sep. 2014 (457,33) la 18 sep. 2026 (80 901,46), 4 384 de randamente zilnice, 365 pe an
 1. Dezvoltați $\ln(1 + R)$ până la ordinul 2 și arătați că $m \approx a - (v_R + a^2)/2 \approx a - v_r/2$ pentru randamente zilnice mici.
 2. Pentru Bitcoin, completați un tabel de la zilnic la anual: media log $\times 365$, volatility drag $v_r \times 365/2$, media simplă implicată, $\text{CAGR} = e^{365m} - 1$; comparați cu CAGR calculat din cele două prețuri de capăt.
 3. Un activ are o medie aritmetică anuală de 10% și o volatilitate de 60%: aproximați creșterea log așteptată și CAGR.
- **De raportat:** dezvoltarea, tabelul, cele două valori de la cerința 3; de ce poate pierde bani traiectoria tipică atunci când randamentul mediu este pozitiv?
- **Rezolvare completă:** notebook-ul, secțiunea A5

A6 [Propus]: când regula $\sqrt{q}$ nu mai funcționează

- **Enunț:** randamente log zilnice, staționare, varianța σ^2 , autocorelațiile ρ_j ; date: EUR/RON de la BNR, 4 iul. 2005 – 18 sep. 2026, 5 352 de variații log zilnice (modele: A3–A4, A5)
 1. Pentru $k = 3$, scrieți $\text{Var}(r_1 + r_2 + r_3)$ ca sumă a celor nouă covarianțe; apoi generalizați la $\text{Var}(\sum_{t=1}^k r_t) = k\sigma^2[1 + 2\sum_{j=1}^{k-1}(1 - j/k)\rho_j]$.
 2. Pentru un AR(1) ipotetic, $\rho_j = \rho^j$, găsiți limita parantezei când $k \rightarrow \infty$.
 3. Calculați $\hat{\rho}_1$, volatilitatea cu $\sqrt{252}$ și corecția ei ipotetică AR(1).
 4. Calculați autocorelațiile la decalajele 1–10 și volatilitatea din variațiile de la sfârșit de lună $\times \sqrt{12}$.
 5. Seria EUR/RON de la EODHD (B6) are $\hat{\rho}_1 = -0,57$: ce factor AR(1) ar rezulta și de ce este o corecție greșită?
- **De raportat:** cele două deducții, volatilitățile și autocorelațiile; autocorelația pozitivă ascunde risc sau inventează risc și este suficient $\hat{\rho}_1$?

Pachetele 3–4: A8 și B3 extins

A8 [Propus]: eroarea standard a unui raport Sharpe

- Enunț: T randamente zilnice iid cu media μ , varianța σ^2 , momentele centrate finite μ_3, μ_4 , asimetria $\gamma_3 = \mu_3/\sigma^3$, kurtosisul obișnuit (nu excesul) $\gamma_4 = \mu_4/\sigma^4$, $SR = \mu/\sigma$ zilnic; SPY: $SR_a = 0,82$, $q = 251,4$, $T = 2\,944$, $Y = 11,71$, $\gamma_3 = -0,31$, $\gamma_4 = 17,1$ (modele: A5, A10, B1 extins)
 1. Gradientul: pentru $g(\mu, \sigma^2) = \mu/\sigma$, calculați ∇g .
 2. Forma pătratică: $\sqrt{T}(\hat{\mu} - \mu, \hat{\sigma}^2 - \sigma^2) \rightarrow N(0, \Sigma)$, $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma^2 & \mu_3 \\ \mu_3 & \mu_4 - \sigma^4 \end{pmatrix}$; calculați $\nabla g^\top \Sigma \nabla g$ și cazul Normal (Lo (2002)).
 3. Cazul Normal, anualizarea: cu $SR_a = \sqrt{q} SR_d$ și $T = qY$, arătați că $\text{Var}(\widehat{SR}_a) \approx (1 + SR_a^2/(2q))/Y$ (aproximare pentru T mare, nu un rezultat exact în eșantion finit).
 4. SE asimptotică pentru SPY în trei feluri: Normal zilnic, general zilnic (cu γ_3, γ_4) și formula Normală cu $q = 1$, $\sqrt{(1 + SR_a^2/2)/Y}$, ca și cum perioada ar fi observată prin randamente anuale; precizați ipoteza de eșantionare a fiecăruia.
- De raportat: deducțiile și cele trei SE; de ce eșantionarea mai deasă decît lunară aproape nu ajută?

B3 extins [Propus]: rămîne schimbarea acțiuni–obligățiuni cînd ținem cont de dependență?

- Enunț: randamente log zilnice S&P 500 – TLT pe zilele comune, ca în B3: 2010–2020 ($n_1 = 2\,769$) și 2022 – 18 sep. 2026 ($n_2 = 1\,182$); bootstrap-ul din B1 extins
 1. Aplicați bootstrap staționar separat în fiecare perioadă (bloc 20, 2 000 de reeșantionări, `default_rng(42)`): recalculați $\hat{\rho}_2^* - \hat{\rho}_1^*$ pe fiecare pereche de reeșantionări.
 2. Raportați intervalul percentil de 95% pentru $\rho_2 - \rho_1$ și reprezentați histograma variațiilor bootstrap, cu ambele intervale.
 3. Comparați lățimea lui cu lățimea intervalului iid din B3 (cerința 6).
- De raportat: intervalul bootstrap, raportul lățimilor și histograma; de ce este mai larg intervalul bootstrap și rezistă concluzia din B3?

Pachetul 4: A7 și A9

A7 [Propus]: de ce e mai mică corelația săptămînală?

- **Enunț:** x_t = S&P 500, y_t = Bitcoin, randamente log zilnice pe zilele comune, 2022 – 18 sep. 2026, $n = 1182$;
 $\gamma(j) = \text{Cov}(x_t, y_{t-j})$ (model: B3)
1. Pentru sumele X, Y a 5 randamente consecutive din zilele comune, desenați grila 5×5 a covarianțelor și arătați că $\text{Cov}(X, Y) = 5\gamma(0) + \sum_{j=1}^4 (5-j)[\gamma(j) + \gamma(-j)]$ și $\text{Var}(X) = 5\sigma_x^2 f_x$, $f_x = 1 + 2 \sum_{j=1}^4 (1-j/5)\rho_{x,j}$; deci $\rho_5 = \{\rho_1 + \sum_{j=1}^4 (5-j)[\gamma(j) + \gamma(-j)] / (5\sigma_x\sigma_y)\} / \sqrt{f_x f_y}$.
 2. Verificați aproximarea $f_x = f_y = 1$: autocorelațiile proprii ale lui x și y la decalajele 1–4 și f_x, f_y .
 3. Calculați termenul decalat, ρ_5 implicat cu și fără $\sqrt{f_x f_y}$ și corelația sumelor pe 5 zile suprapuse.
 4. Calculați corelația săptămînală pentru săptămîni ancorate luni, ..., vineri, fiecare cu interval Fisher de 95%.
 5. Raportați intervalul bootstrap comun, pe blocuri de săptămîni, pentru diferența zilnic minus săptămînal (secțiunea B3 extended din notebook).
- **De raportat:** deducția și valorile de la cerințele 2–5; diferența 0,42 față de 0,30 ține de piețe sau de eșantionare? Efectul Epps (1979) prevede semnul opus

A9 [Propus]: închideri asincrone

- **Enunț:** log-prețurile $X(s) = W(s) + U(s)$ (Bitcoin), $Y(s) = W(s) + V(s)$ (S&P 500), cu W, U, V mișcări browniene independente, cu ratele de varianță $\sigma_W^2, \sigma_U^2, \sigma_V^2$,
 $\rho = \sigma_W^2 / \sqrt{(\sigma_W^2 + \sigma_U^2)(\sigma_W^2 + \sigma_V^2)}$; X se închide la momentele întregi t (24:00 UTC), Y cu o fracție δ de zi mai devreme (20:00 UTC vara, 21:00 iarna)
1. Desenați pe o axă a timpului intervalele acoperite de x_t, y_t și y_{t+1} și arătați că $\text{Corr}(x_t, y_t) = \rho(1 - \delta)$, $\text{Corr}(x_t, y_{t+1}) = \rho\delta$, iar celelalte corelații încrucișate sînt 0.
 2. Deduceți că suma corelațiilor la decalajele $-1, 0, +1$ este ρ (Scholes & Williams (1977)).
 3. Calculați δ vara și iarna și corelațiile implicate pentru $\rho = 0,45$.
 4. Tabelați $\text{Corr}(x_t, y_{t+j})$ observate, $j = -1, 0, 1$, pentru 2022–2026 și comparați.
- **De raportat:** deducția și cele două tabele; este importantă distorsiunea produsă de închiderile asincrone pentru această pereche? Tratați suma ca un indiciu

Pachetele 4–5: C1 și B2 extins

C1 [Propus]: au schimbat ETF-urile spot corelația Bitcoin cu acțiunile?

- **Enunț:** ETF-urile spot pe Bitcoin au început să se tranzacționeze în SUA pe 11 ian. 2024; s-a schimbat atunci corelația Bitcoin – S&P 500? Randamente log zilnice pe zilele comune, 2018 – 18 sep. 2026 (modele: B3, B1 extins)
 1. Corelațiile din 2018–2019, 2020–2021, 1 ian. 2022 – 10 ian. 2024 (înainte) și 11 ian. 2024 – 18 sep. 2026 (după), fiecare cu interval bootstrap staționar de 95% (bloc 20).
 2. Testați $H_0 : \rho_{\text{după}} - \rho_{\text{înainte}} = 0$ cu un interval bootstrap al diferenței; reprezentați corelația mobilă cu data ETF-urilor.
 3. Extinderi pentru proiect (opțional): un activ contrafactual fără un eveniment ETF (argumentați de ce este comparabil), o căutare a datei de ruptură, alte calendare și ferestre.
- **De raportat:** un tabel perioadă / n / $\hat{\rho}$ / interval, diferența, un grafic, o limită; o afirmație causală cere extinderile

B2 extins [Propus]: este extrem drawdown-ul din 2009?

- **Enunț:** randamentele log zilnice ale S&P 500 r_t , 3 ian. 2000 – 18 sep. 2026, $n = 6717$; MDD-ul observat și cea mai lungă perioadă sub maxim calculate de voi la B2, în zile de tranzacționare (perioadele încă deschise se cenzurează în ultima zi)
 1. Construiți o traiectorie: reeșantionați n randamente, $\ln P_t = \ln P_0 + \sum_{s \leq t} r_s^*$, calculați MDD-ul și cea mai lungă perioadă; reprezentați-o.
 2. Repetați de 5 000 de ori cu bootstrap iid și de 5 000 de ori cu bootstrap staționar (bloc 20); sămînța 42.
 3. Reprezentați ambele distribuții ale MDD și ale celei mai lungi perioade, cu valorile observate; raportați medianele, cuantilele din coada nefavorabilă (5% pentru MDD, 95% pentru perioadă) și ponderile din coadă $P(\text{MDD}^* \leq \text{MDD}_{\text{obs}})$, $P(\text{perioada}^* \geq \text{perioada}_{\text{obs}})$.
 4. Calculați $\hat{\rho}_1$ și $\widehat{\text{VR}}(20) = \widehat{\text{Var}}(r_t + \dots + r_{t-19}) / (20 \widehat{\text{Var}}(r_t))$ din toate sumele pe 20 de zile suprapuse (împărțire la numărul de termeni -1 , fără corecție de eșantion mic).
- **De raportat:** graficele și valorile de la cerința 3, $\hat{\rho}_1$ și $\widehat{\text{VR}}(20)$; este MDD-ul observat extrem pentru această distribuție a randamentelor? Randamentele reeșantionate includ chiar criza: un diagnostic, nu o prognoză

Pachetul 6: B7 și B8

B7 [Rezolvat]: studiu de eveniment, taxa bancară din decembrie 2018

- **Enunț:** cît a pierdut Banca Transilvania la vestea taxei bancare (anunțată în seara de 18 dec. 2018; ziua 0 = 19 dec. 2018), dincolo de mișcarea pieței? TLV (închidere ajustată) și BET (închidere), randamente log zilnice; fereastra de estimare $[-250, -11]$ (18 dec. 2017 – 4 dec. 2018, $T = 240$), fereastra evenimentului $[0, +5]$ ($L = 6$); MacKinlay (1997); erori iid cu distribuția Normală, independente de randamentul pieței, cu aceeași varianță σ_ε^2 în ambele ferestre și independente între ferestre
 1. Estimați prin OLS $r_{i,t} = a + b r_{m,t} + \varepsilon_t$: $\hat{a}$, $\hat{b}$, $\hat{\sigma}_\varepsilon$, $\bar{r}_m$, $S_{mm} = \sum (r_{m,t} - \bar{r}_m)^2$.
 2. $AR_\tau = r_{i,\tau} - (\hat{a} + \hat{b} r_{m,\tau})$; tabel ziua, r_i , r_m , predicția, AR ; $CAR[0, +5] = \sum_{\tau=0}^5 AR_\tau$.
 3. Testați $AR_0 = 0$ și $CAR = 0$ cu varianțele erorii de predicție $\hat{\sigma}_\varepsilon^2[1 + 1/T + (r_{m,0} - \bar{r}_m)^2/S_{mm}]$ și $\hat{\sigma}_\varepsilon^2[L + L^2/T + (\sum_\tau r_{m,\tau} - L\bar{r}_m)^2/S_{mm}]$; Student t cu $T - 2$ grade de libertate în ipotezele de mai sus.
- **De raportat:** estimările, tabelul AR , CAR , t și p ; BET conține ambele bănci mari: ce efect are asta asupra lui $\hat{b}$ și asupra AR ?
- **Rezolvare completă:** notebook-ul, secțiunea B7

B8 [Propus]: același eveniment, la BRD

- **Enunț:** evenimentul din B7 pentru BRD (închidere ajustată) față de indicele BET , aceleași ferestre; refolosiți funcția din B7, se schimbă doar simbolul
 1. Raportați $\hat{b}$, $\hat{\sigma}_\varepsilon$, tabelul AR și $CAR[0, +5]$ cu t și p .
 2. Construiți un tabel pentru cele două bănci: AR_0 , statistica t a erorii de predicție, CAR și statistica ei t .
 3. Reprezentați pe același grafic cele două traiectorii CAR , cu benzi de $\pm 1,96$ SE.
 4. Care bancă a fost lovită mai tare față de volatilitatea ei obișnuită? Folosiți t -ul erorii de predicție pentru AR_0 .
- **De raportat:** cele două tabele și graficul; revenirea poate însemna o reacție exagerată sau o politică parțial retrasă: ce informații date ar deosebi cele două explicații?

Pachetul 6: B5 și B5 extins

B5 [Propus]: BET-TR în lei și în euro

- **Enunț:** indicele BET-TR (închidere) și cursul EUR/RON al BNR S_t (lei pentru un euro), prețuri aliniate pe zilele comune, 5 ian. 2015 – 18 sep. 2026 (model: conversia din B1 șase active)
 1. Converteți: $P_t^{EUR} = P_t^{RON} / S_t$; calculați pas cu pas o dată (13 aug. 2025).
 2. Arătați că $r_t^{EUR} = r_t^{RON} - \Delta s_t$, cu $s_t = \ln S_t$.
 3. Calculați CAGR și volatilitatea (q observat) în lei și în euro, precum și corelația dintre r^{RON} și Δs .
 4. Reprezentați ambele traiectorii ale averii.
- **De raportat:** cele două CAGR, cele două volatilități, corelația, graficul; pentru un investitor în euro, deprecierea leului reduce randamentul, adaugă risc sau ambele?

B5 extins [Propus]: este semnificativ efectul valutar?

- **Enunț:** datele din B5, $n = 2\,925$ de randamente pe zilele comune, $q = n/Y$ din prețurile aliniate de la B5 (modele: B1 extins, B7)
 1. Arătați că

$$\text{Var}(r^{EUR}) = \text{Var}(r^{RON}) + \text{Var}(\Delta s) - 2 \text{Cov}(r^{RON}, \Delta s);$$
 raportați fiecare termen anualizat ($\times q$) în unități zecimale, apoi extrageți radicalul.
 2. Regresați r_t^{RON} pe o constantă și Δs_t cu erori standard HAC Newey–West (Newey & West (1987), $L = 8$): panta, t , p ; adăugați un interval bootstrap staționar de 95% pentru corelație.
 3. Estimați drift-ul log anual al leului, $q \times$ media lui Δs_t , cu SE HAC, t și intervalul de 95%.
 4. Arătați că

$$\ln(1 + \text{CAGR}^{RON}) - \ln(1 + \text{CAGR}^{EUR}) = \ln(S_{\text{final}}/S_{\text{inițial}})/Y,$$
 adică drift-ul de la cerința 3.
- **De raportat:** termenii varianței, regresia, drift-ul cu intervalul lui; ipoteza testată la cerința 3 este „drift log zero”: se distinge de zero diferența dintre cele două CAGR-uri calculate de voi la B5?

Pachetul 6: B6 extins

B6 extins [Propus]: filtrul Hampel standard

- **Enunț:** filtrul Hampel standard, [Pearson, Neuvo, Astola & Gabbouj \(2016\)](#), secțiunea 2, ec. (1)–(4): fereastra $x_{k-K}, \dots, x_{k+K}$ cu $K = 5$ (11 cotații, ca în secțiunile 5–6 ale lucrării); m_k = mediana ferestrei, $S_k = 1,4826 \times \text{median}_j |x_{k-j} - m_k|$; x_k este marcată dacă $|x_k - m_k| > t S_k$; primele și ultimele 5 cotații nu sînt testate.
Date: EUR/RON BNR 2015–2026 (reper curat) și seria de piață din B6 audit complet, zilele lucrătoare
- 1. Calculați pas cu pas fereastra din jurul datei de 13 aug. 2025: m_k , MAD, S_k și $|x_k - m_k|/S_k$; pentru ce t este marcată cotația?
- 2. Pe seria BNR: ponderea ferestrelor implozive ($S_k = 0$, secțiunea 3 a lucrării) și ponderea zilelor marcate pe grila lucrării $t = 0; 0,5; \dots; 21$ (secțiunea 5.2), cu un grafic; comparați pragul din ec. (8) cu cel mai mare $|x_k - m_k|/S_k$.
- 3. Pe seria de piață, aplicați $t = 2$ (secțiunea 6) și $t = 5$ (secțiunea 5.2): marcările, suprapunerea cu cele 11 marcări și 9 erori din B6 audit complet, volatilitatea după eliminarea marcărilor.
- **De raportat:** fereastra calculată, cele două ponderi cu graficul, marcările și volatilitatea; de ce MAD și 1,4826; ce se întâmplă într-o fereastră implozivă; poate un prag să înlocuiască verificarea cu BNR din B6 audit complet?

Pachetul 7: B4 și B4 extins

B4 [Propus]: creșterea stablecoin-urilor

- **Enunț:** DefiLlama, valoarea zilnică totală în circulație a stablecoin-urilor legate de USD, în mld. USD (împărțită la 10^9), 31 dec. 2019 – 18 sep. 2026 (modele: A3–A4, B1)
 1. Extrageți valorile de la sfârșitul anilor 2019–2025 și creșterea pe an calendaristic; raportați separat 2026, creșterea de la începutul anului până pe 18 sep.
 2. Găsiți maximul din 2022 și minimul următor până la sfârșitul lui 2023, cu datele lor, și variația de la maxim la minim.
 3. Calculați CAGR între 1 ian. 2020 și 18 sep. 2026 cu valorile exacte de capăt.
 4. Reprezentați seria cu valorile de sfârșit de an.
- **De raportat:** tabelul de sfârșit de an, maximul, minimul și variația, CAGR, graficul; oferta este o valoare în USD aflată în circulație, nu un preț: poate scădea fără ca vreun token să fie ars?

B4 extins [Propus]: a schimbat crahul Terra regimul de creștere?

- **Enunț:** $g_t = \Delta \ln(\text{oferta}_t)$, 2 ian. 2020 – 18 sep. 2026, $n = 2452$; crahul Terra pe 9 mai 2022 (model: regresia OLS și testul t din B7)
 1. Dată cunoscută ([Chow \(1960\)](#)): $g_t = a + b D_t + e_t$, $D_t = 1\{t \geq 9 \text{ mai } 2022\}$, SE HAC ([Newey & West \(1987\)](#), $L = 8$); raportați a , b (anualizate $\times 365$) și t .
 2. Dată necunoscută ([Andrews \(1993\)](#)): statistica Wald HAC pentru fiecare dată din zona centrală de 70% (3 ian. 2021 – 15 sep. 2025); comparați maximul ei cu 8,85, valoarea critică de 5% pentru această trunchiere.
 3. Data prin cele mai mici pătrate: data care minimizează suma pătratelor reziduurilor; reprezentați profilurile Wald și SSR.
 4. Verificați varianța reziduurilor înainte și după dată și spuneți dacă intervalul pentru data rupturii din [Bai \(1997\)](#), care presupune aceeași distribuție a erorilor în ambele regimuri, poate fi raportat.
- **De raportat:** a , b , t , cele două date și profilurile; încetinirea a început odată cu Terra? Ruptura este în nivelul sau în drift-ul ofertei?

Pachetul 8: C3, laborator de investiții pasive

C3 [Propus]: investițiile pasive și elasticitatea cererii

- **Enunț:** rămîne valabilă rata de transmitere de o treime din [Haddad, Huebner & Loualiche \(2025\)](#) (studiul de caz din curs) dacă se schimbă cine trece la administrare pasivă? Acțiunea k , investorul activ i ; w_{ik} = acțiunile deținute de i ca fracție din toate acțiunile lui k ; ponderea activă $A_k = \sum_i w_{ik}$; elasticitatea proprie $\bar{\mathcal{E}}_{ik}$; χ : intensitatea răspunsului strategic la elasticitatea celorlalți investitori din acțiune (Tabelul 2, rîndul 1: $\chi = 2,97$); elasticitatea agregată (nota 53) $\mathcal{E}_{agg,k} = \sum_i w_{ik} \bar{\mathcal{E}}_{ik} / (1 + \chi A_k)$
1. Doi investitori, $w_1 = 0,4$ cu $\bar{\mathcal{E}}_1 = 1$, $w_2 = 0,3$ cu $\bar{\mathcal{E}}_2 = 3$, $\chi = 2,97$; 0,1 din acțiuni trec la administrare pasivă: calculați $\mathcal{E}_{agg}$ înainte și după trecere, cînd ambii reduc proporțional, cînd trece investorul 2 (elastic), cînd trece investorul 1.
 2. Comparați fiecare $\Delta \log \mathcal{E}_{agg} / \Delta \log A$ cu $1/(1 + \chi A) = 0,325$.
 3. FRED BOGZ1LM563064100Q (acțiunile deținute de ETF-uri) raportat la BOGZ1LM893064105Q (toate sectoarele), trim. I 2001 – trim. II 2026: ponderea ETF-urilor în trim. I 2001, trim. IV 2020, trim. II 2026 și variațiile implicate, cu 81% activi și rata de transmitere 0,33.

4. Simulare (cod de pornire în notebook, `numpy.random.default_rng(seed)`): 2000 de acțiuni, $A_k \sim U(0,55; 0,85)$; 40 de investitori activi pe acțiune, cu $w_{ik} = A_k \times$ ponderi cu distribuția Dirichlet(1, ..., 1), uniformă pe simplexul de dimensiune 40; $\bar{\mathcal{E}}_{ik}$ log-Normal cu mediana 1,6 și abaterea standard a logaritmului 0,6; $\chi = 2,97$.
 5. În fiecare acțiune, o fracție $f_k \sim U(0; 0,2)$ din A_k trece la administrare pasivă după trei reguli: toți proporțional; întîi cei mai elastici; întîi cei mai puțin elastici (dețineri întregi, în ordine, ultima parțial, pînă la $f_k A_k$).
 6. Regresați $\Delta \log \mathcal{E}_{agg,k}$ pe o constantă și $\Delta \log A_k$ (Tabelul 4, coloana 1).
 7. Repetați pentru semințele 1–10, cu aceleași extrageri pentru toate regulile, și pentru $\chi = 0$.
- **De raportat:** ponderile ETF și variațiile implicate; un tabel al pantelor (media, minimul, maximul pe semințe; variabilitatea simulării, nu un interval de încredere de eșantionare) lîngă media lui $1/(1 + \chi A_k)$; de ce panta este o treime doar cînd cei care trec sînt reprezentativi și cum trebuie citit 11% din lucrare dacă au trecut primii cei mai elastici investitori?

Bibliografie (1/2)

- ▣ Andrews, D.W.K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. *Econometrica*, 61(4), 821–856.
- ▣ Bai, J. (1997). Estimation of a change point in multiple regression models. *Review of Economics and Statistics*, 79(4), 551–563.
- ▣ Boehmer, E., Musumeci, J., Poulsen, A.B. (1991). Event-study methodology under conditions of event-induced variance. *Journal of Financial Economics*, 30(2), 253–272.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*, cap. 4 al cărții, Event-Study Analysis. Princeton University Press.
- ▣ Chow, G.C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. *Econometrica*, 28(3), 591–605.
- ▣ Epps, T.W. (1979). Comovements in stock prices in the very short run. *Journal of the American Statistical Association*, 74, 291–298.
- ▣ Fisher, R.A. (1915). Frequency distribution of the values of the correlation coefficient in samples from an indefinitely large population. *Biometrika*, 10(4), 507–521.
- ▣ Forbes, K.J., Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction* (ed. a 5-a). Springer.
- ▣ Haddad, V., Huebner, P., Loualiche, E. (2025). How competitive is the stock market? Theory, evidence from portfolios, and implications for the rise of passive investing. *American Economic Review*, 115(3), 975–1018.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). [Understanding cryptocurrencies](#). *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- ▣ Koijen, R.S.J., Yogo, M. (2019). [A demand system approach to asset pricing](#). *Journal of Political Economy*, 127(4), 1475–1515.
- ▣ Lo, A.W. (2002). [The statistics of Sharpe ratios](#). *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- ▣ MacKinlay, A.C. (1997). [Event studies in economics and finance](#). *Journal of Economic Literature*, 35(1), 13–39.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). [A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix](#). *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Opdyke, J.D. (2007). [Comparing Sharpe ratios: so where are the p-values?](#) *Journal of Asset Management*, 8(5), 308–336.
- ▣ Pearson, R.K., Neuvo, Y., Astola, J., Gabbouj, M. (2016). [Generalized Hampel filters](#). *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing*, 2016, articolul 87.
- ▣ Politis, D.N., Romano, J.P. (1994). [The stationary bootstrap](#). *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.
- ▣ Scholes, M., Williams, J. (1977). [Estimating betas from nonsynchronous data](#). *Journal of Financial Economics*, 5(3), 309–327.
- ▣ Date publice: [FRED](#), [cursurile de referință BNR](#), [DefiLlama](#)
- ▣ Cod și date: github.com/danpele/MFM