



Statistica piețelor financiare

Capitolul 2: Distribuții clasice și fapte stilizate



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- ▣ ARCH: AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CDF: Cumulative Distribution Function (funcția de repartiție)
- ▣ CLT: Central Limit Theorem (teorema limită centrală)
- ▣ EGARCH: Exponential GARCH (GARCH exponențial)
- ▣ ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GJR-GARCH: Glosten–Jagannathan–Runkle GARCH (GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle)
- ▣ JB: Jarque–Bera (test) (testul de normalitate Jarque–Bera)
- ▣ LB: Ljung–Box (test) (testul de autocorelație Ljung–Box)
- ▣ MLE: Maximum Likelihood Estimation (estimarea prin metoda verosimilității maxime)
- ▣ OMV: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale (grupul OMV))
- ▣ OUG: Ordonanță de Urgență a Guvernului
- ▣ QQ: Quantile–Quantile (plot) (graficul cuantilă–cuantilă)
- ▣ SFE: Statistics of Financial Markets, Exercises (Quantlet collection of the textbook) (colecția de Quantlet-uri a manualului Statistics of Financial Markets)

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** este distribuția Normală un model bun pentru randamentele zilnice și cum arată randamentele reale?
 - ▶ răspunsul decide cum măsurăm riscul, cum evaluăm opțiunile și cum testăm ipoteze
- ▣ **Traseul** capitolului
 - ▶ distribuția Normală, distribuția lognormală, CLT
 - ▶ momente, testul Jarque–Bera și QQ plots
 - ▶ distribuția Student- t ca primă alternativă cu cozi groase
 - ▶ șase fapte stilizate ale randamentelor [Cont \(2001\)](#)
- ▣ Date reale, 2010–2026: S&P 500, DAX, BET, Bitcoin și patru acțiuni BVB (SNP, BRD, SNN, SNG)

Ce veți ști la final

- ▣ Calculați probabilități și cuantile ale distribuțiilor Normală și lognormală
- ▣ Enunțați CLT și spuneți când funcționează aproximarea Normală
- ▣ Estimați asimetria și excesul de aplatizare și testați normalitatea cu testul Jarque–Bera
- ▣ Citiți un QQ plot și estimați o distribuție Student- t prin metoda verosimilității maxime
- ▣ Verificați șase fapte stilizate pe o serie de randamente și explicați ce înseamnă fiecare pentru un model

Bibliografie și instrumente

- Manual: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), *Statistics of Financial Markets*, ed. a 5-a, secț. 3.3 (Normală și lognormală) și secț. 11.2 (fapte stilizate)
 - ▶ exerciții rezolvate: [Borak, Härdle & López-Cabrera \(2013\)](#)
- Complementar: [Tsay \(2010\)](#), secț. 1.2 (proprietățile distribuției randamentelor); [Cont \(2001\)](#)
- Quantlet-urile Python ale capitolului: [Quantlets/Ch_02](#)
 - ▶ portate din Quantlet-urile SFE ale manualului (SFEDaxReturnDistribution, SFElognormal, SFEclt, SFENormalApprox1–4)
 - ▶ fiecare grafic din aceste slide-uri are legătură către Quantlet-ul care îl desenează
- Notebook-ul cursului: [deschideți în Google Colab](#)
- Curs video: [!\[\]\(2824aab9645d9fab95bae27ff6828dab_img.jpg\) Tukey's g- and h- transformations](#)

O zi care n-ar trebui să existe

- ▣ 16 martie 2020: S&P 500 a scăzut cu $-12,8\%$ (randament logaritmic) într-o singură zi
- ▣ Abaterea standard zilnică 2010–2026: $1,08\%$, deci căderea a fost de $-11,8$ abateri standard
 - ▶ în distribuția Normală, probabilitatea unei asemenea zile este de circa 2×10^{-32}
 - ▶ adică mai rar de o dată la 10^{29} ani de tranzacționare
- ▣ Totuși, asemenea zile au loc: 19 octombrie 1987, octombrie 2008, martie 2020, aprilie 2025
- ▣ Concluzia: greșit este modelul, nu piața

Întrebare pentru sală: cît de des apare o zi de 4 sigma?

- ▣ O zi de k sigma: un randament zilnic aflat la mai mult de k abateri standard de medie
- ▣ Ce credeți? Dacă randamentele zilnice ar fi Normale, cît de des ar apărea o zi de 4 sigma?
- ▣ Ce credeți? Cît de des apare în S&P 500 din 2010?
- ▣ Răspuns
 - ▶ distribuția Normală: o dată la 15 787 de zile de tranzacționare, cam o dată la 63 de ani
 - ▶ S&P 500: 28 de zile din 4 201, o dată la 150 de zile, cam 1,7 pe an

La ce folosește o distribuție

- ▣ **Risc:** probabilitatea unei pierderi mari
 - ▶ VaR 1% (Value at Risk, valoarea expusă la risc): pierderea depășită cu probabilitatea 1%; o cuantilă a distribuției (Capitolul 10)
- ▣ **Evaluare:** formula Black–Scholes presupune prețuri lognormale
 - ▶ cozile mai groase fac mai valoroase opțiunile mult în afara banilor
- ▣ **Inferență:** testele t și intervalele de încredere presupun normalitate (aproximativă)
 - ▶ cozile groase fac erorile standard nesigure în eșantioane mici
- ▣ O distribuție greșită dă cifre greșite, chiar cu date perfecte

Modelul de referință al capitolului

- Prețul P_t , randamentul logaritmic $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$, deci $P_t = P_{t-1}e^{r_t} = P_0e^{r_1+\dots+r_t}$
 - ▶ notație: **i.i.d.** = independente și identic distribuite
- **Modelul de referință:** r_t i.i.d. $N(\mu, \sigma^2)$
 - ▶ prețurile urmează un mers aleator geometric; P_t este lognormal [Osborne \(1959\)](#)
 - ▶ primul model de acest fel, pentru variațiile aritmetice ale prețurilor: [Bachelier \(1900\)](#)
- Capitolul testează fiecare parte a modelului de referință: Normală? identic distribuite? independente?
- Manual: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), secț. 3.3 și secț. 11.2

Carl Friedrich Gauss și distribuția Normală

- ▣ De Moivre (1733) a găsit curba clopot ca limită a probabilităților binomiale
- ▣ Gauss (1809) a folosit-o pentru erorile observațiilor astronomice și a dedus din ea metoda celor mai mici pătrate
- ▣ Laplace (1810) a demonstrat o primă versiune a teoremei limită centrale
- ▣ De aici și celălalt nume: distribuția **gaussiană**
- ▣ În finanțe a devenit modelul implicit al randamentelor, pentru că sumele de variabile Normale rămân Normale



Carl Friedrich Gauss (1777–1855)

Portret: [Christian Albrecht Jensen \(1840\)](#); domeniu public; [Wikimedia Commons](#)


Definiție

- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ are **PDF** (probability density function, densitatea de probabilitate)
 - ▶ $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}$
 - ▶ doi parametri: media μ (poziția) și varianța σ^2 (împrăștierea)
- **Distribuția Normală standard:** $Z = (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$
 - ▶ **CDF** (cumulative distribution function, funcția de repartiție) este $\Phi(z) = P(Z \leq z)$, fără formă închisă; tabele sau software
- Probabilitățile lui X vin din Z : $P(X \leq x) = \Phi((x - \mu)/\sigma)$
- Cuantila de ordin α : $x_\alpha = \mu + \sigma z_\alpha$, cu $z_{0,01} = -2,33$, $z_{0,05} = -1,64$

Proprietăți folosite în finanțe

- ▣ Simetrică în jurul lui μ : media = mediana = modul
- ▣ Asimetria 0 și applatizarea 3 (definite în secțiunea 5)
- ▣ **Închisă la adunare**: dacă $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ și $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ sînt independente, atunci $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$
 - ▶ randamentul logaritmic pe h zile în modelul de referință: $r_t(h) \sim N(h\mu, h\sigma^2)$
 - ▶ volatilitatea crește cu $\sqrt{h}$: regula rădăcinii pătrate a timpului din [Capitolul 1](#)
- ▣ Combinațiile liniare ale unor randamente comun Normale sînt Normale: randamentele portofoliilor rămîn Normale
- ▣ Complet descrisă de două cifre: cunoscînd μ și σ , cunoaștem orice probabilitate

Regula 68–95–99,7



- În 1, 2 și 3 abateri standard: 68,27%, 95,45% și 99,73% din probabilitate
- În afara a 3 abateri standard: o zi din 370; cozile distribuției Normale scad ca $e^{-z^2/2}$, foarte repede

Cît de rare sînt mișcările mari în distribuția Normală?

k	$P(Z > k)$	o dată la ... zile de tranzacționare	o dată la ... ani
1	0,3173	3	0,013
2	0,0455	22	0,087
3	$2,7 \times 10^{-3}$	370	1,5
4	$6,3 \times 10^{-5}$	15 787	63
5	$5,7 \times 10^{-7}$	1 744 278	6 922
6	$2,0 \times 10^{-9}$	506 797 346	2 011 101

- ▣ Anii sînt calculați cu 252 de zile de tranzacționare pe an
- ▣ Fiecare abatere standard în plus face o mișcare mai rară, cu un factor între 7 și 291
- ▣ O zi de 6 sigma n-ar trebui să apară în toată istoria burselor

Exemplu lucrat: pierderile mari ale S&P 500

- S&P 500, 2010–2026: $n = 4\,201$ randamente logaritmice zilnice, media 0,045%, abaterea standard 1,08%
- O pierdere mai mare de 3%: $z = (-3 - 0,045)/1,08 = -2,81$
 - ▶ distribuția Normală: $\Phi(-2,81) = 0,25\%$, deci 10,5 zile așteptate
 - ▶ observat: 49 de zile
- O pierdere mai mare de 5%: $z = -4,65$
 - ▶ distribuția Normală: $6,9 \times 10^{-3}$ zile așteptate; observat: 8 zile
- BET: 13 zile sub -5% , față de $5,1 \times 10^{-3}$ așteptate
- Distribuția Normală subestimează pierderile mari cu ordine de mărime

Recapitulare: Distribuția Normală

- ▣ Doi parametri, simetrică, închisă la adunare, volatilitatea crește cu $\sqrt{h}$
- ▣ Cozile ei sînt subțiri: o zi de 4 sigma o dată la 63 de ani
- ▣ Randamentele reale au mult mai multe mișcări mari decît permite ea


De la randamente logaritmice Normale la prețuri lognormale

- ▣ O variabilă pozitivă Y este **lognormală**, $Y \sim LN(m, s^2)$, dacă $\ln Y \sim N(m, s^2)$
- ▣ Densitatea: $f(y) = \frac{1}{ys\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln y - m)^2}{2s^2}\right)$, $y > 0$
- ▣ În modelul de referință, $\ln(P_T/P_0) = r_1 + \dots + r_T \sim N(T\mu, T\sigma^2)$
 - ▶ deci $P_T/P_0 \sim LN(T\mu, T\sigma^2)$ [Osborne \(1959\)](#)
- ▣ De ce prețuri lognormale și nu Normale?
 - ▶ prețurile nu pot fi negative; un preț Normal ar putea fi
 - ▶ randamentul simplu $R = e^r - 1 > -1$: nu puteți pierde mai mult decât ați investit
- ▣ Manual: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), secț. 3.3; modelul Black–Scholes se bazează pe ea

Media, mediana și modul

- Dacă $Y \sim LN(m, s^2)$:
- mediana e^m ; modul e^{m-s^2} ; media $E[Y] = e^{m+s^2/2}$
 - ▶ întotdeauna modul < mediana < media: o coadă dreaptă lungă (asimetrie pozitivă)
- Varianța: $\text{Var}(Y) = (e^{s^2} - 1) e^{2m+s^2}$
- Media vine din $E[e^X] = e^{m+s^2/2}$ pentru $X \sim N(m, s^2)$ (Seminarul 2 o deduce)
 - ▶ termenul $s^2/2$ în plus este volatility drag din [Capitolul 1](#), văzut din partea cealaltă
- Care contează? Mediana este rezultatul unui investitor tipic; media este trasă în sus de câteva traiectorii foarte bune

Densități lognormale (SFElognormal)



- $m = 0$: mediana este 1 pentru toate cele trei curbe; liniile punctate marchează mediile
- $s = 0,25$: media 1,03, modul 0,94, aproape simetrică; $s = 1$: media 1,65, modul 0,37, asimetria 6,18
- Orizonturi lungi sau volatilitate mare: distanța dintre medie și mediană crește

Exemplu lucrat: 100 de lei în BET

- BET, 2010–2026: randamentul logaritmic mediu anual $\mu = 11,6\%$ și volatilitatea $\sigma = 16,9\%$ (momentele zilnice $\times 251$ și $\sqrt{251}$)
- După un an, $P_1/P_0 \sim LN(\mu, \sigma^2)$
 - ▶ mediana $100e^\mu = 112,3$; media $100e^{\mu+\sigma^2/2} = 113,9$
 - ▶ probabilitatea unei pierderi $\Phi(-\mu/\sigma) = 24,8\%$; cuantila de 5% $100e^{\mu-1,645\sigma} = 84,9$
- După 10 ani, $P_{10}/P_0 \sim LN(10\mu, 10\sigma^2)$
 - ▶ mediana 317,7; media 366,8; probabilitatea unei pierderi 1,5%; cuantila de 5% 131,6
- Probabilitatea unei pierderi scade cu orizontul, dar cel mai prost caz de 5% rămîne mult sub 100
- Atenție: aceste cifre moștenesc toate slăbiciunile modelului Normal al randamentelor logaritmice

Recapitulare: Distribuția lognormală

- ▣ Randamente logaritmice Normale $\Rightarrow$ prețuri lognormale: pozitive, asimetrice la dreapta
- ▣ Mediana e^m sub media $e^{m+s^2/2}$: diferența este volatility drag
- ▣ Raportați mediana și o cuantilă joasă, nu doar media

Tabla lui Galton

- Francis Galton (1889): bilele cad printre rînduri de cuie și sar la stînga sau la dreapta cu probabilitatea $1/2$
- Poziția finală a unei bile este o **sumă** de multe șocuri mici independente
- Grămezile formează o curbă clopot: probabilități binomiale apropiate de densitatea Normală
- Același argument a fost folosit pentru randamente: un randament zilnic este suma multor variații mici de preț din timpul zilei




O tablă Galton după căderea bilelor

Foto: Klaus-Dieter Keller (2010); domeniu public; [Wikimedia Commons](#)

Teorema limită centrală


- ▣ **CLT** (Lindeberg–Lévy): $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. cu media μ și varianța finită σ^2
 - ▶ $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0, 1)$ când $n \rightarrow \infty$
 - ▶ echivalent, suma $X_1 + \dots + X_n$ este aproximativ $N(n\mu, n\sigma^2)$
- ▣ Trei condiții
 - ▶ independență; aceeași distribuție; varianță finită
- ▣ Cît de repede? Eroarea scade ca $1/\sqrt{n}$ și crește cu asimetria lui X (marginea Berry–Esseen)
- ▣ Explică de ce distribuția Normală apare peste tot și de ce mediile de selecție au intervale de încredere Normale

CLT la lucru (SFEclt)



- Media standardizată a n extrageri Bernoulli(0,2) (o variabilă asimetrică), 20 000 de simulări
- Ponderea peste 1,96: 5,8% pentru $n = 5$, 2,7% pentru $n = 30$, 2,8% pentru $n = 300$; distribuția Normală: 2,5%
- Asimetria mediei, $(1 - 2p) / \sqrt{np(1 - p)}$: 0,67, 0,27, 0,09

Aproximarea Normală a distribuției binomiale (SFENormalApprox)



- $B(n, p) \approx N(np, np(1-p))$; cu corecția de continuitate, $P(X \leq k) \approx \Phi((k + 0,5 - np)/\sqrt{np(1-p)})$
- Cea mai mare eroare a CDF: 0,001 pentru $n = 20, p = 0,5$; 0,037 pentru $n = 20, p = 0,1$; 0,017 pentru $n = 100, p = 0,1$
- Regulă practică: aproximarea este bună când $np(1-p)$ este mare (cel puțin circa 9)

Întrebare pentru sală: face CLT randamentele zilnice Normale?

- Un randament logaritmico zilnic este suma a mii de randamente logaritmice din timpul zilei
- **Ce credeți?** Ar trebui atunci randamentele zilnice să fie aproape Normale?
- **Răspuns:** nu neapărat; fiecare condiție a CLT poate fi încălcată
 - ▶ dependență: zilele calme și cele agitate vin în grupuri (secțiunea 8)
 - ▶ distribuție schimbătoare: volatilitatea diferă de la o zi la alta
 - ▶ varianță infinită: Mandelbrot (1963) a propus-o pentru prețurile bumbacului (Capitolul 3, distribuții α -stabile)
- Datele decid: secțiunile următoare măsoară cât de departe sînt randamentele de distribuția Normală


Recapitulare: Teorema limită centrală

- ▣ Sumele multor termeni i.i.d. cu varianță finită sînt aproximativ Normale
- ▣ Convergența este mai lentă pentru variabile asimetrice; $np(1 - p) \geq 9$ pentru distribuția binomială
- ▣ Randamentele pot încălca independența, identitatea distribuției sau varianța finită

Patru momente

- ▣ Media $\mu = E[X]$; varianța $\sigma^2 = E[(X - \mu)^2]$
- ▣ **Asimetria** (skewness): $\gamma_1 = E[(X - \mu)^3]/\sigma^3$
 - ▶ $\gamma_1 < 0$: o coadă stîngă mai lungă, pierderile mari mai frecvente decît câștigurile mari
- ▣ **Aplatizarea** (kurtosis): $\gamma_2 = E[(X - \mu)^4]/\sigma^4$; distribuția Normală: $\gamma_2 = 3$
 - ▶ **excesul de aplatizare** $\gamma_2 - 3$: pozitiv înseamnă cozi groase și un centru înalt și îngust (distribuție leptocurtică)
- ▣ Ambele sînt fără unitate de măsură: descriu forma, nu poziția sau scara
- ▣ Puterile a patra fac aplatizarea foarte sensibilă la cîteva zile extreme

Cum arată asimetria și aplatizarea



- Stînga: aceeași medie și varianță; curba Student- $t(5)$ (secțiunea 7) are exces de aplatizare 6: mai multă masă în centru și în cozi, mai puțină în umeri
- Dreapta: densități skew-Normal cu asimetria $\pm 0,85$; curba punctată este distribuția Normală

Momentele de selecție


- ▣ Momentele centrate de selecție: $m_k = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (r_t - \bar{r})^k$
- ▣ Asimetria de selecție $S = m_3/m_2^{3/2}$; excesul de aplatizare de selecție $K = m_4/m_2^2 - 3$
- ▣ Dacă datele sînt i.i.d. Normale: $S \approx N(0, 6/n)$ și $K \approx N(0, 24/n)$
 - ▶ cu $n = 4\,201$: erorile standard $\sqrt{6/n} = 0,038$ și $\sqrt{24/n} = 0,076$
- ▣ Aceste erori standard sînt valabile doar în ipoteza de normalitate; pentru date cu cozi groase sînt mult prea mici (Seminarul 2, B1)
- ▣ Exerciții din manual: [Borak, Härdle & López-Cabrera \(2013\)](#)

Randamente logaritmice zilnice: momente, 2010–2026

Seria	din	n	Media %	Ab. std. %	Asim.	Exces apl.	Min %
S&P 500	2010	4 201	0,045	1,08	−0,61	13,5	−12,8
DAX	2010	4 244	0,034	1,22	−0,45	7,4	−13,1
BET	2010	4 186	0,046	1,07	−0,98	17,9	−11,9
Bitcoin	2014	4 384	0,118	3,49	−0,70	12,0	−46,5
OMV Petrom (SNP)	2010	3 815	0,076	1,62	−0,54	8,9	−15,8
BRD	2010	3 771	0,044	1,66	−0,38	7,3	−18,2
Nuclearelectrica (SNN)	2013	2 911	0,099	1,52	0,27	5,1	−9,4
Romgaz (SNG)	2013	2 909	0,090	1,40	−0,34	5,3	−11,0

- Toate seriile au exces de aplatizare între 5,1 (SNN) și 17,9 (BET): departe de 0
- Toate seriile, cu excepția SNN, au asimetrie negativă
- Cele mai proaste zile: S&P 500 pe 16 martie 2020, BET pe 19 decembrie 2018 (OUG 114, taxa pe activele bancare), Bitcoin pe 12 martie 2020

Randamentele DAX vs densitatea Normală (SFEDaxReturnDistribution)



- Estimatorul nucleu al densității (o histogramă netezită) față de densitatea Normală cu aceeași medie și abatere standard
- Centrul: vîrf 0,46 față de 0,33; 76,8% din zile în interiorul unei abateri standard, față de 68,3% pentru distribuția Normală
- Cozile (scară logaritmică): la -6% densitatea estimată este de 439 de ori densitatea Normală

Verificați datele înainte de a măsura cozile

- Banca Transilvania (TLV), 27–31 mai 2016: prețul de închidere scade de la 2,83 la 2,09 lei, data ex a unei emisiuni de acțiuni gratuite
- Prețul ajustat din datele noastre: 3,60, apoi 3,10, apoi 3,81
 - ▶ randamente logaritmice $-15,0\%$ și $+20,5\%$ în două zile consecutive: ajustarea a fost aplicată cu o zi mai târziu
- Excesul de aplatizare al TLV, 2010–2026: 17,5 cu aceste două zile, 13,5 fără ele
- Două zile greșite din mii schimbă aplatizarea cu o treime: de aceea TLV nu apare în tabelele acestui capitol
- Regula din [Capitolul 1](#): listați cele mai mari mișcări și verificați-le pe fiecare, mai ales perechile de salturi de semn opus

Recapitulare: Momente

- ▣ Asimetria măsoară lipsa simetriei, excesul de aplatizare măsoară greutatea cozilor față de distribuția Normală
- ▣ Randamentele zilnice: în general asimetrie negativă și exces de aplatizare între 5 și 18
- ▣ Aplatizarea este determinată de câteva zile: verificați-le înainte de a o crede

Testul Jarque–Bera

- ▣ H_0 : datele sînt Normale, deci asimetria = 0 și excesul de aplatizare = 0
- ▣ Statistica **JB** Jarque & Bera (1980), Jarque & Bera (1987): $JB = \frac{n}{6} \left(S^2 + \frac{K^2}{4} \right)$
 - ▶ suma a două statistici standardizate la pătrat: $(S/\sqrt{6/n})^2 + (K/\sqrt{24/n})^2$
- ▣ În ipoteza H_0 și pentru n mare: $JB \sim \chi^2(2)$; respingem la 5% dacă $JB > 5,99$
- ▣ Simplu, folosește doar două momente și este testul standard raportat în finanțele empirice

Exemplu lucrat: Jarque–Bera pentru S&P 500

- ▣ $n = 4\,201$, $S = -0,61$, $K = 13,5$
- ▣ $JB = 700,2 \times (0,367 + 45,5) = 32\,113$
- ▣ Valoarea critică 5,99: normalitatea este respinsă; valoarea p este zero la orice număr de zecimale
- ▣ Termenul aplatizării domină: aproape tot JB vine din $K^2/4$
- ▣ JB pentru celelalte serii: BET 56 762, DAX 9 909, Bitcoin 26 482, SNN 3 174
 - ▶ toate respinse la orice nivel uzual


Ce nu vă spune Jarque–Bera

- Cu mii de observații respinge chiar și abateri foarte mici
 - ▶ raportați mărimea lui S și K , nu doar valoarea p
- Presupune date i.i.d.; cu volatility clustering erorile lui standard sînt prea mici
 - ▶ S&P 500: intervalul de 95% pentru K în ipoteza de normalitate: $[13,34, 13,64]$; intervalul bootstrap: $[6,7, 20,6]$ (Seminarul 2, B1)
- O respingere spune că datele nu sînt Normale; nu spune ce distribuție urmează
- Alte teste (Kolmogorov–Smirnov, Anderson–Darling) compară întreaga CDF: Capitolul 6

QQ plots

- Un **QQ plot** (quantile–quantile plot, graficul cuantilă–cuantilă) compară cuantilele empirice cu cele ale unui model [Wilk & Gnanadesikan \(1968\)](#)
 - ▶ ordonați datele: $r_{(1)} \leq r_{(2)} \leq \dots \leq r_{(n)}$
 - ▶ reprezentați $r_{(i)}$ în funcție de cuantila modelului $F^{-1}((i - 0,5)/n)$
- Cum se citește
 - ▶ puncte pe prima bisectoare: modelul se potrivește
 - ▶ o formă de S, capătul de jos sub dreaptă și cel de sus deasupra: cozi mai groase decât ale modelului
 - ▶ doar un capăt curbat: asimetrie
- Spre deosebire de JB, arată **unde** greșește modelul: centru, umeri sau cozi

QQ plots față de distribuția Normală



- Randamente standardizate față de cuantilele $N(0,1)$: toate trei se depărtează de dreaptă la ambele capete
- S&P 500: cel mai mic randament standardizat $-11,8$, unde cuantila Normală este $-3,7$; BET: $-11,2$ față de $-3,7$
- Coadă de jos se curbează mai mult decât cea de sus: asimetrie negativă

Recapitulare: Testarea normalității

- ▣ JB combină asimetria și aplatizarea; respinge normalitatea pentru toate seriile
- ▣ Raportați mărimea abaterii; erorile standard din teoria Normală sînt prea mici
- ▣ QQ plots arată unde greșește modelul: aici, în ambele cozi

„Student”: William Sealy Gosset

- ▣ Chimist și berar la Guinness, Dublin, lucra cu eșantioane mici de orz și hamei
- ▣ Fabrica de bere nu își lăsa angajații să publice sub propriul nume: a semnat „Student” [Student \(1908\)](#)
- ▣ A dedus distribuția lui $(\bar{X} - \mu)/(s/\sqrt{n})$ pentru date Normale: distribuția t
- ▣ În finanțe este folosită din alt motiv: cozile ei sînt mai groase decît cele ale distribuției Normale [Praetz \(1972\)](#), [Blattberg & Gonedes \(1974\)](#)



William Sealy Gosset (1876–1937)

Foto: autor necunoscut (1908); domeniu public;

[Wikimedia Commons](#)


Definiție

- ▣ $T = Z/\sqrt{V/\nu}$, cu $Z \sim N(0, 1)$ independentă de $V \sim \chi^2(\nu)$: $T \sim t(\nu)$
 - ▶ $\nu > 0$: **gradele de libertate**, care controlează cozile
- ▣ Densitatea: $f(x) = \frac{\Gamma((\nu+1)/2)}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma(\nu/2)} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2}$
- ▣ Versiunea cu poziție și scară pentru randamente: $r = m + s T$, cu poziția m , scara s și ν
- ▣ Când $\nu \rightarrow \infty$, $t(\nu) \rightarrow N(0, 1)$: distribuția Normală este un caz limită

Momente și cozi

- ▣ Media 0 dacă $\nu > 1$; varianța $\nu/(\nu - 2)$ dacă $\nu > 2$; excesul de applatizare $6/(\nu - 4)$ dacă $\nu > 4$
- ▣ Momentele de ordin ν și mai mare sînt infinite
 - ▶ $\nu \leq 4$: applatizare infinită; $\nu \leq 2$: varianță infinită
- ▣ **Cozi de tip putere**: $P(|T| > x) \approx c x^{-\nu}$ pentru x mare
 - ▶ coada Normală scade ca $e^{-x^2/2}$, mult mai repede decît orice putere
 - ▶ ν este și **indicele de coadă**, estimat direct în [Capitolul 5](#)
- ▣ Pentru comparația cu distribuția Normală la aceeași varianță, folosiți $T \sqrt{(\nu - 2)/\nu}$, care are varianța 1

Densități Student- t cu varianța 1



- ▣ ν mai mic: centru mai înalt și cozi mai groase; pe scara logaritmică, cozile Normale scad ca o parabolă
- ▣ $P(|X| > 4)$ la varianța 1: $t(3)$ 0,62%, $t(5)$ 0,36%, $t(10)$ 0,12%, distribuția Normală 0,0063%
- ▣ Cu $\nu = 5$, o zi de 4 sigma este de 56 de ori mai probabilă decât în distribuția Normală

Estimarea unei distribuții Student- t prin verosimilitate maximă


- ▣ **MLE** (maximum likelihood estimation, estimarea prin verosimilitate maximă): alegem (ν, m, s) care maximizează log-verosimilitatea
 - ▶ $\ell(\nu, m, s) = \sum_{t=1}^n \ln f((r_t - m)/s; \nu) - n \ln s$
 - ▶ fără formă închisă: un optimizator numeric (`scipy.stats.t.fit` în notebook)
- ▣ **AIC** (Akaike information criterion, criteriul informațional Akaike) [Akaike \(1974\)](#): $AIC = 2k - 2\ell$
 - ▶ k = numărul de parametri (2 pentru distribuția Normală, 3 pentru t); câștigă AIC mai mic
 - ▶ $\Delta AIC = AIC_{\text{Normal}} - AIC_t > 0$ favorizează t
- ▣ Primele dovezi pentru prețurile acțiunilor: [Praetz \(1972\)](#), [Blattberg & Gonedes \(1974\)](#)

Student- t estimată: gradele de libertate, 2010–2026


Seria	$\hat{\nu}$	JB	ΔAIC
S&P 500	2,78	32 113	1213
DAX	3,31	9 909	739
BET	2,96	56 762	1454
Bitcoin	2,23	26 482	1335
OMV Petrom (SNP)	3,79	12 832	679
BRD	4,67	8 370	478
Nuclearelectrica (SNN)	3,08	3 174	541
Romgaz (SNG)	3,40	3 415	482

- Toate valorile $\hat{\nu}$ între 2,23 (Bitcoin) și 4,67 (BRD)
- $\hat{\nu} < 4$ pentru 7 din cele 8 serii: modelul estimat are aplatizare infinită
- ΔAIC este cel puțin 478: t învinge distribuția Normală peste tot

 SFM_ch2_student_t_fit

S&P 500: distribuția Normală vs Student- t 

- Scara liniară: t ($\hat{\nu} = 2,78$) urmează centrul înalt pe care distribuția Normală îl ratează
- Scara logaritmică: densitatea Normală se prăbușește dincolo de $\pm 4\%$; t urmează cozile observate

QQ plots față de Student- t estimată

- ☐ Centrul și cozile moderate se află acum pe dreaptă
- ☐ Extremele: t estimată așteaptă minime mai mici decât cele observate: S&P 500 $-15,8\%$ față de $-12,8\%$; Bitcoin $-85,0\%$ față de $-46,5\%$
- ☐ Cu $\hat{\nu}$ apropiat de 2, modelul depășește cuantilele cele mai extreme

Ce ratează încă distribuția Student- t

- ▣ **Simetria:** t nu poate reproduce asimetria negativă
 - ▶ există distribuții t asimetrice; depășesc acest capitol
- ▣ **Independența:** un model t i.i.d. nu are volatility clustering
 - ▶ modelele GARCH cu erori t le combină pe amândouă [Bollerslev \(1987\)](#) (Capitolul 9)
- ▣ **Un singur indice de coadă:** un singur ν pentru ambele cozi și pentru centru
 - ▶ teoria valorilor extreme modelează fiecare coadă separat ([Capitolul 5](#))
- ▣ Rămîne cel mai simplu model cu cozi groase și o îmbunătățire mare față de distribuția Normală

Recapitulare: Student- t

- Un parametru în plus, ν , controlează cozile; cozi de tip putere, distribuția Normală când $\nu \rightarrow \infty$
- $\hat{\nu}$ estimat între 2 și 5 pentru randamentele zilnice; AIC preferă clar t
- Ratează asimetria și volatility clustering

Ce este un fapt stilizat?

- ▣ Un **fapt stilizat**: o proprietate statistică comună multor active, piețe și perioade [Cont \(2001\)](#)
- ▣ Calitativ, nu exact: „cozi groase”, nu „ $\nu = 3,2$ ”
- ▣ Rama Cont enumeră unsprezece; noi verificăm șase pe datele noastre
- ▣ Un model bun al randamentelor trebuie să le reproducă; modelul de referință i.i.d. Normal le ratează pe cele mai multe
- ▣ Dovezi mai vechi: [Mandelbrot \(1963\)](#), [Fama \(1965\)](#)



Rama Cont

Foto: [Renate Schmid \(2012\)](#); CC BY-SA 2.0 DE;

[Wikimedia Commons](#)

Şase fapte stilizate


- ▣ 1. **Cozi groase:** mişcările mari sînt mult mai frecvente decît în distribuţia Normală
- ▣ 2. **Gaussianitate agregată** (aggregational Gaussianity): randamentele pe orizonturi mai lungi sînt mai apropiate de distribuţia Normală
- ▣ 3. **Absenţa autocorelaţiei liniare:** randamentele trecute aproape nu prezic randamentele viitoare
- ▣ 4. **Volatility clustering:** mişcările mari urmează mişcărilor mari, de orice semn
- ▣ 5. **Efectul de levier** (leverage effect): scăderile cresc volatilitatea viitoare mai mult decît creşterile
- ▣ 6. **Asimetria câştig/pierdere:** pierderile mari sînt mai mari şi mai frecvente decît câştigurile mari

Faptul 1: cozi groase, numărate

Seria	n	$> 3\sigma$	$> 4\sigma$	$> 5\sigma$	$> 6\sigma$	p (Poisson, 4σ)
S&P 500	4 201	62	28	12	8	2×10^{-46}
DAX	4 244	56	20	5	4	1×10^{-30}
BET	4 186	70	28	16	11	2×10^{-46}
Bitcoin	4 384	80	29	10	4	6×10^{-48}
Normală, $n = 4\,201$		11,34	0,27	$2,4 \times 10^{-3}$	$8,3 \times 10^{-6}$	

- $> k\sigma$: numărul zilelor cu $|r_t - \bar{r}| > k\sigma$; ultimul rând: numărul așteptat în distribuția Normală
- p : probabilitatea a cel puțin atâtea zile de 4 sigma dacă numărul Normal este Poisson cu media $n \times 6,3 \times 10^{-5}$
- S&P 500: de 105 de ori mai multe zile de 4 sigma decît permite distribuția Normală

Faptul 1: zile de 4 sigma pe toate piețele




- Zilele observate dincolo de 4 abateri standard (scară logaritmică) față de așteptarea Normală de 0,18–0,28 zile
- Indici și Bitcoin: o zi de 4 sigma la fiecare 150–212 zile; acțiunile BVB: între 10 și 17 zile în total
- Cu o distribuție Student-*t* estimată, numerele așteptate sînt apropiate de cele observate: S&P 500 34,9, BET 28,1 (Seminarul 2, B4)

Faptul 2: gaussianitatea agregată


- Randamentul logaritmic pe h zile: $r_t(h) = r_t + r_{t-1} + \dots + r_{t-h+1}$, luat pe blocuri care nu se suprapun
 - ▶ dacă se aplică CLT, distribuția lui $r_t(h)$ se apropie de distribuția Normală cînd h crește
- Faptul stilizat: forma se schimbă cu orizontul; nu este aceeași la toate scările de timp [Cont \(2001\)](#)
- Prețul plătit: mai puține observații
 - ▶ S&P 500, 17 ani: 4 201 randamente zilnice, 200 de randamente lunare și 66 de randamente trimestriale
 - ▶ estimările aplatizării pe orizonturi lungi sînt foarte zgomotoase

Faptul 2: aplatizarea scade cu orizontul



- Excesul de aplatizare, zilnic → lunar → trimestrial: S&P 500 13,5 → 3,7 → 1,5; BET 17,9 → 8,3 → 0,6; Bitcoin 12,0 → 1,0 → 0,7
- Scăderea este lentă și nemonotonă: o singură lună de crăh (martie 2020) domină un eșantion de 200 de luni
- Randamentele trimestriale: JB nu mai respinge normalitatea pentru BET ($p = 0,07$) și Bitcoin ($p = 0,22$)

Faptul 2: S&P 500, QQ plots zilnice vs lunare




- Randamentele lunare sînt mult mai aproape de dreaptă decît cele zilnice
- Dar randamentele lunare nu sînt Normale: asimetria $-1,18$, excesul de aplatizare $3,7$, $n = 200$; punctul cel mai de jos este martie 2020
- De ce atît de lent? Volatility clustering face randamentele zilnice dependente, ceea ce încetinește CLT

Faptul 3: absența autocorelației liniare

- ▣ **ACF** (autocorrelation function, funcția de autocorelație): $\rho(h) = \text{Corr}(r_t, r_{t-h})$, $h = 1, 2, \dots$
 - ▶ versiunea de selecție $\hat{\rho}(h) = \sum_t (r_t - \bar{r})(r_{t-h} - \bar{r}) / \sum_t (r_t - \bar{r})^2$
 - ▶ pentru date i.i.d., $\hat{\rho}(h) \approx N(0, 1/n)$: banda de 95% $\pm 1,96/\sqrt{n}$
- ▣ Testul **LB** (Ljung–Box) [Ljung & Box \(1978\)](#) pentru $H_0: \rho(1) = \dots = \rho(m) = 0$
 - ▶ $Q(m) = n(n+2) \sum_{h=1}^m \hat{\rho}(h)^2 / (n-h) \sim \chi^2(m)$; pentru $m = 10$, respingem dacă $Q > 18,3$
- ▣ De ce lipsește? Dacă randamentele ar fi previzibile, investitorii ar exploata acest lucru pînă cînd previzibilitatea dispăre (piețe eficiente, Capitolul 7)

Faptele 3 și 4: ACF a randamentelor și a randamentelor absolute



- Stînga: randamentele; majoritatea autocorelațiilor sînt în bandă sau aproape de ea; S&P 500 $\hat{\rho}(1) = -0,11$, BET 0,03, Bitcoin $-0,02$
- Dreapta: randamentele absolute; toate pozitive, cu scădere lentă: S&P 500 0,31 la decalajul 1, 0,26 la decalajul 10, 0,05 la decalajul 50

Faptul 3: mică, dar nu întotdeauna zero

- ▣ Ljung–Box $Q(10)$ pentru randamente: S&P 500 199, BET 46, Bitcoin 20; valoarea critică 18,3
 - ▶ formal, o parte din autocorelație este semnificativă
- ▣ Două motive să nu supra-interprețăm
 - ▶ valorile sînt mici economic: $|\hat{\rho}(h)| \leq 0,11$, deci se explică cel mult 1,2% din varianță
 - ▶ banda $\pm 1,96/\sqrt{n}$ presupune randamente i.i.d.; cu volatility clustering este prea îngustă, deci „semnificativ” apare prea des
- ▣ Valoarea S&P 500 la decalajul 1 vine mai ales din martie 2020, cînd căderile mari și revenirile au alternat: fără 20 februarie–30 aprilie 2020, $\hat{\rho}(1) = -0,04$
- ▣ Teste robuste ale previzibilității (rapoarte ale varianțelor): Capitolul 7

Faptul 4: volatility clustering


- „Variațiile mari tind să fie urmate de variații mari, de orice semn, iar variațiile mici de variații mici” [Mandelbrot \(1963\)](#)
- Semnul randamentului de mâine este imprevizibil; mărimea lui nu este
- Dovezi: ACF a lui $|r_t|$ pozitivă pe 50 de decalaje
 - ▶ Ljung–Box $Q(10)$ pentru $|r_t|$: S&P 500 3859, BET 2120, Bitcoin 1086
- Deci randamentele sînt necorelate, dar **nu independente**
- Modele: ARCH și GARCH (Capitolul 9)



Benoit Mandelbrot (1924–2010)

Foto: Rama (2007); CC BY-SA 2.0 fr; [Wikimedia Commons](#)

Faptul 4: perioade calme și perioade agitate




- Perioade agitate: 2010–2011 (criza datoriilor din zona euro), decembrie 2018 pentru BET, martie 2020 peste tot, aprilie 2025
- Între ele, ani calmi: volatilitatea unei zile depinde de perioada în care cade

Faptul 5: efectul de levier


- Măsura: $L(k) = \text{Corr}(r_t, |r_{t+k}|)$, $k = 1, 2, \dots$
 - ▶ $L(k) < 0$: o scădere azi este urmată de mișcări mai mari decât o creștere de aceeași mărime
- Explicația prin efectul de levier financiar [Christie \(1982\)](#)
 - ▶ când prețul acțiunii scade, raportul datorii/capital propriu crește, deci capitalul devine mai riscant
- O a doua explicație, volatility feedback: o volatilitate așteptată mai mare crește randamentul cerut și scade prețurile
- Modele cu răspuns asimetric (EGARCH, GJR-GARCH): Capitolul 9

Faptul 5: corelațiile de levier



- Indicii bursieri: $L(k) < 0$ pentru majoritatea primelor 20 de decalaje; media $L(1..5)$: S&P 500 $-0,12$, DAX $-0,10$, BET $-0,11$
- Bitcoin: $L(1) = -0,07$, apoi în interiorul benzii: în spatele Bitcoin nu există o firmă cu datorii, deci mecanismul de levier lipsește

Faptul 6: asimetria câștig/pierdere



- Stînga: o pierdere de 1 din 100 este mai mare decît un câștig de 1 din 100 pentru indici: BET 3,45% față de 2,66%, S&P 500 3,15% față de 2,61%
- Dreapta: zile sub -4σ față de peste $+4\sigma$: BET 20 față de 8, S&P 500 16 față de 12, Bitcoin 18 față de 11
- Excepție: SNN, cu asimetrie pozitivă și cuantila din dreapta mai mare

Şase fapte, opt serii

Seria	Exces apl.	Exces apl., 21 de zile	$\hat{\rho}_r(1)$	$\hat{\rho}_{ r }(10)$	$\tilde{L}(1..5)$	$ q_{0,01} /q_{0,99}$
S&P 500	13,5	3,7	-0,11	0,26	-0,12	1,21
DAX	7,4	5,5	0,01	0,16	-0,10	1,12
BET	17,9	8,3	0,03	0,20	-0,11	1,30
Bitcoin	12,0	1,0	-0,02	0,12	-0,03	1,07
OMV Petrom (SNP)	8,9	3,3	-0,02	0,13	-0,03	1,04
BRD	7,3	0,4	0,03	0,11	-0,05	1,07
Nuclearelectrica (SNN)	5,1	2,3	0,09	0,08	-0,03	0,88
Romgaz (SNG)	5,3	1,4	0,07	0,08	-0,04	1,02

- Faptele 1, 3 și 4 sînt valabile pentru toate seriile; faptul 2, cu zgomot; faptele 5 și 6, pentru indici și majoritatea acțiunilor BVB, slab sau deloc pentru Bitcoin și SNN
- O comparație a distribuțiilor randamentelor criptomonedelor și ale activelor tradiționale: [Pele et al. \(2023\)](#)

 SFM_ch2_cont_stylised_facts

Ce înseamnă faptele pentru modele


Model	1	2	3	4	5	6
i.i.d. Normal	–	trivial	✓	–	–	–
i.i.d. Student- t	✓	✓	✓	–	–	–
GARCH cu erori t (cap. 9)	✓	✓	✓	✓	–	–
EGARCH, GJR-GARCH (cap. 9)	✓	✓	✓	✓	✓	(✓)

- ▣ Coloanele: cele șase fapte în ordinea din această secțiune; (✓): doar pentru randamente pe mai multe zile, dacă erorile nu sînt asimetrice
- ▣ Măsurile de risc (VaR 1%, ES 2,5%, Capitolul 10) moștenesc calitatea modelului: un VaR Normal este prea mic în crize
- ▣ O măsură înrudită a riscului de coadă, entropia informațională: [Pele, Lazar & Dufour \(2017\)](#)

Recapitulare: Fapte stilizate

- ▣ Cozi groase: zile de 4 sigma la cîteva luni, în loc de o dată la cîteva decenii
- ▣ Randamentele sînt aproape necorelate, dar mărimea lor este puternic autocorelată
- ▣ Orizonturile mai lungi sînt mai aproape de distribuția Normală, încet
- ▣ Indicii bursieri: scăderile cresc volatilitatea, iar pierderile sînt mai mari decît cîștigurile

O întrebare deschisă: devin mai subțiri cozile Bitcoin?



- Pe măsură ce o piață se maturizează (mai mulți participanți, futures, ETF-uri), cozile ei s-ar putea subția
- Bitcoin, 2015–2026: $\hat{\nu}$ anual între 1,5 și 5,1; corelația rangurilor cu anul 0,63 ($p = 0,03$)
- De ce este deschisă: 12 estimări anuale zgomotoase, un an (2020, exces de aplatizare 51) dominat de o singură zi
- Instrumentele AI pot accelera un astfel de studiu; nu înlocuiesc verificarea lui Wang et al. (2023)

 SFM_ch2_tails_by_year

Cum ar putea ajuta AI

- ▣ **Literatura:** găsirea studiilor despre indicii de coadă ai activelor cripto și rezumarea metodelor lor
- ▣ **Cod:** o primă versiune a estimărilor pe ferestre mobile pentru ν și excesul de aplatizare
- ▣ **Robustețe:** propunerea altor ferestre, altor măsuri ale cozilor ([Capitolul 5](#)), altor active cripto
- ▣ Exemplu de prompt
 - Write a Python function that fits a Student-t distribution to daily Bitcoin log returns on rolling 365-day windows and returns the degrees of freedom with a bootstrap 95% interval.

Ce trebuie verificat

- ▣ Datele: aceeași coloană de preț și același calendar pentru fiecare an? erori printre cele mai mari mișcări?
- ▣ Estimarea: a convers optimizatorul? $\hat{\nu}$ aproape de 2 sau peste 30 trebuie privit de două ori
- ▣ Inferența: un $\hat{\nu}$ pe an este zgomotos; raportați intervale, nu doar estimări punctuale
- ▣ Volatility clustering: cozi anuale mai subțiri pot însemna doar ani mai calmi (Capitolul 9)
- ▣ Referințele: fiecare lucrare citată trebuie să existe; verificați DOI-ul

Sămînță de proiect

- ▣ **Întrebarea:** se subțiază cozile activelor crypto pe măsură ce piețele lor se maturizează?
 - ▶ date: Bitcoin, Ethereum și Solana din datele cursului; S&P 500 ca reper
- ▣ Pași
 - ▶ estimați $\hat{\nu}$ și excesul de aplatizare pe ferestre mobile de un an, cu intervale bootstrap
 - ▶ testați existența unui trend; repetați pe randamente împărțite la o volatilitate mobilă
 - ▶ comparați numărul zilelor de 4 sigma pe an cu S&P 500
- ▣ Rezultat: un tabel, un grafic și un paragraf despre ce pot și ce nu pot arăta datele
- ▣ Declarați orice folosire a AI și listați erorile AI pe care le-ați corectat

Idei principale

- ▣ Distribuția Normală: doi parametri, cozi subțiri, închisă la adunare
- ▣ Randamentele logaritmice Normale dau prețuri lognormale; media peste mediană cu volatility drag
- ▣ CLT are nevoie de independență, aceeași distribuție și varianță finită
- ▣ Randamentele zilnice: în general asimetrie negativă, exces de aplatizare 5–18, JB respinge, QQ plots se curbează la ambele capete
- ▣ Student- t cu $\hat{\nu}$ între 2 și 5 se potrivește mult mai bine cozilor, dar este simetrică și i.i.d.
- ▣ Șase fapte stilizate: cozi groase, gaussianitate agregată, fără autocorelație liniară, volatility clustering, efect de levier, asimetrie câștig/pierdere

Formule de reținut

Mărimea	Formula
Densitatea Normală	$f(x) = (\sigma\sqrt{2\pi})^{-1} \exp(- (x - \mu)^2 / (2\sigma^2))$
Momentele lognormale	mediana e^m , media $e^{m+s^2/2}$
CLT	$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)/\sigma \xrightarrow{d} N(0, 1)$
Asimetria, excesul de aplatizare	$S = m_3/m_2^{3/2}$, $K = m_4/m_2^2 - 3$
Jarque–Bera	$JB = \frac{n}{6}(S^2 + K^2/4) \sim \chi^2(2)$
Student- $t(\nu)$	varianța $\nu/(\nu - 2)$, excesul de aplatizare $6/(\nu - 4)$
AIC	$2k - 2\ell$
ACF, Ljung–Box	$\hat{\rho}(h)$, $Q(m) = n(n+2) \sum_{h=1}^m \hat{\rho}(h)^2 / (n-h)$
Levier	$L(k) = \text{Corr}(r_t, r_{t+k})$

Verificați-vă

- ▣ **Întrebare:** randamentele zilnice sînt $N(0,05\%, 1\%^2)$; la cîte abateri standard se află o zi de -3% ?
▶ **Răspuns:** $z = (-3 - 0,05)/1 = -3,05$
- ▣ **Întrebare:** $n = 2500$, $S = -0,5$, $K = 6$; cît este JB?
▶ **Răspuns:** $\frac{2500}{6}(0,25 + 9) = 3854$; normalitatea este respinsă
- ▣ **Întrebare:** un randament logaritmic anual este $N(5\%, 20\%^2)$; care sînt mediana și media valorii a 100 investiți după un an?
▶ **Răspuns:** mediana $100e^{0,05} = 105,1$, media $100e^{0,05+0,02} = 107,3$
- ▣ Urmează: [Capitolul 3](#), distribuții α -stabile

Bibliografie (1/2)

- Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 19(6), 716–723.
- Bachelier, L. (1900). Théorie de la spéculation. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 17, 21–86.
- Blattberg, R.C., Gonedes, N.J. (1974). A comparison of the stable and Student distributions as statistical models for stock prices. *Journal of Business*, 47(2), 244–280.
- Bollerslev, T. (1987). A conditionally heteroskedastic time series model for speculative prices and rates of return. *Review of Economics and Statistics*, 69(3), 542–547.
- Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- Christie, A.A. (1982). The stochastic behavior of common stock variances: value, leverage and interest rate effects. *Journal of Financial Economics*, 10(4), 407–432.
- Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- Fama, E.F. (1965). The behavior of stock-market prices. *Journal of Business*, 38(1), 34–105.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- Jarque, C.M., Bera, A.K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. *Economics Letters*, 6(3), 255–259.
- Jarque, C.M., Bera, A.K. (1987). A test for normality of observations and regression residuals. *International Statistical Review*, 55(2), 163–172.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Ljung, G.M., Box, G.E.P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- ▣ Mandelbrot, B. (1963). The variation of certain speculative prices. *Journal of Business*, 36(4), 394–419.
- ▣ Osborne, M.F.M. (1959). Brownian motion in the stock market. *Operations Research*, 7(2), 145–173.
- ▣ Pele, D.T., Lazar, E., Dufour, A. (2017). Information entropy and measures of market risk. *Entropy*, 19(5), 226.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets? *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Praetz, P.D. (1972). The distribution of share price changes. *Journal of Business*, 45(1), 49–55.
- ▣ Student (1908). The probable error of a mean. *Biometrika*, 6(1), 1–25.
- ▣ Tsay, R.S. (2010). *Analysis of Financial Time Series*, 3rd ed. Wiley.
- ▣ Wang, H., Fu, T., Du, Y., Gao, W., et al. (2023). Scientific discovery in the age of artificial intelligence. *Nature*, 620, 47–60.
- ▣ Wilk, M.B., Gnanadesikan, R. (1968). Probability plotting methods for the analysis of data. *Biometrika*, 55(1), 1–17.