



Statistica piețelor financiare

Seminarul 7: Ipoteza piețelor eficiente, mersul aleator și testele VR



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- ADF: Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat)
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BIST: Borsa İstanbul (BIST 100 index) (Bursa din Istanbul (indicele BIST 100))
- BUX: Budapesti Értéktőzsde index (indicele Bursei din Budapesta)
- BVB: Bursa de Valori București
- CD: Chow–Denning (multiple variance-ratio test) (testul multiplu Chow–Denning pentru raportul varianțelor)
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) (furnizor de date de piață)
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- KPSS: Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (stationarity test) (testul de staționaritate Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin)
- LB: Ljung–Box (test) (testul de autocorelație Ljung–Box)
- OMV: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale, grupul OMV)
- PP: Phillips–Perron (unit-root test) (testul de rădăcină unitară Phillips–Perron)
- PX: Prague Stock Exchange index (index Burzy cenných papírů Praha) (indicele Bursei din Praga)
- RW1: Random Walk 1 (i.i.d. increments) (mersul aleator 1 (creșteri i.i.d.))
- RW2: Random Walk 2 (independent increments) (mersul aleator 2 (creșteri independente))
- RW3: Random Walk 3 (uncorrelated increments) (mersul aleator 3 (creșteri necorelate))
- VR: Variance Ratio (raportul varianțelor)
- WIG20: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cum testăm dacă prețurile trecute anticipează randamentele viitoare, fără să ne păcălim singuri?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 7: secțiunea „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
 - ▶ Partea A: rapoarte ale varianțelor, statistici Ljung–Box, testul runs și decizii Dickey–Fuller, pe hîrtie
 - ▶ Partea B: teste de autocorelație, de rădăcină unitară și variance ratio pe S&P 500, DAX, BET, Bitcoin, acțiuni BVB și piețe emergente, fiecare cu o întrebare de interpretare
 - ▶ Partea C: o întrebare deschisă pentru proiect și un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Nu se predă nimic: seminarul este pentru exercițiu; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	regula rădăcinii pătrate a timpului și rapoarte ale varianțelor din autocorelații	Rezolvat,	A1
A3, A4	statisticile Box–Pierce și Ljung–Box, pas cu pas	Propus	A3
A5, A6	testul runs pe un șir de semne	Rezolvat,	A5
A7, A8	decizii ADF și KPSS din rezultatele unei regresii	Propus	A7
B1, B2	ACF, Ljung–Box și teste robuste, testul runs: S&P 500; BET, Bitcoin, acțiuni BVB	Rezolvat,	B1
B3, B4	ADF, Phillips–Perron și KPSS pe prețuri și randamente: DAX; BET, Bitcoin, TLV	Propus	B3
B5, B6	testele variance ratio: S&P 500; cinci piețe emergente	Rezolvat,	B5
C1, C2	a devenit BET mai eficient? ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1, B5

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați voi, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Prețul folosit	Perioada
S&P 500, DAX	EODHD	close	1990–2026
BET	EODHD	close	1997–2026
Bitcoin	EODHD	close, 7 zile pe săptămână	2014–2026
Banca Transilvania (TLV), OMV Petrom (SNP)	EODHD	adjusted close	2010–2026
WIG20, BUX, PX, BIST 100	EODHD	close	ultimii zece ani

- Randamente logaritmice zilnice în %: $r_t = 100 (\ln P_t - \ln P_{t-1})$; weekendurile și închiderile repetate din zilele libere se elimină (cu excepția Bitcoin); ultima zi este 18 septembrie 2026
- TLV: zilele de 30 și 31 mai 2016 se elimină (o ajustare de preț aplicată cu o zi mai târziu, [Capitolul 2](#))
- În notebook: `returns('sp500')`, `log_price('dax')`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/5): eficiență și mers aleator

- ▣ **Eficiența în formă slabă Fama (1970):** prețurile trecute nu pot fi folosite pentru a obține randamente peste randamentul care plătește riscul
 - ▶ randamentele în exces sînt o **diferență de martingal**: $E[r_{t+1} - \mu \mid \text{trecut}] = 0$
- ▣ **Prețul logaritmic $p_t = \ln P_t$, mers aleator:** $p_t = \mu + p_{t-1} + \varepsilon_t$, deci $r_t = \mu + \varepsilon_t$ **Campbell, Lo & MacKinlay (1997)**
 - ▶ **RW1:** ε_t i.i.d. (independente și identic distribuite); **RW2:** independente; **RW3:** necorelate
 - ▶ $\text{RW1} \Rightarrow \text{RW2} \Rightarrow \text{RW3}$; gruparea volatilității este permisă doar de RW3 și de martingal
- ▣ În oricare dintre ele, $\text{Var}(r_t(q)) = q\sigma^2$ pentru randamentul pe q zile $r_t(q) = r_t + \dots + r_{t-q+1}$
 - ▶ „regula rădăcinii pătrate a timpului”: $\text{sd}(r_t(q)) = \sigma\sqrt{q}$

Noțiuni necesare azi (2/5): ACF și teste portmanteau

- ▣ **ACF** (autocorrelation function, funcția de autocorelație) de selecție, cu $e_t = r_t - \bar{r}$:

$$\hat{\rho}(k) = \sum_{t>k} e_t e_{t-k} / \sum_t e_t^2$$
 - ▶ randamente i.i.d.: $\text{Var}(\hat{\rho}(k)) \approx 1/T$, banda de 95% $\pm 1,96/\sqrt{T}$
 - ▶ robust (gruparea volatilității): $\text{Var}(\hat{\rho}(k)) \approx \hat{\delta}(k)/T$, $\hat{\delta}(k) = T \sum_t e_t^2 e_{t-k}^2 / (\sum_t e_t^2)^2$ Lo & MacKinlay (1988)
- ▣ $H_0: \rho(1) = \dots = \rho(m) = 0$; trei statistici, fiecare $\approx \chi^2(m)$ în ipoteza ei nulă
 - ▶ Box–Pierce $Q_{BP} = T \sum_{k=1}^m \hat{\rho}(k)^2$ Box & Pierce (1970); **LB** (Ljung–Box, testul Ljung–Box)
 $Q_{LB} = T(T+2) \sum_{k=1}^m \hat{\rho}(k)^2 / (T-k)$ Ljung & Box (1978)
 - ▶ $\tilde{Q}$ robust = $\sum_{k=1}^m T \hat{\rho}(k)^2 / \hat{\delta}(k)$ Escanciano & Lobato (2009): valabil pentru un martingal cu gruparea volatilității
- ▣ Valori critice de 5%: $\chi_{0,95}^2(3) = 7,81$, $\chi_{0,95}^2(5) = 11,07$, $\chi_{0,95}^2(10) = 18,31$

Noțiuni necesare azi (3/5): testul runs

- ▣ Un **run** (secvență): un șir maximal de randamente cu același semn [Wald & Wolfowitz \(1940\)](#); randamentele nule se elimină
 - ▶ $++---+-$: 4 secvențe; $n_1 = 3$ pozitive, $n_2 = 4$ negative, $n = n_1 + n_2 = 7$
- ▣ Dacă semnele sînt independente:
 - ▶ $E[R] = \frac{2n_1n_2}{n} + 1$, $\text{Var}(R) = \frac{2n_1n_2(2n_1n_2 - n)}{n^2(n - 1)}$
 - ▶ $z = (R - E[R]) / \sqrt{\text{Var}(R)} \approx N(0, 1)$; respingem la 5% dacă $|z| > 1,96$
- ▣ Interpretarea lui z
 - ▶ $z < 0$: prea puține secvențe, semnele persistă (dependență pozitivă, tendințe)
 - ▶ $z > 0$: prea multe secvențe, semnele alternează (dependență negativă, reveniri)
- ▣ Doar semnele: testul ignoră mărimea randamentelor, deci cozile groase și volatilitatea nu îl afectează

Noțiuni necesare azi (4/5): rădăcini unitare

- $I(0)$: staționar (medie și varianță constante, șocurile se sting); $I(1)$: prima diferență este $I(0)$; un mers aleator este $I(1)$
- Regresia Dickey–Fuller [Dickey & Fuller \(1979\)](#): $\Delta p_t = c [+ bt] + \gamma p_{t-1} [+ \sum_j \delta_j \Delta p_{t-j}] + \varepsilon_t$
 - ▶ $H_0: \gamma = 0$ (rădăcină unitară); $\tau = \hat{\gamma}/\text{SE}(\hat{\gamma})$; respingem dacă $\tau < \text{valoarea critică}$
 - ▶ valori critice de 5% [MacKinnon \(1996\)](#): $-2,86$ (constantă), $-3,41$ (constantă și tendință); nu $-1,645$
 - ▶ **ADF** (augmented Dickey–Fuller): cu diferențele decalate [Said & Dickey \(1984\)](#); **PP** (Phillips–Perron): fără ele, cu τ corectat [Phillips & Perron \(1988\)](#)
- **KPSS** [Kwiatkowski et al. \(1992\)](#): H_0 staționaritate; respingem dacă statistica depășește $0,463$ (constantă) sau $0,146$ (tendință)
 - ▶ ADF nu respinge + KPSS respinge: $I(1)$; ADF respinge + KPSS nu: $I(0)$; altfel: neconcludent

Noțiuni necesare azi (5/5): rapoarte ale varianțelor

- ▣ **VR** (variance ratio, raportul varianțelor): $VR(q) = \frac{\text{Var}(r_t(q))}{q \text{Var}(r_t)} = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} \left(1 - \frac{k}{q}\right) \rho(k)$ [Lo & MacKinlay \(1988\)](#)
 - ▶ = 1: mers aleator; > 1: momentum (autocorelație pozitivă); < 1: mean reversion (revenire la medie, negativă)
- ▣ Teste cu T randamente
 - ▶ i.i.d.: $Z(q) = (\widehat{VR}(q) - 1) / \sqrt{2(2q - 1)(q - 1)/(3qT)}$
 - ▶ robust: $Z^*(q) = (\widehat{VR}(q) - 1) / \sqrt{\hat{\theta}(q)/T}$, $\hat{\theta}(q) = \sum_{j=1}^{q-1} [2(q - j)/q]^2 \hat{\delta}(j)$
- ▣ Mai multe orizonturi: **CD** (Chow–Denning) = $\max_i |Z^*(q_i)|$ [Chow & Denning \(1993\)](#); valoarea critică de 5% 2,49 pentru $m = 4$ orizonturi
 - ▶ aceeași regulă pentru m piețe: fiecare test la nivelul $1 - 0,95^{1/m}$ (Šidák)
 - ▶ VR automat [Choi \(1999\)](#): orizontul este ales din date; p-valoarea prin wild bootstrap [Kim \(2009\)](#)

A1: rapoarte ale varianțelor din autocorelații [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Randamentele zilnice au abaterea standard $\sigma = 1,2\%$.
- ▣ 1. Pentru RW1, calculați abaterea standard a randamentului pe 5 zile și pe 20 de zile.
- ▣ 2. Presupunem $\rho(1) = 0,10$, $\rho(2) = 0,05$ și $\rho(k) = 0$ pentru $k \geq 3$; calculați $VR(2)$ și $VR(5)$.
- ▣ 3. Tratați-le ca estimări din $T = 2500$ de randamente i.i.d. și calculați $Z(2)$ și $Z(5)$.
- ▣ 4. Calculați abaterea standard pe 5 zile implicată de $VR(5)$.
- ▣ Raportați: două abateri standard, două VR, două Z și o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $1,2\sqrt{5} = 2,68\%$; $1,2\sqrt{20} = 5,37\%$
- ▣ 2. $VR(2) = 1 + 0,10 = 1,10$; $VR(5) = 1 + 2(0,8 \times 0,10 + 0,6 \times 0,05) = 1,220$
- ▣ 3. $\sqrt{2 \cdot 3 \cdot 1 / (6 \cdot 2500)} = 0,020$, $Z(2) = 5,00$;
 $\sqrt{2 \cdot 9 \cdot 4 / (15 \cdot 2500)} = 0,0438$, $Z(5) = 5,02$
- ▣ 4. $1,2\sqrt{5} \times 1,220 = 2,96\%$ în loc de 2,68%: momentumul face riscul săptămînal mai mare decît spune regula $\sqrt{q}$.

A2: revenire la medie la un activ volatil [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Randamente zilnice: $\sigma = 2\%$, $\rho(1) = -0,08$, $\rho(2) = 0,03$, $\rho(k) = 0$ pentru $k \geq 3$, $T = 1000$. Model: A1.
- ▣ 1. Calculați $VR(2)$ și $VR(5)$.
- ▣ 2. Calculați $Z(2)$ și $Z(5)$ și decideți la 5%.
- ▣ 3. Comparați abaterea standard pe 5 zile implicată de $VR(5)$ cu $2\sqrt{5}$.
- ▣ Raportați: două VR, două Z , două abateri standard și o frază.

A3: Box–Pierce și Ljung–Box, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- ▣ $T = 500$ de randamente zilnice;
 $\hat{\rho}(1), \dots, \hat{\rho}(5) = 0,12; -0,05; 0,04; 0,03; -0,06$.
- ▣ 1. Calculați $Q_{BP}(5)$.
- ▣ 2. Calculați $Q_{LB}(5)$.
- ▣ 3. Comparați cu $\chi^2_{0,95}(5) = 11,07$ și decideți.
- ▣ 4. Spuneți ce decalaj determină rezultatul.
- ▣ Raportați: două statistici, o decizie și o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $T\hat{\rho}(k)^2$: 7,20; 1,25; 0,80; 0,45; 1,80; $Q_{BP}(5) = 11,50$
- ▣ 2. $500 \cdot 502 \hat{\rho}(k)^2 / (500 - k)$: 7,24; 1,26; 0,81; 0,46; 1,83; $Q_{LB}(5) = 11,59$
- ▣ 3. $11,59 > 11,07$: respingem H_0 la 5% ($p = 0,041$)
- ▣ 4. Decalajul 1 dă singur 7,20 din 11,50: o singură autocorelație de 0,12 determină respingerea.

A4: Ljung–Box pe randamentele la pătrat [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ $T = 750$; ACF-ul randamentelor la pătrat: 0,25; 0,20; 0,18; 0,15; 0,12 la decalajele 1–5. Model: A3.
- ▣ 1. Calculați $Q_{LB}(5)$ și decideți la 5%.
- ▣ 2. Spuneți pe care dintre RW1, RW3 și martingal îl respinge.
- ▣ 3. Spuneți dacă eficiența în formă slabă este respinsă.
- ▣ Raportați: o statistică și două fraze.

A5: testul runs pe 20 de zile [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Semnele a 20 de randamente zilnice:
+ + - + + + - - + - - - + + - + - - + +.
- ▣ 1. Numărați n_1 , n_2 și numărul de secvențe R .
- ▣ 2. Calculați $E[R]$ și $\text{Var}(R)$.
- ▣ 3. Calculați z și decideți la 5%.
- ▣ Raportați: R , $E[R]$, z și o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $n_1 = 11$, $n_2 = 9$, $R = 11$
- ▣ 2. $E[R] = 2 \cdot 11 \cdot 9/20 + 1 = 10,90$;
 $\text{Var}(R) = 198 \cdot 178/(400 \cdot 19) = 4,64$
- ▣ 3. $z = (11 - 10,90)/2,15 = 0,05$ ($p = 0,963$): nu respingem independența.
- ▣ Cu 20 de zile testul are putere mică: doar abaterile mari pot fi detectate.

A6: un şir cu secvenţe lungi [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerinţă

- ▣ Semnele a 24 de randamente zilnice: $+++--++--++++--++--$. Model: A5.
- ▣ 1. Număraţi n_1 , n_2 şi R .
- ▣ 2. Calculaţi $E[R]$, $\text{Var}(R)$ şi z .
- ▣ 3. Decideţi la 5% şi spuneţi ce fel de dependenţă arată semnele.
- ▣ Raportaţi: R , $E[R]$, z şi o frază.

A7: ADF și KPSS din rezultatele regresiei [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Preț logaritmice, $T = 2500$:
 $\Delta p_t = 0,021 - 0,0028 p_{t-1} + 0,05 \Delta p_{t-1} + e_t$,
 $SE(\hat{\gamma}) = 0,0019$; KPSS (constantă) = 2,10.
- ▣ Randamente: $\Delta r_t = 0,03 - 0,92 r_{t-1} + e_t$, $SE(\hat{\gamma}) = 0,020$;
KPSS (constantă) = 0,09.
- ▣ 1. Calculați τ pentru preț și pentru randamente.
- ▣ 2. Decideți cu valoarea critică de 5% pentru constantă.
- ▣ 3. Decideți cu KPSS și dați ordinul de integrare al fiecărei serii.
- ▣ Raportați: doi τ , patru decizii și o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. Preț: $\tau = -0,0028/0,0019 = -1,47$; randamente:
 $\tau = -0,92/0,020 = -46,0$
- ▣ 2. Preț: $-1,47 > -2,86$: nu respingem rădăcina unitară;
randamente: $-46,0 < -2,86$: respingem
- ▣ 3. KPSS: preț 2,10 > 0,463: respingem staționaritatea;
randamente 0,09 < 0,463: nu respingem
- ▣ Prețul este $I(1)$, randamentele $I(0)$: imaginea unui mers aleator, dar încă nu o dovadă a lui.

A8: cînd testele nu sînt de acord [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar


Cerință

- ▣ Prețul logaritmic al unei acțiuni, $T = 1500$, constantă și tendință: $\hat{\gamma} = -0,0105$, $SE(\hat{\gamma}) = 0,0029$; KPSS (tendință) = 0,21. Model: A7.
- ▣ 1. Calculați τ și decideți cu valoarea critică de 5% pentru constantă și tendință.
- ▣ 2. Decideți cu KPSS.
- ▣ 3. Combinați cele două decizii și dați două motive posibile pentru conflict.
- ▣ Raportați: τ , două decizii și două fraze.

B1: autocorelația S&P 500 [Rezolvat]

- **Întrebarea:** depinde concluzia privind autocorelația randamentelor zilnice S&P 500 de faptul că ținem cont sau nu de gruparea volatilității?
- **Date:** închiderile S&P 500 din 1990, randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
 1. Desenați ACF-ul randamentelor (decalajele 1–20) cu benzile de 95% i.i.d. și robustă, și ACF-ul randamentelor la pătrat.
 2. Raportați $\hat{\rho}(1), \dots, \hat{\rho}(5)$ pentru randamente și pentru randamentele la pătrat.
 3. Calculați $Q_{LB}(10)$ și $\tilde{Q}(10)$ robust, cu p-valori, pentru randamente și pentru randamentele la pătrat.
 4. Spuneți ce ipoteză de mers aleator respinge fiecare test.
 5. Interpretare: este respinsă eficiența în formă slabă?
- **Raportați:** graficul, zece autocorelații, patru statistici cu p-valori și două fraze
- **Notebook:** secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



- ▣ $\hat{\rho}(1..5)$, randamente: $-0,079$; $-0,004$; $-0,006$; $-0,022$; $-0,016$; la pătrat: $0,311$; $0,408$; $0,250$; $0,298$; $0,308$; $T = 9\,240$
- ▣ Randamente: $Q_{LB}(10) = 90,8$ ($p < 0,001$), $\tilde{Q}(10) = 18,8$ ($p = 0,043$); la pătrat: $Q_{LB}(10) = 8015$, $\tilde{Q}(10) = 189,4$ (ambele $p < 0,001$)
- ▣ Interpretare: randamentele la pătrat resping RW1 (gruparea volatilității); testul robust respinge RW3 doar la limită, din cauza unui $\hat{\rho}(1)$ negativ mic: o revenire slabă, de scurtă durată


B2: BET, Bitcoin și două acțiuni BVB [Propus]

- **Întrebarea:** pentru care dintre BET, Bitcoin, Banca Transilvania și OMV Petrom se schimbă verdictul privind autocorelația între testul clasic și cel robust? Model: B1.
- **Date:** BET din 1997, Bitcoin din 2014, TLV și SNP din 2010 (TLV fără 30–31 mai 2016), randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
 1. Calculați $\hat{\rho}(1)$, $Q_{LB}(10)$ și $\tilde{Q}(10)$ cu p-valori pentru fiecare serie.
 2. Calculați statistica z a testului runs și p-valoarea ei pentru fiecare serie.
 3. Marcați seriile pentru care testul clasic și cel robust nu sînt de acord la 5%.
 4. Interpretare: de ce este BET diferit de celelalte trei?
- **Raportați:** un tabel și două fraze
- **Notebook:** secțiunea B2

B3: rădăcini unitare în DAX [Rezolvat]

- **Întrebarea:** care este ordinul de integrare al prețului logaritmic DAX și al randamentelor lui?
- **Date:** închiderile DAX din 1990; prețul logaritmic și randamentele logaritmice zilnice
- **Cerințe**
 1. Desenați prețul logaritmic cu o tendință liniară ajustată, precum și randamentele.
 2. Aplicați ADF (ordinul decalajelor ales prin AIC), PP și KPSS pe prețul logaritmic, cu constantă și tendință.
 3. Aplicați aceleași trei teste pe randamente, cu constantă.
 4. Interpretare: dovedește o rădăcină unitară în prețul DAX că DAX este eficient în formă slabă?
- **Raportați:** graficul, șase statistici cu p-valori și două fraze
- Notebook: secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



| | ADF | PP | KPSS |
|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| preț logaritmic (tendență) | -2,69 ($p = 0,239$) | -2,65 ($p = 0,260$) | 0,94 ($p < 0,01$) |
| randamente (constantă) | -23,30 ($p < 0,001$) | -97,40 ($p < 0,001$) | 0,04 ($p > 0,10$) |

- ADF a folosit 30 de decalaje pentru preț (AIC); PP și KPSS folosesc 38 de decalaje Bartlett; $T = 9\,288$
- Prețul: nicio respingere ADF sau PP, respingere KPSS: $I(1)$; randamentele: invers: $I(0)$
- Interpretare: nu; rădăcina unitară este necesară pentru un mers aleator, dar permite creșteri previzibile; eficiența se testează pe randamente (B1, B5)


B4: BET, Bitcoin și TLV [Propus]

- **Întrebarea:** sînt de acord cele trei teste de rădăcină unitară pentru BET, Bitcoin și Banca Transilvania? Model: B3.
- **Date:** BET din 1997, Bitcoin din 2014, TLV din 2010 (fără 30–31 mai 2016)
- **Cerințe**
 1. Aplicați ADF, PP și KPSS pe fiecare preț logaritmic (constantă și tendință) și pe fiecare serie de randamente (constantă).
 2. Clasificați fiecare serie ca $I(1)$, $I(0)$ sau neconcludentă.
 3. Pentru un caz neconcludent, propuneți o verificare care l-ar putea lămurii.
 4. Interpretare: ați tranzacționa pe baza acestei dovezi un preț TLV „care revine la medie”?
- **Raportați:** un tabel, trei clasificări și două fraze
- Notebook: secțiunea B4

B5: rapoartele varianțelor pentru S&P 500 [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** revine S&P 500 la medie pe orizonturi de 2–20 de zile, dacă ținem cont de gruparea volatilității?
- ▣ **Date:** închiderile S&P 500 din 1990, randamente logaritmice zilnice în %
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $VR(q)$, $Z(q)$ și $Z^*(q)$ pentru $q = 2, 5, 10, 20$.
 2. Calculați statistica Chow–Denning și comparați-o cu valoarea ei critică de 5%.
 3. Desenați $VR(q)$ pentru $q = 2, \dots, 40$ cu benzile de 95% i.i.d. și robustă.
 4. Interpretare: este revenirea la medie suficient de mare pentru a conta pentru un investitor?
- ▣ **Raportați:** un tabel cu douăsprezece cifre, o statistică, graficul și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B5

B5: rezolvare [Rezolvat]



| | $q = 2$ | $q = 5$ | $q = 10$ | $q = 20$ |
|----------|---------|---------|----------|----------|
| $VR(q)$ | 0,922 | 0,856 | 0,783 | 0,767 |
| $Z(q)$ | -7,54 | -6,33 | -6,17 | -4,50 |
| $Z^*(q)$ | -3,37 | -2,76 | -2,73 | -2,06 |

- $T = 9240$; Chow–Denning: $\max |Z^*| = 3,37 > 2,49$ ($p = 0,003$): respingem mersul aleator
- $Z(2)$ este de circa 2,2 ori $Z^*(2)$: ignorarea grupării volatilității exagerează dovezile
- Interpretare: semnificativă, dar mică: varianța săptămînală este circa 86% din cinci varianțe zilnice; după costurile de tranzacționare, cu greu un profit

B6: cinci piețe emergente [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** care dintre WIG20, BUX, PX, BET și BIST 100 se abate de la un mers aleator în ultimii zece ani? Model: B5.
- ▣ **Date:** randamente logaritmice zilnice de la 19 septembrie 2016 până la 18 septembrie 2026
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $VR(5)$, $Z^*(5)$ și p-valoarea lui pentru fiecare piață.
 2. Calculați p-valoarea Chow–Denning ($q = 2, 5, 10, 20$) și testul VR automat cu p-valoarea wild bootstrap.
 3. Calculați valoarea critică Šidák pentru cinci piețe testate împreună la 5%.
 4. Interpretare: ce piețe ați numi ineficiente, după ce țineți cont de testarea a cinci piețe?
- ▣ **Raportați:** un tabel, o valoare critică și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B6

C1: a devenit BET mai eficient? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** cum a evoluat previzibilitatea BET din 1997 până azi, inclusiv în jurul trecerii la Secondary Emerging de către FTSE Russell în septembrie 2020?
- ▣ **Date:** randamentele logaritmice zilnice BET din 1997; modele: B1, B5
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $VR(5)$ și $Z^*(5)$ pe ferestre mobile de 500 de zile, una la fiecare 21 de zile, și ponderea ferestrelor cu $|Z^*(5)| > 1,96$ în primii și în ultimii cinci ani.
 2. Calculați $\hat{\rho}(1)$, $VR(5)$, $Z^*(5)$ și p-valoarea Chow–Denning în 1997–2006, 2007–2016 și 2017–2026.
 3. Comparați $VR(5)$ în cei cinci ani dinainte și de după 21 septembrie 2020.
 4. Enumerați ce altceva s-a schimbat pe piața românească în același timp.
 5. Interpretare: cum ați separa aceste schimbări de efectul trecerii la noul statut?
- ▣ **Raportați:** un tabel, un grafic și un plan de proiect
- ▣ Notebook: secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI să spună dacă DAX (zilnic, din 1990) este eficient în formă slabă. Răspunsul:
- (a) ADF pe prețul logaritmic DAX dă $\tau = -2,69$, $p = 0,24$: rădăcina unitară nu este respinsă, deci DAX este eficient în formă slabă.
- (b) Ljung-Box $Q(10) = 21,83$, $p = 0,016$: randamentele DAX sînt previzibile, deci DAX nu este eficient.
- (c) Pentru randamentele la pătrat $Q(10) = 3747$: randamentele DAX nu sînt un martingal.
- (d) $VR(10) = 0,93 < 1$ arată autocorelație pozitivă (momentum) în DAX.
- (e) Pentru $RW1$, $VR(q) = 1$ la orice orizont, iar varianța randamentelor pe q zile este de q ori varianța zilnică.
- Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație spuneți dacă este corectă; dacă nu, dați afirmația corectă și, unde se poate, cifra corectă din notebook (secțiunea C2).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de cinci verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Idei de reținut

- ▣ O rădăcină unitară în prețuri este punctul de plecare, nu răspunsul: eficiența privește randamentele
- ▣ Testați martingalul cu statistici robuste ($\tilde{Q}$, Z^*): testele clasice confundă gruparea volatilității cu previzibilitatea
- ▣ $VR > 1$: momentum; $VR < 1$: revenire la medie; S&P 500 revine ușor, vechiul BET urma tendința
- ▣ Multe orizonturi sau multe piețe: folosiți Chow–Denning sau o corecție Šidák
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați ipoteza nulă a fiecărui test, semnul lui $VR - 1$ și versiunea robustă

După seminar

- ▣ Cursul 7 dezvoltă fiecare temă de azi: eficiența, mersul aleator, testele ACF, rădăcinile unitare, rapoartele varianțelor, piețele adaptive
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook; rezolvările se discută la seminar
- ▣ C1 poate deveni un proiect de echipă: acțiunile din BET, WIG20 și BUX drept comparație, un bootstrap pe blocuri al diferenței
- ▣ Lectură: Franke, Härdle & Hafner (2019), cap. 11; exerciții în Borak, Härdle & López-Cabrera (2013), cap. 11; Campbell, Lo & MacKinlay (1997), cap. 2

Bibliografie

- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Box, G.E.P., Pierce, D.A. (1970). Distribution of residual autocorrelations in autoregressive-integrated moving average time series models. *Journal of the American Statistical Association*, 65(332), 1509–1526.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- ▣ Choi, I. (1999). Testing the random walk hypothesis for real exchange rates. *Journal of Applied Econometrics*, 14(3), 293–308.
- ▣ Chow, K.V., Denning, K.C. (1993). A simple multiple variance ratio test. *Journal of Econometrics*, 58(3), 385–401.
- ▣ Dickey, D.A., Fuller, W.A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.
- ▣ Escanciano, J.C., Lobato, I.N. (2009). An automatic Portmanteau test for serial correlation. *Journal of Econometrics*, 151(2), 140–149.
- ▣ Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Kim, J.H. (2009). Automatic variance ratio test under conditional heteroskedasticity. *Finance Research Letters*, 6(3), 179–185.
- ▣ Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P., Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54(1–3), 159–178.
- ▣ Ljung, G.M., Box, G.E.P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- ▣ Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1988). Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test. *Review of Financial Studies*, 1(1), 41–66.
- ▣ MacKinnon, J.G. (1996). Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests. *Journal of Applied Econometrics*, 11(6), 601–618.
- ▣ Phillips, P.C.B., Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, 75(2), 335–346.
- ▣ Said, S.E., Dickey, D.A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. *Biometrika*, 71(3), 599–607.
- ▣ Wald, A., Wolfowitz, J. (1940). On a test whether two samples are from the same population. *Annals of Mathematical Statistics*, 11(2), 147–162.