



Statistica piețelor financiare

Capitolul 7: Ipoteza piețelor eficiente, mersul aleator și testele VR



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ACF: Autocorrelation Function (funcția de autocorelație)
- ADF: Augmented Dickey–Fuller (test) — testul Dickey–Fuller augmentat
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- AMH: Adaptive Markets Hypothesis (ipoteza piețelor adaptive)
- AR: AutoRegressive (model) — model autoregresiv
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- BET-TR: BET Total Return (index) — indicele BET cu dividendele reinvestite
- BUX: Budapesti Értéktőzsde index (indicele Bursei din Budapesta)
- BVB: Bursa de Valori București
- CAPM: Capital Asset Pricing Model (modelul de evaluare a activelor financiare)
- CD: Chow–Denning (multiple variance-ratio test) — testul multiplu Chow–Denning pentru raportul varianțelor
- CME: Chicago Mercantile Exchange (Bursa de mărfuri din Chicago)
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- EMH: Efficient Market Hypothesis (ipoteza pieței eficiente)
- EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) — furnizorul de indici FTSE Russell
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GMM: Generalized Method of Moments (metoda generalizată a momentelor)
- KPSS: Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (stationarity test) — testul de staționaritate Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin
- LB: Ljung–Box (test) — testul de autocorelație Ljung–Box
- MA: Moving Average (model) — model de medie mobilă
- MIT: Massachusetts Institute of Technology (Institutul de Tehnologie din Massachusetts)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- PP: Phillips–Perron (unit-root test) — testul de rădăcină unitară Phillips–Perron
- PX: Prague Stock Exchange index (index Burzy cenných papírů Praha) — indicele Bursei din Praga

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ RW1: Random Walk 1 (i.i.d. increments) — mersul aleator 1 (creșteri i.i.d.)
- ▣ RW2: Random Walk 2 (independent increments) — mersul aleator 2 (creșteri independente)
- ▣ RW3: Random Walk 3 (uncorrelated increments) — mersul aleator 3 (creșteri necorelate)
- ▣ SFE: Statistics of Financial Markets, Exercises (Quantlet collection of the textbook) — colecția de Quantlet-uri a manualului Statistics of Financial Markets
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ UE: Uniunea Europeană
- ▣ VR: Variance Ratio (raportul varianțelor)
- ▣ WIG20: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** ne pot spune prețurile de ieri ceva despre randamentul de mâine?
 - ▶ dacă da, o regulă simplă ar putea bate piața; dacă nu, piața este eficientă în sens slab
 - ▶ Capitolul 4 a definit mersul aleator și martingalul; aici le testăm pe prețuri reale
- ▣ **Traseul** capitolului
 - ▶ piețele eficiente: trei forme, problema ipotezei comune
 - ▶ ipotezele de mers aleator RW1, RW2, RW3 și martingalul
 - ▶ zgometul alb și funcția de autocorelație; testele Ljung–Box și runs
 - ▶ rădăcini unitare: ADF, Phillips–Perron, KPSS; prețuri față de randamente
 - ▶ testele variance ratio; eficiența pe piețe diferite și în timp; anomalii

Rezultatele învățării

- ▣ Enunțați cele trei forme ale eficienței pieței și explicați de ce orice test este un test comun
- ▣ Deosebiți RW1, RW2, RW3 și martingalul și precizați care dintre aceste ipoteze sînt încălcate de volatility clustering
- ▣ Citiți un ACF de selecție cu banda de încredere potrivită și calculați statisticile Box–Pierce, Ljung–Box și runs
- ▣ Aplicați și combinați testele ADF, Phillips–Perron și KPSS pe prețuri și pe randamente
- ▣ Calculați un raport al varianțelor și testul lui robust, pentru un orizont și pentru mai multe orizonturi împreună
- ▣ Judecați, pe date reale, care piețe par eficiente și dacă acest lucru se schimbă în timp

Bibliografie și instrumente

- Manual: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), cap. 11 (11.3 așteptări și piețe eficiente, 11.5 teste de mers aleator, 11.6 teste de rădăcină unitară)
 - ▶ exerciții rezolvate: [Borak, Härdle & López-Cabrera \(2013\)](#), cap. 11
- Econometria previzibilității: [Campbell, Lo & MacKinlay \(1997\)](#), cap. 2 (mers aleator, variance ratio) și cap. 4 (studii de eveniment)
- Quantlet-urile Python ale capitolului: [Quantlets/Ch_07](#)
 - ▶ portate din Quantlet-urile SFE SFetimewn, SFEacfar1, SFEacfar2, SFEacfma1 și SFEacfma2
- Notebook-ul cursului: [deschideți în Google Colab](#)
- Curs video:  [Efficiency of cryptocurrency markets – A GMM-based analysis](#)

Puteți bate piața?

- Dacă prețurile trecute ar anticipa randamentele viitoare, o regulă simplă ar aduce bani fără risc
 - ▶ investitorii ar folosi regula; tranzacțiile lor ar muta prețurile până când tiparul dispare
- Dovezile despre investitorii profesioniști
 - ▶ fondurile de investiții nu au bătut, în medie, o strategie buy-and-hold, după deducerea costurilor [Jensen \(1968\)](#)
 - ▶ puține fonduri au o abilitate suficient de mare încât să își acopere costurile [Fama & French \(2010\)](#)
- O sinteză a argumentelor pro și contra: [Malkiel \(2003\)](#)



Ringul de tranzacționare al Bursei din New York, 1963

Foto: [Thomas J. O'Halloran \(1963\)](#), Library of Congress;
domeniu public; [Wikimedia Commons](#)

1900: prețurile ca mers aleator

- Louis Bachelier, *Théorie de la spéculation* [Bachelier \(1900\)](#)
 - ▶ primul model matematic al prețurilor: variația unui preț este o sumă de multe șocuri mici aleatoare
 - ▶ câștigul așteptat al speculatorului este zero
- [Kendall \(1953\)](#): 22 de serii de prețuri britanice se comportă ca o serie „rătăcitoare”
 - ▶ variațiile de la o săptămână la alta seamănă cu extrageri independente
- [Roberts \(1959\)](#): măsurile aleatoare simulate arată „tipare” pe care analiștii tehnici le văd în prețurile reale




Louis Bachelier (1870–1946)

Foto: autor necunoscut; domeniu public;

[Wikimedia Commons](#)

Care este S&P 500?



- ▣ Patru mersuri aleatoare cu pași Normali i.i.d. (media 0,033%, abaterea standard 1,13% pe zi, ca la S&P 500) și prețul logaritmic S&P 500 din 1990
- ▣ **Întrebare pentru sală:** fără legendă, ați putea spune care traiectorie este cea reală?
- ▣ **Răspuns:** greu; avânturile și căderile lungi apar și în zgomotul pur (valori finale: 2,76–4,50; S&P 500: 3,06)

1965: prețurile anticipate corect fluctuează aleator

- Paul Samuelson [Samuelson \(1965\)](#): dacă prețurile conțin deja tot ce anticipează investitorii, următoarea variație este imprevizibilă
 - ▶ formal: prețul este un **martingal**, $E[P_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] = P_t$ ([Capitolul 4](#))
 - ▶ $\mathcal{F}_t$: informația disponibilă la momentul t
- Caracterul aleator al variațiilor de preț este semnul unei piețe care funcționează, nu al haosului
- [Fama \(1965\)](#): randamentele zilnice ale celor 30 de acțiuni Dow Jones nu arată aproape deloc autocorelație




Paul A. Samuelson (1915–2009), Premiul Nobel 1970

Foto: [Bernard Gotfryd \(1970–1975\)](#); domeniu public; [Wikimedia](#)

[Commons](#)

Ne spune randamentul de ieri ceva despre cel de azi?



- Fiecare punct: (randamentul de ieri, randamentul de azi); dreapta: cele mai mici pătrate; panta ei este prima autocorelație $\hat{\rho}(1)$
- S&P 500: $\hat{\rho}(1) = -0,079$ (o ușoară revenire); BET: $\hat{\rho}(1) = 0,156$ (o ușoară continuare); sînt aceste valori diferite de zero?

Recapitulare: pot fi anticipate prețurile?

- ▣ De la Bachelier (1900) la Samuelson (1965): variațiile prețurilor par aleatoare, iar economia explică de ce
- ▣ Investitorii profesioniști bat rar piața după costuri
- ▣ Autocorelațiile zilnice sînt mici, dar nu nule: avem nevoie de teste, nu de impresii

Ce este o piață eficientă?

- ▣ **EMH** (efficient market hypothesis, ipoteza pieței eficiente) **Fama (1970)**: prețurile „reflectă pe deplin” informația disponibilă Ω_t
 - ▶ nicio regulă de tranzacționare care folosește Ω_t nu câștigă mai mult decât randamentul care îi compensează riscul
 - ▶ prețurile se mișcă doar la **știri**: informație care nu era în Ω_t
- ▣ Eficiența este relativă la o mulțime de informații
 - ▶ cu cât Ω_t este mai mică, cu atât afirmația este mai slabă și testul mai ușor
- ▣ Eficient nu înseamnă „randamente zero”: randamentul așteptat remunerează riscul



Eugene F. Fama, Premiul Nobel 2013

Foto: Bengt Nyman (2013); CC BY 2.0; Wikimedia

[Commons](#)

Trei forme ale eficienței

Forma	Mulțimea de informații Ω_t	Strategii fără randamente în exces	Testul tipic
Slabă	prețurile și randamentele trecute	analiza tehnică, tiparele grafice	autocorelație, runs, variance ratio
Semi-tare	toată informația publică	analiza fundamentală a datelor publice	studii de eveniment
Tare	toată informația, inclusiv cea privată	informația privilegiată	randamentele insiderilor și ale administratorilor de fonduri

- Formele sînt incluse una în alta: tare $\Rightarrow$ semi-tare $\Rightarrow$ slabă; respingerea formei slabe le respinge pe toate trei
- Acest capitol testează mai ales forma slabă: prețurile trecute sînt date gratuite pentru oricine [Fama \(1970\)](#), [Fama \(1991\)](#)

Modelul jocului echitabil

- ▣ Fie r_{t+1} randamentul unui activ și $E[r_{t+1} | \Omega_t]$ **randamentul așteptat de echilibru** (randamentul care îi remunerează riscul)
 - ▶ **randamentul în exces** (surpriza): $z_{t+1} = r_{t+1} - E[r_{t+1} | \Omega_t]$
- ▣ **Joc echitabil:** $E[z_{t+1} | \Omega_t] = 0$
 - ▶ erorile de prognoză sînt nule în medie, orice am ști la momentul t
 - ▶ o regulă care investește $w(\Omega_t)$ cîștigă $E[w(\Omega_t) z_{t+1}] = 0$ peste echilibru
- ▣ Cu un randament așteptat constant μ : $E[r_{t+1} | \Omega_t] = \mu$; randamentele minus μ sînt o **diferență de martingal**
- ▣ Definiția nu cere nici varianță constantă, nici distribuția Normală

Problema ipotezei comune

- Pentru a testa eficiența trebuie să știm randamentul așteptat de echilibru $E[r_{t+1} | \Omega_t]$
 - ▶ pentru asta ne trebuie un model de echilibru: medie constantă, CAPM (capital asset pricing model, modelul de evaluare a activelor financiare), modele cu factori
- Orice test al eficienței este un **test comun** al eficienței și al modelului **Fama (1991)**
 - ▶ o respingere poate însemna o piață inefficientă sau un model greșit al randamentelor așteptate
 - ▶ eficiența, luată separat, nu poate fi respinsă niciodată
- Pentru randamentele zilnice problema contează puțin: randamentele așteptate zilnice sînt foarte mici (circa 0,033% pentru S&P 500), deci orice model rezonabil dă aproape același răspuns

Paradoxul Grossman–Stiglitz

- ▣ Informația costă: trebuie colectată și analizată Grossman & Stiglitz (1980)
 - ▶ dacă prețurile ar reflecta perfect toată informația, nimeni nu ar fi plătit pentru a o colecta
 - ▶ atunci nimeni nu ar mai colecta-o, iar prețurile nu ar mai putea s-o reflecte
- ▣ Concluzie: o piață poate fi doar **aproape** eficientă
 - ▶ micile ineficiențe acoperă costurile investitorilor informați
 - ▶ întrebarea devine „cît de eficientă, unde și cînd?”, nu „da sau nu?”
- ▣ Această perspectivă duce la ipoteza piețelor adaptive din secțiunea 8

2013: un Premiu Nobel, două perspective



Eugene F. Fama: prețurile sînt greu de anticipat pe zile și săptămîni

Foto: Bengt Nyman (2013); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- Amîndoi au dreptate, pe orizonturi diferite: randamentele pe termen scurt sînt aproape imprevizibile; cele pe termen lung sînt parțial previzibile din indicatorii de evaluare



Robert J. Shiller: prețurile oscilează prea mult față de valorile fundamentale

Foto: Bengt Nyman (2013); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

Recapitulare: piețe eficiente

- ▣ Eficiența se definește relativ la o mulțime de informații: slabă, semi-tare, tare
- ▣ Joc echitabil: randamentele în exces sînt imprevizibile, condiționat de Ω_t
- ▣ Orice test este un test comun cu un model al randamentelor așteptate
- ▣ Informația costisitoare face imposibilă eficiența perfectă [Grossman & Stiglitz \(1980\)](#)

Modelul mersului aleator pentru prețurile logaritmice

- Prețul logaritmice $p_t = \ln P_t$; **mers aleator cu tendință (drift)** μ : $p_t = \mu + p_{t-1} + \varepsilon_t$
 - ▶ randamentul $r_t = p_t - p_{t-1} = \mu + \varepsilon_t$: creșterile ε_t au media 0
 - ▶ prin recurență: $p_t = p_0 + \mu t + \sum_{s=1}^t \varepsilon_s$: fiecare șoc este **permanent**
- Dacă ε_t sînt necorelate, cu varianța σ^2 :
 - ▶ $E[p_t] = p_0 + \mu t$ și $\text{Var}(p_t - p_0) = t\sigma^2$: incertitudinea crește cu orizontul
 - ▶ randamentul pe q zile $r_t(q) = r_t + \dots + r_{t-q+1}$ are $\text{Var}(r_t(q)) = q\sigma^2$
- Prețuri logaritmice, nu prețuri: P_t nu poate deveni negativ, iar randamentele logaritmice se adună în timp ([Capitolul 1](#))

Trei ipoteze de mers aleator

- ▣ **RW1** (creșteri i.i.d.): ε_t independente și identic distribuite, $\varepsilon_t \sim \text{IID}(0, \sigma^2)$ Campbell, Lo & MacKinlay (1997)
 - ▶ cea mai puternică: nicio funcție a trecutului nu anticipează vreo funcție a viitorului
- ▣ **RW2** (creșteri independente): ε_t independente, dar nu identic distribuite
 - ▶ permite varianței să se schimbe în timp într-un mod care nu poate fi anticipat din trecut (regimuri)
- ▣ **RW3** (creșteri necorelate): $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = 0$ pentru orice $k \neq 0$
 - ▶ cea mai slabă: permite $\text{Cov}(\varepsilon_t^2, \varepsilon_{t-k}^2) \neq 0$, adică volatility clustering
- ▣ Include una în alta: $\text{RW1} \Rightarrow \text{RW2} \Rightarrow \text{RW3}$; testele RW3 folosesc doar autocorelațiile randamentelor

Comparația ipotezelor de mers aleator

Proprietatea randamentelor	RW1	RW2	RW3	Martingal
$\text{Corr}(r_t, r_{t-k}) = 0$	da	da	da	da
$E[r_t \mid \text{trecut}] = \mu$ (media imprevizibilă)	da	da	nu mereu	da
varianță constantă	da	nu	nu	nu
admite volatility clustering	nu	nu	da	da
randamentele GARCH (Capitolul 9) o satisfac	nu	nu	da	da

- **GARCH** (generalised autoregressive conditional heteroskedasticity, heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată): varianța de mîine depinde de șocurile de azi; media rămîne imprevizibilă
- Eficiența în formă slabă cere doar un martingal (sau RW3), nu RW1

Martingal și mers aleator

- $\{p_t - \mu t\}$ este un **martingal** dacă $E[p_{t+1} - \mu(t+1) \mid \mathcal{F}_t] = p_t - \mu t$ Samuelson (1965)
 - ▶ echivalent, $E[r_{t+1} - \mu \mid \mathcal{F}_t] = 0$: randamentele minus μ sînt o diferență de martingal
 - ▶ o diferență de martingal cu varianță finită este necorelată: martingal $\Rightarrow$ RW3
- RW1 și RW2 implică martingalul; reciproca nu este adevărată: un martingal poate avea varianța previzibilă
- **Întrebare pentru sală**: este volatility clustering în contradicție cu eficiența în formă slabă?
 - ▶ **Răspuns**: nu; respinge RW1 și RW2, dar o varianță previzibilă nu face randamentul previzibil; martingalul și RW3 rămîn valabile

Exemplu lucrat: cum crește riscul cu orizontul

- ▣ S&P 500 din 1990: abaterea standard zilnică $\hat{\sigma} = 1,13\%$
 - ▶ în ipoteza de mers aleator, $\text{sd}(r_t(q)) = \sigma\sqrt{q}$
- ▣ Pas cu pas
 - ▶ o săptămână, $q = 5$: $1,13 \times \sqrt{5} = 1,13 \times 2,24 = 2,53\%$
 - ▶ o lună, $q = 20$: $1,13 \times 4,47 = 5,07\%$
 - ▶ un an, $q = 250$: $1,13 \times 15,81 = 17,92\%$
- ▣ Aceasta este „regula rădăcinii pătrate a timpului”, folosită pentru a scala VaR și volatilitatea
- ▣ Dacă randamentele sînt autocorelate, regula nu mai funcționează: testul variance ratio din secțiunea 7 măsoară cu cît


Recapitulare: ipotezele mersului aleator

- ▣ $p_t = \mu + p_{t-1} + \varepsilon_t$: șocuri permanente, $\text{Var}(r_t(q)) = q\sigma^2$
- ▣ RW1 (i.i.d.) $\Rightarrow$ RW2 (independente) $\Rightarrow$ RW3 (necorelate)
- ▣ Martingal: media imprevizibilă, varianța posibil previzibilă; ipoteza nulă potrivită pentru eficiență

Zgomot alb și autocorelație

- ▣ **Autocovarianța** la decalajul k : $\gamma(k) = \text{Cov}(x_t, x_{t-k})$; **autocorelația**: $\rho(k) = \gamma(k)/\gamma(0)$
 - ▶ **ACF** (autocorrelation function, funcția de autocorelație): $k \mapsto \rho(k)$, $k = 1, 2, \dots$
- ▣ **Zgomot alb**: media 0, varianța constantă σ^2 , $\rho(k) = 0$ pentru orice $k \neq 0$
 - ▶ zgomotul i.i.d. este zgomot alb; zgomotul alb gaussian este i.i.d. $N(0, \sigma^2)$
 - ▶ zgomotul alb nu trebuie să fie independent: randamentele GARCH sînt zgomot alb, dar nu i.i.d.
- ▣ **ACF de selecție**: $\hat{\rho}(k) = \sum_{t=k+1}^T (x_t - \bar{x})(x_{t-k} - \bar{x}) / \sum_{t=1}^T (x_t - \bar{x})^2$
 - ▶ pentru date i.i.d., $\hat{\rho}(k) \approx N(0, 1/T)$: banda de 95% $\pm 1,96/\sqrt{T}$

Zgomotul alb gaussian și ACF-ul lui de selecție




- Stînga: 1 000 de extrageri din $N(0, 1)$ (ca în SFETimewn); dreapta: $\hat{\rho}(1), \dots, \hat{\rho}(30)$ cu banda $\pm 1.96/\sqrt{1000} = \pm 0,062$
- Aici 0 din 30 de autocorelații ies din bandă; cu 30 de decalaje ne așteptăm la circa 1,5 doar din întâmplare

 SFM_ch7_white_noise_acf

ACF-ul proceselor AR și MA


- ▣ **AR(1)** (autoregresiv): $x_t = \alpha x_{t-1} + \varepsilon_t$, $|\alpha| < 1$: $\rho(k) = \alpha^k$
 - ▶ scădere geometrică; semne alternante dacă $\alpha < 0$; exemplu: $\alpha = 0,9 \Rightarrow \rho(3) = 0,9^3 = 0,729$
- ▣ **AR(2)**: $x_t = \alpha_1 x_{t-1} + \alpha_2 x_{t-2} + \varepsilon_t$: $\rho(1) = \alpha_1 / (1 - \alpha_2)$, $\rho(k) = \alpha_1 \rho(k-1) + \alpha_2 \rho(k-2)$
 - ▶ $\alpha_1 = 0,5$, $\alpha_2 = 0,4$: $\rho(1) = 0,5/0,6 = 0,833$, $\rho(2) = 0,5 \times 0,833 + 0,4 = 0,817$
- ▣ **MA(1)** (moving average, medie mobilă): $x_t = \varepsilon_t + \beta \varepsilon_{t-1}$: $\rho(1) = \beta / (1 + \beta^2)$, $\rho(k) = 0$ pentru $k \geq 2$
 - ▶ $\beta = 0,5$: $\rho(1) = 0,5/1,25 = 0,40$; un $MA(q)$ are un ACF care se anulează după decalajul q
- ▣ Forma ACF-ului arată tipul de dependență: scădere lentă (AR), anulare bruscă (MA), nimic (zgomot alb)

ACF-ul teoretic și de selecție pentru șase procese



- Bare: $\rho(k)$ teoretic; puncte: ACF-ul de selecție al unei traiectorii simulate de 1 000 de valori (SFEacf1, SFEacf2, SFEacfma1, SFEacfma2)
- Un mers aleator este limita $\alpha \rightarrow 1$ a AR(1): ACF-ul lui nu ar scădea deloc

ACF-ul randamentelor zilnice




□ Bare: $\hat{\rho}(1), \dots, \hat{\rho}(20)$; linia întreruptă: banda i.i.d. $\pm 1,96/\sqrt{T}$; zona umbrită: banda robustă (slide-ul următor)

Interpretarea ACF-ului randamentelor

- ▣ Primele autocorelații: S&P 500 $-0,079$, DAX $-0,009$, BET $0,156$, Bitcoin $-0,022$
 - ▶ doar S&P 500 și BET ies în evidență la decalajul 1, cu semne opuse
- ▣ Banda **robustă**: $\pm 1,96 \sqrt{\hat{\delta}(k)/T}$, $\hat{\delta}(k) = T \sum_t e_t^2 e_{t-k}^2 / (\sum_t e_t^2)^2$, $e_t = r_t - \bar{r}$ Lo & MacKinlay (1988)
 - ▶ randamente i.i.d.: $\hat{\delta}(k) \approx 1$; volatility clustering: randamentele mari în modul urmează după randamente mari în modul, deci $\hat{\delta}(k) > 1$
 - ▶ S&P 500 la decalajul 1: $\pm 0,046$ în loc de $\pm 0,020$
- ▣ S&P 500, numărul de decalaje (din 20) aflate în afara benzii: 9 cu banda i.i.d., 3 cu banda robustă
- ▣ Banda i.i.d. testează RW1; banda robustă testează RW3, ipoteza care contează pentru eficiență

 SFM_ch7_autocorrelation_tests

Randamentele sînt aproape necorelate, mărimea lor nu



- ACF-ul lui $|r_t|$: S&P 500 0,27 la decalajul 1, 0,22 la decalajul 20, 0,09 la decalajul 100; randamentele însele: linii punctate în jurul lui 0
- Mișcările mari urmează după mișcări mari: RW1 și RW2 sînt respinse la prima vedere; graficul nu spune nimic despre RW3 și martingal

Recapitulare: zgomotul alb și ACF

- Zgomot alb: necorelat; zgomot i.i.d.: independent; randamentele GARCH: zgomot alb, nu i.i.d.
- AR: scădere geometrică a ACF; $MA(q)$: anulare după q decalaje
- Folosiți banda robustă $\pm 1,96\sqrt{\hat{\delta}(k)/T}$ pentru randamente: banda i.i.d. este prea îngustă

Teste portmanteau: Box–Pierce și Ljung–Box

- $H_0: \rho(1) = \dots = \rho(m) = 0$; H_1 : cel puțin un $\rho(k) \neq 0$; un singur test pentru m decalaje împreună
 - ▶ „portmanteau”: un geamantan în care încap multe autocorelații deodată
- Box–Pierce [Box & Pierce \(1970\)](#): $Q_{BP}(m) = T \sum_{k=1}^m \hat{\rho}(k)^2$
- **LB** (Ljung–Box) [Ljung & Box \(1978\)](#): $Q_{LB}(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}(k)^2}{T-k}$, mai aproape de χ^2 în eșantioane mici
 - ▶ pentru randamente i.i.d. ambele $\sim \chi^2(m)$; respingem H_0 dacă $Q > \chi_{0,95}^2(m)$; $\chi_{0,95}^2(10) = 18,31$
- Alegerea lui m : aici $m = 10$ (două săptămîni de tranzacționare); un m mai mare diluează un efect de scurtă durată

Exemplu lucrat: Ljung–Box pas cu pas

- ▣ $T = 1000$ de randamente zilnice, $\hat{\rho}(1) = 0,06$, $\hat{\rho}(2) = -0,04$, $\hat{\rho}(3) = 0,03$; testăm cu $m = 3$
 - ▶ $T\hat{\rho}(k)^2$: 3,6; 1,6; 0,9; suma lor: $Q_{BP}(3) = 6,10$
 - ▶ $Q_{LB}(3) = 1000 \times 1002 \times (0,06^2/999 + 0,04^2/998 + 0,03^2/997) = 6,12$
- ▣ Decizia: $\chi_{0,95}^2(3) = 7,81 > 6,12$: nu respingem H_0 la 5%
 - ▶ observație: $\hat{\rho}(1) = 0,06$ se află chiar în interiorul benzii $\pm 1,96/\sqrt{1000} = \pm 0,062$; nici testul comun nu respinge
- ▣ Cu aceleași autocorelații și $T = 5000$, Q este de cinci ori mai mare și respingerea este clară: în eșantioanele lungi, autocorelațiile mici devin semnificative

Un test portmanteau robust la volatility clustering

- Distribuția χ^2 a lui Q_{LB} cere $\text{Var}(\hat{\rho}(k)) = 1/T$: condiție adevărată pentru randamente i.i.d., falsă în prezența volatility clustering
 - ▶ atunci Q_{LB} respinge un martingal adevărat mult prea des
- Statistica **robustă**: împărțim fiecare $\hat{\rho}(k)^2$ la propria varianță $\hat{\delta}(k)/T$ Escanciano & Lobato (2009)
 - ▶ $\tilde{Q}(m) = \sum_{k=1}^m \frac{T\hat{\rho}(k)^2}{\hat{\delta}(k)} \sim \chi^2(m)$ pentru o diferență de martingal cu momentul de ordin patru finit
 - ▶ cu randamente i.i.d., $\hat{\delta}(k) \approx 1$ și $\tilde{Q} \approx Q_{BP}$
- Regula: testăm RW1 cu Q_{LB} ; testăm martingalul (eficiența în formă slabă) cu $\tilde{Q}$

Teste de autocorelație pe date reale

	T	$\hat{\rho}(1)$	$Q_{LB}(10)$	p	$\tilde{Q}(10)$	p	$Q_{LB}(10), r^2$	runs z	p
S&P 500	9 240	-0,079	90,8	< 0,001	18,8	0,043	8015	2,97	0,003
DAX	9 288	-0,009	21,8	0,016	8,6	0,571	3747	1,73	0,084
BET	7 243	0,156	198,3	< 0,001	42,9	< 0,001	2500	-7,75	< 0,001
Bitcoin	4 384	-0,022	20,2	0,028	11,9	0,294	213	2,68	0,007
TLV	3 788	0,010	29,1	0,001	13,2	0,210	481	-1,68	0,093
SNP	3 815	-0,015	20,7	0,023	9,9	0,446	505	1,72	0,085
BRD	3 771	0,032	19,9	0,030	10,8	0,375	416	-3,04	0,002
TGN	3 725	0,055	28,7	0,001	12,3	0,263	639	1,49	0,136

- LB clasic: toate cele opt serii resping la 5%; $\tilde{Q}$ robust: doar S&P 500 ($p = 0,043$) și BET ($p = < 0,001$)
- Randamentele la pătrat: Q_{LB} uriaș peste tot: RW1 și RW2 sînt respinse pentru fiecare serie (volatility clustering)
- Începutul seriilor: S&P 500 și DAX 1990; BET 1997; Bitcoin 2014; acțiuni BVB 2010 (TLV fără 30–31 mai 2016, o eroare de date, [Capitolul 2](#))

Testul runs

- Un **run** (secvență): un șir de randamente cu același semn; $++-++++--$ are 4 secvențe [Wald & Wolfowitz \(1940\)](#)
 - ▶ testul folosește doar semnele: este **neparametric**, insensibil la cozile groase și la volatilitate
- Cu n_1 randamente pozitive și n_2 negative, $n = n_1 + n_2$, în ipoteza de independență:
 - ▶ $E[R] = \frac{2n_1n_2}{n} + 1$, $\text{Var}(R) = \frac{2n_1n_2(2n_1n_2 - n)}{n^2(n - 1)}$, $z = \frac{R - E[R]}{\sqrt{\text{Var}(R)}} \approx N(0, 1)$
- Prea puține secvențe ($z < 0$): semnele persistă, dependență pozitivă; prea multe secvențe ($z > 0$): semnele alternează
 - ▶ BET: 3 278 secvențe față de 3 606 așteptate, $z = -7,75$; S&P 500: 4 738 față de 4 596, $z = 2,97$
 - ▶ aceleași direcții ca $\hat{\rho}(1)$: continuare la BET, revenire la S&P 500


Recapitulare: testarea autocorelației

- ▣ $Q_{LB}(m) = T(T+2) \sum \hat{\rho}(k)^2 / (T-k) \sim \chi^2(m)$ pentru randamente i.i.d.
- ▣ În prezența volatility clustering folosim $\tilde{Q}$ robust: verdictul se schimbă pentru șase din opt serii
- ▣ Testul runs: doar semnele; prea puține secvențe înseamnă continuare
- ▣ $\tilde{Q}$: revenire la S&P 500, continuare la BET; nicio respingere pentru DAX, Bitcoin și acțiunile BVB

Serii staționare și serii integrate

- ▣ Serie **(slab) staționară**: medie constantă, varianță constantă, $\text{Cov}(x_t, x_{t-k})$ depinde doar de k
 - ▶ șocurile se sting; seria revine la media ei; notația $I(0)$
- ▣ **Integrată de ordinul 1**, $I(1)$: nu este staționară, dar prima ei diferență $\Delta x_t = x_t - x_{t-1}$ este
 - ▶ mersul aleator este $I(1)$: p_t rătăcește, $\Delta p_t = r_t$ este staționar
- ▣ **Rădăcină unitară** (unit root): în $p_t = \phi p_{t-1} + \varepsilon_t$, cazul $\phi = 1$; $|\phi| < 1$ dă un $\text{AR}(1)$ staționar
 - ▶ denumirea: rădăcina ecuației $1 - \phi z = 0$ este $z = 1/\phi = 1$
- ▣ Întrebarea acestei secțiuni: sînt prețurile logaritmice $I(1)$ și randamentele $I(0)$?

Importanța practică: regresia falsă



- ▣ Estimăm regresia unui mers aleator pe altul, independent ($T = 500$, 2 000 de repetări) Granger & Newbold (1974): $|t| > 1,96$ în 90% din cazuri, R^2 median = 0,17
- ▣ Pe diferențe: $|t| > 1,96$ în 5,5% din cazuri, cum este de așteptat; lecția: testați existența rădăcinii unitare înainte de a estima regresii în niveluri ($|t| > 40$ în 2,6% din cazuri, valori care nu apar în grafic)

Testul Dickey–Fuller

- Scădem p_{t-1} : $\Delta p_t = c + \gamma p_{t-1} + \varepsilon_t$ cu $\gamma = \phi - 1$ [Dickey & Fuller \(1979\)](#)
 - ▶ H_0 : $\gamma = 0$ (rădăcină unitară); H_1 : $\gamma < 0$ (staționară); un test unilateral
 - ▶ statistica: $\tau = \hat{\gamma}/SE(\hat{\gamma})$, raportul t obișnuit din OLS (ordinary least squares, metoda celor mai mici pătrate)
- În ipoteza H_0 , τ **nu** urmează o lege t sau Normală: valorile ei critice sînt mai negative
 - ▶ valorile critice de 5% [MacKinnon \(1996\)](#): $-2,86$ cu constantă, $-3,41$ cu constantă și tendință (distribuția Normală: $-1,645$)
- Trei specificații: fără constantă; constanta c ; constantă și tendință $c + bt$
 - ▶ prețurile logaritmice cresc în timp: folosim constantă și tendință; randamentele: doar constantă


Testul augmentat și un exemplu lucrat

- ▣ **ADF** (augmented Dickey–Fuller, Dickey–Fuller augmentat) [Said & Dickey \(1984\)](#): adăugăm diferențe decalate ca să eliminăm autocorelația din ε_t
 - ▶ $\Delta p_t = c + bt + \gamma p_{t-1} + \sum_{j=1}^L \delta_j \Delta p_{t-j} + \varepsilon_t$; același τ , aceleași valori critice
 - ▶ L ales prin AIC (Akaike information criterion, criteriul informațional Akaike, [Capitolul 6](#)), cel mult $12(T/100)^{1/4}$
- ▣ **Exemplu lucrat**: prețul logaritmic BET, constantă, fără decalaje, $T = 7\,243$
 - ▶ OLS: $\hat{\gamma} = -0,00001$, $\text{SE}(\hat{\gamma}) = 0,00016$
 - ▶ $\tau = -0,00001/0,00016 = -0,09 > -2,86$: nu respingem rădăcina unitară
 - ▶ un test t obișnuit (valoarea critică $-1,645$) ar fi respins-o: distribuția greșită dă răspunsul greșit

Phillips–Perron și KPSS

- ▣ **PP** (Phillips–Perron) [Phillips & Perron \(1988\)](#): regresia Dickey–Fuller fără decalaje; τ este corectat pentru autocorelație și heteroscedasticitate
 - ▶ corecția folosește o varianță pe termen lung cu ponderi Bartlett [Newey & West \(1987\)](#); aceeași H_0 și aceleași valori critice ca ADF
- ▣ **KPSS** (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) [Kwiatkowski et al. \(1992\)](#): ipotezele sînt **inversate**
 - ▶ H_0 : staționară (în jurul unei constante sau al unei tendințe); H_1 : rădăcină unitară
 - ▶ $KPSS = \sum_{t=1}^T S_t^2 / (T^2 \hat{\lambda}^2)$, S_t sumele parțiale ale reziduurilor, $\hat{\lambda}^2$ varianța lor pe termen lung
 - ▶ respingem staționaritatea dacă $KPSS > 0,463$ (constantă) sau $> 0,146$ (tendință), la 5%
- ▣ Folosiți-le pe amîndouă: ADF/PP întrebă „există dovezi împotriva rădăcinii unitare?”; KPSS întrebă „există dovezi împotriva staționarității?”
 - ▶ ADF nu respinge și KPSS respinge: $I(1)$; ADF respinge și KPSS nu: $I(0)$; ambele resping sau niciunul nu respinge: neconcludent

BET: prețul logaritm și randamentele



- Prețul logaritm: ADF $-1,73$ ($p = 0,736$), KPSS 2,30 ($p < 0,01$): rădăcină unitară, nestăționar
- Randamentele: ADF $-13,65$ ($p < 0,001$), KPSS 0,12 ($p > 0,10$): staționare
- Căderea din 2008 pare o abatere temporară, dar testele indică șocuri permanente, fără revenire la o dreaptă de tendință

Teste de rădăcină unitară pe prețuri și randamente

	preț logaritmic (constantă, tendință)			randamente (constantă)		
	ADF	PP	KPSS	ADF	PP	KPSS
S&P 500	-1,47	-1,57	2,23	-17,61	-105,05	0,12
DAX	-2,69	-2,65	0,94	-23,30	-97,40	0,04
BET	-1,73	-1,54	2,30	-13,65	-74,47	0,12
Bitcoin	-1,48	-1,54	1,81	-20,16	-67,84	0,13
TLV	-3,46	-3,35	0,57	-12,96	-60,79	0,23
SNP	-0,80	-0,74	2,50	-19,50	-62,71	0,29
BRD	-2,18	-2,19	1,64	-59,46	-59,53	0,29
TGN	-0,96	-0,92	0,71	-39,90	-57,83	0,22

- Valori critice de 5%: ADF și PP -3,41 (tendință), -2,86 (constantă); KPSS 0,146 (tendință), 0,463 (constantă)
- Prețurile logaritmice: nicio respingere ADF/PP cu excepția TLV (ADF $p = 0,044$); KPSS respinge staționaritatea peste tot: prețurile sînt $I(1)$
- Randamentele: ADF și PP resping puternic; KPSS nu respinge niciodată ($p > 0,10$): randamentele sînt $I(0)$

O rădăcină unitară nu dovedește eficiența

- ▣ O rădăcină unitară în prețuri este **necesară** pentru un mers aleator, dar **nu suficientă**
 - ▶ exemplu: $r_t = 0,3 r_{t-1} + \varepsilon_t$ face din p_t o serie $I(1)$ ale cărei creșteri sînt previzibile
 - ▶ ADF nu o poate deosebi de un mers aleator; BET are rădăcină unitară și randamente autocorelate
- ▣ Un preț staționar (fără rădăcină unitară) ar contrazice eficiența: prețurile ar reveni la un nivel previzibil
 - ▶ TLV: ADF respinge la 5% cu tendință, iar KPSS respinge și el: un caz neconcludent, nu o regulă profitabilă
- ▣ Testele de rădăcină unitară au putere mică împotriva unui ϕ apropiat de 1: întrebarea eficienței privește creșterile și cere teste pe randamente

Recapitulare: rădăcini unitare

- ▣ $I(1)$: șocurile sînt permanente; $I(0)$: șocurile se sting; mers aleator = prețuri $I(1)$, randamente $I(0)$
- ▣ ADF și PP: H_0 rădăcină unitară, valori critice Dickey–Fuller; KPSS: H_0 staționaritate
- ▣ Datele noastre: prețuri logaritmice $I(1)$, randamente $I(0)$; regresiile în nivel pot fi false
- ▣ Rădăcina unitară este necesară, nu suficientă, pentru un mers aleator

Ideea raportului varianțelor

- În ipoteza de mers aleator, $\text{Var}(r_t(q)) = q \text{Var}(r_t)$; **VR** (variance ratio, raportul varianțelor) compară cei doi termeni
 - ▶ $\text{VR}(q) = \frac{\text{Var}(r_t(q))}{q \text{Var}(r_t)} = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} \left(1 - \frac{k}{q}\right) \rho(k)$ Lo & MacKinlay (1988), Campbell, Lo & MacKinlay (1997)
- Interpretarea valorii
 - ▶ $\text{VR}(q) = 1$: mers aleator (RW1, RW2, RW3 dau toate 1)
 - ▶ $\text{VR}(q) > 1$: autocorelație pozitivă, **momentum** (mișcările continuă)
 - ▶ $\text{VR}(q) < 1$: autocorelație negativă, **mean reversion** (revenire la medie: mișcările sînt parțial anulate)
- Un singur număr rezumă $q - 1$ autocorelații cu ponderi descrescătoare: mai multă putere împotriva autocorelațiilor mici și persistente

Exemplu lucrat: VR din ACF-ul S&P 500

- ▣ $\hat{\rho}(1), \dots, \hat{\rho}(4)$ pentru S&P 500: $-0,079; -0,004; -0,006; -0,022$
 - ▶ $q = 2$: $VR(2) = 1 + \hat{\rho}(1) = 0,921$
 - ▶ $q = 5$: ponderile $2(1 - k/5) = 1,6; 1,2; 0,8; 0,4$: $VR(5) = 1 + 1,6\hat{\rho}(1) + 1,2\hat{\rho}(2) + 0,8\hat{\rho}(3) + 0,4\hat{\rho}(4) = 0,855$
- ▣ Estimatorul Lo-MacKinlay pe aceleași date: $VR(2) = 0,922$, $VR(5) = 0,856$
 - ▶ aproape aceleași cifre: cele două forme diferă doar prin corecții de eşantion mic
- ▣ Interpretare: varianța săptămînală reprezintă circa 0,856 din suma a cinci varianțe zilnice: mișcările zilnice ale S&P 500 sînt parțial anulate într-o săptămîină

Lo și MacKinlay (1988): estimator și teste


□ Cu T randamente, media $\hat{\mu}$ și sume pe q zile suprapuse Lo & MacKinlay (1988):

- ▶ $\hat{\sigma}_a^2 = \frac{1}{T-1} \sum_t (r_t - \hat{\mu})^2$, $\hat{\sigma}_c^2(q) = \frac{1}{m} \sum_t (r_t(q) - q\hat{\mu})^2$
- ▶ $m = q(T - q + 1)(1 - q/T)$ corectează deplasarea; $\widehat{VR}(q) = \hat{\sigma}_c^2(q)/\hat{\sigma}_a^2$

□ Testul **homoscedastic** (RW1): $Z(q) = \frac{\widehat{VR}(q) - 1}{\sqrt{2(2q-1)(q-1)/(3qT)}} \approx N(0, 1)$

□ Testul **robust** (RW3, martingal): $Z^*(q) = \frac{\widehat{VR}(q) - 1}{\sqrt{\hat{\theta}(q)/T}} \approx N(0, 1)$

- ▶ $\hat{\theta}(q) = \sum_{j=1}^{q-1} [2(q-j)/q]^2 \hat{\delta}(j)$, cu $\hat{\delta}(j)$ din banda ACF robustă




Andrew W. Lo, MIT

Foto: David Shankbone (2012); CC BY 3.0;


Wikimedia Commons
 SFM_ch7_variance_ratio

Necesitatea testului robust: o verificare Monte Carlo



- 1000 de eșantioane de $T = 2000$ de randamente cu H_0 adevărată: Normale i.i.d. și GARCH(1,1) ($\alpha = 0,12$, $\beta = 0,86$), adică necorelate, dar cu volatility clustering
- i.i.d.: ambele resping circa 5%; GARCH: $Z(2)$ respinge în 17,1% din cazuri, $Z^*(2)$ doar în 4,7%
- Mărimea** unui test: cât de des respinge o H_0 adevărată; Z „găsește” o ineficiență care nu este decât volatility clustering

Rapoarte ale varianțelor pentru orizonturi de 2–40 de zile



- S&P 500: VR scade sub 1 la orice orizont (mean reversion); BET: VR crește pînă la circa 1,517 la 20 de zile și peste (momentum)
- DAX și Bitcoin: în interiorul benzii robuste (zona umbrită) la orice orizont; banda i.i.d. (linia întreruptă) este mult mai îngustă

Rapoarte ale varianțelor și teste robuste

	VR(2)	VR(5)	VR(10)	VR(20)	$Z^*(2)$	$Z^*(5)$	$Z^*(10)$	$Z^*(20)$
S&P 500	0,922	0,856	0,783	0,767	-3,37	-2,76	-2,73	-2,06
DAX	0,990	0,968	0,932	0,925	-0,61	-0,88	-1,21	-0,91
BET	1,156	1,283	1,362	1,517	5,99	5,25	4,74	4,94
Bitcoin	0,977	0,991	1,027	1,094	-0,88	-0,19	0,37	0,91
TLV	1,009	0,997	0,954	0,995	0,34	-0,04	-0,48	-0,04
SNP	0,985	0,960	0,975	1,038	-0,53	-0,68	-0,29	0,32
BRD	1,032	1,083	1,078	1,107	1,28	1,55	0,97	0,96
TGN	1,055	1,150	1,142	1,166	2,05	2,60	1,69	1,44

- $|Z^*| > 1,96$: respingem mersul aleator la 5% pentru acel orizont
- S&P 500: mean reversion semnificativ la toate cele patru orizonturi; BET: momentum semnificativ la toate patru
- Transgaz: $Z^*(2) = 2,05$ și $Z^*(5) = 2,60$; DAX, Bitcoin, TLV, SNP, BRD: nicio respingere
- Atenție: sînt opt teste simultane pe fiecare serie, deci unele orizonturi „semnificative” apar din întîmplare

Mai multe orizonturi deodată: testul Chow–Denning

- Testarea separată pentru $q = 2, 5, 10, 20$ la 5% crește mult probabilitatea de a obține cel puțin o respingere falsă
 - ▶ pentru 4 teste independente: $1 - 0,95^4 = 18,5\%$
- Statistica **CD** (Chow–Denning) [Chow & Denning \(1993\)](#): $CD = \max_i |Z^*(q_i)|$, $i = 1, \dots, m$
 - ▶ valoarea critică din distribuția modulului maxim studentizat: $P(CD \leq c) = (2\Phi(c) - 1)^m$
 - ▶ $m = 4$, 5%: $c = 2,49$ în loc de 1,96; Φ : funcția de repartiție Normală standard
- Respingem mersul aleator dacă cel mai mare $|Z^*|$ depășește 2,49: o singură decizie pentru toate orizonturile

O alegere automată a orizontului

- Orizontul q poate fi ales din date: testul VR automat [Choi \(1999\)](#)
 - ▶ $VR(k) = 1 + 2 \sum_{i=1}^{T-1} w(i/k) \hat{\rho}(i)$, cu ponderi w care scad lin (nucleul spectral pătratic) [Andrews \(1991\)](#)
 - ▶ lăţimea de bandă k creşte cu autocorelaţia de ordinul 1 şi cu T ; statistica $\sqrt{T/k} (VR(k) - 1) / \sqrt{2} \approx N(0, 1)$
- p-valoare prin **wild bootstrap** [Kim \(2009\)](#): reeşantionăm $r_t^* = \eta_t(r_t - \bar{r})$ cu $\eta_t \sim N(0, 1)$, de 500 de ori
 - ▶ fiecare r_t^* păstrează mărimea lui r_t (volatilitatea), dar pierde orice autocorelaţie: o distribuţie nulă robustă
- Trei instrumente, o întrebare: $Z^*(q)$ pentru un orizont ales, CD pentru o mulţime de orizonturi, testul automat pentru un orizont ales de date

Teste comune și automate pe date reale


	T	CD	p	$\hat{k}$	VR automat	p (bootstrap)
S&P 500	9 240	3,37	0,003	3,7	-5,21	0,006
DAX	9 288	1,21	0,644	1,7	-0,39	0,608
BET	7 243	5,99	< 0,001	5,6	8,86	< 0,001
Bitcoin	4 384	0,91	0,835	2,0	-1,01	0,352
TLV	3 788	0,48	0,981	1,5	0,31	0,718
SNP	3 815	0,68	0,937	1,7	-0,53	0,562
BRD	3 771	1,55	0,403	2,3	1,58	0,152
TGN	3 725	2,60	0,037	3,0	3,78	0,004

- Ambele teste resping pentru S&P 500, BET și Transgaz; niciunul nu respinge pentru DAX, Bitcoin, TLV, SNP și BRD
- $\hat{k}$ este mare unde prima autocorelație este mare (BET 5,6) și mic unde ea este aproape 0 (DAX 1,7)
- Interpretare: respingerea nu înseamnă profit: o autocorelație de $-0,079$ explică mai puțin de 1% din varianța randamentului de mâine; costurile de tranzacționare absorb cea mai mare parte

Recapitulare: testul variance ratio

- ▣ $VR(q) = 1 + 2 \sum_{k < q} (1 - k/q) \rho(k)$; > 1 momentum, < 1 mean reversion
- ▣ Folosiți $Z^*(q)$: $Z(q)$ homoscedastic respinge prea des în prezența volatility clustering
- ▣ Mai multe orizonturi: Chow–Denning; orizont ales de date: VR automat cu wild bootstrap
- ▣ S&P 500 revine la medie, BET are momentum; DAX, Bitcoin și majoritatea acțiunilor BVB sînt compatibile cu un mers aleator

Șaisprezece piețe în ultimii zece ani




- VR(5) cu intervalul robust de 95%, de la 19 septembrie 2016 până la 18 septembrie 2026: piețe dezvoltate, emergente și crypto

Interpretarea comparației între piețe

- ▣ Doar două intervale exclud valoarea 1: PX ($Z^*(5) = 2,08$) și BET ($Z^*(5) = 2,03$), ambele peste 1
 - ▶ două piețe central-europene mai mici, cu acțiuni mai puțin lichide în indice
- ▣ **Multe piețe, multe teste:** 16 teste la 5% dau, în medie, 0,8 respingeri false
 - ▶ dacă testele ar fi independente, probabilitatea de a obține cel puțin o respingere falsă ar fi $1 - 0,95^{16} = 56\%$
 - ▶ Chow–Denning pe patru orizonturi: nicio piață nu respinge la 5% (BET $p = 0,159$, PX $p = 0,142$)
- ▣ S&P 500: $VR(5) = 0,84$, cel mai mic, dar cu un interval larg ($Z^* = -1,22$): oscilațiile mari din 2020 măresc $\hat{\theta}$
- ▣ Bitcoin și Ethereum: $VR(5)$ aproape de 1, ca pe piețele dezvoltate

Ipoteza piețelor adaptive

- ▣ **AMH** (adaptive markets hypothesis, ipoteza piețelor adaptive) **Lo (2004)**: piețele sînt ecosisteme de investitori care învață și se adaptează
 - ▶ oportunitățile de profit apar, sînt exploatate și dispar; eficiența se schimbă odată cu mediul
 - ▶ crizele, tehnologia nouă, participanții noi și reglementarea îndepărtează piața de eficiență sau o readuc spre ea
- ▣ Consecința testabilă: previzibilitatea variază în timp
 - ▶ dovezi: **Kim, Shamsuddin & Lim (2011)**(SUA, un secol de date); **Urquhart & McGroarty (2016)**; sinteză: **Lim & Brooks (2011)**
- ▣ Instrumentul: același test pe ferestre mobile




Andrew W. Lo, autorul AMH

Foto: **David Shankbone (2012)**; CC BY 3.0;

Wikimedia Commons

Rapoarte ale varianțelor pe ferestre mobile



- $VR(5)$ și $Z^*(5)$ pe ferestre de 500 de zile de tranzacționare (circa doi ani), o fereastră nouă la fiecare 21 de zile, datată la sfârșitul ferestrei

Interpretarea rapoartelor varianțelor pe ferestre mobile

- ▣ BET: $VR(5)$ până la 1,80 în fereastra care se termină în 2000; mai aproape de 1 după 2008, cu excepția unor episoade scurte
 - ▶ 29% dintre ferestre resping la 5%, toate cu $VR > 1$ (momentum)
- ▣ S&P 500: $VR(5)$ mai ales sub 1; cel mai mic, 0,59, în fereastra care se termină în 2008
 - ▶ 4% dintre ferestre resping, toate cu $VR < 1$: revenirile sînt cele mai puternice în crize
- ▣ Bitcoin: nicio fereastră nu respinge din 2016 (185 de ferestre)
- ▣ Atenție: ferestrele consecutive au în comun 479 din 500 de zile; ponderea ferestrelor care resping este o descriere, nu un test

Trei subperioade pentru fiecare piață

	perioada	T	$\hat{\rho}(1)$	VR(5)	$Z^*(5)$	CD p
BET	1997–2006	2 306	0,270	1,50	6,15	< 0,001
BET	2007–2016	2 516	0,066	1,08	0,82	0,262
BET	2017–2026	2 421	0,064	1,20	2,04	0,154
S&P 500	1990–2001	3 025	0,017	0,96	−0,62	0,334
S&P 500	2002–2013	3 019	−0,100	0,80	−2,53	0,010
S&P 500	2014–2026	3 196	−0,124	0,85	−1,30	0,080
Bitcoin	2014–2017	1 201	0,028	0,98	−0,23	0,983
Bitcoin	2018–2021	1 461	−0,058	0,98	−0,21	0,374
Bitcoin	2022–2026	1 722	−0,026	1,01	0,18	0,924

- BET: momentum puternic în 1997–2006 ($\hat{\rho}(1) = 0,270$), mult mai slab după aceea; din 2017 VR(5) este tot peste 1, dar testul comun nu respinge
- S&P 500: autocorelația negativă apare după 2002; Bitcoin: nicio respingere în vreuna dintre subperioadele de după 2014; [Urquhart \(2016\)](#) a găsit ineficiență în primii lui ani

Previzibilitatea BET în primii ani

- **Tranzacționare redusă** (thin trading): puține tranzacții pe zi la multe acțiuni din indice
 - ▶ un preț de închidere poate fi vechi de câteva ore; știrile intră în indice pe parcursul mai multor zile
 - ▶ indicele arată atunci autocorelație pozitivă chiar dacă fiecare acțiune este eficientă
- Schimbările de după 2007
 - ▶ mai multă lichiditate, investitori străini, aderarea la UE, reclasificarea de către FTSE Russell la statutul Secondary Emerging (2020) [FTSE Russell \(2019\)](#)
- Crahurile de la Bursa de Valori București: [Pele & Mazurencu-Marinescu \(2012\)](#)



Palatul Bursei, București

Foto: [Neoclassicism Enthusiast \(2019\)](#); CC BY-SA

4.0; [Wikimedia Commons](#)

Recapitulare: eficiența pe piețe și în timp

- ▣ În ultimii zece ani majoritatea piețelor, inclusiv Bitcoin, sînt compatibile cu un mers aleator
- ▣ Eficiența se schimbă în timp: AMH; ferestrele mobile o arată, dar se suprapun
- ▣ BET în primii ani: tranzacționare redusă și momentum; azi: mult mai aproape de un mers aleator
- ▣ Multe piețe, multe teste: așteptați-vă la cîteva respingeri false


Studii de eveniment și forma tare

- ▣ **Studiu de eveniment** (forma semi-tare) [MacKinlay \(1997\)](#), [Campbell, Lo & MacKinlay \(1997\)](#), cap. 4: cât de repede absoarbe un preț o știre publică?
 - ▶ randamentul anormal: randamentul minus randamentul unui model (de exemplu piața); cumulat pe o fereastră în jurul anunțului
 - ▶ piață eficientă: un salt în ziua știrii, fără derivă ulterioară
 - ▶ cercetări recente: cât de repede absorb prețurile futures știrile, măsurat în nanosecunde la Eurex și CME [Tak, Schlamp, Osterrieder & Pele \(2026\)](#); reacția pieței la actualizările Ethereum [Lin, Găman, Wang & Pele \(2025\)](#)
- ▣ **Forma tare**: poate cineva cu informație privată să obțină randamente în exces?
 - ▶ insiderii (managerii care tranzacționează acțiunile propriei companii) pot: de aceea tranzacționarea pe baza informațiilor privilegiate este ilegală
 - ▶ administratorii profesioniști de fonduri, în majoritate, nu pot [Jensen \(1968\)](#), [Fama & French \(2010\)](#)

Anomalii calendaristice

- ▣ O **anomalie**: un tipar în randamente pe care modelul de echilibru nu îl explică
 - ▶ **efectul de weekend**: randamente mici sau negative luna [French \(1980\)](#)
 - ▶ **efectul ianuarie**: randamente mai mari în ianuarie, mai ales la acțiunile mici [Rozeff & Kinney \(1976\)](#)
 - ▶ **efectul de început de lună**: randamente concentrate în jurul primelor zile de tranzacționare ale lunii [Ariel \(1987\)](#)
- ▣ Durează anomaliile?
 - ▶ randamentele anomaliilor publicate scad după publicare: investitorii învață [McLean & Pontiff \(2016\)](#)
 - ▶ au fost testate sute de tipare: un tipar nou trebuie să aibă $|t| > 3$, nu 2 [Harvey, Liu & Zhu \(2016\)](#)
- ▣ Căutarea repetată în date (data mining): cu destule împărțiri calendaristice, unele vor părea semnificative din întâmplare

Randamentele pe zile ale săptămânii: S&P 500 și BET



- Randamentul zilnic mediu pe zile ale săptămânii, cu intervale de 95% (erori standard Newey–West Newey & West (1987)); testul Wald al mediilor egale: S&P 500 $p = 0,69$, BET $p = 0,24$
- BET lunea: $-0,019\%$, singura medie negativă, dar nesemnificativă; ianuarie: BET $0,185\%$ pe zi față de $0,036\%$ ($t = 1,72$, $p = 0,09$); S&P 500: $p = 0,59$
- Niciun efect calendaristic nu rezistă la 5% în datele noastre

Recapitulare: forma semi-tare, forma tare și anomalii

- ▣ Studiile de eveniment: pe piețele eficiente prețurile reacționează imediat la știrile publice, fără derivă
- ▣ Forma tare nu este valabilă pentru insideri, dar este aproximativ valabilă pentru administratorii profesioniști de fonduri
- ▣ Anomaliile calendaristice: slabe în datele noastre și se estompează după publicare

O întrebare deschisă

- ▣ **A devenit BET mai eficient după trecerea României la statutul de piață Secondary Emerging (septembrie 2020)?** [FTSE Russell \(2019\)](#)
 - ▶ cinci ani înainte: $\hat{\rho}(1) = -0,002$, $VR(5) = 1,12$ ($Z^* = 0,80$); cinci ani după: $\hat{\rho}(1) = 0,087$, $VR(5) = 1,18$ ($Z^* = 1,78$)
 - ▶ diferența celor două $VR(5)$: $z = 0,34$: nicio dovadă de schimbare
- ▣ Întrebarea rămîne deschisă: pandemia COVID-19, noile listări mari și volumele mai mari s-au produs în același timp; care este unitatea potrivită de analiză, indicele sau fiecare acțiune?
- ▣ Instrumentele AI pot accelera un astfel de studiu; nu înlocuiesc verificarea lui [Wang et al. \(2023\)](#)

 [SFM_ch7_adaptive_markets](#)

Contribuția posibilă a AI

- ▣ **Literatura:** o listă a studiilor despre eficiența piețelor din Europa Centrală și de Est și a testelor folosite în ele
- ▣ **Cod:** o primă versiune a testelor Lo-MacKinlay și VR automat pe ferestre mobile pentru acțiunile din BET, cu p-valori wild bootstrap
- ▣ **Robustețe:** alte ferestre, alte orizonturi, BET-TR în loc de BET, volumul tranzacțiilor ca variabilă de control
- ▣ Exemplu de prompt
 - `Write a Python function that computes the Lo-MacKinlay variance ratio VR(5) and the heteroskedasticity-robust z-statistic for daily BET log returns on rolling 500-day windows, and test whether the mean VR differs before and after 21 September 2020.`

Verificări necesare

- ▣ Statistica: Z^* robust, nu Z homoscedastic; o ciornă care folosește Z va „găsi” ineficiență
- ▣ Randamentele logaritmice ale indicelui, nu nivelurile prețurilor; un test de rădăcină unitară pe randamente nu este un test de eficiență
- ▣ Ferestrele mobile se suprapun: un test t pe media statisticilor mobile tratează valori dependente ca independente
- ▣ Data evenimentului și fereastra se fixează înainte de a vedea rezultatul
- ▣ Referințele: fiecare lucrare citată trebuie să existe; verificați DOI-ul

Idee de proiect

- ▣ **Întrebarea:** este piața de la București mai eficientă azi decât în 2015?
 - ▶ o a doua întrebare: apare schimbarea în indice sau în acțiunile individuale?
 - ▶ date: BET din 1997, BET-TR din 2014, acțiuni BVB (TLV, SNP, BRD, TGN) din 2010 (EODHD)
- ▣ Pași
 - ▶ VR(2), VR(5) mobile cu Z^* și testul Chow–Denning pentru indice și pentru fiecare acțiune
 - ▶ comparați 2015–2020 cu 2020–2025 printr-un bootstrap pe blocuri al diferenței
 - ▶ repetați pentru WIG20 și BUX, ca termeni de comparație: s-au schimbat toate în același timp?
- ▣ Livrabil: un tabel, un grafic și un paragraf despre ce pot și ce nu pot arăta datele
- ▣ Declarați orice utilizare a instrumentelor AI și enumerați erorile acestora pe care le-ați corectat

Idei de reținut

- ▣ Piață eficientă: prețurile reflectă informația; forma slabă = prețurile trecute nu pot fi folosite pentru randamente în exces
- ▣ Ipoteza nulă potrivită este martingalul (RW3), nu RW1: volatility clustering nu înseamnă ineficiență
- ▣ Prețurile logaritmice sînt $I(1)$, iar randamentele $I(0)$ în toate seriile noastre; rădăcina unitară, în sine, nu dovedește eficiența
- ▣ Folosiți teste robuste: $\tilde{Q}$ și $Z^*(q)$; combinați orizonturile cu Chow–Denning sau lăsați datele să aleagă (VR automat)
- ▣ Dovezi: S&P 500 revine ușor la medie, BET avea momentum în primii ani, majoritatea piețelor sînt azi aproape eficiente; eficiența variază în timp
- ▣ Previzibilitatea statistică nu înseamnă profit: costurile și riscul decid

Formule de reținut

Mărimea	Formula
Mers aleator	$p_t = \mu + p_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \text{Var}(r_t(q)) = q\sigma^2$
ACF de selecție	$\hat{\rho}(k) = \sum_t e_t e_{t-k} / \sum_t e_t^2, \quad \text{band } \pm 1,96\sqrt{\hat{\delta}(k)/T}$
Ljung–Box	$Q_{LB}(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \hat{\rho}(k)^2 / (T-k) \sim \chi^2(m)$
Testul runs	$E[R] = 2n_1 n_2 / n + 1, \quad z = (R - E[R]) / \text{sd}(R)$
ADF	$\Delta p_t = c + bt + \gamma p_{t-1} + \sum_j \delta_j \Delta p_{t-j} + \varepsilon_t, \quad \tau = \hat{\gamma} / \text{SE}(\hat{\gamma})$
KPSS	$\sum_t S_t^2 / (T^2 \hat{\lambda}^2), \quad H_0: \text{staționaritate}$
VR	$\text{VR}(q) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} (1 - k/q) \rho(k)$
Testul VR robust	$Z^*(q) = (\widehat{\text{VR}}(q) - 1) / \sqrt{\hat{\theta}(q)/T}, \quad \hat{\theta}(q) = \sum_{j < q} [2(q-j)/q]^2 \hat{\delta}(j)$
Chow–Denning	$\max_i Z^*(q_i) , \quad P(\text{CD} \leq c) = (2\Phi(c) - 1)^m$

Autoevaluare

- ▣ **Întrebare:** $\hat{\rho}(1) = 0,10$ și $\hat{\rho}(k) = 0$ pentru $k \geq 2$; ce ne spune VR(2)?
 - ▶ **Răspuns:** $1 + 0,10 = 1,10$: varianța pe două zile este cu 10% mai mare decât în cazul unui mers aleator, deci momentum
- ▣ **Întrebare:** ADF nu respinge pe prețurile logaritmice, iar KPSS respinge; este piața eficientă?
 - ▶ **Răspuns:** știm doar că prețurile sînt $I(1)$; eficiența cere teste pe creșteri (ACF, VR)
- ▣ **Întrebare:** $Q_{LB}(10)$ respinge puternic pentru randamentele la pătrat; este respinsă eficiența în formă slabă?
 - ▶ **Răspuns:** nu; este vorba de volatility clustering, care respinge RW1 și RW2, nu martingalul
- ▣ Urmează: Capitolul 8, estimatori de volatilitate și volatility clustering

Bibliografie (1/3)

- ▣ Andrews, D.W.K. (1991). Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation. *Econometrica*, 59(3), 817–858.
- ▣ Ariel, R.A. (1987). A monthly effect in stock returns. *Journal of Financial Economics*, 18(1), 161–174.
- ▣ Bachelier, L. (1900). Théorie de la spéculation. *Annales scientifiques de l'École normale supérieure*, 17, 21–86.
- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Box, G.E.P., Pierce, D.A. (1970). Distribution of residual autocorrelations in autoregressive-integrated moving average time series models. *Journal of the American Statistical Association*, 65(332), 1509–1526.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- ▣ Choi, I. (1999). Testing the random walk hypothesis for real exchange rates. *Journal of Applied Econometrics*, 14(3), 293–308.
- ▣ Chow, K.V., Denning, K.C. (1993). A simple multiple variance ratio test. *Journal of Econometrics*, 58(3), 385–401.
- ▣ Dickey, D.A., Fuller, W.A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.
- ▣ Escanciano, J.C., Lobato, I.N. (2009). An automatic Portmanteau test for serial correlation. *Journal of Econometrics*, 151(2), 140–149.
- ▣ Fama, E.F. (1965). The behavior of stock-market prices. *Journal of Business*, 38(1), 34–105.
- ▣ Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- ▣ Fama, E.F. (1991). Efficient capital markets: II. *Journal of Finance*, 46(5), 1575–1617.
- ▣ Fama, E.F., French, K.R. (2010). Luck versus skill in the cross-section of mutual fund returns. *Journal of Finance*, 65(5), 1915–1947.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ French, K.R. (1980). Stock returns and the weekend effect. *Journal of Financial Economics*, 8(1), 55–69.

Bibliografie (2/3)

- ▣ FTSE Russell (2019). [FTSE Russell announces results of country classification review](#). Press release, London Stock Exchange Group.
- ▣ Granger, C.W.J., Newbold, P. (1974). [Spurious regressions in econometrics](#). *Journal of Econometrics*, 2(2), 111–120.
- ▣ Grossman, S.J., Stiglitz, J.E. (1980). [On the impossibility of informationally efficient markets](#). *American Economic Review*, 70(3), 393–408.
- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). [...and the cross-section of expected returns](#). *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Jensen, M.C. (1968). [The performance of mutual funds in the period 1945–1964](#). *Journal of Finance*, 23(2), 389–416.
- ▣ Kendall, M.G. (1953). [The analysis of economic time-series, Part I: prices](#). *Journal of the Royal Statistical Society, Series A*, 116(1), 11–34.
- ▣ Kim, J.H. (2009). [Automatic variance ratio test under conditional heteroskedasticity](#). *Finance Research Letters*, 6(3), 179–185.
- ▣ Kim, J.H., Shamsuddin, A., Lim, K.-P. (2011). [Stock return predictability and the adaptive markets hypothesis: evidence from century-long U.S. data](#). *Journal of Empirical Finance*, 18(5), 868–879.
- ▣ Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P., Shin, Y. (1992). [Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root](#). *Journal of Econometrics*, 54(1–3), 159–178.
- ▣ Lim, K.-P., Brooks, R. (2011). [The evolution of stock market efficiency over time: a survey of the empirical literature](#). *Journal of Economic Surveys*, 25(1), 69–108.
- ▣ Lin, Y., Găman, A., Wang, Y., Pele, D.T. (2025). [Market responses to Ethereum development milestones: an event study approach](#). SSRN Working Paper 5176758.
- ▣ Ljung, G.M., Box, G.E.P. (1978). [On a measure of lack of fit in time series models](#). *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- ▣ Lo, A.W. (2004). [The adaptive markets hypothesis](#). *Journal of Portfolio Management*, 30(5), 15–29.
- ▣ Lo, A.W. (2017). [Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought](#). Princeton University Press.
- ▣ Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1988). [Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test](#). *Review of Financial Studies*, 1(1), 41–66.
- ▣ MacKinlay, A.C. (1997). [Event studies in economics and finance](#). *Journal of Economic Literature*, 35(1), 13–39.

Bibliografie (3/3)

- ▣ MacKinnon, J.G. (1996). Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests. *Journal of Applied Econometrics*, 11(6), 601–618.
- ▣ Malkiel, B.G. (2003). The efficient market hypothesis and its critics. *Journal of Economic Perspectives*, 17(1), 59–82.
- ▣ McLean, R.D., Pontiff, J. (2016). Does academic research destroy stock return predictability? *Journal of Finance*, 71(1), 5–32.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2012). Modelling stock market crashes: the case of Bucharest Stock Exchange. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542.
- ▣ Phillips, P.C.B., Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, 75(2), 335–346.
- ▣ Roberts, H.V. (1959). Stock-market “patterns” and financial analysis: methodological suggestions. *Journal of Finance*, 14(1), 1–10.
- ▣ Rozeff, M.S., Kinney, W.R. (1976). Capital market seasonality: the case of stock returns. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 379–402.
- ▣ Said, S.E., Dickey, D.A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. *Biometrika*, 71(3), 599–607.
- ▣ Samuelson, P.A. (1965). Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly. *Industrial Management Review*, 6(2), 41–49; reprinted in the *World Scientific Handbook in Financial Economics Series*, 25–38.
- ▣ Tak, A., Schlamp, S., Osterrieder, J., Pele, D.T. (2026). Racing the news: nanosecond market efficiency at Eurex and CME. SSRN Working Paper 7157232.
- ▣ Tsay, R.S. (2010). *Analysis of Financial Time Series*, 3rd ed. Wiley.
- ▣ Urquhart, A. (2016). The inefficiency of Bitcoin. *Economics Letters*, 148, 80–82.
- ▣ Urquhart, A., McGroarty, F. (2016). Are stock markets really efficient? Evidence of the adaptive market hypothesis. *International Review of Financial Analysis*, 47, 39–49.
- ▣ Wald, A., Wolfowitz, J. (1940). On a test whether two samples are from the same population. *Annals of Mathematical Statistics*, 11(2), 147–162.
- ▣ Wang, H., Fu, T., Du, Y., Gao, W., et al. (2023). Scientific discovery in the age of artificial intelligence. *Nature*, 620, 47–60.