



Statistica piețelor financiare

Seminarul 4: Probabilitate



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ CDF: Cumulative Distribution Function (funcția de repartiție)
- ▣ EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) (furnizor de date de piață)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GBM: Gradient Boosting Machine (model de boosting pe gradient)
- ▣ LCG: Linear Congruential Generator (generator congruențial liniar)
- ▣ PCG64: Permuted Congruential Generator, 64-bit (NumPy default) (generatorul congruențial permutat pe 64 de biți (implicit în NumPy))
- ▣ PMF: Probability Mass Function (funcția de masă de probabilitate)
- ▣ RANDU: RANDU (IBM random number generator of the 1960s) (generatorul de numere aleatoare RANDU al IBM, anii 1960)

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cum descriem, condiționăm și simulăm randamente și prețuri aleatoare?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 4: secțiunea „Ce vă trebuie azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
 - ▶ Partea A: momente, tabele comune, condiționare, arbori binomiali, $AR(1)$, transformare inversă și GBM pe hîrtie
 - ▶ Partea B: dependența în randamente reale, Monte Carlo, generatoare de numere aleatoare și GBM față de date, fiecare cu o întrebare de interpretare
 - ▶ Partea C: o întrebare deschisă pentru proiect și un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Nu se predă nimic: seminarul este pentru exercițiu; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	momentele unui randament discret; este independentă o pereche necorelată?	Rezolvat,	A1
A3, A4	volatilitatea unui portofoliu; un model cu două regimuri și legea varianței totale	Propus	A3
A5, A6	un arbore binomial; mers aleator, martingal și AR(1)	Rezolvat,	A5
A7, A8	transformarea inversă pas cu pas; GBM și procesul Wiener	Propus	A7
B1, B2	sînt randamentele independente? media și varianța condiționată	Rezolvat,	B1
B3, B4	probabilitatea unei pierderi prin Monte Carlo; testarea unui generator de numere aleatoare	Propus	B3
B5, B6	GBM față de BET; crește varianța liniar cu orizontul?	Rezolvat,	B5
C1, C2	cît de des apare un an prost? ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B3, B5

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați voi, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Prețul folosit	Perioada
S&P 500, DAX, BET	EODHD	close	2000–2026
Bitcoin	EODHD	close, 7 zile pe săptămână	2014–2026

- Randamente logaritmice zilnice în %: $r_t = 100 (\ln P_t - \ln P_{t-1})$
- Weekendurile și închiderile repetate din zilele libere se elimină (cu excepția Bitcoin); fiecare serie pe calendarul ei
- Simulările folosesc generatorul implicit din NumPy cu semințe fixe, astfel încât fiecare cifră poate fi reprodusă

Ce vă trebuie azi (1/4): variabile aleatoare și momente

- ▣ X discretă: **PMF** (probability mass function, funcția de masă de probabilitate) $p(x_i) = P(X = x_i)$; X continuă: **PDF** (probability density function, densitatea) f
 - ▶ **CDF** (cumulative distribution function, funcția de repartiție): $F(x) = P(X \leq x)$; cuantila $q_\alpha = F^{-1}(\alpha)$
- ▣ $E[X] = \sum x_i p(x_i)$ sau $\int x f(x) dx$; $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$
- ▣ $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$; $\rho = \text{Cov}/(\sigma_X \sigma_Y)$; $\text{Var}(aX + bY) = a^2 \sigma_X^2 + b^2 \sigma_Y^2 + 2ab \text{Cov}$
- ▣ **Independente**: $P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$ pentru fiecare celulă; independente $\Rightarrow$ necorelate, nu și invers
 - ▶ banda i.i.d. pentru o corelație de selecție: $\pm 1,96/\sqrt{n}$

Ce vă trebuie azi (2/4): condiționare

- ▣ $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$; $E[Y | X]$: media lui Y după ce aflăm X , cea mai bună prognoză a lui Y pe baza lui X
- ▣ **Proprietatea turnului:** $E[E[Y | X]] = E[Y]$
- ▣ **Legea varianței totale:** $\text{Var}(Y) = E[\text{Var}(Y | X)] + \text{Var}(E[Y | X])$
- ▣ Pentru randamente: $\mu_t = E[r_t | \mathcal{F}_{t-1}]$ și $\sigma_t^2 = \text{Var}(r_t | \mathcal{F}_{t-1})$, cu $\mathcal{F}_{t-1}$ informația pînă ieri
 - ▶ un σ_t schimbător este ceea ce modelează GARCH (Capitolul 9)
- ▣ Un amestec de distribuții Normale cu varianțe diferite are applatizarea peste 3: $E[X^4] = 3\sigma^4$ pentru $N(0, \sigma^2)$

Ce vă trebuie azi (3/4): procese

- ▣ **Zgomot alb:** media 0, varianța σ^2 , necorelat în timp; zgomot **i.i.d.**: independent și identic distribuit
- ▣ **Mers aleator:** $S_t = S_{t-1} + \varepsilon_t$, $E[S_t] = S_0$, $\text{Var}(S_t) = t\sigma^2$
- ▣ **Martingal:** $E[X_{t+1} | \mathcal{F}_t] = X_t$ (un joc echitabil)
- ▣ **AR(1):** $X_t = c + \phi X_{t-1} + \varepsilon_t$, $|\phi| < 1$: media $c/(1 - \phi)$, varianța $\sigma^2/(1 - \phi^2)$, $\rho(h) = \phi^h$
- ▣ **Arbore binomial:** sus cu u cu probabilitatea p , jos cu d ; după n pași $S_n = S_0 u^K d^{n-K}$, $K \sim B(n, p)$
 - ▶ $E[S_n] = S_0(pu + (1 - p)d)^n$; joc echitabil pentru $p^* = (1 - d)/(u - d)$

Ce vă trebuie azi (4/4): simulare, Wiener și GBM

- ▣ **Transformarea inversă:** $U \sim U(0, 1) \Rightarrow F^{-1}(U)$ are CDF F ; exponențială: $-\ln(1 - U)/\lambda$; distribuția Normală: $\mu + \sigma\Phi^{-1}(U)$
- ▣ **LCG** (linear congruential generator, generator congruențial liniar): $x_{k+1} = (ax_k + c) \bmod M$, $u_k = x_k/M$
- ▣ **Monte Carlo:** $\hat{p}$ = ponderea simulărilor în care are loc evenimentul; eroarea standard $\sqrt{p(1-p)/N}$
- ▣ **Procesul Wiener:** $W(0) = 0$, creșteri independente, $W(t) - W(s) \sim N(0, t - s)$; $\text{Cov}(W(s), W(t)) = \min(s, t)$
- ▣ **GBM** (geometric Brownian motion, mișcarea browniană geometrică): $S_T = S_0 \exp((\mu - \sigma^2/2)T + \sigma W_T)$
 - ▶ media $S_0 e^{\mu T}$, mediana $S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)T}$; randamente logaritmice zilnice Normale i.i.d.
 - ▶ drawdown-ul maxim: $\min_t (P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1)$, cea mai mare cădere de la un vîrf curent

A1: momentele unui randament discret [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Randamentul zilnic X (în %) al unei acțiuni ia valorile -3 , 0 și 2 cu probabilitățile $0,2$, $0,3$ și $0,5$.
- ▣ 1. Calculați $E[X]$, $E[X^2]$, $\text{Var}(X)$ și abaterea standard.
- ▣ 2. Scrieți CDF $F(x)$ pentru orice x .
- ▣ 3. Calculați $P(X < 0)$ și mediana.
- ▣ Raportați: patru momente, CDF și două cifre.

Rezolvare

- ▣ 1. $E[X] = -0,6 + 0 + 1 = 0,40$; $E[X^2] = 1,8 + 2 = 3,80$; $\text{Var} = 3,80 - 0,40^2 = 3,64$; abaterea std. $1,908$
- ▣ 2. $F(x) = 0$ pentru $x < -3$; $0,2$ pe $[-3, 0)$; $0,5$ pe $[0, 2)$; 1 pentru $x \geq 2$
- ▣ 3. $P(X < 0) = 0,2$; mediana $= \inf\{x : F(x) \geq 0,5\} = 0$
- ▣ Media este pozitivă deși o pierdere este posibilă: riscul și randamentul așteptat sînt întrebări diferite.

A2: necorelate, dar dependente [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ X = mișcarea pieței (-1 scădere, 0 stagnare, $+1$ creștere); $Y = 1$ dacă ziua este „mare”. Probabilitățile comune: $P(-1, 1) = 0,25$, $P(0, 0) = 0,5$, $P(1, 1) = 0,25$, celelalte celule 0 . Model: A1.
- ▣ 1. Calculați distribuțiile marginale ale lui X și Y și mediile lor.
- ▣ 2. Calculați $\text{Cov}(X, Y)$ și ρ .
- ▣ 3. Decideți dacă X și Y sînt independente, folosind o celulă a tabelului.
- ▣ 4. Calculați $\text{Var}(X + Y)$.
- ▣ Raportați: două marginale, ρ , un verdict și o varianță.

A3: volatilitatea unui portofoliu cu două active [Rezolvat]

Cerință

- Două active cu volatilitățile anuale $\sigma_1 = 20\%$ și $\sigma_2 = 30\%$; ponderile 0,6 și 0,4.
- 1. Calculați volatilitatea portofoliului pentru $\rho = 0,3$.
- 2. Repetați pentru $\rho = 0$, $\rho = -0,5$ și $\rho = 1$.
- 3. Explicați cînd portofoliul este mai puțin riscant decît media ponderată a celor două volatilități.
- Raportați: patru volatilități și o frază.

Rezolvare

- 1.
 $\sigma_p^2 = 0,36 \times 400 + 0,16 \times 900 + 2 \times 0,24 \times 0,3 \times 600 = 374,4$;
 $\sigma_p = 19,35\%$
- 2. $\rho = 0$: 16,97%; $\rho = -0,5$: 12,00%; $\rho = 1$: 24,00%
- 3. Doar $\rho = 1$ dă media ponderată
 $0,6 \times 20 + 0,4 \times 30 = 24\%$; orice $\rho < 1$ diversifică.

A4: două regimuri și legea varianței totale [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ O zi este calmă cu probabilitatea 0,8, $r \mid \text{calm} \sim N(0, 0,8^2)$, și agitată în rest, $r \mid \text{agitat} \sim N(0, 2^2)$ (în %). Model: A3.
- ▣ 1. Folosiți legea varianței totale pentru a calcula $\text{Var}(r)$ și abaterea standard.
- ▣ 2. Calculați $E[r^4]$ cu $E[Z^4] = 3\sigma^4$ în fiecare regim, apoi aplatizarea $E[r^4]/\text{Var}(r)^2$.
- ▣ 3. Explicați de ce amestecul are cozi groase, deși fiecare regim este Normal.
- ▣ Raportați: o varianță, o aplatizare și o frază.

A5: un arbore binomial cu trei pași [Rezolvat]

Cerință

- $S_0 = 100$, $u = 1,1$, $d = 0,9$, $p = 0,55$, trei pași independenți.
- 1. Listați valorile posibile ale lui S_3 și probabilitățile lor.
- 2. Calculați $E[S_3]$ în două moduri: din tabel și din $S_0(pu + (1 - p)d)^3$.
- 3. Calculați $P(S_3 < 100)$.
- 4. Găsiți p^* care face din S_t un martingal.
- Raportați: un tabel, două speranțe, o probabilitate, p^* .

Rezolvare

- 1. $K = 0..3$ creșteri: 72,9; 89,1; 108,9; 133,1 cu 0,0911; 0,3341; 0,4084; 0,1664 ($\binom{3}{k} p^k (1 - p)^{3-k}$)
- 2. $E[S_3] = 100 \times 1,01^3 = 103,03$ în ambele moduri
- 3. $P(K \leq 1) = 0,4253$
- 4. $p^* = (1 - 0,9)/(1,1 - 0,9) = 0,50$: cu $p = 0,55 > p^*$ prețul are o tendință de creștere

A6: mers aleator, martingal și AR(1) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ $S_t = S_{t-1} + \varepsilon_t$, ε_t i.i.d. cu media 0 și varianța σ^2 ; $X_t = 0,2 + 0,6X_{t-1} + \varepsilon_t$ cu $\sigma = 1$. Model: A5.
- ▣ 1. Calculați $E[S_t]$ și $\text{Var}(S_t)$ și arătați că S_t este un martingal.
- ▣ 2. Arătați că și $S_t^2 - t\sigma^2$ este un martingal.
- ▣ 3. Calculați media, varianța și $\rho(1)$, $\rho(2)$, $\rho(5)$ pentru X_t staționar.
- ▣ 4. Calculați $E[X_{t+1} \mid X_t = 2]$ și $\text{Var}(X_{t+1} \mid X_t = 2)$.
- ▣ Raportați: două derivări, cinci momente, o prognoză.

A7: transformarea inversă pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Aveți numerele uniforme $u = 0,3$ și $u = 0,9$ (și $u = 0,15, 0,45, 0,8$ pentru întrebarea 2).
- ▣ 1. Transformați $u = 0,3$ și $u = 0,9$ în extrageri exponențiale cu rata $\lambda = 0,5$.
- ▣ 2. Transformați $u = 0,15, 0,45, 0,8$ în extrageri ale randamentului X din A1.
- ▣ 3. Transformați $u = 0,01$ într-o extragere din $N(0,05, 1,2^2)$.
- ▣ Raportați: șase valori simulate.

Rezolvare

- ▣ 1. $x = -\ln(1 - u)/0,5$: 0,713 și 4,605
- ▣ 2. $F^{-1}(u) = \inf\{x : F(x) \geq u\}$ cu $F = 0,2, 0,5, 1$: -3, 0 și 2
- ▣ 3. $0,05 + 1,2 \times (-2,326) = -2,742$: cuantila de 1%
- ▣ Un u mare dă o extragere mare: transformarea inversă păstrează ordinea numerelor uniforme.

A8: GBM și procesul Wiener [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar


Cerință

- ▣ Un indice urmează GBM cu $\mu = 8\%$, $\sigma = 20\%$ pe an, $S_0 = 100$; W este un proces Wiener. Model: A7.
- ▣ 1. Calculați media și mediana lui S_1 și ale lui S_5 .
- ▣ 2. Calculați $P(S_T < 100)$ pentru $T = 1$ și $T = 5$.
- ▣ 3. Calculați cuantila de 5% a lui S_1 și a lui S_5 .
- ▣ 4. Calculați $\text{Var}(W(2) - W(0,5))$ și $\text{Cov}(W(1), W(3))$.
- ▣ Raportați: opt cifre GBM și două momente Wiener.

B1: sînt independente randamentele S&P 500? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** sînt independente randamentele zilnice ale S&P 500 și ce ne spune ziua de ieri despre cea de azi?
- ▣ **Date:** închiderile S&P 500, 2000–2026, randamente logaritmice zilnice în %
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $\text{Corr}(r_t, r_{t-1})$ și $\text{Corr}(r_t^2, r_{t-1}^2)$ și comparați-le cu banda $\pm 1,96/\sqrt{n}$.
 2. Împărțiți zilele în chintile ale lui $|r_{t-1}|$ și calculați media și abaterea standard a lui r_t în fiecare chintilă.
 3. Verificați legea varianței totale, cu chintilele ca grupuri.
 4. Interpretare: ce este previzibil pe baza zilei de ieri, media sau varianța randamentului de azi?
- ▣ **Raportați:** două corelații, un tabel cu cinci chintile, o descompunere, o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



- $n = 6\,714$, banda $\pm 0,024$; $\text{Corr}(r_t, r_{t-1}) = -0,099$;
 $\text{Corr}(r_t^2, r_{t-1}^2) = 0,313$
- Mediile condiționate Q1–Q5: 0,021; 0,006; 0,029; 0,027; 0,042 (%)
- Abaterile std. condiționate: 0,91; 0,98; 1,07; 1,21; 1,71; Q5/Q1 = 1,88
- Varianța totală $1,4691 = 1,4690$ (în grupuri) $+0,00013$ (între grupuri, 0,01%)
- Interpretare: varianța este previzibilă, media aproape deloc; corelația negativă la decalajul 1 vine din zilele de criză cu reveniri mari, deci randamentele nu sînt independente


B2: același lucru pentru DAX, BET și Bitcoin [Propus]

- **Întrebarea:** arată DAX, BET și Bitcoin același tipar ca S&P 500?
- **Date:** randamente logaritmice zilnice, 2000–2026 (Bitcoin din 2014); model: B1
- **Cerințe**
 1. Calculați ambele corelații la decalajul 1 și banda pentru fiecare serie.
 2. Calculați abaterea standard condiționată în Q1 și Q5 și raportul lor.
 3. Calculați ponderea varianței explicate de mediile chintilelor.
 4. Interpretare: de ce este BET singura serie cu $\text{Corr}(r_t, r_{t-1})$ clar pozitivă?
- **Raportați:** un tabel și o frază
- Notebook: secțiunea B2

B3: probabilitatea unei pierderi lunare prin Monte Carlo [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** cât de probabilă este o pierdere de peste 10% în 21 de zile pentru S&P 500 și depinde răspunsul de model?
- ▣ **Date:** randamentele logaritmice zilnice ale S&P 500, 2000–2026; 100 000 de luni simulate
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați probabilitatea exactă în ipoteza unor randamente zilnice Normale i.i.d., cu media și abaterea standard de selecție.
 2. Estimați-o prin Monte Carlo în același model și dați eroarea standard.
 3. Estimați-o prin reșantionarea cu întoarcere a 21 de zile observate (transformarea inversă empirică).
 4. Calculați ponderea ferestrelor de 21 de zile suprapuse din date cu o pierdere de peste 10%.
 5. Interpretare: care diferențe sînt eroare de simulare și care sînt eroare de model?
- ▣ **Raportați:** patru probabilități, două erori standard, o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



- Normal exact: 2,922%; Monte Carlo Normal: 2,917% (eroare std. 0,053%); bootstrap: 3,184% (eroare std. 0,056%)
- Date: 2,67% din 6 694 de ferestre suprapuse (179 de ferestre, din câteva episoade); luni care nu se suprapun: 3,45% din 319
- Interpretare: Monte Carlo față de exact diferă cu mai puțin de o eroare std. (eroare de simulare); bootstrap față de Normal diferă cu circa 3,5 erori std. (eroare de model: cozi zilnice mai groase); datele sînt zgomotoase pentru că ferestrele suprapuse sînt dependente


B4: testați un generator de numere aleatoare [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** poate un generator să treacă testele simple și să fie totuși inutilizabil?
- ▣ **Date:** RANDU, $x_{k+1} = 65539 x_k \bmod 2^{31}$, sămînța 1, 100 000 de numere; NumPy PCG64 cu aceeași sămînță; model: B3
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați media, varianța și corelația la decalajul 1 pentru ambele șiruri și comparați cu 1/2, 1/12 și 0.
 2. Numărați valorile distincte ale lui $9u_k - 6u_{k+1} + u_{k+2}$ pentru ambele generatoare.
 3. Găsiți perioada generatoarelor LCG $(a, c, M) = (5, 1, 16)$, $(5, 0, 16)$ și $(4, 1, 16)$ pornite din 7.
 4. Interpretare: de ce nu detectează testele unidimensionale defectul RANDU?
- ▣ **Raportați:** un tabel cu șase statistici, două numărători, trei perioade, o frază
- ▣ Notebook: secțiunea B4

B5: este BET o mișcare browniană geometrică? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** ce trăsături ale BET poate reproduce un GBM cu aceeași tendință și volatilitate?
- ▣ **Date:** închiderile BET, 2000–2026; 500 de traiectorii GBM de aceeași lungime
- ▣ **Cerințe**
 1. Calibrați GBM: tendința logaritmică anuală și volatilitatea din randamentele logaritmice zilnice.
 2. Simulați 500 de traiectorii și calculați, pentru fiecare, excesul de aplatizare, $\text{Corr}(r_t^2, r_{t-1}^2)$ și drawdown-ul maxim.
 3. Plasați valorile reale în distribuțiile simulate (cuantilele de 5% și 95%).
 4. Interpretare: ce fapte stilizate ratează GBM și care cifră de risc este cea mai afectată?
- ▣ **Raportați:** doi parametri, trei comparații, o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B5

B5: rezolvare [Rezolvat]



- $n = 6\,670$ zile; $\sigma = 22,1\%$, tendința logaritmică $16,0\%$ pe an
- Excesul de aplatizare: real $11,06$, intervalul GBM de 90% $[-0,10; 0,10]$; $\text{Corr}(r_t^2, r_{t-1}^2)$: real $0,330$, GBM $[-0,022; 0,022]$
- Drawdown-ul maxim: real $-82,5\%$, mediana GBM $-42,7\%$, intervalul $[-62,8\%, -31,4\%]$
- Interpretare: GBM ratează complet cozile groase și volatility clustering; crahul din 2008 face drawdown-ul real mai adânc decât al oricărei traiectorii simulate, deci o limită de risc bazată pe GBM ar fi fost mult prea largă

B6: crește varianța liniar cu orizontul? [Propus]

- **Întrebarea:** este valabilă relația $\text{Var}(\text{randament pe } h \text{ zile}) = h \text{Var}(\text{randament zilnic})$, cum prezice un mers aleator cu creșteri i.i.d.?
- **Date:** randamentele logaritmice zilnice ale S&P 500, BET, Bitcoin; blocuri care nu se suprapun de $h = 5, 21, 63$ de zile; model: B5
- **Cerințe**
 1. Calculați raportul $\text{Var}(h \text{ zile}) / (h \text{Var}(1 \text{ zi}))$ pentru fiecare serie și orizont.
 2. Folosiți eroarea standard aproximativă $\sqrt{2/(m-1)}$ a unui raport de varianțe cu m blocuri pentru a judeca distanța față de 1.
 3. Interpretare: ce spune un raport peste 1 sau sub 1 despre autocorelația randamentelor?
- **Raportați:** un tabel 3×3 și două fraze
- **Notebook:** secțiunea B6

C1: cât de des apare un an prost? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** dă GBM probabilitatea corectă a unui drawdown de peste 20% (sau 40%) în cursul unui an calendaristic?
- ▣ **Date:** S&P 500, DAX, BET, Bitcoin, ani calendaristici compleți 2000–2025 (Bitcoin 2015–2025); modele: B3, B5
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați drawdown-ul maxim din fiecare an calendaristic și ponderea anilor cu peste 20% și cu peste 40%.
 2. Simulați 10 000 de traiectorii de un an în GBM și în bootstrap-ul i.i.d. al randamentelor zilnice și calculați aceleași două probabilități.
 3. Comparați datele și modelele cu un test binomial.
 4. Propuneți un model care ar putea reproduce ambele cifre.
 5. Interpretare: ce spune diferența dintre bootstrap și date despre volatility clustering?
- ▣ **Raportați:** un tabel, două valori p binomiale, un scurt plan de proiect
- ▣ Notebook: secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI să „rezume faptele de probabilitate despre S&P 500 pentru un raport de risc”. Răspunsul:
- (a) $\text{Corr}(r_t, r_{t-1}) = -0,099$, deci randamentele zilnice sînt independente și varianța de mîine nu poate fi prevăzută.
- (b) Prețul logaritmic este un mers aleator, deci varianța lui este aceeași la fiecare dată și procesul este staționar.
- (c) În GBM cu $\mu = 8\%$ și $\sigma = 19\%$, valoarea mediană a 100 după 10 ani este $100 \exp(0,8) = 222,6$.
- (d) 0 probabilitate Monte Carlo de circa 3% din 10.000 de traiectorii are o eroare standard de circa 0,0017.
- (e) Un portofoliu 50/50 din S&P 500 și DAX are volatilitatea zilnică $\sqrt{0,25 \times 1,22^2 + 0,25 \times 1,43^2} = 0,94\%$.
- Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație spuneți dacă este corectă; dacă nu, dați afirmația corectă și cifra corectă din notebook (secțiunea C2).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de cinci verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Ce rămîne de azi

- ▣ Corelația zero nu înseamnă independență: verificați și pătratele sau valorile absolute
- ▣ Varianța condiționată a randamentelor se mișcă după știrile de ieri; media condiționată abia se mișcă
- ▣ Amestecurile de regimuri Normale dau cozi groase
- ▣ Monte Carlo: raportați eroarea standard; separați eroarea de simulare de eroarea de model
- ▣ GBM reproduce aproximativ traiectoria unui indice, dar nu cozile, grupurile de volatilitate sau cele mai adînci drawdown-uri
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați fiecare definiție, model și cifră

După seminar

- ▣ Cursul 4 dezvoltă fiecare temă de azi: distribuții, dependență, condiționare, Monte Carlo, arbori binomiali, mers aleator, procesul Wiener și GBM
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook; rezolvările se discută la seminar
- ▣ C1 poate deveni un proiect de echipă: simulări GARCH și cu schimbare de regim, block bootstrap, mai mulți indici
- ▣ Lectură: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), cap. 3–5; exerciții rezolvate: [Borak, Härdle & López-Cabrera \(2013\)](#)

Bibliografie

- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Cox, J.C., Ross, S.A., Rubinstein, M. (1979). Option pricing: a simplified approach. *Journal of Financial Economics*, 7(3), 229–263.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Glasserman, P. (2003). *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Springer.
- ▣ Marsaglia, G. (1968). Random numbers fall mainly in the planes. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 61(1), 25–28.