



Statistica piețelor financiare

Seminarul 11: Ipoteza piețelor fractale și memoria lungă



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ ACF: Autocorrelation Function (funcția de autocorelație)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ▣ ARFIMA: AutoRegressive Fractionally Integrated Moving Average (model autoregresiv fracționar integrat cu medie mobilă)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ DFA: Detrended Fluctuation Analysis (analiza fluctuațiilor fără tendință)
- ▣ EMH: Efficient Market Hypothesis (ipoteza pieței eficiente)
- ▣ EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- ▣ FMH: Fractal Market Hypothesis (ipoteza pieței fractale)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GPH: Geweke–Porter–Hudak (log-periodogram estimator) — estimatorul Geweke–Porter–Hudak pe log-periodogramă
- ▣ MA: Moving Average (medie mobilă)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cum putem măsura memoria lungă a unei piețe fără să vedem memorie acolo unde nu există?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 11: secțiunea „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
 - ▶ Partea A: R/S pas cu pas, exponentul Hurst dintr-un grafic R/S, zgomotul gaussian fracționar și scalarea riscului, ponderile și autocorelațiile ARFIMA, pe hârtie
 - ▶ Partea B: R/S, DFA, GPH și testul lui Lo cu benzi Monte Carlo pe S&P 500, BET, Banca Transilvania și Bitcoin; memoria lungă a volatilității; exponenți pe ferestre mobile; fiecare cu o întrebare de interpretare
 - ▶ Partea C: o întrebare deschisă pentru proiect și un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	R/S pentru opt randamente, pas cu pas; H din trei puncte ale unui grafic R/S	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	zgomot gaussian fracționar: autocorelații, riscul pe 10 zile, VaR 1% (value at risk, valoarea expusă la risc)	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	ARFIMA(0,d,0): ponderi și autocorelații comparate cu un AR(1)	Rezolvat, Propus	A5
B1, B2	R/S, DFA, GPH și testul lui Lo cu benzi Monte Carlo: S&P 500; BET, TLV	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	memoria lungă a lui $ r_t $ și r_t^2 , testul permutării: S&P 500; Bitcoin	Rezolvat, Propus	B3
B5, B6	exponenți DFA pe ferestre mobile, cu o bandă Monte Carlo: S&P 500; DAX, TLV	Rezolvat, Propus	B5
C1, C2	se schimbă memoria în crize? ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1, B3

- ▣ **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați voi, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Prețul folosit	Perioada
S&P 500, DAX, BET	EODHD	închidere	2000–2026
Bitcoin	EODHD	închidere, 7 zile pe săptămână	2014–2026
Banca Transilvania (TLV)	EODHD	închidere ajustată	2010–2026

- Randamente logaritmice zilnice în %: $r_t = 100 (\ln P_t - \ln P_{t-1})$; weekendurile și închiderile repetate din zilele libere se elimină (cu excepția Bitcoin); ultima zi este 18 septembrie 2026
- TLV: zilele de 30 și 31 mai 2016 se elimină (o ajustare de preț aplicată cu o zi mai târziu, [Capitolul 2](#))
- În notebook: `returns('bet')`, `hurst_rs(x)`, `hurst_dfa(x)`, `gph(x)`, `lo_test(x)`, `mc_null(N)`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/5): ipoteza pieței fractale și H

- **FMH** (fractal market hypothesis, ipoteza pieței fractale) [Peters \(1994\)](#): o piață este stabilă când investitori cu multe orizonturi (de la minute la decenii) tranzacționează între ei
 - ▶ într-o criză, toate orizonturile se reduc la cel mai scurt: fără cumpărători, fără lichiditate
 - ▶ testabilă prin scalare și memorie pe orizonturi diferite
- **Autosimilaritate**: $X_{ct} \stackrel{d}{=} c^H X_t$; abaterea standard pe h zile este de h^H ori cea zilnică
 - ▶ **Exponentul Hurst** $H \in (0, 1)$: $H = 0,5$ creșteri independente (mers aleator, EMH); $H > 0,5$ persistență; $H < 0,5$ antipersistență
 - ▶ H nu este o probabilitate; dimensiunea fractală a unei traiectorii de preț este $D = 2 - H$

Noțiuni necesare azi (2/5): statistica R/S

- Blocul $x_1, \dots, x_n$, media $\bar{x}$; abaterile cumulate $Y_k = \sum_{j=1}^k (x_j - \bar{x})$
 - amplitudinea $R_n = \max_k Y_k - \min_k Y_k$; abaterea standard $S_n = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_j (x_j - \bar{x})^2}$; $(R/S)_n = R_n/S_n$ [Hurst \(1951\)](#)
- $(R/S)_n \approx c n^H$: facem media R/S pe blocuri fără suprapunere de mărime n , apoi estimăm regresia lui $\log(R/S)_n$ pe $\log n$; panta este $\hat{H}$
 - trei mărimi de bloc la distanțe egale pe scară logaritmică: panta OLS este egală cu panta dintre punctele extreme
- Eșantioane mici: pentru date i.i.d., panta R/S este peste 0,5 (circa 0,544 pentru $N = 6714$) [Anis & Lloyd \(1976\)](#)

Noțiuni necesare azi (3/5): memoria lungă, fGn și ARFIMA

- **Memoria lungă:** $\rho(k) \sim C k^{2d-1}$, $0 < d < 0,5$; autocorelațiile scad hiperbolic și nu sînt sumabile (Franke, Härdle & Hafner (2019), 14.1); memoria scurtă (AR): $\rho(k) = \phi^k$
- **Zgomotul gaussian fracționar** (fGn, fractional Gaussian noise), creșterile mișcării browniene fracționare Mandelbrot & Van Ness (1968):
 - ▶ $\rho(k) = \frac{1}{2} \left(|k+1|^{2H} - 2|k|^{2H} + |k-1|^{2H} \right) \approx H(2H-1)k^{2H-2}$; $\rho(1) = 2^{2H-1} - 1$
- **ARFIMA(0,d,0)** Hosking (1981): $(1-L)^d X_t = \varepsilon_t$, $d = H - 0,5$
 - ▶ $(1-L)^d = \sum_j \pi_j L^j$: $\pi_0 = 1$, $\pi_j = \pi_{j-1}(j-1-d)/j$; ponderile MA $\psi_j = \psi_{j-1}(j-1+d)/j$
 - ▶ $\rho(1) = d/(1-d)$, $\rho(k) = \rho(k-1)(k-1+d)/(k-d)$

Noțiuni necesare azi (4/5): DFA, GPH, testul lui Lo și benzile Monte Carlo

- **DFA** Peng et al. (1994): profilul Y_k ; o dreaptă estimată în fiecare bloc de mărime n ; $F(n) =$ rădăcina mediei pătratelor abaterilor; panta lui $\log F$ în funcție de $\log n = \hat{H}$
- **GPH** Geweke & Porter-Hudak (1983): OLS pentru $\ln I(\lambda_j)$ (periodograma) în funcție de $-\ln(4 \sin^2(\lambda_j/2))$, $j \leq m = \lfloor T^{0,5} \rfloor$; panta $\hat{d}$, SE $\pi/\sqrt{24m}$
- **R/S modificat al lui Lo** Lo (1991): $V = R/(\sqrt{N}\hat{\sigma}(q))$, cu o varianță Newey–West; H_0 : memorie scurtă; respingem la 5% dacă $V \notin [0,809, 1,862]$
- **Banda Monte Carlo** Weron (2002): simulăm multe serii i.i.d. Normale de aceeași lungime, aplicăm același estimator, luăm cuantilele de 2,5% și 97,5%
 - ▶ respingem $H = 0,5$ doar dacă $\hat{H}$ se află în afara benzii

Noțiuni necesare azi (5/5): memorie aparentă, volatilitate, ferestre mobile

- ▣ **Memorie lungă aparentă:** schimbările mediei [Diebold & Inoue \(2001\)](#) și volatilitatea GARCH persistentă ([Capitolul 9](#)) produc ACF de selecție care scad lent
- ▣ **Testul permutării:** o permutare aleatoare păstrează distribuția și distruge ordinea; dacă $\hat{H}$ scade la 0,5, memoria era în ordinea zilelor
- ▣ **Volatilitatea:** memoria lungă a lui $|r_t|$ și r_t^2 [Ding, Granger & Engle \(1993\)](#) privește mărimea randamentelor, nu direcția lor
- ▣ **Ferestre mobile:** $\hat{H}$ pe ferestre de 1000 de zile mutate cu 21, datat la sfârșitul ferestrei; cu teste la 5%, circa 5% dintre ferestre ies din bandă din întâmplare

A1: R/S pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Opt randamente zilnice (%):
0,5; -0,3; 0,8; -0,2; 0,6; -0,1; 0,4; -0,7.
- ▣ 1. Calculați media, abaterile și abaterile cumulate $Y_1, \dots, Y_8$.
- ▣ 2. Calculați R , S (cu numitorul n) și R/S .
- ▣ 3. Randamentele S&P 500 din 2000 dau $(R/S)_{16} = 3,91$, $(R/S)_{64} = 8,38$, $(R/S)_{256} = 17,03$; calculați $\hat{H}$.
- ▣ Raportați: R , S , R/S , $\hat{H}$ și o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $\bar{x} = 0,125$; Y_k : 0,375; -0,050; 0,625; 0,300; 0,775; 0,550; 0,825; 0,000
- ▣ 2. $R = 0,825 - (-0,050) = 0,875$; $S = \sqrt{1,915/8} = 0,489$;
 $R/S = 1,788$
- ▣ 3. $\log_{10}$: n : 1,204; 1,806; 2,408; R/S : 0,592; 0,923; 1,231;
 $\hat{H} = 0,639/1,204 = 0,531$
- ▣ Semnele alternante țin abaterile cumulate mici; un $\hat{H}$ puțin peste 0,5 reflectă deplasarea R/S în eșantioane mici, nu memoria (B1).

A2: semne grupate [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Opt randamente (%): 0,6; 0,4; 0,5; 0,3; -0,4; -0,6; -0,2; -0,5. Model: A1.
- ▣ 1. Calculați media și $Y_1, \dots, Y_8$.
- ▣ 2. Calculați R , S și R/S și comparați cu A1.
- ▣ 3. Randamentele BET dau $(R/S)_{16} = 4,23$, $(R/S)_{64} = 10,08$, $(R/S)_{256} = 21,61$; calculați $\hat{H}$.
- ▣ Raportați: R/S , $\hat{H}$ și două fraze.

A3: zgomot gaussian fracționar și riscul pe 10 zile [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Randamentele zilnice urmează un fGn cu $H = 0,7$ și volatilitatea zilnică $\sigma = 1,2\%$; $z_{0,99} = 2,326$.
- ▣ 1. Calculați exact $\rho(1)$ și $\rho(10)$, precum și $\rho(10)$ cu aproximarea $H(2H - 1)k^{2H-2}$.
- ▣ 2. Calculați factorul de scalare 10^H și comparați-l cu $\sqrt{10}$.
- ▣ 3. Calculați VaR 1% pe o zi și pe 10 zile (cazul Normal), cu h^H și cu $\sqrt{h}$.
- ▣ 4. Calculați dimensiunea fractală a traiectoriei prețului.
- ▣ Raportați: șase valori și o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $\rho(1) = 2^{0,4} - 1 = 0,320$;
 $\rho(10) = \frac{1}{2}(11^{1,4} - 2 \cdot 10^{1,4} + 9^{1,4}) = 0,0704$; aproximarea
 $0,7 \cdot 0,4 \cdot 10^{-0,6} = 0,0703$
- ▣ 2. $10^{0,7} = 5,012$, față de $\sqrt{10} = 3,162$
- ▣ 3. $2,326 \times 1,2 = 2,79\%$; 10 zile: $2,79 \times 5,012 = 13,99\%$, față de $8,83\%$ (+58,5%)
- ▣ 4. $D = 2 - H = 1,30$
- ▣ Randamentele persistente fac ca pierderile pe mai multe zile să se adune: regula $\sqrt{h}$ subestimează riscul pe 10 zile cu peste o treime.

A4: antipersistență și o abatere mică de la 0,5 [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Datele din A3, cu $H = 0,4$ și cu $H = 0,55$. Model: A3.
- ▣ 1. Calculați $\rho(1)$ și $\rho(10)$ pentru ambele valori ale lui H .
- ▣ 2. Calculați VaR 1% pe 10 zile pentru ambele valori și diferența față de regula $\sqrt{h}$, în %.
- ▣ 3. Calculați D pentru ambele valori.
- ▣ Raportați: opt valori și o frază.

A5: ARFIMA(0; 0,3; 0) comparat cu un AR(1) [Rezolvat]

Cerință

- ▣ $(1 - L)^{0,3} X_t = \varepsilon_t$, ε_t i.i.d. $N(0, 1)$.
- ▣ 1. Calculați π_1 , π_2 și ponderile MA ψ_1 , ψ_2 .
- ▣ 2. Calculați $\rho(1)$, $\rho(2)$, $\rho(10)$ și $\rho(50)$.
- ▣ 3. Pentru un AR(1) cu $\phi = \rho(1)$, calculați $\rho(10)$ și $\rho(50)$.
- ▣ 4. Dați H și primul decalaj cu $\rho(k) < 0,05$ pentru ambele modele.
- ▣ Raportați: zece valori și o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $\pi_1 = -0,3$, $\pi_2 = -0,3 \times 0,7/2 = -0,105$; $\psi_1 = 0,3$, $\psi_2 = 0,3 \times 1,3/2 = 0,195$
- ▣ 2. $\rho(1) = 0,3/0,7 = 0,429$; $\rho(2) = 0,429 \times 1,3/1,7 = 0,328$; $\rho(10) = 0,173$; $\rho(50) = 0,091$
- ▣ 3. $0,429^{10} = 0,0002$; $0,429^{50} \approx 0$
- ▣ 4. $H = 0,8$; sub 0,05 după 4 decalaje (AR) și 222 de decalaje (ARFIMA)
- ▣ Același $\rho(1)$, memorie foarte diferită: AR(1) uită în cîteva zile, ARFIMA în cîteva luni.

A6: memorie puternică și antipersistență [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar


Cerință

- ▣ ARFIMA(0,d,0) cu $d = 0,45$ și cu $d = -0,2$. Model: A5.
- ▣ 1. Calculați π_1 , π_2 , $\rho(1)$, $\rho(2)$ și $\rho(10)$ pentru ambele valori.
- ▣ 2. Pentru $d = 0,45$, comparați $\rho(10)$ și $\rho(50)$ cu un AR(1) cu $\phi = \rho(1)$.
- ▣ 3. Dați H pentru ambele valori și precizați care este staționar.
- ▣ Raportați: un tabel mic și o frază.

B1: memorie lungă în randamentele S&P 500? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** au randamentele zilnice S&P 500 memorie lungă?
- ▣ **Date:** închiderile S&P 500 din 2000, randamente logaritmice zilnice în %
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați H cu R/S și DFA (mărimi de bloc de la 10 la $N/4$) și d cu GPH ($m = \lfloor T^{0.5} \rfloor$), cu eroarea standard a lui $\hat{d}$.
 2. Calculați statistica modificată a lui Lo, $V(q)$, cu q ales prin regula lui Andrews, și statistica clasică $V(0)$.
 3. Simulați 300 de serii i.i.d. Normale de aceeași lungime și dați banda de 95% a fiecărui estimator.
 4. Desenați graficul R/S în interiorul anvelopei Monte Carlo.
 5. Interpretare: este estimarea R/S de peste 0,5 o dovadă de memorie lungă?
- ▣ **Raportați:** un tabel cu patru estimări și benzile lor, graficul și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



	R/S	DFA	GPH $\hat{H} = \hat{d} + 0,5$	Lo $V(q)$
estimare	0,530	0,488	0,536	1,559 ($q = 7$)
banda de 95%	[0,512; 0,575]	[0,456; 0,540]	[0,363; 0,652]	[0,809, 1,862]

- $N = 6\,714$; GPH: $\hat{d} = 0,036$, SE 0,071 ($m = 81$), $t = 0,51$; statistica clasică $V(0) = 1,379$
- Interpretare: nu: seriile i.i.d. de această lungime dau în medie R/S 0,544; fiecare estimare se află în banda ei, iar testul lui Lo nu respinge memoria scurtă


B2: BET și Banca Transilvania [Propus]

- **Întrebarea:** arată BET sau Banca Transilvania memorie lungă în randamente? Model: B1.
- **Date:** BET din 2000, TLV din 2010 (fără 30–31 mai 2016); randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
 1. Estimați H cu R/S, DFA și GPH pentru fiecare serie.
 2. Calculați $V(q)$ al lui Lo și precizați dacă memoria scurtă este respinsă la 5%.
 3. Calculați banda Monte Carlo a fiecărui estimator pentru fiecare lungime.
 4. Interpretare: ce ar putea explica rezultatul pentru BET?
- **Raportați:** un tabel și două fraze
- Notebook: secțiunea B2

B3: memoria lungă a volatilității S&P 500 [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** au randamentele absolute și pătratele randamentelor S&P 500 memorie lungă?
- ▣ **Date:** randamentele logaritmice zilnice S&P 500 din 2000; $|r_t|$ și r_t^2
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați d cu GPH pentru $m = \lfloor T^{0,5} \rfloor$ și $m = \lfloor T^{0,6} \rfloor$ și H cu DFA, pentru $|r_t|$ și r_t^2 .
 2. Raportați ACF a lui $|r_t|$ la decalajele 1, 50 și 250 și banda de 95% $\pm 1,96/\sqrt{T}$.
 3. Permutați aleator $|r_t|$ și repetați estimările.
 4. Desenați ACF a lui $|r_t|$ înainte și după permutare.
 5. Interpretare: contrazice memoria lungă a lui $|r_t|$ forma slabă a EMH?
- ▣ **Raportați:** un tabel, graficul și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



	GPH $T^{0,5}$	GPH $T^{0,6}$	DFA	$\rho(1)$	$\rho(50)$	$\rho(250)$
$ r_t $	0,470	0,467	0,953	0,289	0,127	0,009
r_t^2	0,326	0,377	0,892	0,313	0,053	-0,010
$ r_t $ permutat	0,028	-0,001	0,498	-0,008	-0,011	0,009

- $m = 81$ și 197 ; SE $0,071$ și $0,046$; banda ACF $\pm 0,024$; după permutare, toate estimările scad la 0 (d) sau la $0,5$ (H)
- Interpretare: nu: forma slabă privește direcția randamentelor (B1); memoria lungă a lui $|r_t|$ înseamnă risc previzibil, care cere un model de volatilitate (Capitolul 9)


B4: randamentele și volatilitatea Bitcoin [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** arată Bitcoin memorie lungă în randamente, în volatilitate sau în ambele? Modele: B1, B3.
- ▣ **Date:** randamentele logaritmice zilnice Bitcoin din 2014 (7 zile pe săptămână)
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați R/S, DFA, GPH și $V(q)$ al lui Lo pentru randamente, cu benzile Monte Carlo.
 2. Estimați GPH ($T^{0,5}$, $T^{0,6}$) și DFA pentru $|r_t|$ și r_t^2 .
 3. Repetați estimările volatilității după o permutare aleatoare a lui $|r_t|$.
 4. Interpretare: este Bitcoin mai aproape de S&P 500 sau de BET?
- ▣ **Raportați:** un tabel și două fraze
- ▣ Notebook: secțiunea B4

B5: exponenți Hurst pe ferestre mobile pentru S&P 500 [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** s-a schimbat memoria randamentelor S&P 500 din 2000 încolo?
- ▣ **Date:** randamentele logaritmice zilnice S&P 500 din 2000
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați exponentul DFA pe ferestre de 1000 de zile mutate cu 21 de zile, datate la ultima zi a fiecărei ferestre.
 2. Calculați banda Monte Carlo de 95% pentru $N = 1000$.
 3. Raportați minimul și maximul, cu datele lor, precum și ponderea ferestrelor sub bandă și peste bandă.
 4. Desenați exponentul pe ferestre mobile, cu banda.
 5. Interpretare: dovedește o fereastră din afara benzii că piața era inefficientă în acel moment?
- ▣ **Raportați:** șase valori, graficul și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B5

B5: rezolvare [Rezolvat]



- 273 de ferestre din 29 decembrie 2003; banda $[0,417; 0,577]$; $\hat{H}$ mediu = 0,443
- Minimul 0,316 (31 decembrie 2008), maximul 0,549 (9 iulie 2021); 22,3% dintre ferestre sub bandă, 0,0% peste
- Interpretare: nu: din întâmplare, circa 14 dintre 273 de ferestre ies din bandă, iar ferestrele consecutive se suprapun; contează doar perioadele lungi; aici perioadele sînt sub bandă (antipersistență după 2008 și în 2016), niciodată peste

B6: exponenți pe ferestre mobile pentru DAX și Banca Transilvania [Propus]

- **Întrebarea:** se confirmă rezultatul din B5 pentru DAX și Banca Transilvania? Model: B5.
- **Date:** DAX din 2000, TLV din 2010; randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
 1. Estimați exponentul DFA pe ferestre mobile ca în B5.
 2. Raportați ponderea ferestrelor sub bandă și peste bandă, precum și minimul și maximul, cu datele lor.
 3. Comparați exponentul mediu din prima și din ultima treime a ferestrelor.
 4. Interpretare: care piață pare mai stabilă în timp?
- **Raportați:** un tabel și două fraze
- **Notebook:** secțiunea B6

C1: se schimbă memoria pieței în crize? [Propus]

- **Întrebarea:** se schimbă exponentul Hurst al randamentelor sau al volatilității într-o criză, așa cum sugerează ipoteza pieței fractale?
- **Date:** randamentele logaritmice zilnice S&P 500 și BET; un an liniștit (2017) și doi ani de criză (septembrie 2008–august 2009, februarie 2020–februarie 2021); modele: B1, B3
- **Cerințe**
 1. Estimați exponentul DFA pentru r_t și $|r_t|$ și volatilitatea anualizată în fiecare dintre cei trei ani, pentru ambii indici.
 2. Calculați banda Monte Carlo pentru ferestre de circa 250 de zile.
 3. Enumerați trei motive pentru care un singur an de criză nu poate lămurii întrebarea.
 4. Interpretare: ce abordare ar separa o schimbare a memoriei de o schimbare a volatilității?
- **Raportați:** un tabel și un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI să interpreteze estimările memoriei lungi pentru S&P 500 (date zilnice, din 2000). Răspunsul:
- (a) R/S dă $H = 0,530$ pentru randamente: peste 0,5, deci randamentele au memorie lungă și tendințele pot fi exploatare.
- (b) $H = 0,530$ înseamnă o probabilitate de 53% ca mâine să aibă același semn ca azi.
- (c) GPH dă $d = 0,470$ pentru $|r|$, deci $H = d - 0,5 = -0,030$: randamentele absolute sînt antipersistente.
- (d) Memoria lungă a lui $|r|$ contrazice forma slabă a EMH.
- (e) Statistica modificată a lui Lo, $V = 1,56$, se află în $[0,809; 1,862]$, deci memoria scurtă nu este respinsă la 5%.
- (f) Pentru mai multă precizie, folosiți toate cele $T/2 = 3357$ de frecvențe în regresia GPH.
- Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Idei de reținut

- ▣ R/S, DFA și GPH estimează același H în moduri diferite; raportăm mai mulți estimatori, fiecare cu o bandă Monte Carlo pentru același N
- ▣ $d = H - 0,5$; H este un exponent de scalare, nu o probabilitate
- ▣ Randamentele piețelor mari: fără memorie lungă; volatilitatea: memorie lungă peste tot; testul permutării o localizează în ordinea zilelor
- ▣ Estimările pe ferestre mobile: interpretăm perioadele lungi din afara benzii, nu ferestrele izolate
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați banda, conversia dintre d și H și lățimea de bandă

După seminar

- ▣ Cursul 11 dezvoltă fiecare temă de azi: FMH, autosimilaritatea, fBm și ARFIMA, estimatorii, memoria aparentă, exponenții pe ferestre mobile, scalarea riscului
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook; rezolvările se discută la seminar
- ▣ C1 poate deveni un proiect de echipă: randamente standardizate cu GARCH, multe crize, o bandă pe baza unui GARCH
- ▣ Lectură: Franke, Härdle & Hafner (2019), cap. 14; Lo (1991); Weron (2002)

Bibliografie

- ▣ Anis, A.A., Lloyd, E.H. (1976). The expected value of the adjusted rescaled Hurst range of independent normal summands. *Biometrika*, 63(1), 111–116.
- ▣ Diebold, F.X., Inoue, A. (2001). Long memory and regime switching. *Journal of Econometrics*, 105(1), 131–159.
- ▣ Ding, Z., Granger, C.W.J., Engle, R.F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. *Journal of Empirical Finance*, 1(1), 83–106.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Geweke, J., Porter-Hudak, S. (1983). The estimation and application of long memory time series models. *Journal of Time Series Analysis*, 4(4), 221–238.
- ▣ Hosking, J.R.M. (1981). Fractional differencing. *Biometrika*, 68(1), 165–176.
- ▣ Hurst, H.E. (1951). Long-term storage capacity of reservoirs. *Transactions of the American Society of Civil Engineers*, 116(1), 770–799.
- ▣ Kristoufek, L. (2013). Fractal markets hypothesis and the global financial crisis: wavelet power evidence. *Scientific Reports*, 3, 2857.
- ▣ Lo, A.W. (1991). Long-term memory in stock market prices. *Econometrica*, 59(5), 1279–1313.
- ▣ Mandelbrot, B.B., Van Ness, J.W. (1968). Fractional Brownian motions, fractional noises and applications. *SIAM Review*, 10(4), 422–437.
- ▣ Peng, C.-K., Buldyrev, S.V., Havlin, S., Simons, M., Stanley, H.E., Goldberger, A.L. (1994). Mosaic organization of DNA nucleotides. *Physical Review E*, 49(2), 1685–1689.
- ▣ Peters, E.E. (1994). *Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics*. Wiley.
- ▣ Weron, R. (2002). Estimating long-range dependence: finite sample properties and confidence intervals. *Physica A*, 312(1–2), 285–299.