



Statistica piețelor financiare

Seminarul 12: Modele de scoring



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ **AI:** Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ **AR:** Accuracy Ratio (of the CAP curve) — raportul de acuratețe (al curbei CAP)
- ▣ **AUC:** Area Under the (ROC) Curve (aria de sub curba ROC)
- ▣ **CAP:** Cumulative Accuracy Profile (profilul cumulat al acurateței)
- ▣ **CI:** Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ **DM:** Deutsche Mark (marca germană)
- ▣ **EAD:** Exposure At Default (expunerea la momentul nerambursării)
- ▣ **FN:** False Negative (fals negativ)
- ▣ **FPR:** False Positive Rate (rata fals pozitivelor)
- ▣ **HL:** Hosmer–Lemeshow (test) — testul Hosmer–Lemeshow
- ▣ **IRB:** Internal Ratings-Based (approach) — abordarea pe baza ratingurilor interne
- ▣ **KS:** Kolmogorov–Smirnov (statistic) — statistica Kolmogorov–Smirnov

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ **LDA**: Linear Discriminant Analysis (analiza discriminantă liniară)
- ▣ **LGD**: Loss Given Default (pierderea în caz de nerambursare)
- ▣ **PD**: Probability of Default (probabilitatea de nerambursare)
- ▣ **PDO**: Points to Double the Odds (punctele care dublează șansa bun:rău)
- ▣ **ROC**: Receiver Operating Characteristic (curve) — curba caracteristică de operare
- ▣ **RWA**: Risk-Weighted Assets (activele ponderate la risc)
- ▣ **TN**: True Negative (adevărat negativ)
- ▣ **TP**: True Positive (adevărat pozitiv)
- ▣ **TPR**: True Positive Rate — rata adevărat pozitivelor (sensibilitatea)
- ▣ **UCI**: University of California, Irvine (Machine Learning Repository) — Universitatea din California, Irvine (arhiva de date pentru învățare automată)

Întrebarea de azi și traseul

- **Întrebarea:** cum transformă o bancă datele unui solicitant într-o probabilitate de nerambursare și cum judecăm această probabilitate?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 12: secțiunea „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- Traseul
 - ▶ Partea A: șansa și logaritmul șansei, WoE și IV, matricea de confuzie și AUC, punctele unui scorecard, pe hîrtie
 - ▶ Partea B: un scorecard pe date reale de credit, validarea lui, logit față de LDA, capitalul și echitatea, fiecare cu o întrebare de interpretare
 - ▶ Partea C: o întrebare deschisă pentru proiect și un răspuns AI de verificat
- Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	PD a unui solicitant dintr-un model logit; rapoartele șanselor	Rezolvat,	A1
A3, A4	WoE și IV dintr-un tabel de bun-platnici și rău-platnici	Propus	A3
A5, A6	matricea de confuzie, AUC prin numărarea perechilor, Gini, KS, scorul Brier	Rezolvat,	A5
A7, A8	scalarea scorecard-ului și punctele; corecția a priori și pierderea așteptată	Propus	A7
B1, B2	IV și un logit WoE: South German Credit; IV pentru datele din Taiwan	Rezolvat,	B1
B3, B4	validarea scorecard-ului; logit față de LDA pe datele din Taiwan	Propus	B3
B5, B6	pierderea așteptată și capitalul IRB ale unui portofoliu; echitatea pe sexe și vârste	Rezolvat,	B5
C1, C2	gradient boosting comparat cu logit-ul; erorile unui răspuns AI	Propus	B3, A5

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați voi, după model

Datele folosite

Setul de date	Sursa	Mărimea	Rezultatul
South German Credit	South German Credit (2020)	1000 de credite, 1973–1975	300 rău-platnici, 700 bun-platnici
Carduri de credit, Taiwan	Default of Credit Card Clients (2009)	30 000 de deținători, 2005	nerambursare în octombrie 2005 (22,1%)

- Ambele sub licența CC BY 4.0, salvate o singură dată în data/credit din repository-ul cursului; South German Credit este versiunea corectată a datelor germane de credit din UCI [Grömping \(2019\)](#)
- Nerambursare = 1 pentru un credit neperformant sau o plată ratată, 0 în rest; în South German Credit, creditele neperformante sînt suprareprezentate (rata din populație este de aproximativ 5%)
- În notebook: `load_credit('sgc')`, `woe_table(x, y, var)`, `logit_fit(X, y)`, `auc(score, y)`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/7): nerambursarea și pierderea așteptată

- **Nerambursarea** (default): debitorul nu plătește conform contractului (Basel: peste 90 de zile de întârziere sau probabilitate mică de plată) [Comitetul de la Basel \(2006\)](#)
 - ▶ $Y = 1$ pentru nerambursare (rău-platnic), $Y = 0$ pentru bun-platnic
 - ▶ un **scor de credit** ordonează solicitanții după risc
- Trei parametri de risc ai unui credit
 - ▶ **PD**: probabilitatea de nerambursare într-un an
 - ▶ **LGD**: partea din expunere pierdută în caz de nerambursare
 - ▶ **EAD**: suma datorată la nerambursare
- **Pierderea așteptată**: $EL = PD \times LGD \times EAD$
 - ▶ pierderea medie a creditului; este inclusă în dobândă

Noțiuni necesare azi (2/7): capitalul IRB și suprareprezentarea

- ▣ Capitalul IRB din Basel pentru alte credite de retail, pe unitatea de EAD:
 - ▶ $K = \text{LGD}[\Phi((\Phi^{-1}(\text{PD}) + \sqrt{R} \Phi^{-1}(0,999))/\sqrt{1-R}) - \text{PD}]$, $\text{RWA} = 12,5 K \text{ EAD}$
 - ▶ Φ, Φ^{-1} : funcția de repartiție $N(0, 1)$ și inversa ei; termenul din $\Phi(\cdot)$ este PD într-un an care apare o dată la 1000 de ani
 - ▶ R : corelația cu economia, care scade de la 0,16 la 0,03 când PD crește; RWA: activele ponderate la risc
- ▣ **Suprareprezentarea**: eșantionul are rata rău-platnicilor π_s , iar populația π
 - ▶ adunăm $\ln \frac{\pi/(1-\pi)}{\pi_s/(1-\pi_s)}$ la logaritmul șansei fiecărui solicitant
 - ▶ ordonarea solicitanților nu se schimbă, nivelul PD se schimbă

Noțiuni necesare azi (3/7): șansa și modelul logit

- ▣ **Șansa** (odds) de nerambursare $p/(1 - p)$; **logaritmul șansei** $\ln[p/(1 - p)]$; șansa bun:rău $(1 - p)/p$
 - ▶ p : probabilitatea de nerambursare; $p = 0,2$: șansa 0,25, logarithmul șansei $-1,386$, șansa bun:rău 4:1
- ▣ **Modelul logit Cox (1958)**: $\ln \frac{p}{1 - p} = \eta = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k$, $p = \frac{1}{1 + e^{-\eta}}$
 - ▶ $x_1, \dots, x_k$: caracteristicile solicitantului; η : predictorul liniar; β_0 : termenul liber
 - ▶ coeficienții se estimează prin verosimilitate maximă
 - ▶ β_j : modificarea logarithmului șansei la o unitate de x_j ; e^{β_j} : **raportul șanselor** (odds ratio), factorul care înmulțește șansa
 - ▶ efectul asupra probabilității: $\Delta p \approx p(1 - p)\beta_j$

Noțiuni necesare azi (4/7): LDA, WoE și IV

- **LDA** (analiza discriminantă liniară, [Fisher \(1936\)](#)): $w = S_W^{-1}(m_1 - m_0)$ separă cel mai bine grupurile
 - ▶ m_1, m_0 : mediile rău-platnicilor și ale bun-platnicilor; S_W : covarianța lor comună
 - ▶ cu grupuri Normale, logaritmul șansei este liniar în x , ca în modelul logit
- Împărțim o variabilă în intervale (clase); g_i, b_i : bun-platnicii și rău-platnicii din intervalul i ; G, B : totalurile
 - ▶ **Weight of Evidence**: $WoE_i = \ln \frac{g_i/G}{b_i/B}$; pozitiv: mai sigur decît media, negativ: mai riscant
 - ▶ un interval fără bun-platnici sau fără rău-platnici: adăugăm 0,5 la ambele frecvențe
- **Information Value**: $IV = \sum_i (g_i/G - b_i/B) WoE_i \geq 0$
 - ▶ regula practică [Siddiqi \(2006\)](#): sub 0,02 inutilă, 0,02–0,1 slabă, 0,1–0,3 medie, peste 0,3 puternică
- Un **logit WoE**: fiecare variabilă este înlocuită cu WoE al intervalului ei
 - ▶ intervalele și WoE provin doar din eșantionul de estimare; eșantionul de test joacă rolul viitorilor solicitanți și se folosește o singură dată, la final

Noțiuni necesare azi (5/7): praguri și costuri

- ▣ Pragul c : respingem dacă $PD > c$
 - ▶ **TP**: rău-platnic respins; **FN**: rău-platnic acceptat
 - ▶ **FP**: bun-platnic respins; **TN**: bun-platnic acceptat
- ▣ Ratele
 - ▶ $TPR = TP/(TP + FN)$: ponderea rău-platnicilor identificați; $FPR = FP/(FP + TN)$: ponderea bun-platnicilor respinși
 - ▶ $\text{acurate\cetea} = (TP + TN)/n$, n fiind numărul solicitanților
- ▣ Costul pe solicitant = $(C_{FN} FN + C_{FP} FP)/n$; C_{FN} , C_{FP} : costul unei erori de fiecare tip
 - ▶ pragul Bayes: respingem dacă $p > C_{FP}/(C_{FP} + C_{FN})$; cu $C_{FN} = 5$, $C_{FP} = 1$: $p > 1/6$

Noțiuni necesare azi (6/7): discriminarea și calibrarea

- Curba **ROC**: (FPR, TPR) pentru toate pragurile; **AUC**: aria de sub ea [Hanley & McNeil \(1982\)](#)
 - ▶ $AUC = P(\text{PD unui rău-platnic aleator} > \text{PD unui bun-platnic aleator})$, egalitățile contează 1/2; 0,5: nicio discriminare, 1: perfectă
 - ▶ prin numărare: ponderea perechilor (rău, bun) în ordinea corectă; **Gini** = $2 AUC - 1$
 - ▶ **KS** = $\max_s |F_{\text{rău}}(s) - F_{\text{bun}}(s)|$, F : funcțiile de repartiție ale PD pentru rău-platnici și bun-platnici
 - ▶ DeLong [DeLong et al. \(1988\)](#): eroarea standard și testul pentru AUC
- **Calibrarea**: PD medie a unui grup trebuie să fie egală cu rata lui de nerambursare
 - ▶ **scorul Brier** [Brier \(1950\)](#): $\frac{1}{n} \sum_i (p_i - y_i)^2$, eroarea pătratică medie a PD; o valoare mai mică este mai bună
 - ▶ Hosmer–Lemeshow [Hosmer & Lemeshow \(1980\)](#): $\sum_g (O_g - E_g)^2 / [E_g(1 - \bar{p}_g)] \approx \chi^2(G - 2)$
 - ▶ G grupuri ordonate după PD; O_g : nerambursările observate; E_g : nerambursările așteptate (suma PD); $\bar{p}_g$: PD medie a grupului g

Noțiuni necesare azi (7/7): scorecard-uri și echitate

- ▣ **Scorecard:** Scorul = Offset + Factor $\times$ $\ln(\text{șansa bun:rău})$ Siddiqi (2006)
 - ▶ **PDO** (points to double the odds): Factor = PDO / $\ln 2$
 - ▶ scorul de bază la șansa₀: Offset = Baza – Factor $\ln(\text{șansa}_0)$
 - ▶ punctele atributului i al variabilei j (logit WoE cu k variabile): $-(\beta_j \text{WoE}_{ij} + \beta_0/k) \text{Factor} + \text{Offset}/k$
- ▣ **Echitatea** (fairness) la un prag Hardt, Price & Srebro (2016)
 - ▶ paritatea demografică: rate egale de aprobare între grupuri
 - ▶ egalitatea de șanse: rate egale de aprobare a bun-platnicilor între grupuri
 - ▶ calibrarea în fiecare grup: aceeași PD înseamnă aceeași rată de nerambursare în fiecare grup

A1: PD a unui solicitant [Rezolvat]

Cerință

- Logit pentru nerambursare: termenul liber $-2,101$; durata (ani) $0,385$; vîrsta (decenii) $-0,159$; suma (1000 DM) $0,029$; fără cont curent $1,859$; sold < 0 DM $1,338$.
- Solicitantul: 2 ani, 30 de ani, 3000 DM, fără cont curent.
- 1. Calculați logaritmul șansei η și PD.
- 2. Calculați șansa de nerambursare și interpretați $e^{1,859}$.
- 3. Calculați PD cu un an în plus de durată și comparați-o cu $p(1-p)\beta$.
- Raportați: patru valori și o frază.

Rezolvare

- 1.
 $\eta = -2,101 + 0,385 \times 2 - 0,159 \times 3 + 0,029 \times 3 + 1,859 = 0,138$; $PD = 1/(1 + e^{-0,138}) = 53,4\%$
- 2. șansa $= e^{0,138} = 1,148$; $e^{1,859} = 6,42$: fără cont curent, șansa este de 6,42 ori cea a grupului de referință
- 3. $\eta + 0,385$: $PD = 62,8\%$ (+9,3 puncte procentuale); $p(1-p)\beta = 9,6$ puncte procentuale
- Raportul șanselor este constant; modificarea PD depinde de poziția solicitantului.

A2: un al doilea solicitant [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Același logit ca în A1. Solicitantul: 1 an, 45 de ani, 2000 DM, sold sub 0 DM. Model: A1.
- ▣ 1. Calculați η , șansa și PD.
- ▣ 2. Calculați PD cu un an în plus de durată.
- ▣ 3. Comparați modificarea PD cu cea din A1 și explicați diferența.
- ▣ Raportați: patru valori și o frază.

A3: WoE și IV pentru contul curent [Rezolvat]

Cerință

- ▣ South German Credit, eșantionul complet: bun-platnici/rău-platnici după contul curent: fără cont 139/135; sub 0 DM 164/105; 0–200 DM 49/14; cel puțin 200 DM sau salariu 348/46.
- ▣ 1. Calculați g_i/G și b_i/B pentru fiecare grup.
- ▣ 2. Calculați WoE pentru fiecare grup.
- ▣ 3. Calculați IV și clasificați variabila.
- ▣ Raportați: un tabel și o frază.

Rezolvare

	g	b	g/G	b/B	WoE	IV
fără cont	139	135	0,199	0,450	−0,818	0,206
< 0 DM	164	105	0,234	0,350	−0,401	0,046
0–200 DM	49	14	0,070	0,047	0,405	0,009
≥ 200 DM / salariu	348	46	0,497	0,153	1,176	0,404
total	700	300	1	1		0,666

- ▣ de exemplu $\ln(0,497/0,153) = 1,176$; $IV = 0,666 > 0,3$: puternică.
- ▣ WoE scade monoton de la grupul cel mai sigur la cel mai riscant.

A4: WoE și IV pentru economii [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Bun-platnici/rău-platnici după economii: fără sau necunoscute 386/217; sub 100 DM 69/34; 100–500 DM 52/11; 500–1000 DM 42/6; cel puțin 1000 DM 151/32. Model: A3.
- 1. Calculați WoE pentru fiecare grup.
- 2. Calculați IV și clasificați variabila.
- 3. Propuneți o unire a grupurilor cu WoE apropiat.
- Raportați: un tabel și două fraze.

A5: matricea de confuzie și AUC prin numărare [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Zece solicitanți, PD și rezultatul ($Y = 1$: nerambursare): 0,05 (0); 0,10 (0); 0,12 (0); 0,20 (0); 0,25 (1); 0,30 (0); 0,40 (0); 0,55 (1); 0,60 (0); 0,80 (1).
- ▣ 1. Construiți matricea de confuzie la pragul 0,5 și calculați acuratețea, TPR și FPR.
- ▣ 2. Calculați AUC numărînd perechile (rău, bun) în ordinea corectă, precum și Gini.
- ▣ 3. Calculați statistica KS și scorul Brier.
- ▣ Raportați: șapte valori și o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. TP 2, FN 1, FP 1, TN 6: acuratețe 80,0%, TPR 66,7%, FPR 14,3%
- ▣ 2. bun-platnici sub fiecare rău-platnic: $4 + 6 + 7 = 17$ din 21 de perechi: AUC = 0,810, Gini = 0,619
- ▣ 3. la $PD \leq 0,20$: 4/7 din bun-platnici, 0/3 din rău-platnici: KS = 0,571; Brier = $1,4819/10 = 0,148$
- ▣ Rău-platnicul cu PD 0,25 este ordonat sub trei bun-platnici, iar cel cu 0,55 sub unul: 4 din 21 de perechi sînt în ordinea greșită.

A6: un al doilea eşantion [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Opt solicitanți: 0,08 (0); 0,15 (0); 0,22 (1); 0,35 (0); 0,42 (0); 0,50 (1); 0,65 (1); 0,90 (0). Model: A5.
- ▣ 1. Construiți matricea de confuzie la pragul 0,4 și calculați acuratețea, TPR și FPR.
- ▣ 2. Calculați AUC prin numărarea perechilor, precum și Gini.
- ▣ 3. Calculați statistica KS și scorul Brier.
- ▣ Raportați: șapte valori și o frază.

A7: scalarea unui scorecard [Rezolvat]

Cerință

- PDO = 20; 600 de puncte la șansa bun:rău 50:1. Un logit WoE cu $k = 6$ variabile are termenul liber $\beta_0 = -0,850$ și, pentru contul curent, $\beta = -0,829$; WoE: fără cont $-0,826$, cel puțin 200 DM 1,043.
- 1. Calculați Factor și Offset.
- 2. Calculați scorul unei PD de 5% și PD a unui scor de 560.
- 3. Calculați punctele celor două grupuri de cont curent.
- Raportați: șase valori și o frază.

Rezolvare

- 1. Factor = $20 / \ln 2 = 28,85$; Offset = $600 - 28,85 \ln 50 = 487,12$
- 2. $487,12 + 28,85 \times \ln 19 = 572,08$; 560: $\ln$ șansa = 2,526, șansa 12,50:1, PD = 7,4%
- 3. Offset/ $k = 81,19$, $\beta_0/k = -0,1417$: fără cont $-(-0,829 \times (-0,826) + (-0,1417)) \times 28,85 + 81,19 = 65,5$; cel puțin 200 DM: 110,2
- Un cont bine alimentat valorează cu 44,7 puncte mai mult decît lipsa contului: 2,2 dublări ale șansei bun:rău.

A8: altă scală, corecția a priori și pierderea așteptată [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar


Cerință

- O bancă folosește $PDO = 40$ și 500 de puncte la șansa 20:1. Un model estimat pe un eșantion cu 30% rău-platnici dă unui solicitant $PD = 30\%$; rata din populație este 5%; $EAD = 10\,000$ DM, $LGD = 45\%$. Model: A7.
- 1. Calculați Factor, Offset, scorul unei PD de 10% și PD a unui scor de 520.
- 2. Corecțați PD de 30% pentru populație.
- 3. Calculați pierderea așteptată cu ambele PD.
- Raportați: șapte valori și o frază.

B1: un scorecard WoE pentru South German Credit [Rezolvat]

- **Întrebarea:** ce variabile aduc informație despre nerambursare și cât de bine ordonează un logit WoE solicitantii noi?
- **Date:** South German Credit; o împărțire stratificată: 700 de credite pentru estimare, 300 pentru test (30% rău-platnici în ambele)
- **Cerințe**
 1. Calculați tabelele WoE și IV pentru cele 20 de variabile pe eșantionul de estimare (durata, suma și vârsta în cinci intervale fixe).
 2. Păstrați variabilele cu IV de cel puțin 0,1 și estimați un logit pentru nerambursare pe valorile lor WoE.
 3. Calculați AUC pe eșantionul de estimare și pe cel de test, cu un interval DeLong de 95% pentru AUC de test.
 4. Reprezentați grafic WoE pentru grupurile de istoric de credit.
 5. Interpretare: are sens economic ordinea grupurilor de istoric de credit?
- **Raportați:** lista variabilelor selectate cu IV-ul lor, coeficienții, două valori AUC cu intervalul, graficul și două fraze
- Notebook: secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



	termen liber	contul curent	istoricul de credit	destinația creditului	economiile	durata	vechimea la angajator
IV		0,591	0,215	0,205	0,166	0,159	0,122
$\hat{\beta}$	-0,850	-0,829	-0,675	-0,937	-0,726	-1,082	-0,873
se	0,095	0,127	0,206	0,217	0,246	0,239	0,265

- 6 variabile cu $IV \geq 0,1$; AUC: estimare 0,789, test 0,801, CI 95% [0,749; 0,854]
- Interpretare: da: o întârziere în trecut (54% neperformante) și un cont critic (50%) sînt cele mai riscante, toate creditele la această bancă rambursate la timp (18%) cele mai sigure; în etichetele UCI necorectate, acest grup, cel mai sigur, se numea „cont critic”


B2: Information Value pentru datele din Taiwan [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** ce fel de informație prezice nerambursarea unui deținător de card: comportamentul de plată sau datele personale? Model: B1.
- ▣ **Date:** cardurile de credit din Taiwan, 30 000 de clienți; aceeași împărțire stratificată 70/30
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați IV pentru PAY_0 și PAY_2 (starea plăților în septembrie și august; categoriile de la -2 la 3 sau mai mult), pentru LIMIT_BAL, PAY_AMT1, BILL_AMT1 și AGE (quintile) și pentru SEX, EDUCATION și MARRIAGE (categorii) pe eșantionul de estimare.
 2. Calculați rata de nerambursare pentru fiecare categorie PAY_0.
 3. Ordonați variabilele după IV și clasificați-le cu regula practică.
 4. Interpretare: de ce este starea plății din ultima lună mult mai puternică decât datele personale?
- ▣ **Raportați:** un tabel cu nouă valori IV, șase rate de nerambursare și două fraze
- ▣ Notebook: secțiunea B2

B3: validarea scorecard-ului [Rezolvat]

- **Întrebarea:** cât de bun este scorecard-ul din B1 pe eșantionul de test și ce prag ar trebui să folosească banca?
- **Date:** cele 300 de credite de test din B1 cu PD-urile lor; costuri: 5 pentru un rău-platnic acceptat, 1 pentru un bun-platnic respins
- **Cerințe**
 1. Construiți matricea de confuzie la pragurile 0,5 și 1/6, cu acuratețea, TPR, FPR și costul pe solicitant.
 2. Calculați AUC, Gini, raportul de acuratețe al curbei CAP și statistica KS.
 3. Calculați scorul Brier, comparați-l cu o PD constantă de 30% și aplicați testul Hosmer–Lemeshow cu cinci grupuri.
 4. Reprezentați curba ROC cu cele două praguri și graficul de calibrare.
 5. Interpretare: ce prag i-ați recomanda băncii?
- **Raportați:** un tabel cu două matrice de confuzie, șase statistici, graficul și două fraze
- **Notebook:** secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



prag	TP	FN	FP	TN	acuratețe	TPR	FPR	cost
0,5	43	47	25	185	76,0%	47,8%	11,9%	0,867
1/6	82	8	112	98	60,0%	91,1%	53,3%	0,507

- AUC = 0,801, Gini = 0,603, AR = 0,602, KS = 0,511; Brier = 0,162 față de 0,210; HL = 0,589 ($p = 0,899$): nicio dovadă de calibrare greșită
- Interpretare: pragul de 1/6: respinge mai mulți solicitanți (64,7%), dar identifică 91,1% din rău-platnici, iar costul scade de la 0,867 la 0,507; acuratețea este un criteriu greșit când erorile au costuri diferite

B4: logit sau LDA pe datele din Taiwan? [Propus]

- **Întrebarea:** diferă logit-ul și LDA a lui Fisher prin ordonare sau prin calibrare? Model: B3.
- **Date:** Taiwan, împărțire 70/30; 13 variabile standardizate: logaritmul limitei, vârsta, indicatorii stării plății din septembrie, numărul lunilor cu întârziere, gradul de utilizare, logaritmul plăților
- **Cerințe**
 1. Estimați un logit și o LDA pe eșantionul de estimare cu aceleași variabile.
 2. Calculați AUC de test pentru ambele și testul DeLong de egalitate a AUC.
 3. Calculați scorul Brier, statistica Hosmer–Lemeshow (zece grupuri) și PD medie pentru ambele, față de rata de nerambursare.
 4. Calculați acuratețea regulii „nimeni nu intră în nerambursare” și a celor două modele la pragul 0,5.
 5. Interpretare: este LDA mai slabă la ordonare sau la calibrare?
- **Raportați:** un tabel și două fraze
- Notebook: secțiunea B4

B5: de la PD la capital [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** câtă pierdere așteptată și cât capital Basel are portofoliul de test din B1 și cât contează corecția a priori?
- ▣ **Date:** cele 300 de credite de test din B1; EAD = suma creditului; $LGD = 45\%$; rata din populație 5%; alte expuneri de retail
- ▣ **Cerințe**
 1. Corecți PD a fiecărui credit de la rata de 30% din eșantion la rata de 5% din populație.
 2. Calculați pierderea așteptată a portofoliului, în DM și ca pondere din EAD, cu și fără corecție.
 3. Calculați capitalul IRB K și activele ponderate la risc ale portofoliului cu PD corectate.
 4. Interpretare: de ce schimbă corecția pierderea așteptată, dar nu și AUC?
- ▣ **Raportați:** opt valori și două fraze
- ▣ Notebook: secțiunea B5

B5: rezolvare [Rezolvat]

- Corecția logaritmului șanse: $\ln(0,05/0,95) - \ln(0,30/0,70) = -2,097$
 - ▶ PD medie: 30,7% pe scala eșantionului, 7,3% după corecție (mediana 4,2%, maximul 54,4%)
- EAD 957 819 DM; EL 41 744 DM = 4,4% din EAD (fără corecție: 16,3%)
 - ▶ capitalul IRB K : 54 542 DM = 5,7% din EAD; RWA 681 771 DM, o pondere de risc de 71,2%
- PD medie corectată este peste 5%, deoarece corecția se aplică logaritmului șanse, nu PD
- Interpretare: corecția adaugă aceeași constantă la fiecare logaritm al șanse: ordinea solicitanților, deci AUC, nu se schimbă, în timp ce fiecare PD scade, iar EL coboară de la 16,3% la 4,4% din EAD

B6: echitatea pe datele din Taiwan [Propus]

- **Întrebarea:** tratează logit-ul din B4 în mod egal bărbații și femeile, precum și clienții tineri și pe cei mai în vîrstă? Model: B5 și slide-ul 7/7.
- **Date:** eșantionul de test din Taiwan (9000 de clienți); sexul și vîrsta nu sînt variabile ale modelului; aprobăm cei 75% cu PD cea mai mică
- **Cerințe**
 1. Calculați rata de aprobare și rata de nerambursare pentru bărbați și femei, precum și pentru clienții de pînă la 25 de ani și cei mai în vîrstă.
 2. Calculați rata de aprobare a bun-platnicilor (egalitatea de șanse) în fiecare grup.
 3. Calculați rata de nerambursare printre clienții aprobați din fiecare grup.
 4. Interpretare: de care criteriu de echitate se apropie cel mai mult modelul?
- **Raportați:** un tabel și două fraze
- Notebook: secțiunea B6

C1: gradient boosting comparat cu logit-ul [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** comparațiile raportează câștiguri pentru modelele flexibile [Lessmann et al. \(2015\)](#); cât de mare este câștigul pe datele din Taiwan și merită pierderea unui scorecard simplu?
- ▣ **Date:** variabilele și împărțirea din B4; modele: B3, B4
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați gradient boosting (scikit-learn, setările implicite) pe eșantionul de estimare.
 2. Comparați AUC de test cu cel al logit-ului prin testul DeLong și comparați scorurile Brier.
 3. Comparați AUC de estimare și de test pentru gradient boosting.
 4. Interpretare: este câștigul suficient de mare pentru a înlocui scorecard-ul?
- ▣ **Raportați:** un tabel și un plan de proiect
- ▣ **Notebook:** secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- ▣ Un student a cerut unui asistent AI să rezume scorecard-ul din B1. Răspunsul:
- ▣ (a) AUC este 0,80, deci scorecard-ul clasifică corect 0,80 din solicitanți.
- ▣ (b) Coeficientul Gini este $AUC - 0,5 = 0,30$.
- ▣ (c) Un solicitant cu PD de 30% din acest model are o probabilitate de 30% de nerambursare la bancă.
- ▣ (d) Cu $PDO = 20$, o PD care scade la jumătate, de la 20% la 10%, adaugă exact 20 de puncte.
- ▣ (e) KS este cea mai mare distanță verticală dintre distribuțiile scorurilor rău-platnicilor și bun-platnicilor.
- ▣ (f) LDA poate fi folosită doar când fiecare variabilă are distribuția Normală.
- ▣ Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rând de justificare.

Idei de reținut

- ▣ Un logit modelează logaritmul șansei; e^β este un raport al șanselor; efectul asupra PD este $p(1 - p)^\beta$
- ▣ WoE și IV transformă un tabel de bun-platnici și rău-platnici într-o dovadă și o ordonare a variabilelor
- ▣ AUC numără perechile ordonate corect; Gini = $2 \text{ AUC} - 1$; acuratețea înșală când clasele sînt dezechilibrate
- ▣ Alegem pragul din costuri; corectăm PD din eșantioane suprareprezentate înaintea oricărui calcul de EL sau capital
- ▣ Un răspuns AI este doar o primă versiune: verificați ce înseamnă AUC, formula Gini, corecția a priori și scala PDO

După seminar

- Cursul 12 dezvoltă fiecare temă de azi: parametrii Basel, WoE și IV, logit și LDA, scorecard-urile, validarea, reject inference, echitatea, Altman și Merton
- Încercați cerințele [Propus] în notebook; rezolvările se discută la seminar
- C1 poate deveni un proiect de echipă: comparație prin validare încrucișată, costuri și echitate pe grupuri
- Lectură: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), cap. 21–22; [Härdle & Simar \(2019\)](#), cap. 14; [Siddiqi \(2006\)](#)

Bibliografie

- ▣ Basel Committee on Banking Supervision (2006). *International convergence of capital measurement and capital standards: a revised framework (comprehensive version)*. Bank for International Settlements.
- ▣ Brier, G.W. (1950). *Verification of forecasts expressed in terms of probability*. *Monthly Weather Review*, 78(1), 1–3.
- ▣ Cox, D.R. (1958). *The regression analysis of binary sequences*. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 20(2), 215–232.
- ▣ Default of Credit Card Clients [data set] (2009). *UCI Machine Learning Repository*, CC BY 4.0.
- ▣ DeLong, E.R., DeLong, D.M., Clarke-Pearson, D.L. (1988). *Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: a nonparametric approach*. *Biometrics*, 44(3), 837–845.
- ▣ Fisher, R.A. (1936). *The use of multiple measurements in taxonomic problems*. *Annals of Eugenics*, 7(2), 179–188.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Grömping, U. (2019). *South German credit data: correcting a widely used data set*. Reports in Mathematics, Physics and Chemistry 4/2019, Beuth University of Applied Sciences Berlin.
- ▣ Hanley, J.A., McNeil, B.J. (1982). *The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve*. *Radiology*, 143(1), 29–36.
- ▣ Härdle, W.K., Simar, L. (2019). *Applied Multivariate Statistical Analysis*, 5th ed. Springer.
- ▣ Hardt, M., Price, E., Srebro, N. (2016). *Equality of opportunity in supervised learning*. *Advances in Neural Information Processing Systems* 29; arXiv:1610.02413.
- ▣ Hosmer, D.W., Lemeshow, S. (1980). *Goodness of fit tests for the multiple logistic regression model*. *Communications in Statistics – Theory and Methods*, 9(10), 1043–1069.
- ▣ Lessmann, S., Baesens, B., Seow, H.-V., Thomas, L.C. (2015). *Benchmarking state-of-the-art classification algorithms for credit scoring: an update of research*. *European Journal of Operational Research*, 247(1), 124–136.
- ▣ Siddiqi, N. (2006). *Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring*. Wiley.
- ▣ South German Credit [data set] (2020). *UCI Machine Learning Repository*, CC BY 4.0.