



Statistica piețelor financiare

Seminarul 2: Distribuții clasice și fapte stilizate



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ ACF: Autocorrelation Function (funcția de autocorelație)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- ▣ CDF: Cumulative Distribution Function (funcția de repartiție)
- ▣ CLT: Central Limit Theorem (teorema limită centrală)
- ▣ EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- ▣ JB: Jarque–Bera (test) — testul de normalitate Jarque–Bera
- ▣ MLE: Maximum Likelihood Estimation (estimarea prin metoda verosimilității maxime)
- ▣ OMV: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale, grupul OMV)
- ▣ QQ: Quantile–Quantile (plot) — graficul cuantilă–cuantilă
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cît de departe sînt randamentele zilnice reale de distribuția Normală și cum măsurăm acest lucru?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 2: secțiunea „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
 - ▶ Partea A: calcule și derivări pe hîrtie cu distribuțiile Normală, lognormală și Student- t
 - ▶ Partea B: momente, teste, QQ plots și fapte stilizate pe date reale, fiecare cu o întrebare de interpretare
 - ▶ Partea C: o întrebare deschisă pentru proiect și un răspuns generat de AI, de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	cît de probabilă este o pierdere zilnică mare în ipoteza distribuției Normale?	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	care este prețul după un an și după zece ani, dacă prețurile sînt lognormale?	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	cînd este o sumă aproximativ Normală (CLT)?	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	statistica Jarque–Bera și momentele unei distribuții Student- t	Rezolvat, Propus	A7
B1, B2	cît de departe de normalitate sînt randamentele zilnice și cît de precis este estimată boltirea?	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	se potrivește mai bine o distribuție Student- t ? cîte zile de 4 sigma?	Rezolvat, Propus	B3
B5–B7	gaussianitate agregată, volatility clustering, efect de levier și asimetrie	Rezolvat, Propus	B5
C1, C2	devin mai subțiri cozile Bitcoin? ce este greșit într-un răspuns generat de AI?	Propus	B3, B5

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Prețul folosit	Perioada
S&P 500, DAX, BET	EODHD	close	2010–2026
Bitcoin	EODHD	close, 7 zile pe săptămână	2014–2026
OMV Petrom (SNP)	EODHD	adjusted close	2010–2026

- ▣ Randamente logaritmice zilnice în %: $r_t = 100 (\ln P_t - \ln P_{t-1})$
- ▣ Weekendurile și prețurile de închidere repetate din zilele de sărbătoare se elimină (cu excepția Bitcoin); fiecare serie are calendarul ei
- ▣ În notebook: `returns('sp500')`, `moments(r)`, `t_fit(r)`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/6): distribuția Normală

- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$: densitatea $f(x) = (\sigma\sqrt{2\pi})^{-1} \exp(- (x - \mu)^2 / (2\sigma^2))$
 - ▶ μ : media (centrul clopotului); σ^2 : varianța (lățimea lui); $\exp(x) = e^x$
- Standardizare: $Z = (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$, distanța față de medie măsurată în abateri standard
 - ▶ $P(X \leq x) = \Phi((x - \mu)/\sigma)$, unde Φ este funcția de repartiție (CDF, cumulative distribution function) a distribuției Normale standard
 - ▶ valori utile: $\Phi(-1,645) = 0,05$, $\Phi(-1,96) = 0,025$, $\Phi(-2,326) = 0,01$; $P(|Z| > 4) = 6,3 \times 10^{-5}$
- Cuantila de ordin α : $x_\alpha = \mu + \sigma z_\alpha$, valoarea pentru care $P(X \leq x_\alpha) = \alpha$
 - ▶ $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha)$: aceeași cuantilă pentru $N(0, 1)$, de exemplu $z_{0,01} = -2,326$

Noțiuni necesare azi (2/6): zile de k sigma

- O zi de k sigma: $|r_t - \bar{r}| > k s$, un randament aflat la mai mult de k abateri standard de medie
 - ▶ r_t : randamentul logaritmic din ziua t ; $\bar{r}$, s : media și abaterea standard de selecție
- Numărul așteptat de zile de k sigma în n zile, conform distribuției Normale: $n \cdot P(|Z| > k)$
 - ▶ numărul acestor zile urmează aproximativ o distribuție Poisson cu această medie: evenimente rare, fiecare zi fiind o încercare independentă
 - ▶ p-value-ul Poisson: probabilitatea de a observa cel puțin numărul observat, dacă modelul Normal ar fi corect

Noțiuni necesare azi (3/6): prețuri lognormale și CLT

- Y este **lognormală**, $Y \sim LN(m, s^2)$, dacă $\ln Y \sim N(m, s^2)$; m, s^2 : media și varianța lui $\ln Y$
 - ▶ mediana e^m , media $e^{m+s^2/2}$, $P(Y \leq y) = \Phi((\ln y - m)/s)$
- Dacă randamentele logaritmice anuale sînt i.i.d. $N(\mu, \sigma^2)$: $P_T = P_0 e^{r_1 + \dots + r_T}$, cu $\ln(P_T/P_0) \sim N(T\mu, T\sigma^2)$
 - ▶ i.i.d.: independente și identic distribuite; P_0 : prețul de azi; T : orizontul, în ani
- **CLT** (central limit theorem, teorema limită centrală): pentru X_i i.i.d. cu media μ și varianța finită σ^2 , $X_1 + \dots + X_n \approx N(n\mu, n\sigma^2)$
 - ▶ trei condiții: independență, distribuție identică, varianță finită
 - ▶ distribuția binomială $B(n, p)$, numărul de succese în n încercări independente cu probabilitatea p :
 $P(X \geq k) \approx 1 - \Phi((k - 0,5 - np)/\sqrt{np(1-p)})$
 - ▶ termenul $-0,5$ este corecția de continuitate: întregul k acoperă intervalul $[k - 0,5; k + 0,5]$

Noțiuni necesare azi (4/6): forma distribuției și testul Jarque–Bera

- Momentele centrate de selecție $m_k = \frac{1}{n} \sum_t (r_t - \bar{r})^k$: media puterii k a abaterilor (m_2 : varianța)
 - ▶ asimetria $S = m_3/m_2^{3/2}$: $S < 0$ înseamnă o coadă stîngă mai lungă
 - ▶ excesul de boltire $K = m_4/m_2^2 - 3$: $K > 0$ înseamnă cozi mai groase decît la distribuția Normală; distribuția Normală: $S = K = 0$
 - ▶ în ipoteza de normalitate, erorile standard $\sqrt{6/n}$ și $\sqrt{24/n}$
- **Jarque–Bera**: $JB = \frac{n}{6}(S^2 + K^2/4)$, zero pentru o formă Normală și mare cînd S sau K este departe de 0
 - ▶ în ipoteza de normalitate, JB urmează $\chi^2(2)$, distribuția hi-pătrat cu 2 grade de libertate; respingem la 5% dacă $JB > 5,99$
- **QQ plot**: datele ordonate $r_{(i)}$ față de cuantilele modelului $F^{-1}((i - 0,5)/n)$
 - ▶ $r_{(i)}$: al i -lea cel mai mic randament; F^{-1} : funcția cuantilă a modelului; o formă de S înseamnă cozi mai groase decît ale modelului

Noțiuni necesare azi (5/6): distribuția Student- t

- **Student- $t(\nu)$:** o distribuție simetrică ale cărei cozi devin mai groase când gradele de libertate ν scad
 - ▶ varianța $\nu/(\nu - 2)$ pentru $\nu > 2$; excesul de boltire $6/(\nu - 4)$ pentru $\nu > 4$; sub aceste valori momentul este infinit
 - ▶ pentru randamente $r = m + s T$, cu $T \sim t(\nu)$, poziția m și scala s ; abaterea standard este $s\sqrt{\nu/(\nu - 2)}$
- Estimată prin MLE (maximum likelihood estimation, estimarea prin verosimilitate maximă): parametrii care fac randamentele observate cele mai probabile
 - ▶ ℓ : log-verosimilitatea maximizată; căciula marchează o estimare, de exemplu $\hat{\nu}$
 - ▶ $AIC = 2k - 2\ell$, unde k este numărul de parametri (2 pentru distribuția Normală, 3 pentru t); se preferă valoarea AIC mai mică

Noțiuni necesare azi (6/6): fapte stilizate

- **Faptele stilizate Cont (2001):** proprietăți statistice comune majorității activelor și perioadelor
- **ACF:** $\hat{\rho}(h) = \text{Corr}(r_t, r_{t-h})$, corelația dintre randamentele aflate la h zile distanță (h : lagul)
 - ▶ banda de 95% în ipoteza de independență: $\pm 1,96/\sqrt{n}$
 - ▶ **Ljung–Box:** $Q(m) = n(n+2) \sum_{h=1}^m \hat{\rho}(h)^2 / (n-h)$ testează împreună primele m laguri, prin comparație cu $\chi^2(m)$;
 $\chi^2_{0,95}(10) = 18,31$
- Fără autocorelație liniară: $\hat{\rho}(h)$ pentru r_t aproape de 0; **volatility clustering:** $\hat{\rho}(h)$ pentru $|r_t|$ pozitivă și cu scădere lentă
- **Gaussianitatea agregată:** randamentele pe h zile (sume de h randamente zilnice) sînt mai apropiate de distribuția Normală cînd h crește
- **Efectul de levier:** $L(k) = \text{Corr}(r_t, |r_{t+k}|) < 0$, o scădere azi este urmată de variații mai mari peste k zile
 - ▶ **asimetria câștig/pierdere:** pierderile mari sînt mai ample și mai frecvente decît câștigurile mari
- **Bootstrap:** reeșantionăm zilele cu întoarcere de multe ori, recalculăm statistica și reținem percentilele 2,5% și 97,5%

A1: o pierdere zilnică mare în ipoteza distribuției Normale [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Randamentele logaritmice zilnice ale unui indice sînt $N(\mu, \sigma^2)$, cu $\mu = 0,05\%$ și $\sigma = 1,1\%$; un an are 252 de zile de tranzacționare.
- ▣ 1. Calculați probabilitatea unei pierderi zilnice mai mari de 2% și numărul așteptat de asemenea zile pe an.
- ▣ 2. Calculați cuantila de 1% a randamentului zilnic.
- ▣ 3. Calculați numărul așteptat de zile de 4 sigma în 10 ani.
- ▣ Raportați: o probabilitate, un număr de zile, o cuantilă și un număr așteptat.

Rezolvare

- ▣ 1. $z = (-2 - 0,05)/1,1 = -1,86$;
 $P = \Phi(-1,86) = 3,12\%$; $252 \times 3,12\% = 7,9$ zile pe an
- ▣ 2. $x_{0,01} = 0,05 + 1,1 \times (-2,326) = -2,51\%$
- ▣ 3. $P(|Z| > 4) = 6,3 \times 10^{-5}$; în 2520 de zile: 0,16 zile, deci majoritatea deceniilor n-ar avea niciuna
- ▣ Cursul 2 arată că indicii reali au o asemenea zi la cîteva luni.

A2: aceleași întrebări pentru Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Randamentele logaritmice zilnice ale Bitcoin sînt $N(0,12\%, 3,6\%^2)$; Bitcoin se tranzacționează 365 de zile pe an. Model: A1.
- ▣ 1. Calculați probabilitatea unei pierderi zilnice mai mari de 10% și numărul așteptat de asemenea zile pe an.
- ▣ 2. Calculați cuantila de 1% a randamentului zilnic.
- ▣ 3. Calculați numărul așteptat de zile de 4 sigma în 10 ani.
- ▣ Raportați: o probabilitate, un număr de zile, o cuantilă și un număr așteptat.

A3: prețuri lognormale după un an și după zece ani [Rezolvat]

Cerință

- O acțiune costă 100 de lei; randamentele ei logaritmice anuale sînt i.i.d. $N(0,07, 0,18^2)$.
- 1. Calculați mediana și media prețului după un an.
- 2. Calculați probabilitatea ca prețul după un an să fie sub 100 de lei.
- 3. Calculați cuantila de 5% a prețului după un an.
- 4. Repetați 1–3 pentru zece ani.
- Raportați: opt valori și o frază despre orizont.

Rezolvare

- 1. Mediana $100e^{0,07} = 107,25$; media $100e^{0,07+0,0162} = 109,00$
- 2. $P = \Phi(-0,07/0,18) = \Phi(-0,389) = 34,9\%$
- 3. $100e^{0,07+0,18 \times (-1,645)} = 79,77$
- 4. $T = 10$: $10\mu = 0,7$, $\sqrt{10}\sigma = 0,569$; mediana 201,38, media 236,79, $P(\text{pierdere}) = 10,9\%$, cuantila de 5% 78,96
- O pierdere devine mai puțin probabilă în timp, dar cuantila de 5% nu se îmbunătățește: 79,77 după un an, 78,96 după zece ani.

A4: de ce media este $e^{m+s^2/2}$ [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Fie $X \sim N(m, s^2)$ și $Y = e^X$. Model: A3; exercițiu de tipul celor din [Borak, Härdle & López-Cabrera \(2013\)](#).
- ▣ 1. Scrieți $E[e^X] = \int e^x f(x) dx$ și formați pătratul perfect în exponent pentru a arăta că $E[e^X] = e^{m+s^2/2}$.
- ▣ 2. Folosiți aceeași idee pentru $E[e^{2X}]$ și deduceți $\text{Var}(Y) = (e^{s^2} - 1)e^{2m+s^2}$.
- ▣ 3. Pentru $m = 0,07$, $s = 0,18$, calculați media și mediana lui Y și diferența lor.
- ▣ Raportați: cele două derivări și o frază care leagă diferența de volatility drag din [Capitolul 1](#).

A5: zilele de creștere dintr-un an (aproximarea Normală) [Rezolvat]

Cerință

- Un indice crește într-o zi dată cu probabilitatea $p = 0,53$, independent de la o zi la alta; un an are 252 de zile de tranzacționare.
- 1. Precizați distribuția numărului X de zile de creștere, media și abaterea standard a lui X .
- 2. Aproximați $P(X \geq 140)$ cu distribuția Normală și corecția de continuitate.
- 3. Comparați cu valoarea binomială exactă din notebook.
- Raportați: două momente, două probabilități, o frază despre calitatea aproximării.

Rezolvare

- 1. $X \sim B(252, 0,53)$; $E[X] = 133,56$,
ab. std. $= \sqrt{252 \times 0,53 \times 0,47} = 7,92$
- 2. $z = (139,5 - 133,56)/7,92 = 0,750$;
 $P \approx 1 - \Phi(0,750) = 22,67\%$
- 3. Exact: 22,69%
- $np(1 - p) \approx 63$ este mare, deci aproximarea dată de CLT este foarte bună aici.

A6: este Normal un randament lunar? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Randamentele logaritmice zilnice sînt i.i.d., cu media 0,04% și abaterea standard 1,2%. Model: A5.
- ▣ 1. Precizați distribuția aproximativă a randamentului logaritmice pe 21 de zile și cei doi parametri ai ei.
- ▣ 2. Calculați probabilitatea unei pierderi pe 21 de zile mai mari de 10% și a unei pierderi pe 5 zile mai mari de 10%.
- ▣ 3. Stabiliți dacă CLT se mai aplică atunci cînd randamentele zilnice sînt Student- t cu $\nu = 3$.
- ▣ 4. Stabiliți dacă CLT se aplică pentru $\nu = 1,5$.
- ▣ Raportați: două distribuții, două probabilități, două răspunsuri, fiecare cu o justificare.

A7: Jarque–Bera pe hîrtie [Rezolvat]

Cerință

- O serie de $n = 4000$ de randamente zilnice are asimetria $S = -0,6$ și excesul de boltire $K = 12$.
- 1. Calculați erorile standard ale lui S și K în ipoteza de normalitate și cele două statistici z .
- 2. Calculați JB și ponderea care provine din boltire.
- 3. Decideți la nivelul de 5%.
- Raportați: două erori standard, două valori z , JB, decizia.

Rezolvare

- 1. $\sqrt{6/4000} = 0,0387$, $\sqrt{24/4000} = 0,0775$; $z_S = -15,5$, $z_K = 154,9$
- 2. $JB = \frac{4000}{6}(0,36 + 36) = 240 + 24\,000 = 24\,240$, aproape în întregime din K
- 3. $JB > 5,99$: respingem normalitatea
- JB este suma celor două statistici z la pătrat: $z_S^2 + z_K^2$.

A8: momentele distribuției Student- t [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar


Cerință

- ▣ $T \sim t(\nu)$; un model pentru randamentele zilnice este $r = m + s T$. Model: A7.
- ▣ 1. Calculați varianța și excesul de boltire pentru $t(5)$ și $t(10)$.
- ▣ 2. Găsiți ν pentru care excesul de boltire este 3.
- ▣ 3. Găsiți scala s care dă o abatere standard zilnică de 1,2% pentru $\nu = 5$ și pentru $\nu = 6$.
- ▣ 4. Comparați $P(|X| > 4)$ pentru o $t(5)$ cu varianța 1 (valoarea din notebook) cu valoarea Normală.
- ▣ Raportați: patru momente, o valoare ν , două valori ale scalei și un raport.

B1: cât de departe de normalitate este S&P 500? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** cu ce precizie putem măsura cât de departe sînt randamentele logaritmice zilnice ale S&P 500 de distribuția Normală?
- ▣ **Date:** închiderile S&P 500, 2010–2026, randamente logaritmice zilnice în %
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați media, abaterea standard, asimetria, excesul de boltire și cea mai slabă zi, cu data ei.
 2. Calculați erorile standard ale lui S și K în ipoteza de normalitate și statistica JB.
 3. Aplicați bootstrap pentru S și K , cu 2000 de reeșantionări ale zilelor, și rețineți percentilele 2,5% și 97,5%.
 4. Interpretare: de ce este intervalul bootstrap al lui K mult mai larg decît cel din teoria Normală?
- ▣ **Raportați:** un tabel de momente, JB, două intervale pentru K , o frază
- ▣ Notebook: secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



- $n = 4\,201$; media 0,045%, abaterea std. 1,08%; cea mai slabă zi -12,8%, pe 16 martie 2020
- $S = -0,61$ (SE 0,038), $K = 13,49$ (SE 0,076); JB = 32 113: normalitatea este respinsă
- Teoria Normală: $K \in [13,34; 13,64]$; bootstrap: $[6,7; 20,6]$; pentru S , bootstrap $[-1,54; 0,29]$
- Interpretare: $\sqrt{24/n}$ presupune date Normale; cu cozi groase, K depinde de câteva zile, iar prezența sau absența lor într-o reșantionare îl modifică mult; abaterea standard bootstrap a lui K este de 50 de ori mai mare
- Intervalul asimetriei conține 0: semnul lui S nu este sigur


B2: încă trei serii [Propus]

- **Întrebarea:** care dintre BET, Bitcoin și OMV Petrom este cel mai departe de distribuția Normală, cu și fără ziua sa cea mai extremă?
- **Date:** randamente logaritmice zilnice, 2010–2026 (Bitcoin din 2014), fiecare pe calendarul ei; model: B1
- **Cerințe**
 1. Calculați n , media, abaterea standard, S , K și JB pentru fiecare serie.
 2. Eliminați cel mai mare randament în valoare absolută din fiecare serie și recalculați K .
 3. Interpretare: ce vă spune schimbarea lui K despre boltire ca rezumat al riscului?
- **Raportați:** un tabel și două fraze
- **Notebook:** secțiunea B2

B3: distribuția Normală sau Student- t pentru BET? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** descrie o distribuție Student- t randamentele zilnice ale BET mai bine decât distribuția Normală?
- ▣ **Date:** închiderile BET, 2010–2026, randamente logaritmice zilnice în %
- ▣ **Cerințe**
 1. Desenați QQ plot-ul randamentelor standardizate față de $N(0, 1)$.
 2. Estimați o distribuție Student- t prin verosimilitate maximă și desenați QQ plot-ul față de distribuția t estimată.
 3. Comparați log-verosimilitățile și AIC ale celor două modele.
 4. Interpretare: unde greșește distribuția Normală?
 5. Interpretare: unde greșește distribuția t estimată?
- ▣ **Raportați:** $\hat{\nu}$, $\hat{m}$, $\hat{s}$, două valori AIC, două QQ plots, o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



- $\hat{\nu} = 2,96$, $\hat{m} = 0,078\%$, $\hat{s} = 0,628\%$; abaterea standard implicită $\hat{s}\sqrt{\hat{\nu}/(\hat{\nu} - 2)} = 1,10\%$
- $\ell_t = -5496$ față de $\ell_N = -6224$; $AIC_N - AIC_t = 1454$: distribuția t este clar preferată
- Cel mai mic randament $-11,9\%$; cuantila corespunzătoare: distribuția Normală $-3,9\%$, distribuția t estimată $-13,4\%$
- Interpretare: distribuția Normală nu descrie niciuna dintre cozi (forma de S); distribuția t descrie bine centrul și cea mai mare parte a cozilor, dar cuantilele ei extreme depășesc puțin datele


B4: cîte zile de 4 sigma? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** care model estimează corect numărul zilelor de 4 sigma pentru S&P 500, DAX, BET și Bitcoin?
- ▣ **Date:** randamente logaritmice zilnice, 2010–2026 (Bitcoin din 2014); model: B3
- ▣ **Cerințe**
 1. Numărați zilele cu $|r_t - \bar{r}| > 4s$ din fiecare serie.
 2. Calculați numărul așteptat conform distribuției Normale și probabilitatea Poisson de a observa cel puțin numărul observat.
 3. Calculați numărul așteptat cu distribuția Student- t estimată (același prag $\bar{r} \pm 4s$).
 4. Interpretare: are distribuția Student- t cozi prea groase, prea subțiri sau potrivite pentru fiecare serie?
- ▣ **Raportați:** un tabel și o frază pentru fiecare serie
- ▣ **Notebook:** secțiunea B4

B5: devin randamentele S&P 500 Normale pe orizonturi mai lungi? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** sînt randamentele pe 5 și pe 21 de zile ale S&P 500 mai apropiate de distribuția Normală decît cele zilnice?
- ▣ **Date:** randamentele logaritmice zilnice ale S&P 500, 2010–2026; randamentele pe h zile sînt sume pe blocuri disjuncte de h zile
- ▣ **Cerințe**
 1. Construiți randamentele logaritmice pe 5 și pe 21 de zile.
 2. Calculați n , S , K , eroarea standard $\sqrt{24/n}$ și JB cu p-value-ul lui pentru $h = 1, 5, 21$.
 3. Desenați cele trei QQ plots față de $N(0, 1)$.
 4. Interpretare: este Normală distribuția randamentelor lunare?
 5. Interpretare: de ce are testul mai puțină putere la $h = 21$?
- ▣ **Raportați:** un tabel cu trei rînduri, trei QQ plots, două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B5

B5: rezolvare [Rezolvat]



h	n	S	K	$\sqrt{24/n}$	JB (p-value)
1	4201	-0,61	13,49	0,08	32 113 (≈ 0)
5	840	-0,62	7,06	0,17	1 797 (≈ 0)
21	200	-1,18	3,68	0,35	159 ($2,9 \times 10^{-35}$)

- Interpretare: K scade de la 13,49 la 3,68, dar randamentele lunare tot nu sînt Normale (asimetria $-1,18$, martie 2020); cu doar 200 de luni, eroarea standard a lui K este 0,35, deci abaterile mai mici n-ar fi detectate

B6: sînt independente randamentele BET? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** sînt randamentele zilnice ale BET independente, nu doar necorelate?
- ▣ **Date:** randamentele logaritmice zilnice ale BET, 2010–2026; model: B5
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați ACF pentru r_t și pentru $|r_t|$ la lagurile 1–10 și banda $\pm 1,96/\sqrt{n}$.
 2. Calculați statistica Ljung–Box $Q(10)$ pentru r_t și pentru $|r_t|$ și comparați cu $\chi^2_{0,95}(10)$.
 3. Interpretare: pot fi randamentele necorelate, dar nu independente?
- ▣ **Raportați:** două coloane ACF, două valori Q , o frază
- ▣ Notebook: secțiunea B6

B7: seamă Bitcoin cu un indice bursier? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** arată atît S&P 500, cît și Bitcoin efectul de levier și asimetria câștig/pierdere?
- ▣ **Date:** randamente logaritmice zilnice, S&P 500 2010–2026, Bitcoin 2014–2026; model: B5
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $L(k) = \text{Corr}(r_t, |r_{t+k}|)$ pentru $k = 1, \dots, 5$ și media lor, cu banda $\pm 1,96/\sqrt{n}$.
 2. Numărați zilele sub $\bar{r} - 4s$ și peste $\bar{r} + 4s$; testați dacă scăderile și creșterile sînt la fel de probabile (testul binomial, $p = 0,5$).
 3. Comparați $|q_{0,01}|$ cu $q_{0,99}$ și analizați asimetria.
 4. Interpretare: ce fapte stilizate ale indicilor bursieri are și Bitcoin?
- ▣ **Raportați:** un tabel și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B7

C1: devin mai subțiri cozile Bitcoin? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** a devenit mai subțire coada randamentelor zilnice ale Bitcoin din 2015, pe măsură ce piața s-a maturizat?
- ▣ **Date:** randamentele logaritmice zilnice ale Bitcoin și S&P 500, 2015–2026; modele: B3, B5
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați o distribuție Student- t și calculați excesul de boltire pentru fiecare an calendaristic și fiecare serie.
 2. Calculați corelația rangurilor Spearman între an și $\hat{\nu}$.
 3. Estimați o distribuție t pe 2015–2020 și una pe 2021–2026 și comparați $\hat{\nu}$.
 4. Propuneți o cale de a face răspunsul mai robust (intervale, alte ferestre, alte active cripto).
 5. Interpretare: ce ne pot spune 12 estimări anuale despre un trend?
- ▣ **Raportați:** un tabel, corelația rangurilor cu p-value-ul ei, un scurt plan de proiect
- ▣ Notebook: secțiunea C1

C2: verificarea unui răspuns generat de AI [Propus]

- Un student a întrebat un asistent AI: „Describe distribuția randamentelor zilnice ale S&P 500 în 2010–2026.” Răspunsul:
- (a) Excesul de boltire este 13,5; cum distribuția Normală are boltirea 0, boltirea S&P 500 este 13,5.
- (b) $JB = 32113$ cu $p = 0,000$, ceea ce dovedește că randamentele urmează o distribuție Student-t.
- (c) În distribuția Normală, o zi de 4 sigma apare o dată la 15787 de zile; cele 28 de zile de acest fel din 4201 sînt doar ghinion.
- (d) Autocorelația la lagul 1 este doar -0,11, deci randamentele sînt independente și volatilitatea nu poate fi prevăzută.
- (e) Cu randamente logaritmice anuale $N(7\%, 18\%^2)$, valoarea așteptată după un an a unei investiții de 100 este $100 \exp(0,07) = 107,25$.
- **Cerințe**
 1. Pentru fiecare afirmație precizați dacă este corectă; dacă nu, formulați afirmația corectă și dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).
- **Raportați:** o listă de cinci verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Idei de reținut

- ▣ Distribuția Normală face zilele de 4 sigma aproape imposibile; piețele reale au o asemenea zi la fiecare cîteva luni
- ▣ Prețuri lognormale: mediana este sub medie, iar diferența provine din volatility drag
- ▣ Asimetria și boltirea sînt fragile: raportați intervale bootstrap și extremele
- ▣ Distribuția Student- t descrie datele mult mai bine decît distribuția Normală, dar nu perfect
- ▣ Randamentele sînt aproape necorelate, dar nu independente: mărimea lor este previzibilă
- ▣ Un răspuns generat de AI este o ciornă: verificați fiecare definiție, fiecare model și fiecare valoare numerică

După seminar

- Cursul 2 dezvoltă fiecare temă de azi: modelele Normal și lognormal, CLT, momente și teste, distribuția Student- t și șase fapte stilizate
- Încercați cerințele [Propus] în notebook; rezolvările se discută la seminar
- C1 poate deveni un proiect de echipă: ferestre mobile, intervale bootstrap, mai multe active cripto
- Lectură: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), secț. 3.3 și secț. 11.2; exerciții rezolvate: [Borak, Härdle & López-Cabrera \(2013\)](#)

Bibliografie

- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Jarque, C.M., Bera, A.K. (1987). A test for normality of observations and regression residuals. *International Statistical Review*, 55(2), 163–172.
- ▣ Ljung, G.M., Box, G.E.P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- ▣ Student (1908). The probable error of a mean. *Biometrika*, 6(1), 1–25.