



Serii de timp

Seminarul 7: Cointegrare și VECM



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ ADF: Augmented Dickey–Fuller (test) — testul Dickey–Fuller augmentat
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian (Schwarz))
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ ECM: Error Correction Model (model cu corecția erorii)
- ▣ EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- ▣ GS1: 1-year Treasury constant-maturity yield (FRED series code) — codul FRED al randamentului titlurilor de stat americane la 1 an
- ▣ GS10: 10-year Treasury constant-maturity yield (FRED series code) — codul FRED al randamentului titlurilor de stat americane la 10 ani
- ▣ HUF: Hungarian forint (ISO 4217 code) — forintul maghiar (codul ISO 4217)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ PIB: Produsul intern brut
- ▣ PLN: Polish zloty (ISO 4217 code) — zlotul polonez (codul ISO 4217)
- ▣ ROBOR: Romanian Interbank Offer Rate (rata dobânzii la care băncile din România oferă depozite interbancare)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ VAR: Vector AutoRegression (model vector autoregresiv)
- ▣ VECM: Vector Error Correction Model (model vectorial cu corecția erorii)

Întrebarea de azi și traseul

- **Întrebarea:** sînt două sau mai multe serii $I(1)$ legate printr-un echilibru pe termen lung, cît de repede revin la el și cine face ajustarea?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 7: secțiunea „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- Traseul
 - ▶ Partea A: statistici Engle–Granger calculate de mîină; un ECM și timpul lui de înjumătățire; un VECM cu două variabile; statistici Johansen; de la VAR la VECM
 - ▶ Partea B: ratele dobînzii din SUA; consumul și PIB-ul României; EUR/RON, EUR/HUF și EUR/PLN; ROBOR, randamentul la 10 ani al României și Euribor
 - ▶ Partea C: pairs trading pe două bănci din România și un răspuns AI de verificat
- Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	o statistică Engle–Granger cu două și cu trei variabile	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	un ECM și un VECM cu două variabile: viteză și timp de înjumătățire	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	statistici Johansen din valori proprii; un VAR(2) scris ca VECM	Rezolvat, Propus	A5
B1, B2	Engle–Granger și ECM: randamentele din SUA; consumul și PIB-ul României	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	Johansen și VECM: trei monede; trei rate ale dobânzii	Rezolvat, Propus	B3
C1, C2	pairs trading în afara eșantionului; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1, B3

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
Randamentele titlurilor de stat SUA, 1 și 10 ani	FRED (GS1, GS10)	lunar	1960–2026
Consumul gospodăriilor și PIB-ul, România	Eurostat (namq_10_gdp)	trimestrial, ajustat sezonier	1995–2026
EUR/RON, EUR/HUF, EUR/PLN	cursurile de referință BNR	sfârșitul lunii	2005–2026
ROBOR 3M, Euribor 3M	Eurostat (irt_st_m)	lunar	2010–2026
Randamentul la 10 ani, România	EODHD	zilnic, media lunară	2010–2026
Banca Transilvania, BRD	EODHD	zilnic, închidere ajustată	2014–2026

- ▣ Nivelurile ca 100 ln (consum, PIB, cursuri, prețuri ale acțiunilor); ratele dobânzii în % pe an
- ▣ În notebook: `adf_test`, `eg_test` (Engle–Granger și Phillips–Ouliaris), `ecm_fit`, `johansen`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/4): cointegrarea

- $y_t \sim I(1)$: y_t are o rădăcină unitară, iar $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$ este staționar ([Capitolul 3](#); testul ADF, H_0 : rădăcină unitară)
 - ▶ regresia unei serii $I(1)$ pe o alta, fără legătură cu ea, este o **regresie falsă**: t mare, R^2 mare
- **Cointegrarea**: serii $I(1)$ $y_{1t}, \dots, y_{nt}$ pentru care o combinație $\beta^\top y_t$ este staționară
 - ▶ β : vectorul de cointegrare, normalizat cu un coeficient egal cu 1; $u_t = \beta^\top y_t - \mu$: eroarea de echilibru
 - ▶ seriile au trenduri stochastice comune: n variabile, r vectori de cointegrare, $n - r$ trenduri comune
- Exemplu: rata dobânzii la 1 an și cea la 10 ani rătăcesc, dar diferența dintre ele rămîne într-o bandă

Noțiuni necesare azi (2/4): testul Engle–Granger

- ▣ **Pasul 1:** OLS în niveluri, $y_t = a + bx_t + u_t$; reziduurile $\hat{u}_t$
 - ▶ **Pasul 2:** ADF pe $\hat{u}_t$ fără constantă: $\Delta\hat{u}_t = \gamma\hat{u}_{t-1} + \sum_j \delta_j \Delta\hat{u}_{t-j} + e_t$, $\tau = \hat{\gamma}/\text{SE}(\hat{\gamma})$
 - ▶ H_0 : fără cointegrare ($\gamma = 0$); respingem dacă τ este sub valoarea critică
- ▣ **Valorile critice** (MacKinnon, cu constantă, T mare): mai negative decât cele Dickey–Fuller, deoarece OLS face ca $\hat{u}_t$ să pară staționar
 - ▶ 5%: $-2,86$ (o serie, Dickey–Fuller); $-3,34$ (2 variabile); $-3,74$ (3 variabile)
- ▣ **Phillips–Ouliaris** Z_t : aceeași H_0 și aceleași valori critice; fără decalaje, cu o corecție prin varianța pe termen lung
 - ▶ în Python: `coint (statsmodels)`, `phillips_ouliaris (arch)`

Noțiuni necesare azi (3/4): corecția erorii

- ▣ **ECM** (error correction model, modelul cu corecția erorii): $\Delta y_t = c + \gamma \hat{u}_{t-1} + \delta_0 \Delta x_t + \dots + \varepsilon_t$, cu
 $\hat{u}_{t-1} = y_{t-1} - \hat{a} - \hat{b}x_{t-1}$
 - ▶ $\gamma < 0$: **viteza de ajustare**, fracțiunea din distanța din perioada anterioară închisă de y ; δ_0 : efectul pe termen scurt; b : efectul pe termen lung
- ▣ **Timpul de înjumătățire**: o distanță scade ca $(1 + \gamma)^h$; jumătate din ea dispare după $h_{1/2} = \ln 0,5 / \ln(1 + \gamma)$ perioade
 - ▶ exemplu: $\gamma = -0,5$ dă $h_{1/2} = 1$; $\gamma = -0,1$ dă circa 6,6 perioade
- ▣ Toți termenii unui ECM sînt staționari: OLS și testele t sînt valide

Noțiuni necesare azi (4/4): VECM și Johansen

- **VECM:** $\Delta y_t = \Pi y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta y_{t-i} + u_t$; dintr-un VAR(p) ([Capitolul 6](#)): $\Pi = A_1 + \dots + A_p - I$, $\Gamma_i = -(A_{i+1} + \dots + A_p)$
 - ▶ $r = \text{rang}(\Pi)$: $0 =$ fără cointegrare; $0 < r < n$: $\Pi = \alpha \beta^\top$, r vectori de cointegrare (coloanele lui β) și coeficienții de ajustare α
 - ▶ $\alpha_i = 0$: y_i nu se ajustează (**slab exogenă**)
- **Johansen:** valorile proprii $\hat{\lambda}_1 \geq \dots \geq \hat{\lambda}_n$; urma = $-T \sum_{i>r} \ln(1 - \hat{\lambda}_i)$, valoarea proprie maximă = $-T \ln(1 - \hat{\lambda}_{r+1})$
 - ▶ testăm $r = 0, r \leq 1$ etc.: rangul este primul r nerespins; valori critice de 5% cu constantă, $n = 3$: urma 29,80; 15,49; 3,84; valoarea maximă 21,13; 14,26; 3,84

A1: o statistică Engle–Granger [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Două serii $I(1)$, $T = 200$. Pasul 1 dă reziduurile $\hat{u}_t$; pasul 2 dă $\Delta\hat{u}_t = -0,118 \hat{u}_{t-1}$, cu $SE = 0,036$.
- ▣ 1. Calculați τ .
- ▣ 2. Comparați τ cu valorile Engle–Granger de 5% și 10% pentru 2 variabile, $-3,37$ și $-3,07$, și decideți.
- ▣ 3. Precizați ce ar fi concluzionat valoarea Dickey–Fuller $-2,88$.
- ▣ 4. Explicați de ce diferă cele două valori critice.
- ▣ Raportați: o valoare, două decizii și o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $\tau = -0,118/0,036 = -3,28$
- ▣ 2. $-3,28 > -3,37$: nu respingem „fără cointegrare” la 5% ($p = 0,058$); $-3,28 < -3,07$: respingem la 10%
- ▣ 3. $-3,28 < -2,88$: tabelul Dickey–Fuller ar raporta greșit cointegrare la 5%
- ▣ 4. OLS alege $\hat{b}$ astfel încît să minimizeze varianța reziduurilor, deci $\hat{u}_t$ pare mai staționar decît o eroare adevărată: distribuția din ipoteza nulă se deplasează la stînga.

A2: trei variabile [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Trei serii $I(1)$, $T = 150$: y_t regresat pe x_{1t} și x_{2t} . Pasul 2 dă $\hat{\gamma} = -0,162$, $SE = 0,041$. Model: A1.
- ▣ 1. Calculați τ .
- ▣ 2. Decideți la 5% și la 1% cu valorile pentru 3 variabile, $-3,80$ și $-4,39$.
- ▣ 3. Precizați ce valoare critică ar folosi greșit un student care ar uita de x_{2t} (2 variabile: $-3,38$).
- ▣ 4. Precizați câți vectori de cointegrare poate găsi metoda Engle–Granger cu trei variabile.
- ▣ Raportați: o valoare, două decizii și două fraze.

A3: un model cu corecția erorii [Rezolvat]

Cerință

- ECM estimat (logaritmul consumului c_t și al venitului y_t , în %): $\Delta c_t = 0,2 + 0,5 \Delta y_t - 0,25 (c_{t-1} - 0,9 y_{t-1})$.
- 1. Precizați efectul pe termen lung și efectul pe termen scurt al venitului asupra consumului.
- 2. Interpretați coeficientul $-0,25$ și calculați timpul de înjumătățire.
- 3. Calculați Δc_t dacă $c_{t-1} - 0,9 y_{t-1} = 2$ și $\Delta y_t = 1$.
- 4. Precizați ce ar însemna un coeficient de $+0,25$.
- Raportați: două elasticități, un timp de înjumătățire, o prognoză și o frază.

Rezolvare

- 1. Termen lung: 0,9 (din echilibrul $c = 0,9y + \text{const.}$); termen scurt: 0,5 (în aceeași perioadă)
- 2. Un sfert din distanța din perioada anterioară se închide în fiecare perioadă; $h_{1/2} = \ln 0,5 / \ln 0,75 = 2,41$ perioade
- 3. $\Delta c_t = 0,2 + 0,5 \cdot 1 - 0,25 \cdot 2 = 0,2$: corecția erorii anulează efectul pe termen scurt
- 4. Consumul s-ar îndepărta de echilibru după o abatere: fără corecția erorii, fără cointegrare.

A4: un VECM cu două variabile [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ $\Delta y_{1t} = -0,20 z_{t-1} + u_{1t}$, $\Delta y_{2t} = 0,05 z_{t-1} + u_{2t}$, cu $z_t = y_{1t} - y_{2t}$. Model: A3.
- ▣ 1. Scrieți α , β și $\Pi = \alpha\beta^\top$ și precizați rangul lui Π .
- ▣ 2. Explicați care variabilă face cea mai mare parte a ajustării.
- ▣ 3. Arătați că $z_t = (1 + \beta^\top \alpha) z_{t-1} + (u_{1t} - u_{2t})$ și calculați timpul de înjumătățire.
- ▣ Raportați: o matrice, un rang, un timp de înjumătățire și o frază.



A5: statistici Johansen din valori proprii [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Trei serii $I(1)$, $T = 200$, cazul cu constantă; valorile proprii Johansen sînt 0,120; 0,045 și 0,008.
- ▣ 1. Calculați statisticile urmei pentru $r = 0$, $r \leq 1$ și $r \leq 2$.
- ▣ 2. Calculați statisticile valorii proprii maxime.
- ▣ 3. Comparați cu valorile de 5% (urma 29,80; 15,49; 3,84; maxima 21,13; 14,26; 3,84) și alegeți rangul.
- ▣ 4. Precizați numărul trendurilor comune.
- ▣ Raportați: șase statistici, un rang și un număr de trenduri.

Rezolvare

- ▣ 1. $-200[\ln 0,880 + \ln 0,955 + \ln 0,992] = 36,38$;
 $-200[\ln 0,955 + \ln 0,992] = 10,82$; $-200 \ln 0,992 = 1,61$
- ▣ 2. 25,57; 9,21; 1,61
- ▣ 3. $r = 0$ respins de ambele teste ($36,38 > 29,80$, $25,57 > 21,13$); $r \leq 1$ nerespins: rangul 1
- ▣ 4. $n - r = 3 - 1 = 2$ trenduri stochastice comune.

A6: de la VAR(2) la VECM [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar


Cerință

- ▣ $y_t = A_1 y_{t-1} + A_2 y_{t-2} + u_t$ cu $A_1 = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,2 \\ 0,1 & 0,7 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 0,1 & 0 \\ 0 & 0,2 \end{pmatrix}$. Model: A5.
- ▣ 1. Calculați $\Pi = A_1 + A_2 - I$ și $\Gamma_1 = -A_2$.
- ▣ 2. Arătați că Π are rangul 1 și scrieți-o ca $\alpha\beta^\top$, cu $\beta = (1, -1)^\top$.
- ▣ 3. Interpretați semnele lui α .
- ▣ Raportați: două matrice, α și o frază.

B1: randamentele din SUA la 1 an și la 10 ani [Rezolvat]

- **Întrebarea:** sînt cointegrate randamentele titlurilor de stat la 1 an și la 10 ani, cît de repede se închide distanța dintre ele și care rată o închide?
- **Date:** FRED GS1 și GS10, medii lunare, % pe an, ianuarie 1960–septembrie 2026
- **Cerințe**
 1. Aplicați ADF (cu constantă) pe ambele randamente și pe variația randamentului la 10 ani.
 2. Aplicați Engle–Granger (10 ani pe 1 an) și Phillips–Ouliaris și comparați cu valoarea Engle–Granger de 5%.
 3. Estimați ECM pentru randamentul la 10 ani (cîte un decalaj din fiecare diferență) și aceeași ecuație pentru randamentul la 1 an.
 4. Interpretare: dacă randamentul la 10 ani este cu 1 punct procentual peste echilibru, cît timp trece pînă se închide jumătate din distanță și prin care rată?
- **Raportați:** trei valori p ADF, două teste de cointegrare, doi coeficienți de ajustare și o frază
- Notebook: secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



- ▣ ADF $p = 0,26$ (1 an), $0,63$ (10 ani): rădăcini unitare; variația: $p < 0,001$; ambele randamente sînt $I(1)$
- ▣ Pasul 1: $\hat{\epsilon}_t^{(10)} = 1,76 + 0,827 i_t^{(1)}$; pasul 2: $\tau = -3,59$ (19 decalaje) $< -3,34$: cointegrare la 5% ($p = 0,025$); Phillips–Ouliaris $Z_t = -3,65$ ($p = 0,022$)
- ▣ ECM, 10 ani: $\hat{\gamma} = -0,0295$ ($t = -4,81$), $\hat{\delta}_0 = 0,53$; 1 an: $\hat{\gamma} = 0,0172$ ($t = 1,25$), nesemnificativ
- ▣ Interpretare: timpul de înjumătățire $\ln 0,5 / \ln(1 - 0,0295) = 23,1$ luni, circa doi ani; randamentul la 10 ani închide distanța, iar cel la 1 an (stabilit de politica monetară) nu reacționează


B2: consumul și PIB-ul în România [Propus]

- **Întrebarea:** este consumul gospodăriilor din România cointegrat cu PIB-ul, cum sugerează „marile rapoarte”?
- **Date:** Eurostat, consumul real al gospodăriilor și PIB-ul real, volume înălțuite, ajustate sezonier, 1995–2026; c_t , y_t ca 100 ln; model: B1
- **Cerințe**
 1. Aplicați ADF (constantă și trend) pe c_t și y_t și ADF (constantă) pe variațiile lor.
 2. Aplicați Engle–Granger (c_t pe y_t) și Phillips–Ouliaris și raportați panta.
 3. Reprezentați grafic raportul dintre consum și PIB și aplicați ADF pe $c_t - y_t$.
 4. Interpretare: are sens o pondere stabilă a consumului pentru România în perioada 1995–2026?
- **Raportați:** patru teste ADF, două teste de cointegrare, un grafic și două fraze
- **Notebook:** secțiunea B2

B3: trei monede central-europene [Rezolvat]

- **Întrebarea:** au EUR/RON, EUR/HUF și EUR/PLN un echilibru comun pe termen lung?
- **Date:** cursurile de referință BNR (cursuri încrucișate pentru HUF și PLN), la sfârșitul lunii, 100 ln, din iulie 2005
- **Cerințe**
 1. Aplicați ADF pe fiecare curs.
 2. Aplicați testele Johansen ale urmei și ale valorii proprii maxime, cu constantă și decalaje după BIC.
 3. Comparați cu cele trei teste Engle–Granger pe perechi și cu corelațiile nivelurilor și ale variațiilor.
 4. Interpretare: ar trebui modelate cele trei cursuri cu un VECM?
- **Raportați:** trei valori p ADF, un tabel cu șase statistici Johansen, un rang și o frază
- Notebook: secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



	$r = 0$	$r \leq 1$	$r \leq 2$
urma (valoarea de 5%)	24,21 (29,80)	7,94 (15,49)	2,72 (3,84)
valoarea proprie maximă (valoarea de 5%)	16,27 (21,13)	5,21 (14,26)	2,72 (3,84)

- ADF $p = 0,55; 0,75; 0,08$: trei cursuri $I(1)$; Johansen ($T = 255, k = 1$): nicio statistică nu depășește valoarea critică: rangul 0
- Engle–Granger $p = 0,29$ (RON, HUF), $0,08$ (RON, PLN), $0,20$ (HUF, PLN); corelația este $0,89$ în niveluri, dar doar $0,31$ în variațiile lunare
- Interpretare: nu; cu rangul 0 nu există niciun β de estimat; modelăm variațiile cu un VAR în diferențe (Capitolul 6)

B4: ROBOR, randamentul la 10 ani al României și Euribor [Propus]

- **Întrebarea:** câte relații pe termen lung leagă ratele dobânzii din România între ele și de Euribor și care rată se ajustează?
- **Date:** ROBOR 3M și Euribor 3M (Eurostat), randamentul la 10 ani al României (media lunară a datelor zilnice), ianuarie 2010–august 2026; model: B3
- **Cerințe**
 1. Aplicați testele Johansen (constantă, decalaje după BIC) și alegeți rangul.
 2. Estimați VECM cu acest rang și cu constanta restricționată la relația de cointegrare; normalizați β pe ROBOR.
 3. Raportați $\hat{\alpha}$ cu statisticile t și aplicați ADF pe eroarea de echilibru.
 4. Interpretare: care rate sînt slab exogene și ce spune acest lucru despre condițiile monetare din România?
- **Raportați:** un tabel cu statisticile Johansen, $\hat{\beta}$, $\hat{\alpha}$ cu t , un test ADF și două fraze
- **Notebook:** secțiunea B4

C1: pairs trading pe două bănci [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** ar fi câștigat bani un investitor care ar fi găsit Banca Transilvania și BRD cointegrate la sfârșitul lui 2021?
- ▣ **Date:** prețuri zilnice ajustate, formare 2014–2021, tranzacționare ianuarie 2022–septembrie 2026; modele: B1, B3
- ▣ **Cerințe**
 1. Pe perioada de formare, aplicați Engle–Granger și Phillips–Ouliaris (TLV pe BRD) și păstrați $\hat{b}$, media și abaterea standard a spread-ului.
 2. Pe perioada de tranzacționare, aplicați regula: deschidere la $|z| > 2$, închidere la $z = 0$; calculați randamentul anual brut și net (după un cost de 0,20% pe unitatea tranzacționată).
 3. Repetați testul Engle–Granger doar pe perioada de tranzacționare.
 4. Interpretare: este rezultatul o dovadă că pairs trading funcționează la BVB?
- ▣ **Raportați:** două teste, numărul de tranzacții, două randamente și un plan de proiect
- ▣ **Notebook:** secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a întrebat un asistent AI despre cointegrare. Răspunsul:
 - (a) Statistica Engle-Granger este $-3,0$ cu două variabile; deoarece $-3,0 < -2,87$, valoarea Dickey-Fuller de 5%, seriile sînt cointegrate.
 - (b) Coeficientul erorii de echilibru decalate din ECM este $+0,15$, deci 15% din distanță se corectează în fiecare perioadă.
 - (c) Johansen respinge $r = 0$ și $r \leq 1$, dar nu și $r \leq 2$ pentru trei randamente, deci randamentele au două trenduri comune.
 - (d) EUR/RON și EUR/HUF sînt ambele $I(1)$, iar $R^2 = 0,79$ în niveluri, deci sînt cointegrate.
 - (e) Dacă două serii sînt cointegrate, cel puțin una dintre ele o cauzează Granger pe cealaltă.
 - (f) O regulă de pairs trading cu raportul Sharpe 0,44 pe datele din 2014-2026 își va păstra acest raport Sharpe și în viitor.
- Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Idei de reținut

- ▣ Testați întâi că fiecare serie este $I(1)$; apoi testați eroarea de echilibru, niciodată corelația nivelurilor
- ▣ Testele pe reziduuri cer valorile critice Engle–Granger, care depind de numărul de variabile
- ▣ ECM dă viteza de ajustare; timpul de înjumătățire $\ln 0,5 / \ln(1 + \gamma)$ este în unitățile datelor
- ▣ Johansen dă rangul; $n - r$ este numărul trendurilor comune; α arată cine se ajustează
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați valorile critice, semnele și numărul trendurilor

După seminar

- ▣ Cursul 7 dezvoltă fiecare temă de azi: trendurile comune, distribuția Engle–Granger, ECM, modelul VECM și teorema de reprezentare a lui Granger, testele Johansen, prognoza și pairs trading
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook
- ▣ C1 poate deveni un proiect de echipă: pairs trading la BVB, în afara eșantionului și după costuri
- ▣ Lectură: [Huang și Petukhina \(2022\)](#), cap. 9; [Hamilton \(1994\)](#), cap. 19–20; [Engle și Granger \(1987\)](#)
- ▣ **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar**

Bibliografie

- ▣ Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251–276. doi:10.2307/1913236
- ▣ Gatev, E., Goetzmann, W. N., & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs trading: Performance of a relative-value arbitrage rule. *Review of Financial Studies*, 19(3), 797–827. doi:10.1093/rfs/hhj020
- ▣ Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press. doi:10.2307/j.ctv14jx6sm
- ▣ Huang, C., & Petukhina, A. (2022). *Applied Time Series Analysis and Forecasting with Python*. Springer. doi:10.1007/978-3-031-13584-2
- ▣ Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12(2–3), 231–254. doi:10.1016/0165-1889(88)90041-3
- ▣ Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580. doi:10.2307/2938278
- ▣ MacKinnon, J. G. (2010). Critical values for cointegration tests. Queen's Economics Department Working Paper No. 1227, Queen's University. ideas.repec.org/p/qed/wpaper/1227
- ▣ Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. *Econometrica*, 58(1), 165–193. doi:10.2307/2938339