

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Animal: | Responsável: | | | | Experimento | | | |
| Aparência | Ponto | Data/hora | Data/hora | Data/hora | Data/hora | Data/hora | Data/hora | Data/hora |
| Normal | 0 | | | | | | | |
| Pelo em mal estado | 1 | | | | | | | |
| Pelo em mal estado, ou secreções oculares e nasais | 2 | | | | | | | |
| Pelo arrepiado, postura anormal | 3 | | | | | | | |
| Ingestão de água e alimento/perda de peso | Ponto | Data/hora | Data/hora | Data/hora | Data/hora | Data/hora | Data/hora | Data/hora |
| Normal | 0 | | | | | | | |
| Incerta <5% | 1 | | | | | | | |
| Baixo consumo de alimento e água | 2 | | | | | | | |
| Não está consumindo alimento e água | 3 | | | | | | | |
| Sinais Clínicos | Ponto | Data/hora | Data/hora | Data/hora | Data/hora | Data/hora | Data/hora | Data/hora |
| Normal para T°C, Frequência respiratória e cardíaca | 0 | | | | | | | |
| Alterações leves | 1 | | | | | | | |
| T° varia em $\pm 1^\circ\text{C}$ e FC/resp $\pm 30\%$ | 2 | | | | | | | |
| T° varia em $\pm 2^\circ\text{C}$ e FC/resp $\pm 3=50\%$ | 3 | | | | | | | |
| Comportamento espontâneo | Ponto | Data/hora | Data/hora | Data/hora | Data/hora | Data/hora | Data/hora | Data/hora |
| Norma, esperado | 0 | | | | | | | |
| Alterações menores | 1 | | | | | | | |
| Pouca mobilidade, baixo estado de alerta, isolado | 2 | | | | | | | |
| Vocalizações, automatização, muito inquieto ou deprimido | 3 | | | | | | | |
| Comportamento provocado - manipulação | Ponto | Data/hora | Data/hora | Data/hora | Data/hora | Data/hora | Data/hora | Data/hora |
| Normal | 0 | | | | | | | |
| Leve depressão ou resposta exagerada | 1 | | | | | | | |
| Mudança na resposta esperada | 2 | | | | | | | |
| Reação violenta ou muita debilitada | 3 | | | | | | | |
| Ajuste de pontuação | | | | | | | | |
| Se assinalou e mais de uma vez some um ponto extra para cada um | | | | | | | | |
| Soma total | | | | | | | | |

0-4 normal – 5-9 monitorar cuidadosamente e considerar analgésicos 10-14 sofrimento, proporcionar alívio, observar regularmente. Buscar segunda opinião, principalmente do veterinário; 15-20 dor severa. Eutanásia. Protocolo necessita ser reavaliado