

Paciente...: 39815852 DAVI ANTONINO NUNES DA SILVA

Nascimento: 11/11/1985 Sexo: M

Nº Pedido: 133894344

RG: 400631507 SSP SP

CPF: 34452937837

Convênio...: HAPVIDA

Matrícula: 07YT5002010003013

Solicitante.: Dr(a) RAFAEL RAVANELLI - CRM 140506-SP

Exame:

US ESTUDO DE 3 OU MAIS VASOS C/DOPPLER CONV - BILATERAL

Dt Realização:

14/05/2026 14:46

Dt Liberação:

14/05/2026 15:37

### ULTRASSONOGRAMA DOPPLER DO SISTEMA VENOSO PROFUNDO E SUPERFICIAL DIREITO

Técnica:

Exame realizado com transdutor linear de alta frequência.

ANÁLISE:

Sistema Profundo

Veia femoral comum de calibre, compressibilidade e fluxo vascular preservados ao estudo Doppler

Veia femoral de calibre, compressibilidade e fluxo vascular preservados ao estudo Doppler.

Veia femoral profunda proximal de calibre, compressibilidade e fluxo vascular preservados ao estudo Doppler.

Veia poplítea de calibre, compressibilidade e fluxo vascular preservados ao estudo Doppler.

Veias fibulares de calibre, compressibilidade e fluxo vascular preservados ao estudo Doppler.

Veias tibiais anteriores de calibre, compressibilidade e fluxo vascular preservados ao estudo Doppler.

Veias tibiais posteriores de calibre, compressibilidade e fluxo vascular preservados ao estudo Doppler.

Veias musculares da panturrilha de calibre, compressibilidade e fluxo vascular preservados ao estudo Doppler.

As veias analisadas apresentam-se pérvias, com fluxo fásico, variante com a respiração, inferindo patência do sistema ilíaco e da veia cava inferior.

Sistema Superficial

Veia safena magna de calibre preservado, apresentando sinais de insuficiência com tempo de refluxo maior que 0,5 segundos no terço distal da perna. Veia safena magna direita sai do compartimento no terço distal da coxa retornando no terço distal da perna.

Veia safena parva de calibre preservado, sem sinais de insuficiência ou trombos intraluminais.

Junção safeno-femoral de calibre preservado, sem sinais de insuficiência ou trombos intraluminais.

Junção safeno-poplítea de calibre preservado, sem sinais de insuficiência ou trombos intraluminais.

Veias perforantes sem sinais de insuficiência.

SAFENA MAGNA:

Segmentos Calibres (cm)

Crossa 0,6 cm

Terço distal da coxa 0,3 cm

**Paciente...: 39815852 DAVI ANTONINO NUNES DA SILVA****Nascimento: 11/11/1985 Sexo: M****Nº Pedido: 133894344****RG: 400631507 SSP SP****CPF: 34452937837****Convênio...: HAPVIDA****Matrícula: 07YT5002010003013****Solicitante.: Dr(a) RAFAEL RAVANELLI - CRM 140506-SP****Exame:****US ESTUDO DE 3 OU MAIS VASOS C/DOPPLER CONV - BILATERAL****Dt Realização:****14/05/2026 14:46****Dt Liberação:****14/05/2026 15:37**

Terço distal da perna 0,2 cm

**OPINIÃO:**

Veia safena magna com sinais de insuficiência.

Insuficiência de varicosidades na perna.

**ULTRASSONOGRAMA DOPPLER DO SISTEMA VENOSO PROFUNDO E SUPERFICIAL ESQUERDO****Técnica:**

Exame realizado com transdutor linear de alta frequência.

**ANÁLISE:****Sistema Profundo**

Veia femoral comum de calibre, compressibilidade e fluxo vascular preservados ao estudo Doppler

Veia femoral de calibre, compressibilidade e fluxo vascular preservados ao estudo Doppler.

Veia femoral profunda proximal de calibre, compressibilidade e fluxo vascular preservados ao estudo Doppler.

Veia poplítea de calibre, compressibilidade e fluxo vascular preservados ao estudo Doppler.

Veias fibulares de calibre, compressibilidade e fluxo vascular preservados ao estudo Doppler.

Veias tibiais anteriores de calibre, compressibilidade e fluxo vascular preservados ao estudo Doppler.

Veias tibiais posteriores de calibre, compressibilidade e fluxo vascular preservados ao estudo Doppler.

Veias musculares da panturrilha de calibre, compressibilidade e fluxo vascular preservados ao estudo Doppler.

As veias analisadas apresentam-se pérvias, com fluxo fásico, variante com a respiração, inferindo patência do sistema ilíaco e da veia cava inferior.

**Sistema Superficial**

Veia safena magna de calibre preservado, apresentando sinais de insuficiência com tempo de refluxo maior que 0,5 segundos no terço distal da coxa, proximal da perna, médio da perna e distal da perna.

Veia safena parva de calibre preservado, sem sinais de insuficiência ou trombos intraluminais.

Junção safeno-femoral de calibre preservado, sem sinais de insuficiência ou trombos intraluminais.

Junção safeno-poplítea de calibre preservado, sem sinais de insuficiência ou trombos intraluminais.

Paciente...: 39815852 DAVI ANTONINO NUNES DA SILVA

Nascimento: 11/11/1985 Sexo: M

Nº Pedido: 133894344

RG: 400631507 SSP SP

CPF: 34452937837

Convênio...: HAPVIDA

Matrícula: 07YT5002010003013

Solicitante.: Dr(a) RAFAEL RAVANELLI - CRM 140506-SP

Exame:

US ESTUDO DE 3 OU MAIS VASOS C/DOPPLER CONV - BILATERAL

Dt Realização:

14/05/2026 14:46

Dt Liberação:

14/05/2026 15:37

Veias perforantes sem sinais de insuficiência.

SAFENA MAGNA:

Segmentos Calibres (cm)

Crossa 0,7 cm

Terço distal da coxa 0,4 cm

Terço distal da perna 0,2 cm

OPINIÃO:

Veia safena magna com sinais de insuficiência.

Insuficiencia de varicosidades na perna.



DAVID RAFAEL FERREIRA FILHO - CRM 200714-SP