

Homework 5

Dan Sokolsky

October 28, 2020

Exercise 1.

Proof. First, we claim $f_b \in L^1(\mathbb{R}^n)$, and $f_s \in L^r(\mathbb{R}^n)$ -

$$\int |f_b| = \int |f_b|^p |f_b|^{1-p} \leq C(p) \|f\|_p^p < \infty$$

$$\int |f_s|^r = \int |f_s|^{r-p} |f_s|^p \leq C(r, p) \|f\|_p^p < \infty$$

Now, since $|Tf| \leq |Tf_b| + |Tf_s|$, we have $\{|Tf| > t\} \subseteq \{|Tf_b| > \frac{t}{2}\} \cup \{|Tf_s| > \frac{t}{2}\}$, so that -

$$\begin{aligned} \mu\{|Tf| > t\} &\leq \mu\{|Tf_b| > \frac{t}{2}\} + \mu\{|Tf_s| > \frac{t}{2}\} \leq \\ &\frac{2A\|f\|_1}{t} \int |f_b| + \frac{2^r A^r \|f\|_r^r}{t^r} \int |f_s|^r \end{aligned}$$

Now,

$$\int_0^\infty t^{q-1} t^{-1} \int_{|f|>t} |f| = \int_{\mathbb{R}^n} |f| \int_0^{|f|} t^{q-2} = \frac{1}{q-1} \int_{\mathbb{R}^n} |f| |f|^{q-1} = \frac{\|f\|_q^q}{q-1}$$

since $q > p > 1$, and

$$\int_0^\infty t^{q-1} t^{-r} \int_{|f|\leq t} |f|^r = \int_{\mathbb{R}^n} |f|^r \int_{|f|}^\infty t^{q-1-r} = \frac{1}{r-q} \int_{\mathbb{R}^n} |f|^r |f|^{q-r} = \frac{\|f\|_q^q}{r-q}$$

since $q < r$. Altogether,

$$\|Tf\|_q \leq C\|f\|_q$$

□

Exercise 2.

Proof. (a)

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus B_{2r}(0)} |K(x) - K(x-z)| dx = \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_{2r}(0)} \left| \int_{x-z}^x DK(t) dt \right| dx \leq$$

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_{2r}(0)} \int_{x-z}^x |DK(t)| dt dx &\leq \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_{2r}(0)} B|x|^{-n-1} |x - (x-z)| dx = \\ &B|z| \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_{2r}(0)} |x|^{-n-1} dx = C(n)B \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} (K(x) - K(x - x_\xi)) e^{-2\pi i x \xi} dx &= \int_{\mathbb{R}^n} K(x) e^{-2\pi i x \xi} dx - \int_{\mathbb{R}^n} K(x - x_\xi) e^{-2\pi i x \xi} dx = \\ \hat{K}(\xi) - \int_{\mathbb{R}^n} K(x) e^{-2\pi i (x+x_\xi) \xi} dx &= \hat{K}(\xi) - e^{-i\pi} \int_{\mathbb{R}^n} K(x) e^{-2\pi i x \xi} dx = \\ \hat{K}(\xi) + \hat{K}(\xi) &= 2\hat{K}(\xi) \end{aligned}$$

(c) Since K vanishes outside the annulus $B_R(0) \setminus B_\epsilon(0)$, we have

$$\begin{aligned} \left| \int_{B_{\frac{1}{|\xi|}}(0)} K(x) e^{-2\pi i x \xi} dx \right| &\leq \int_{B_{\frac{1}{|\xi|}}(0) \setminus (B_R(0) \cup B_\epsilon(0))} |K(x) e^{-2\pi i x \xi}| dx \leq \\ A \int_{B_{\frac{1}{|\xi|}}(0) \setminus (B_R(0) \cup B_\epsilon(0))} \frac{1}{|x|^n} &= C(n)A \end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned} \left| \int_{B_{\frac{1}{|\xi|}}(0)} K(x - x_\xi) e^{-2\pi i x \xi} dx \right| &\leq \int_{B_{\frac{1}{|\xi|} + x_\xi}(x_\xi) \setminus (B_{R+x_\xi}(x_\xi) \cup B_{\epsilon+x_\xi}(x_\xi))} |K(x) e^{-2\pi i (x+x_\xi) \xi}| dx = \\ \int_{B_{\frac{1}{|\xi|} + x_\xi}(x_\xi) \setminus (B_{R+x_\xi}(x_\xi) \cup B_{\epsilon+x_\xi}(x_\xi))} |e^{-i\pi} \cdot |K(x) e^{-2\pi i (x) \xi}| &dx \leq C(n)A \end{aligned}$$

(e)

$$\begin{aligned} |\hat{K}(\xi)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} K(x) e^{-2\pi i x \xi} dx \right| = \left| \int_{B_R(0) \setminus B_\epsilon(0)} K(x) e^{-2\pi i x \xi} dx \right| \leq \\ \int_{B_R(0) \setminus B_\epsilon(0)} |K(x) e^{-2\pi i x \xi}| dx &\leq A \int_{B_R(0) \setminus B_\epsilon(0)} \frac{1}{|x|^n} dx = C(n)A \end{aligned}$$

□

Exercise 3.

Proof. (a) (i)

□