

# Factorización de Matrices. LU. Crout. Doolittle.

CM4F1

Ángel Enrique Ramírez Gutiérrez

aramirezg@uni.edu.pe

Escuela Profesional de Matemática  
Universidad Nacional de Ingeniería

10 de mayo de 2022

$$Ax = b$$

$$A = LU$$

$$\Rightarrow (LU)x = b$$

$$z = Ux$$

$\Rightarrow Lz = b$  sustitución progresiva:  $z$  ✓  
conociendo  $z$  ahora se resuelve.

$Ux = z$  sustitución regresiva:  $x$



## 1. Factorización LU

### 1.1. Método de Doolittle

### 1.2. Método de Crout

sustitución regresiva

Hemos visto que del Algoritmo ~~2~~? lo fácil que es resolver un sistema lineal de la forma  $Ux = b$  donde  $U$  es una matriz triangular superior, pues se resuelve usando **sustitución regresiva**.

Es claro que esta simplicidad es análoga cuando se tiene un sistema de la forma  $Lx = b$  donde  $L$  es una matriz triangular inferior, en este caso se resuelve usando la **sustitución progresiva**.

Hemos visto que el total de operaciones (multiplicación/división y sumas/restas) es proporcional a  $n^2/2$  para la sustitución regresiva. Esto mismo se cumple para la sustitución progresiva.

Por tanto, si se tiene el sistema  $Ax = b$  tal que es posible factorizar la matriz  $A$  en la forma  $A = LU$  donde  $L$  es una matriz triangular inferior y  $U$  una matriz triangular superior, podemos resolver el sistema de la forma siguiente:

$$Ax = b \Rightarrow (LU)x = b \Rightarrow L(Ux) = b$$

Si hacemos  $Ux = z$ , entonces primero debemos resolver el sistema:

$$Lz = b$$

usando sustitución progresiva para calcular " $z$ " y luego resolver el sistema:

$$Ux = z$$

usando sustitución regresiva obteniendo así " $x$ " solución del sistema original.

## Teorema

Si  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  puede llevarse a una forma escalonada  $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$  sin intercambiar filas, entonces existe una matriz triangular inferior  $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$  con  $l_{ii} = 1$  para  $i = 1, 2, \dots, n$  tal que  $A = LU$ . Si además  $A$  es invertible, entonces las matrices  $L$  y  $U$  son únicas.

**Ejemplo:** Determine la factorización  $LU$  de la matriz asociada el sistema y determine la solución:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 & 4 \\ 12 & -8 & 6 & 10 \\ 3 & -13 & 9 & 3 \\ -6 & 4 & 1 & -18 \end{pmatrix}}_A x = \begin{pmatrix} 12 \\ 34 \\ 27 \\ -38 \end{pmatrix}$$

$$A_1 = F_{41}(-1) F_{31}(-\frac{1}{2}) F_{21}(-2) A =$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A1: \text{rowop}(A1, 4, 1, -1);$$

$$\begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 & 4 & 12 \\ 0 & -4 & 2 & 2 & 10 \\ 0 & -12 & 8 & 1 & 21 \\ 0 & 2 & 3 & -14 & -26 \end{pmatrix}$$

Actualizar  $L$ :

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

A2: rowop(A2, 4, 2, -1/2);

$$\begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 & 4 & 12 \\ 0 & -4 & 2 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 2 & -5 & -9 \\ 0 & 0 & 4 & -13 & -21 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = F_{42}(\frac{1}{2}) F_{32}(-3) A_1 =$$

Actualizar  $L$ :

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 3 & 1 & 0 \\ -1 & -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

A3: rowop(A2, 4, 3, 2);

$$\begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 & 4 & 12 \\ 0 & -4 & 2 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 2 & -5 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

Actualizar  $L$ :

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 3 & 1 & 0 \\ -1 & -\frac{1}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$F_{43}(-2) F_{42}(\frac{1}{2}) F_{32}(-3) F_{41}(1) F_{31}(\frac{1}{2}) F_{21}(-2) A = U =$   
No se han realizado intercambio de filas

$$\begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & -4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 3 & 1 & 0 \\ -1 & -\frac{1}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

y se cumple:  $A = LU$

Resta calcular:  $z$  a partir de:

$$Lz = b^d$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 3 & 1 & 0 \\ -1 & -\frac{1}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 10 \\ -9 \\ -3 \end{pmatrix}$$

substitución progresiva:

$$z_1 = 12$$

$$z_2 = 10 - 2z_1 = 10 - 2(12) = -14$$

$$z_3 = -9 - \frac{1}{2}z_1 - 3z_2 = -9 - \frac{1}{2}(12) - 3(-14) = 27$$

$$z_4 = -3 + z_1 + \frac{1}{2}z_2 - 2z_3 = -3 + 12 + \frac{1}{2}(-14) - 2(27) =$$

Conocido  $z$  se resuelve ahora:

$$Ux = z$$

substitución regresiva:  $x$

Hasta ahora nuestra hipótesis es que el sistema tiene solución única, es decir,  $\det(A) \neq 0$ . ¿Esto es suficiente para garantizar la existencia de  $L$  y  $U$  tal que  $A = LU$ ?

Consideremos la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 4 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

observamos que  $\det(A) = 4 \neq 0$ . Deseamos calcular L y U tal que  $A = LU$ , es decir

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 4 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix} \quad (2)$$



De (2) obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\underbrace{0 = l_{11}u_{11}}, \quad \underline{10 = l_{11}u_{12}}, \quad \underline{4 = l_{11}u_{13}} \quad (3)$$

De (3) podemos observar que  $\underline{l_{11}} \neq 0$  y así  $u_{11} = 0$ .

Otra vez, a partir de (3) se observa que:

$$\boxed{\begin{array}{l} 0 = l_{21}u_{11} \\ 2 = l_{31}u_{11} \end{array}} \quad (\rightarrow \leftarrow) \quad (4)$$

Como  $\underline{u_{11}} = 0$  se puede observar que se contradice la segunda ecuación de (4). Por tanto, la matriz A no admite descomposición LU a pesar que A es una matriz no singular.

Los ejemplos anteriores nos motivan a establecer condiciones sobre una matriz  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  tal que pueda existir la factorización LU. Con este fin, damos primero las siguientes definiciones.

## Definición

Dada la matriz  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , definimos las **matrices esquina**  $A_k$  como aquellas submatrices de  $A$  formadas como sigue:

$$A_k = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{pmatrix}, \quad k = 1, \dots, n.$$

Es decir, cada matriz  $A_k$  es la submatriz principal de la matriz  $A$  obtenida con sus primeras  $k$  filas y columnas.

## Teorema (Existencia de descomposición $LU$ )

La matriz  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  admite una factorización  $LU$  si y sólo si todas las matrices esquina  $A_k$  satisfacen:

$$\underline{\det(A_k)} \neq 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

La demostración puede ser realizada por inducción y se deja como ejercicio de investigación al estudiante, [1].

El Teorema 10 garantiza cuando una matriz  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  no singular admite descomposición  $LU$  tal que  $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$  matriz triangular inferior y  $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$  matriz triangular superior. Observe que si consideramos cualquier matriz  $D \in \mathbb{R}^{n \times n}$  diagonal y no singular, se tiene que:

$$A = \underline{L}U = L(DD^{-1})U = (\underline{LD})(\underline{D^{-1}U}) = \underline{L^*}\underline{U^*},$$

donde  $L^* \in \mathbb{R}^{n \times n}$  sigue siendo una matriz triangular inferior y  $U^* \in \mathbb{R}^{n \times n}$  es una matriz triangular superior, esto indica que en general la factorización  $LU$  no es única. Sin embargo, el teorema siguiente da las condiciones para el cual la factorización  $LU$  es única.

## Teorema

Si una matriz  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  es no singular y admite factorización  $LU$  tal que los elementos de la diagonal de la matriz  $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$  son iguales a 1, entonces esta factorización es única.

**Demostración:** Supongamos que  $A$  admite dos factorizaciones  $LU$ , es decir:

$$A = L_1 U_1 = L_2 U_2$$

tal que los elementos de la diagonal de  $L_1$  y  $L_2$  son iguales a 1. Observe que  $L_1^{-1}$  y  $L_2^{-1}$  son matrices triangulares inferiores. De modo análogo para las matrices triangulares superiores. Por tanto  $L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1}$ .

El producto de matrices triangulares inferiores con unos en la diagonal resulta otra matriz triangular inferior con unos en la diagonal. De forma análoga, para las matrices triangulares superiores. Esto implica que  $U_2 U_1^{-1} = I_n$  y por tanto  $U_1 = U_2$ , así también  $L_1 = L_2$ .

De manera análoga se tiene el siguiente resultado.

## Teorema

Si una matriz  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  es no singular y admite factorización  $LU$  tal que los elementos de la diagonal de la matriz  $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$  son iguales a 1, entonces esta factorización es única.

La demostración del Teorema 13 es análoga a la del Teorema 12.

Hasta ahora está garantizada la existencia y unicidad de matrices  $L$  y  $U$  tal que  $A = LU$ . Ahora la pregunta natural es: ¿Cómo calcular estas matrices?

Consideramos una matriz  $A$  que satisface las condiciones del Teorema 12. Formamos un sistema de ecuaciones de la forma  $A = LU$  y manteniendo la fila " $i$ " constante y variamos todas las columnas  $j$ , así obtenemos:

Fila  $i = 1$  columna  $j = 1, 2, \dots, n$ :

$$a_{1j} = l_{11}u_{1j} \Rightarrow u_{1j} = \frac{a_{1j}}{l_{11}},$$

Fila  $i = 2, 3, \dots, n$ , tenemos dos casos:

- Columna  $j = 1, 2, \dots, i - 1$ :

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^j l_{ik}u_{kj} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}u_{kj} + l_{ij}u_{jj} \Rightarrow l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}u_{kj}}{u_{jj}}.$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} & 0 \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & l_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & u_{14} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & u_{24} \\ 0 & 0 & u_{33} & u_{34} \\ 0 & 0 & 0 & u_{44} \end{pmatrix}$$

$L \qquad U$

Resolva A fila por fila  
Fila 1:

$$C1: a_{11} = l_{11} u_{11}$$

$$C2: a_{12} = l_{11} u_{12}$$

$$C3: a_{13} = l_{11} u_{13}$$

$$C4: a_{14} = l_{11} u_{14}$$

Fila 2:

$$C1: a_{21} = l_{21} u_{11}$$

$$C2: a_{22} = l_{21} u_{12} + l_{22} u_{22}$$

$$C3: a_{23} = l_{21} u_{13} + l_{22} u_{23}$$

$$C4: a_{24} = l_{21} u_{14} + l_{22} u_{24}$$

Método de  
Doolittle

Fila 3:

$$C1: a_{31} = l_{31} u_{11}$$

$$C2: a_{32} = l_{31} u_{12} + l_{32} u_{22}$$

$$C3: a_{33} = l_{31} u_{13} + l_{32} u_{23} + l_{33} u_{33}$$

$$C4: a_{34} = l_{31} u_{14} + l_{32} u_{24} + l_{33} u_{34}$$

Fila 4:

$$C1: a_{41} = l_{41} u_{11}$$

$$C2: a_{42} = l_{41} u_{12} + l_{42} u_{22}$$

$$C3: a_{43} = l_{41} u_{13} + l_{42} u_{23} + l_{43} u_{33}$$

$$C4: a_{44} = l_{41} u_{14} + l_{42} u_{24} + l_{43} u_{34} + l_{44} u_{44}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} & 0 \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & l_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & u_{14} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & u_{24} \\ 0 & 0 & u_{33} & u_{34} \\ 0 & 0 & 0 & u_{44} \end{pmatrix}$$

$A \qquad L \qquad U$

Columna 1:

$$F1: a_{11} = l_{11} u_{11}$$

$$F2: a_{21} = l_{21} u_{11}$$

$$F3: a_{31} = l_{31} u_{11}$$

$$F4: a_{41} = l_{41} u_{11}$$

Columna 2

$$F2: a_{12} = l_{11} u_{12}$$

$$F2: a_{22} = l_{21} u_{12} + l_{22} u_{22}$$

$$F3: a_{32} = l_{31} u_{12} + l_{32} u_{22}$$

$$F4: a_{42} = l_{41} u_{12} + l_{42} u_{22}$$

Método de  
Crout

Columna 3:

$$F2: a_{13} = l_{11} u_{13}$$

$$F2: a_{23} = l_{21} u_{13} + l_{22} u_{23}$$

$$F3: a_{33} = l_{31} u_{13} + l_{32} u_{23} + l_{33} u_{33}$$

$$F4: a_{43} = l_{41} u_{13} + l_{42} u_{23} + l_{43} u_{33}$$

Columna 4:

$$F2: a_{14} =$$

$$F2: a_{24} =$$

$$F3: a_{34} =$$

$$F4: a_{44} =$$



- Columna  $j = i, i + 1, \dots, n$ :

$$\longrightarrow a_{ij} = \sum_{k=1}^i l_{ik} u_{kj} = \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj} + l_{ii} u_{ij} \Rightarrow u_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj}}{l_{ii}}.$$

El razonamiento anterior es llamado **método de Doolittle** y desde que consideramos  $A$  una matriz no singular, entonces  $l_{ii}$  ( $i = 1, \dots, n$ ) son todos no nulos. Este método es mostrado en el Algoritmo 1.

## Algoritmo 1: Factorización $LU$ por el método de Doolittle

**Entrada:** Ingresar una matriz  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ .

Asignar valores no nulos para  $l_{ii}$  ( $i = 1, \dots, n$ ). Caso contrario asumir  $l_{ii} = 1$ .

```
1 inicio
2   para  $i \leftarrow 1$  a  $n$  hacer
3     para  $j \leftarrow 1$  a  $i - 1$  hacer
4       
$$a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj}$$

5       
$$l_{ij} \leftarrow \frac{\quad}{u_{jj}};$$

6     fin para
7     para  $j \leftarrow i$  a  $n$  hacer
8       
$$a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj}$$

9       
$$u_{ij} \leftarrow \frac{\quad}{l_{ii}};$$

10    fin para
11  fin para
12  devolver Matrices  $L$  y  $U$ .
```

## Ejemplo 6: Método de Doolittle

Encuentre la factorización  $LU$  por el método de Doolittle de la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 4 & 7 & 2 \\ 2 & 11 & 5 \end{pmatrix}$$

**Resolución:**

Al igual que para el método de Doolittle, sea una matriz  $A$  que satisface las condiciones del Teorema 12. A partir del sistema  $A = LU$ , el razonamiento es como sigue, formamos un sistema de ecuaciones manteniendo la columna "  $j$  " constante y variamos todas las filas  $i$ , así obtenemos: Columna  $j = 1$ , fila  $i = 1, 2, \dots, n$ :

$$a_{i1} = l_{i1}u_{11} \Rightarrow l_{i1} = \frac{a_{i1}}{u_{11}},$$

Columna  $j = 2, 3, \dots, n$ , tenemos dos casos:

- Fila  $i = 1, 2, \dots, j - 1$ :

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^i l_{ik}u_{kj} = \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{kj} + l_{ii}u_{ij} \Rightarrow u_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{kj}}{l_{ii}}.$$

- Fila  $i = j, j + 1, \dots, n$ :

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^j l_{ik} u_{kj} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj} + l_{ij} u_{jj} \Rightarrow l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj}}{u_{jj}}.$$

El razonamiento anterior es llamado **método de Crout** y desde que consideramos  $A$  una matriz no singular, entonces  $u_{ii}$  ( $i = 1, \dots, n$ ) son todos no nulos. Este método es mostrado en el Algoritmo 2.

## Algoritmo 2: Factorización $LU$ por el método de Crout

**Entrada:** Ingresar una matriz  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ .

Asignar valores no nulos para  $u_{ii}$  ( $i = 1, \dots, n$ ). Caso contrario asumir  $u_{ii} = 1$ .

```
1 inicio
2   para  $j \leftarrow 1$  a  $n$  hacer
3     para  $i \leftarrow 1$  a  $j - 1$  hacer
4       
$$a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj}$$

5       
$$u_{ij} \leftarrow \frac{\quad}{l_{ii}};$$

6     fin para
7     para  $i \leftarrow j$  a  $n$  hacer
8       
$$a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj}$$

9       
$$l_{ij} \leftarrow \frac{\quad}{u_{jj}};$$

10    fin para
11  devolver Matrices  $L$  y  $U$ .
12 fin
```

# Ejemplo 7: Método de Crout

Encuentre la factorización  $LU$  por el método de Crout de la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Resolución:

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix}$$

Col 1:  $u_{11} = 2$

$$F1: -1 = l_{11} u_{11}$$

$$F2: 0 = l_{21} u_{11}$$

$$F3: 1 = l_{31} u_{11}$$

Col 2:  $u_{22} = 2$

$$F1: 2 = l_{11} u_{12}$$

$$F2: 2 = l_{21} u_{12} + l_{22} u_{22}$$

$$F3: 0 = l_{31} u_{12} + l_{32} u_{22}$$

Q3:

$$u_{33} = 1$$

$$F_2: -1 = \frac{l_{11}}{(-2)} \frac{u_{13}}{(3)}$$

$$F_2: 1 = \frac{l_{21}}{(6)} \frac{u_{13}}{(3)} + \frac{l_{22}}{(2)} \frac{u_{23}}{1/2}$$

$$F_3: -1 = \frac{l_{31}}{(3)} \frac{u_{13}}{(3)} + \frac{l_{32}}{(1)} \frac{u_{23}}{1/2} + \frac{l_{33}}{2} \frac{u_{33}}{1} = 2$$

La décomposition LU de A est:

$$L = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -5/2 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -5/2 \end{pmatrix}}_L \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_U$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}}_{L^*} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -5/2 \end{pmatrix}}_{U^*} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{U^*}$$



## Teorema

Sea  $A$  una matriz rectangular  $m \times n$  que se puede reducir a una forma escalonada efectuando únicamente operaciones elementales de eliminación (operaciones del tipo  $\alpha F_i + F_j$  con  $i < j$ ). Entonces existe una matriz  $m \times m$  inferior  $L$  con unos en la diagonal principal y una matriz  $m \times n$ ,  $U$  con  $u_{ij} = 0$  si  $i > j$  tales que:

$$A = LU$$

## Ejemplo:

Determine la descomposición  $LU$  para la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 2 \\ 2 & 5 & 8 & -1 \\ 3 & 6 & 12 & 3 \end{pmatrix}_{3 \times 4}$$

Iniciamos con la matriz  $L$  de la forma:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ * & 1 & 0 \\ * & * & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

Y procedemos a escalar la matriz aplicando operaciones elementales:

$$F_{31}(\underline{-3})F_{21}(\underline{-2})A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 2 \\ 0 & -3 & -6 & -5 \\ 0 & -6 & -9 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & * & 1 \end{pmatrix}$$

*Forma  
escalonada*

$$F_{32}(-2)F_{31}(-3)F_{21}(-2)A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 2 \\ 0 & -3 & -6 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \end{pmatrix}}_{\text{Forma escalonada}} \Rightarrow L = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}}$$

Por tanto se tienen:

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 2 \\ 0 & -3 & -6 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \end{pmatrix} \text{ y } L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

y se cumple:

$$A = LU$$



J. De la Fuente, “Técnicas de cálculo para sistemas de ecuaciones, programación lineal y programación entera,” *Editorial Reverté, SA, Barcelona*, 1998.