De la pista al mecanismo

1. Empieza por el fenotipo

Ubica edad de inicio, microorganismos, gravedad de las infecciones, inflamación, autoinmunidad e historia familiar.

Infecciones sinopulmonares

Inmunidad humoral: IgG, IgA, IgM y función de anticuerpos.

Oportunistas en lactantes

Linfocitos T o defecto combinado: sospecha y referencia urgente.

Abscesos profundos

Defectos de fagocitos: DHR según contexto clínico.

Infección invasiva recurrente por Neisseria

Considerar complemento: CH50 y AH50.

Una prueba aislada normal no siempre descarta un error innato de inmunidad.

FUENTES: primaryimmune.org | info4pi.org | fumeni.org.mx

Caso y repaso para el examen

2. Caso express

Lactante de siete meses con candidiasis persistente, neumonías graves y dificultad para crecer.

¿Qué priorizar?

Alteración de linfocitos T o inmunodeficiencia combinada grave; referir de manera urgente.

3. Comprueba tu aprendizaje

- [ ] Explica qué aporta el hemograma con diferencial.
- [ ] Relaciona patrones con IgG/IgA/IgM, T/B/NK, DHR y CH50.
- [ ] Distingue prueba de tamiz de prueba confirmatoria.
- [ ] Recuerda interpretar según edad y contexto.

Para profundizar

Consulta Diagnosing PI y Laboratory Testing de IDF; señales de Jeffrey Modell Foundation y recursos de FUMENI.

FUENTES: primaryimmune.org | info4pi.org | fumeni.org.mx