

Cálculo estocástico

Eliuth Montiel Navarrete

2027-1

Índice

1. Clase 0	2
2. Clase 1	2
3. Clase 2	4
4. Clase 3	5
5. Clase 4	8
5.1. Tema 2	8
5.2. 2.2 Variables aleatorias, distribución y esperanza	10

1. Clase 0

No vine. xd

La clase se dividirá en 2 partes, tiempo discreto y tiempo continuo.

Se realizará una segunda parcial

Evaluación

- Primer parcial (Tiempo discreto) - 30
- Segundo parcial (Tiempo continuo) - 30
- Proyecto final - 40

2. Clase 1

Repaso de la clase anterior

Empezamos con un valor S_0 y en un futuro t contamos con dos posibilidades:

Si H : $S_1(H) = uS_0$

Si T : $S_1(T) = dS_0$

Contamos con dos probabilidades para cada evento:

$P(H) = P$ y $P(T) = (1 - P)$

Por ende:

$$u = \frac{S_1(H)}{S_0} \quad d = \frac{S_1(T)}{S_0}$$

$$0 < d < 1 + r < u$$

De manera intuitiva podemos decir que $u > 1$ y $d < 1$ además se establecen las siguientes reglas:

- $d < u$
- $d \neq u$
- $d > ut$

Se introduce r , es la tasa de interés a la que se puede prestar y pedir prestado, la mayoría de las veces se cumple que $r \geq 0$.

Arbitraje financiero: Estrategia que no requiere dinero, tiene una probabilidad positiva de hacer dinero, probabilidad de cero de perder dinero.

Propiedades del modelo:

1. Su relación con la fijación de precios de activos por arbitraje y los precios neutrales al riesgo.
2. Con suficientes números de periodos se aproxima a un modelo continuo.

3. Desarrollar la teoría de esperanza condicional y martingala.

Ejemplo: Supongamos una opción call Europea con $S(0) = 4, u = 2, d = \frac{1}{2}$ y $r = \frac{1}{4}$. Suponga $k = 5$ (precio *strike*) y que iniciamos con una riqueza de $x_0 = 1.20$ y compramos $\Delta_0 = \frac{1}{2}$ de la acción.

En $t_0 : S(0) = 4$.

En $t_1 : S(H) = 8, S(T) = 2$

$(8 - 5)^+ = 3$ El máximo entre lo del paréntesis y 0.

$(2 - 5)^+ = 0$

Como nuestra riqueza es de $X_0 = 1.2$ necesitamos un préstamo para comprar $\Delta_0 = \frac{1}{2}$ acciones del mercado. Entonces:

$$X_0 - \Delta_0 = 1.2 - (\frac{1}{2})(4) = -0.8$$

En el plazo de tiempo establecido tenemos un interés y principal que se debe pagar:

$$(1 + r)(X_0 - \Delta_0 S_0) = (1 + \frac{1}{4})(-0.8) = -1$$

Como somos dueños de la Δ_0 de acción.

$$\begin{aligned} X_1(H) &= \Delta_0 S_1(H) + (1 + r)(X_0 - \Delta_0 S_0) \\ &= (\frac{1}{2})(8) + (1 + \frac{1}{4})(1.2 - (\frac{1}{2})(4)) = 3 \end{aligned}$$

Para $X_1(T)$ sustituimos $X_1 H$ en la ecuación anterior por lo que:

$$X_1(T) = 1 - 1 = 0$$

Hemos replicado la opción al negociar con la acción y el mercado de dinero (banco). Por lo tanto el valor inicial de 1.20 es el precio que impide el arbitraje en la opción en S_0 (el tiempo 0).

¿Que pasa si valiera 1.21 o 1.19? ¿Cómo realiza el arbitraje?

Los argumentos del ejemplo depende de varios supuestos:

- Las acciones de un activo se pueden dividir.
- La tasa de interés es la misma para un préstamo que para una inversión.
- El precio de compra y venta del activo es el mismo (el *spread* es de cero.)
- En cualquier periodo el activo puede tomar dos posibles valores.

Para determinar el precio de V_0 de un derivado:

$$\begin{aligned} X_1 &= \Delta_0 S_1 + (1 + r)(X_0 - \Delta_0 S_0) \\ &= (1 + r)X_0 + \Delta_0(S_1 - (1 + r)S_0) \end{aligned}$$

Debemos escoger X_0 y Δ_0 tal que $X_1(H) = V_1(H)$ y $X_1(T) = V_1(T)$

Recuerde que los valores de $V_1(H)$ y $V_1(T)$ están dados, lo que no sabemos es

qué valor va a ocurrir. La réplica del derivado requiere:

$$X_0 + \Delta_0\left(\frac{1}{1+r}S_1(H) - S_0\right) = \frac{1}{1+r}V_1(H)$$

$$X_0 + \Delta_0\left(\frac{1}{1+r}S_1(T) - S_0\right) = \frac{1}{1+r}V_1(T)$$

En estas ecuaciones tenemos como incógnitas: $X_0, \Delta_0, V_1(T), V_1(H)$

Ejemplo al margen:

$$P(X) = 0.5 \text{ y } P(nx) = 0.5$$

Suponiendo que

$$X = 1.5 \text{ MUSD}$$

$$nx = 0.25 \text{ MUSD}$$

$$Io = 0.5 \text{ MUSD}$$

$$\begin{aligned} E[G] &= 0.5(1.5 - 0.5) + 0.5(0.25 - 0.5) \\ &= 0.5 - 0.125 = 0.375 \end{aligned}$$

Cuándo retirarte se puede saber en "La ruina del jugador."

Nota: Debería graficar esto para determinar el caso en el que $V_1(H) = V_1(T)$

3. Clase 2

Una forma de resolver estas dos ecuaciones:

$$X_0 + \Delta_0\left(\frac{1}{1+r}S_1(H) - S_0\right) = \frac{1}{1+r}V_1(H) \dots(a)$$

$$X_0 + \Delta_0\left(\frac{1}{1+r}S_1(T) - S_0\right) = \frac{1}{1+r}V_1(T) \dots(b)$$

Multiplicando la primera ecuación por $\tilde{p}$ y la segunda por $\tilde{q} = 1 - \tilde{p}$. De esta manera obtenemos:

$$X_0 + \Delta_0\left(\frac{1}{1+r}(\tilde{p}S_1(H) + \tilde{q}S_1(T) - S_0)\right) = \frac{1}{1+r}(\tilde{p}V_1(H) + \tilde{q}V_1(T) - S_0) \dots(1)$$

Si tomamos a $\tilde{p}$ tal que:

$$S_0 = \frac{1}{1+r}(\tilde{p}S_1(H) + \tilde{q}S_1(T)) \dots(2)$$

Entonces, sustituyendo (2) en (1):

$$X_0 = \frac{1}{1+r}(\tilde{p}V_1(H) + \tilde{q}V_1(T)) \dots(3)$$

Podemos resolver para $\tilde{p}$ directamente en 2:

$$\tilde{p} = \frac{S_0(1+r) - S_1(T)}{S_1(H) - S_1(T)} = \frac{S_0(1+r) - dS_0}{uS_0 - dS_0} = \frac{1+r-d}{u-d} \dots(4)$$

Por lo que:

$$\tilde{q} = 1 - \tilde{p} = \frac{u-1-r}{u-d} \dots(5)$$

Recordando que la esperanza se define en tiempo discreto como:

$$E[X] = \sum_{i=1}^n p_i * x_i$$

Y para tiempo continuo ecuación

Se puede resolver para $\Delta_0 = \frac{V_1}{S_1}$ restando (a) de (b) para obtener la fórmula "delta hedge".

$$\Delta_0 = \frac{V_1(H) - V_1(T)}{S_1(H) - S_1(T)} \dots(6)$$

Tenemos 4 casos para el valor final a partir del precio strike k :

- $X_1 < k$: Out of the money.
- $X_1 = k$: At of the money.
- $X_1 > k$: In of the money.
- $X_1 \gg k$: Deep in the money.

En conclusión: Si un agente comienza en X_0 dado por (3) y en el tiempo cero compra Δ_0 acciones dado por (6), en el tiempo uno. Si la moneda da H tendrá $V_1(H)$ y se cae, T tendrá $V_1(T)$. El agente ha cubierto una porción corta en el derivado. El que paga V_1 en el tiempo uno debe valer:

$$V_0 = \frac{1}{1+r} [\tilde{p}V_1(H) + \tilde{q}V_1(T)] \dots(6)$$

en el momento cero los número $\tilde{p}$ y $\tilde{q}$ son números positivos por la condición de no arbitraje y suman uno. Por esta razón las consideramos probabilidades, pero no son las probabilidades reales, son probabilidades neutrales al riesgo. Las probabilidades p y q deben cumplir:

$$S_0 < \frac{1}{1+r} [pS_1(H) + qS_1(T)]$$

Para que un inversionista esté dispuesto a arriesgar su riqueza, mientras que $\tilde{p}$ y $\tilde{q}$ es la tasa promedio de crecimiento del activo que es igual a la tasa de crecimiento de la inversión en el mercado, por lo que los inversionistas son neutrales a este riesgo.

4. Clase 3

2.- Modelo Binomial multiperiodo Se lanza una moneda muchas veces, cuando aparece H se mueve hacia arriba y si aparece T hacia abajo. El único supuesto en la condición de no arbitraje. (Nota:)u y d son constantes en cada evento.

(Insertar fig 1.)

Ejemplo:

- $S_0 = 4$
- $u = 2$
- $d = \frac{1}{2}$

(Insertar fig 2)

Considerar una opción Call Europea.

Deseamos el precio que no admita arbitraje.

A la expiración, el pago de la opción call con strike k y fecha de expiración 2 es $V_2 = (S_2 - k)^+$, donde V_2 y S_2 dependen del primero y segundo lanzamiento.

Deseamos saber el precio que no permite el arbitraje en el momento cero. Se compran Δ_0 acciones del activo. invirtiendo $V_0 - \Delta_0 S_0$ UM para financiarlo ($V_0 - S_0$ sería negativo por lo que se financia con $\Delta_0 S_0 V_0$) UM. En el tiempo uno, el agente tiene un portafolio

$$X_1 = \Delta_0 S_1 + (1+r)(V_0 - \Delta_0 S_0) \dots (2.1)$$

Tenemos dos posibilidades:

$$X_1 = \Delta_0 S_1(H) + (1+r)(V_0 - \Delta_0 S_0) \dots (2.2)$$

$$X_1 = \Delta_0 S_1(T) + (1+r)(V_0 - \Delta_0 S_0) \dots (2.3)$$

Después del primer lanzamiento el agente puede reajustar su cobertura

$$V_2 = \Delta_1 S_2 + (1+r)(X_1 - \Delta_1 S_1) \dots (2.4)$$

Tenemos cuatro posibles resultados:

$$1. V_2(HH) = \Delta_1(H) S_2(HH) + (1+r)(X_1(H) - \Delta_1(H) S_1(H)) \dots (2.5)$$

$$2. V_2(HT) = \Delta_1(H) S_2(HT) + (1+r)(X_1(H) - \Delta_1(H) S_1(H)) \dots (2.6)$$

$$3. V_2(TT) = \Delta_1(T) S_2(TT) + (1+r)(X_1(T) - \Delta_1(T) S_1(T)) \dots (2.7)$$

$$4. V_2(TH) = \Delta_1(T) S_2(TH) + (1+r)(X_1(T) - \Delta_1(T) S_1(T)) \dots (2.8)$$

Ahora tenemos seis ecuaciones con seis incógnitas: V_0 , Δ_0 , $\Delta(H)$, $\Delta(T)$, $X_1(H)$, $X_1(T)$. Para resolver estas ecuaciones y determinar V_0 comentaremos con la ecuación (2.7) y la ecuación (2.8) para encontrar $\Delta_1(T)$.

(Nota:) La economía sí funciona con una gallina decapitada.

$$\Delta_1(T) = \frac{V_2(TH) - V_2(TT)}{S_2(TH) - S_2(TT)} \dots (2.9)$$

Sustituyendo en (2.7) o (2.8) obtenemos:

$$X_1(T) = \frac{1}{1+r} [\tilde{p} V_2(TH) + \tilde{q} V_2(TT)] \dots (2.10)$$

$$\tilde{p} S_2(TH) + \tilde{q} S_2(TT) = (1+r) S_1(T)$$

Lo que provoca que todos los términos involucrados $\Delta_1(T)$ desaparezcan. La ecuación (2.10) define el "precio de la opción en el tiempo uno si el primer resultado es $T\tau$ la denotaremos como $V_1(T)$

$$V_1(T) = \frac{1}{1+r} [\tilde{p}V_2(TH) + \tilde{q}V_2(TT)] \dots (2.11)$$

Las ecuaciones 2.5 y 2.6 dan algo similar:

$$\Delta_1(H) = \frac{V_2(HH) - V_2(HT)}{S_2(HH) - S_2(HT)} \dots (2.12)$$

$$V_1(H) = \frac{1}{1+r} [\tilde{p}V_2(HH) + \tilde{q}V_2(HT)] \dots (2.13)$$

Este es analogo a la ecuación 1.6. La solución de esta ecuación para Δ_0 y V_0 es la misma que para (A) y (B) y los resultados nuevamente son (5) y (6).

Recapitulando tenemos tres procesos estocásticos, (Δ_0, Δ_1) , (X_0, X_1, X_2) y (V_0, V_1, V_2) .

$$X_{n+1} = \Delta_n S_{n+1} + (1+r)(X_n - \Delta_n S_n) \dots (2.14)$$

Para un derivado que expira en el tiempo dos, la variable aleatoria V_2 para una Opción Call Europea es $V_2(\omega_1\omega_2) = (S_2(\omega_1\omega_2) - k)^+$. Deseamos determinar un valor de X_0 y valores para Δ_0 , $\Delta_1(H)$ y $\Delta_1(T)$ tal que X_2 al aplicar recursivamente satisface: $X_2(\omega_1\omega_2) = V_2(\omega_1\omega_2)$, no importando los valores de ω_1 y ω_2 .

Teorema 1. (Réplica en el modelo binomial en multiperiodo)

Considere un modelo binomial de activos-precio de N periodos, con $0 < d < 1+r < u$ y con:

$$\tilde{p} = \frac{1+r-d}{u-d}, \tilde{q} = \frac{u-1-r}{u-d} \dots (2.15)$$

Sea V_N una variable aleatoria dependiente de los primeros N lanzamientos $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$. Define recursivamente hacia atrás en el tiempo la secuencia de variables aleatorias $V_{N-1}, V_{N-2}, \dots, V_0$ por

$$V_n(\omega_1\omega_2 \dots \omega_n) = \frac{1}{1+r} [\tilde{p}V_{n+1}(\omega_1\omega_2 \dots \omega_n H) + \tilde{q}V_{n+1}(\omega_1\omega_2 \dots \omega_n T)] \dots (2.16)$$

tal que cada V_n depende de los primeros n lanzamientos $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$, donde n se encuentra entre $N-1$ y 0. Se define:

$$\Delta_n(\omega_1 \dots \omega_n) = \frac{V_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n H) - V_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n T)}{S_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n H) - S_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n T)} \dots (2.17)$$

donde nuevamente n se encuentra entre cero y $N-1$. Si colocamos $X_0 = V_0$ y se define recursivamente hacia adelante en el tiempo, el portafolio vale $x_1, x_2, \dots, x_N$ por (2.14), entonces tendremos:

$$X_N(\omega_1\omega_2 \dots \omega_N) = V_N(\omega_1\omega_2 \dots \omega_N) \text{ para toda } \omega_1\omega_2 \dots \omega_N \dots (2.18)$$

Definición 1:

Para $n = 1, 2, \dots, N$, la variable aleatoria $V_n(\omega_1, \dots, \omega_N)$ en el teorema 1, está definida para ser el precio del derivado en el tiempo n si el resultado de los primeros lanzamientos son $\omega_1 \dots \omega_n$. El precio del derivado en el momento cero está definido a ser V_0 .

Ejemplo 3:

Como en la figura 3, suponga $S_0 = 4$, $u = 2$, $d = \frac{1}{2}$. Asuma $r = \frac{1}{4}$. Entonces $\tilde{p} = \tilde{q} = \frac{1}{2}$. Considere una Opción Lookback que paga: $V_3 = \max(S_n - S_3)$ $0 \leq n \leq 3$.

$$V_3(HHH) = S_3(HHH) - S_3(HHH) = 32 - 32 = 0$$

$$V_3(HHT) = S_2(HH) - S_3(HHT) = 16 - 8 = 8$$

$$V_3(HTH) = S_1(H) - S_3(HTH) = 8 - 8 = 0$$

$$V_3(THH) = S_1(H) - S_3(THH) = 8 - 8 = 0$$

$$V_3(HTT) = S_1(H) - S_3(HTT) = 8 - 2 = 6$$

$$V_3(TTH) = S_0 - S_3(TTH) = 4 - 2 = 2$$

$$V_3(THT) = S_0 - S_3(THT) = 4 - 2 = 2$$

$$V_3(TTT) = S_0 - S_3(TTH) = 4 - 0.5 = 3.5$$

(Nota:) Se obtiene el valor máximo únicamente del camino seguido.

5. Clase 4

Continuación del ejercicio de la clase anterior:

$$V_2(HH) = (\frac{1}{1+\frac{1}{4}})(\frac{1}{2}V_3(HHH) + \frac{1}{2}V_3(HHT)) = \frac{4}{5}(\frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(8)) = \frac{4}{5}(4) = 3.2$$

$$V_2(HT) = (\frac{4}{5})(\frac{1}{2}V_3(HTH) + \frac{1}{2}V_3(HTT)) = \frac{4}{5}(\frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(6)) = \frac{4}{5}(3) = 2.4$$

$$V_2(TH) = (\frac{4}{5})(\frac{1}{2}V_3(THH) + \frac{1}{2}V_3(THT)) = \frac{4}{5}(\frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(2)) = \frac{4}{5}(1) = 0.8$$

$$V_2(TT) = (\frac{4}{5})(\frac{1}{2}V_3(TTH) + \frac{1}{2}V_3(TTT)) = \frac{4}{5}(\frac{1}{2}(2) + \frac{1}{2}(3.5)) = \frac{4}{5}(3) = 2.2$$

(Nota:) Los medios vienen de las probabilidades de $\tilde{p}$ y $\tilde{q}$.

$$V_1(H) = (\frac{4}{5})(\frac{1}{2}V_2(HH) + \frac{1}{2}V_2(HT)) = (\frac{4}{5})(\frac{1}{2}(3.2) + \frac{1}{2}(2.4)) = (\frac{4}{5})(1.6 + 1.2) = (\frac{4}{5})(2.8) = 2.24$$

$$V_1(T) = (\frac{4}{5})(\frac{1}{2}V_2(TH) + \frac{1}{2}V_2(TT)) = (\frac{4}{5})(\frac{1}{2}(0.8) + \frac{1}{2}(2.2)) = (\frac{4}{5})(0.4 + 1.1) = (\frac{4}{5})(1.5) = 1.2$$

$$V_0 = (\frac{4}{5})(\frac{1}{2}V_1(H) + \frac{1}{2}V_1(T)) = (\frac{4}{5})(\frac{1}{2}(2.24) + \frac{1}{2}(1.2)) = (\frac{4}{5})(1.12 + 0.6) = (\frac{4}{5})(1.72) = 1.376$$

Si un agente vende la opción Lookback en el momento cero por 1.376, puede cubrir su posición corta en la opción de compra.

$$\Delta_0 = \frac{V_1(H) - V_1(T)}{S_1(H) - S_1(T)} = \frac{2.24 - 1.2}{8 - 2} = \frac{1.04}{6} = 0.1733$$

Se paga $0.1733 * 4 = 0.6932$ por cada acción. Para cubrirnos debemos comprar $\Delta_0 * 4 = 0.1733 * 4 = 0.6932$ acciones e invertir $1.376 - 0.6932 = 0.6828$.

5.1. Tema 2

Teoría de la probabilidad en el espacio del lanzamiento de una moneda.

2.1 Espacio de probabilidad finita.

Un espacio de probabilidad finita es usado para modelar una situación en la

cual un experimento aleatorio con muchas posibilidades es conocido. Por ejemplo: lanzar una moneda tres veces.

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, TTH, THT, TTT\}$$

Suponga que la probabilidad de cara es p y cruz es $q = 1 - p$. Asumamos que los lanzamientos son independientes igual que la probabilidad de los elementos ω (secuencias de tres lanzamientos $\omega = \omega_1\omega_2\omega_3$) en Ω son:

$$\begin{aligned} P(HHH) &= p^3 \\ P(HHT) &= p^2q \\ P(HTH) &= p^2q \\ P(THH) &= p^2q \\ P(HTT) &= pq^2 \\ P(TTH) &= pq^2 \\ P(THT) &= pq^2 \\ P(TTT) &= q^3 \end{aligned}$$

Los subconjuntos Ω son llamados eventos, se pueden describir con palabras o con símbolos. Por ejemplo, el evento:

$$\text{"El primer lanzamiento es cara"} = \{\omega \in \Omega : \omega_1 = H\} = \{HHH, HHT, HTH, HTT\}$$

...2.1.3

Se determina la probabilidad del evento al sumar las probabilidades de los elementos en el evento:

$$P(\text{Primer lanzamiento es cara}) = p^3 + p^2q + p^2q + q^2p = P(HHH) + P(HHT) + P(HTH) + P(HTT) = p(p^2 + 2pq + q^2) = p(p + q)^2 = p(1)^2 = p$$

Generalizemos la situación un poco al permitir que Ω sea cualquier conjunto finito, algunos elementos en Ω tengan probabilidad cero.

Definición 2.1.1: Un espacio de probabilidad finita, consiste de un espacio muestral Ω y una medida de probabilidad P . El espacio muestral Ω es un conjunto finito no vacío y la medida de probabilidad P es una función que asigna a cada elemento ω de Ω un número en $[0,1]$ tal que

$$\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1 \quad \text{...2.1.4}$$

Un evento es un subconjunto de Ω y definimos la probabilidad de un evento A

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega) \quad \text{...2.1.5}$$

El conjunto ω es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento, $P(\omega)$ es la probabilidad de que ocurra un resultado particular ω .

$P(A)$ es la probabilidad de que el resultado que ocurre esté en el conjunto A. Si $P(A) = 0$, entonces el resultado es seguro que no se encuentra en A, si $P(A) = 1$, el resultado es seguro que se encuentra en A. Entonces

$$P(\Omega) = 1 \dots (2.1.6)$$

Es claro de (2.1.5) que si A y B son subconjuntos distintos de Ω

$$P(A \subset B) = P(A) + P(B) \dots (2.1.7)$$

5.2. 2.2 Variables aleatorias, distribución y esperanza

Un experimento aleatorio generalmente genera datos numéricos. Lo que eleva al concepto de variables aleatorias.

Definición 2.2.1: Sea (Ω, P) un espacio de probabilidad finita. Una variable aleatoria (v.a.) es una función real valuada definida en Ω .

Ejemplo: Recordemos el espacio Ω de tres lanzamientos independientes y definimos el precio de un activo para las fórmulas.

Insertar Figura 4.

Observe que S_0 no es aleatorio ya que toma el valor de 4, no importando el resultado de la moneda, a esta v.a. se le llama en algunas ocasiones v.a. degenerada.

Se acostumbra escribir el argumento de v.a. como ω aún cuando es una secuencia $\omega = \omega_1\omega_2\omega_3$, por ejemplo $S_3(\omega_1\omega_2\omega_3)$ o $S_3(\omega)$

La distribución de una v.a. es una especificación de las probabilidades que los varios valores de la v.a. toma. Una v.a. no es una distribución y una distribución no es una v.a.

Esto es importante porque el cambio de medida cambia la distribución de las v.a. pero no las v.a. mismas.

Ejemplo: Lanzar una moneda tres veces

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, TTH, THT, TTT\}$$

Define la variable aleatoria:

- $X = \text{Total de caras}$
- $Y = \text{Total de cruces}$
- $X(HHH) = 3$
- $X(HHT) = X(HTH) = X(THH) = 2$
- $X(HTT) = X(THT) = X(TTH) = 1$

- $X(TTT) = 0$
- $Y(TTT) = 3$
- $Y(TTH) = Y(THT) = Y(HTT) = 2$
- $Y(THH) = Y(HTH) = Y(HHT) = 2$
- $Y(HHH) = 0$

Suponga que la medida de probabilidad $\tilde{P}$ donde cara es $\frac{1}{2}$ y la probabilidad de cada elemento de Ω es $\frac{1}{8}$, entonces:

- $\tilde{P}\{\omega \in \Omega : X(\omega) = 0\} = \tilde{P}(TTT) = \frac{1}{8}$
- $\tilde{P}\{\omega \in \Omega : X(\omega) = 1\} = \tilde{P}(HTT) = \tilde{P}(THT) = \tilde{P}(TTH) = \frac{3}{8}$
- $\tilde{P}\{\omega \in \Omega : X(\omega) = 2\} = \tilde{P}(HHT) = \tilde{P}(HTH) = \tilde{P}(THH) = \frac{3}{8}$
- $\tilde{P}\{\omega \in \Omega : X(\omega) = 3\} = \tilde{P}(HHH) = \frac{1}{8}$

Podemos simplificar la notación:

$\tilde{P}\{\omega \in \Omega : X(\omega) = j\}$ por $\tilde{P}\{X = j\}$ entonces:

$$\begin{aligned}\tilde{P}\{X = 0\} &= \frac{1}{8}, \tilde{P}\{X = 1\} = \frac{3}{8} \\ \tilde{P}\{X = 2\} &= \frac{3}{8}, \tilde{P}\{X = 3\} = \frac{1}{8}\end{aligned}$$

Esta tabla de probabilidades donde X toma sus valores registra la distribución de X bajo $\tilde{P}$. Las v.a. Y es diferente de X.

$$\begin{aligned}\tilde{P}\{Y = 0\} &= \frac{1}{8}, \tilde{P}\{Y = 1\} = \frac{3}{8} \\ \tilde{P}\{Y = 2\} &= \frac{3}{8}, \tilde{P}\{Y = 3\} = \frac{1}{8}\end{aligned}$$

Sin embargo su distribución de probabilidad es la misma. El punto aquí es que la v.a. es una función definida en Ω , mientras que su distribución es una tabulación de probabilidad que la v.a. puede tomar.

Suponga que se toma una medida de probabilidad P para Ω que corresponde a $\frac{2}{3}$ de probabilidad de cara y $\frac{1}{3}$ de probabilidad de que caiga cruz. Entonces:

$$\begin{aligned}\tilde{P}\{X = 0\} &= \frac{1}{27}, \tilde{P}\{X = 1\} = \frac{6}{27} \\ \tilde{P}\{X = 2\} &= \frac{12}{27}, \tilde{P}\{X = 3\} = \frac{8}{27}\end{aligned}$$

La v.a. X tiene una distribución diferente bajo P que bajo $\tilde{P}$. Es la misma v.a. ¿Qué pasa con Y?

$$\begin{aligned}\tilde{P}\{Y = 0\} &= \frac{8}{27}, \tilde{P}\{Y = 1\} = \frac{12}{27} \\ \tilde{P}\{Y = 2\} &= \frac{6}{27}, \tilde{P}\{Y = 3\} = \frac{1}{27}\end{aligned}$$