

隨機抽樣的方法

Methods of Random Sampling

Tsai, Dai-Rong

Table of contents

1	隨機抽樣的方法	2
1.1	簡單隨機抽樣 (Simple Random Sampling)	2
1.2	系統性抽樣 (Systematic Sampling)	3
1.3	分層抽樣 (Stratified Sampling)	4
1.4	群集抽樣 (Cluster Sampling)	6
2	信賴區間	8
3	中央極限定理	11

- 研究背景: 某大學去年共有 2,000 名畢業生, 來自 26 個科系 (科系 A-Z)
- 研究目的: 隨機抽樣 100 名畢業生, 推論該所大學學生畢業一年的就業率

```
graduate <- read.csv("data/graduate.csv")
```

```
dim(graduate)
```

```
[1] 2000    3
```

```
head(graduate)
```

	department	id	employment
1	A	1	1
2	A	2	1
3	A	3	0
4	A	4	0
5	A	5	0
6	A	6	1

```
table(graduate$department)
```

```
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T  
57 109 55 103 109 30  76 101  71  59  98  73  70  67  49  95  53  20  62 104  
  U   V   W   X   Y   Z  
111  84  85  99  78  82
```

```
N <- nrow(graduate)
```

```
n <- 100
```

```
set.seed(1) # 使每次執行程式時得到相同的隨機結果
```

1 隨機抽樣的方法

1.1 簡單隨機抽樣 (Simple Random Sampling)

```
sample1_id <- sample(1:N, size = n)
```

```
sample1 <- graduate[sample1_id, ]
```

```
dim(sample1)
```

```
[1] 100  3
```

```
head(sample1)
```

	department	id	employment
1017	N	1017	0
1860	Y	1860	1
679	I	679	1
129	B	129	1
930	L	930	1
1533	U	1533	1

```
# 就業率估計值
```

```
mean(sample1$employment)
```

```
[1] 0.66
```

1.2 系統性抽樣 (Systematic Sampling)

- 每隔 k 筆資料選擇一個樣本點
- 樣本均勻散佈在整個抽樣名單中
- 資料若有週期性, 估計結果會有偏差 (bias)

```
# 計算抽樣間距
k <- N / n
k
```

```
[1] 20
```

```
# 抽樣起始點
start <- sample(1:k, size = 1)
start
```

```
[1] 13
```

```
# 從 start 開始, 每隔 k 筆抽取一人
sample2_id <- seq(from = start, by = k, length.out = n)
sample2_id
```

```
[1] 13 33 53 73 93 113 133 153 173 193 213 233 253 273 293
[16] 313 333 353 373 393 413 433 453 473 493 513 533 553 573 593
[31] 613 633 653 673 693 713 733 753 773 793 813 833 853 873 893
[46] 913 933 953 973 993 1013 1033 1053 1073 1093 1113 1133 1153 1173 1193
[61] 1213 1233 1253 1273 1293 1313 1333 1353 1373 1393 1413 1433 1453 1473 1493
[76] 1513 1533 1553 1573 1593 1613 1633 1653 1673 1693 1713 1733 1753 1773 1793
[91] 1813 1833 1853 1873 1893 1913 1933 1953 1973 1993
```

```
sample2 <- graduate[sample2_id, ]
dim(sample2)
```

```
[1] 100 3
```

```
head(sample2)
```

	department	id	employment
13	A	13	0
33	A	33	1
53	A	53	0
73	B	73	1
93	B	93	1
113	B	113	1

```
# 就業率估計值  
mean(sample2$employment)
```

```
[1] 0.71
```

1.3 分層抽樣 (Stratified Sampling)

- 較小的分層 (strata) 可以增加抽出率, 以保障這些分層有足夠樣本數
- 各分層的樣本平均值進行加權平均, 以估計族群平均值
- 變異數比簡單隨機抽樣小

Warning

各分層樣本平均值之權重, 應該使用目標族群中各分層的比例, 而非抽出樣本的分層比例。

```
# 計算目標族群中各科系人數  
dept_count <- table(graduate$department)  
dept_count
```

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
57	109	55	103	109	30	76	101	71	59	98	73	70	67	49	95	53	20	62	104
U	V	W	X	Y	Z														
111	84	85	99	78	82														

```
# 計算各科系抽樣人數  
# 此處將各科系抽出率設為一致 (n/N), 實際上各分層可以有不同抽出率  
dept_sample_size <- round(dept_count * n / N)  
dept_sample_size
```

```
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
3 5 3 5 5 2 4 5 4 3 5 4 4 3 2 5 3 1 3 5 6 4 4 5 4 4
```

```
# round() 四捨五入之後可能造成總和不等於 100
sum(dept_sample_size)
```

```
[1] 101
```

```
# 產生科系清單
dept_list <- unique(graduate$department)

# 初始化一個空的向量，收集各科系所抽出的 ID
sample3_id <- c()

# 根據各科系指定的樣本數進行隨機抽樣
for(dept in dept_list) {
  # 找出該科系所有學生的資料列
  dept_id <- which(graduate$department == dept)

  # 從該科系隨機抽取指定人數
  dept_id_sampled <- sample(dept_id, size = dept_sample_size[dept])

  # 將各科系所抽出的 id 合併成一個向量
  sample3_id <- c(sample3_id, dept_id_sampled)
}

sample3 <- graduate[sample3_id, ]

# 查看 sample3 各科系人數是否與 dept_sample_size 一致
all.equal(table(sample3$department), dept_sample_size)
```

```
[1] TRUE
```

```
dim(sample3)
```

```
[1] 101 3
```

```
head(sample3)
```

	department	id	employment
21	A	21	1
31	A	31	0
38	A	38	1
74	B	74	1
130	B	130	1
160	B	160	1

```
# 就業率估計值
```

```
sum(tapply(sample3$employment, sample3$department, mean) * proportions(dept_count))
```

```
[1] 0.6632333
```

1.4 群集抽樣 (Cluster Sampling)

- 以群集 (cluster) 為單位隨機抽樣, 抽中的群集中所有成員皆作為樣本
- 若從抽中的群集成員中再進行隨機抽樣, 稱為 二階段抽樣 (two-stage sampling)
- 節省研究經費及時間成本
- 變異數比簡單隨機抽樣大

```
# 產生科系清單
```

```
dept_list <- unique(graduate$department)
```

```
# 隨機抽取 5 個科系
```

```
dept_selected <- sample(dept_list, size = 5)
```

```
sort(dept_selected)
```

```
[1] "F" "I" "Q" "T" "X"
```

```
# 找出這 5 個科系的所有學生
```

```
cluster_id <- which(graduate$department %in% dept_selected)
```

```
length(cluster_id)
```

```
[1] 357
```

```
# 從這些學生中隨機抽取 100 人
sample4_id <- sample(cluster_id, size = n)
sample4 <- graduate[sample4_id, ]

# 檢查 sample4 包含哪些科系
table(sample4$department)
```

```
F I Q T X
5 22 15 28 30
```

```
dim(sample4)
```

```
[1] 100  3
```

```
head(sample4)
```

	department	id	employment
1248	Q	1248	1
1254	Q	1254	0
651	I	651	1
1811	X	1811	0
646	I	646	1
1788	X	1788	0

```
# 就業率估計值
mean(sample4$employment)
```

```
[1] 0.7
```

2 信賴區間

```
p <- mean(sample1$employment)
p + c(qnorm(0.025), qnorm(0.975)) * sqrt(p * (1-p) / n)
```

```
[1] 0.5671548 0.7528452
```

Q. 重複抽樣 100 次, 得到 100 個信賴區間, 有幾個區間會涵蓋就業率的母體真值?

```
# 初始化一個空的矩陣, 包含 3 個 columns, 依序記錄:
# (1) p 的估計值
# (2) p 的信賴區間下界
# (3) p 的信賴區間上界
p_rep <- matrix(nrow = 0, ncol = 3)

# 重複抽樣 100 次
for(i in 1:100) {
  sample1_id <- sample(1:N, size = n)
  sample1 <- graduate[sample1_id, ]

  p <- mean(sample1$employment)
  p_ci <- p + c(qnorm(0.025), qnorm(0.975)) * sqrt(p * (1-p) / n)

  # 合併每一次抽樣所計算出的 p 與 p_ci
  p_rep <- rbind(p_rep, c(p, p_ci))
}

dim(p_rep)
```

```
[1] 100 3
```

```
head(p_rep)
```

```
      [,1]      [,2]      [,3]
[1,] 0.71 0.6210643 0.7989357
[2,] 0.71 0.6210643 0.7989357
[3,] 0.70 0.6101832 0.7898168
```

```
[4,] 0.66 0.5671548 0.7528452
[5,] 0.70 0.6101832 0.7898168
[6,] 0.60 0.5039818 0.6960182
```

```
# 就業率的母體真值
p_true <- mean(graduate$employment)
p_true
```

```
[1] 0.7
```

```
# 標準誤 (standard error)
p_se <- sqrt(p_true * (1 - p_true) / n)
p_se
```


```
[1] 0.04582576
```

```
# 有幾個區間會涵蓋就業率的母體真值 ?
cover_or_not <- (p_true >= p_rep[, 2] & p_true <= p_rep[, 3])
sum(cover_or_not)
```

```
[1] 95
```

```
plot(p_rep[, 1], 1:100, pch = 18, cex = 0.7, xlim = c(0.5, 0.9),
     col = ifelse(cover_or_not, 8, 2),
     main = "95% Confidence Interval",
     xlab = "p", ylab = "number of sample",)
segments(p_rep[, 2], 1:100, p_rep[, 3], 1:100,
         col = ifelse(cover_or_not, 8, 2))
abline(v = p_true, lty = 2)
```

95% Confidence Interval



3 中央極限定理

增加重複抽樣次數至 1000 次, 可更清楚描繪就業率的抽樣分布 (sampling distribution)。

```
p_rep <- matrix(nrow = 0, ncol = 3)

for(i in 1:1000) {
  sample1_id <- sample(1:N, size = n)
  sample1 <- graduate[sample1_id, ]

  p <- mean(sample1$employment)
  p_ci <- p + c(qnorm(0.025), qnorm(0.975)) * sqrt(p * (1-p) / n)

  p_rep <- rbind(p_rep, c(p, p_ci))
}
```

```
# 觀測值
c(Mean = mean(p_rep[, 1]), SE = sd(p_rep[, 1]))
```

Mean	SE
0.6996900	0.0462054

```
# 理論值
c(Mean = p_true, SE = p_se)
```

Mean	SE
0.70000000	0.04582576

```
hist(p_rep[, 1], prob = TRUE, border = "white",
     main = "Sampling Distribution", xlab = "p")
curve(dnorm(x, mean = p_true, sd = p_se), add = TRUE,
     col = 2, lwd = 2, lty = 2)
```

Sampling Distribution

