## Matemática I - comisión 2Primer Parcial - 07/10/2013

## Lógica

1. Verificar que la fórmula

$$(p \to q) \to (p \to (r \to q))$$

es una tautología, demostrando que es equivalente a V.

2. Mostrar la validez del siguiente razonamiento:

$$P \to Q$$

$$\neg R \to (Q \to S)$$

$$R \to T$$

$$\neg T \land P$$

$$Q \land S$$

3. Demostrar la siguiente afirmación

Si la suma de tres números es menor a 60, entonces al menos uno de ellos es menor a 20.

usando el método (directo, contrarrecíproco o absurdo) que creas más conveniente.

4. Consideremos el universo formado por cinco tanguerías de Buenos Aires: Rapsodia, Salambo, TodoTango, Urquiza, Wilches, o sea  $U = \{r, s, t, u, w\}$ ; los predicados:

D(x,y) la tanguería x le ha prestado discos a la y

M(x) la tanguería x tiene piso de madera

J(x) la tanguería x abre los jueves

P(x) la tanguería x está en Pompeya

cuyas extensiones son:

$$p = \{(t, w), (t, s), (r, w), (r, u), (r, t), (u, s)\}$$
$$q = \{s, t, u\}, r = \{s, u, w\}, s = \{t, w\}$$

y los enunciados

- a) En Pompeya no hay ninguna tanguería que tenga piso de madera y que, además, abra los jueves.
- b) Hay, al menos, una tanguería de Pompeya que le ha prestado discos a alguna tanguería con piso de madera que abre los jueves.
- c) Hay , al menos, una tanguería que le ha prestado discos a todas las tanguerías de Pompeya y también a todas las que tienen piso de madera.

Se pide: formalizar los enunciados en lógica de primer orden usando los símbolos de predicado indicados, y analizar el valor de verdad de las fórmulas resultantes en el universo que se presenta **justificando cada valor hallado**.

1

## Conjuntos

1. Encontrar una expresión equivalente a

$$(A\cap C)\cup (A\cap (B\cup \overline{C}))$$

lo más sencilla posible, mediante el uso de propiedades básicas.

- 2. De 40 boy scouts que fueron a un campamento, 14 se cayeron en el lago, 13 se indigestaron con hongos y 16 se perdieron en la excursion del domingo. Fueron 3 los que se indigestaron y se cayeron al lago, 5 los que se cayeron al lago y se perdieron, 8 los que se indigestaron y se perdieron. Los que tuvieron los tres percances fueron 2. Reponder a las siguientes preguntas y dar las expresiones correspondientes a los conjuntos de los cuales se pide el cardinal.
  - a) ¿Cuántos no tuvieron ningún percance?
  - b) ¿Cuantos solamente se cayeron al lago?
  - c) ¿Cuántos tuvieron exactamente dos percances?
  - d) ¿Cuántos de los que tuvieron exactamente 2 percances no se cayeron al lago?
- 3. Demostrar, a partir de las definiciones, que

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$$

## Relaciones

1. Dado el conjunto  $A = \{a, b, c\}$  y las relaciones en A definidas como sigue

$$R = \{(a, a), (a, b), (b, a)\} \qquad S = \{(b, b), (b, a)\}$$

- a) Decidir **justificando** si R es reflexiva, simétrica, transitiva, irreflexiva y/o antisimétrica.
- b) Decidir **justificando** si S es transitiva y/o antisimétrica.
- c) ¿Qué pares hay que agregar necesariamente a S para que sea reflexiva?
- d) ¿Qué pares hay que agregar necesariamente a S para que sea simétrica?
- 2. Respecto del diagrama de Hasse que se muestra a la derecha, se pide:
  - a) Encontrar un subconjunto de 5 elementos que tenga máximo, dos subconjuntos distintos de 3 elementos que no tengan máximo pero sí supremo, dos subconjuntos distintos de 2 elementos que no tengan supremo.
  - b) Dar todos los subconjuntos totalmente ordenados de 3 elementos.
  - c) Agregar un elemento q y relacionarlo con el resto, de modo tal que en el diagrama modificado, el ínfimo de  $\{e, f\}$  sea q, en lugar de n.

